

کنترل علف هرز پیچک صحرایی (*Convolvulus arvensis L.*) در مزارع گندم

Weed control of field bindweed (*Convolvulus arvensis L.*) in wheat field

رضا پورآذر^{۱*} و جواد خلقانی^۲

چکیده:

به منظور بررسی اثر علفکش‌های گلیفوسیت و ۲,۴-D+MCRA علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و ۷ تیمار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (ایستگاه شاپور) در سال‌های زراعی ۸۱-۸۰ و ۸۲ به اجرا درآمد. تیمارهای مورد مطالعه عبارت بودند از: علفکش گلیفوسیت در مقادیر ۰/۴۱۰، ۰/۸۲۰، ۱/۲۳۰ و ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر/هکتار، علفکش ۲,۴-D+MCRA ۰/۴۱۰ کیلوگرم ماده موثر/هکتار، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز. تیمارها حدود ۲۰ روز قبل از برداشت گندم اعمال گردیدند. در بین تیمارهای علفکشی تیمار ۱/۲۳۰ ۲,۴-D+MCRA بیشترین درصد کنترل را به خود اختصاص داد و پس از آن، تیمارهای ۱/۶۴۰ و ۰/۶۴۰ کیلوگرم/هکتار از علفکش گلیفوسیت به ترتیب بیشترین میزان کنترل پیچک را نشان دادند. تیمارهای ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم/هکتار از علفکش گلیفوسیت نتوانستند بخوبی پیچک را کنترل نمایند و از نظر تعداد علف‌های هرز و وزن خشک آن تفاوت معنی داری را با میزان ۱/۶۴۰ کیلوگرم/هکتار گلیفوسیت و ۰/۶۴۰ ۲,۴-D+MCRA نشان دادند. بیشترین میزان رشد مجدد پیچک پس از اعمال تیمارها در تیمارهای شاهد بدون کنترل و علفکش‌های رانداب به میزان‌های ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم/هکتار مشاهده گردید. در سال اول آزمایش به جز تیمار شاهد بدون علف هرز که بالاترین عملکرد را داشت دیگر تیمارهای آزمایش عملکرد یکسانی را به خود اختصاص دادند که دلیل معنی دار نشدن عملکرد در این تیمارها به کنترل پیچک قبل از برداشت گندم بر می‌گردد زیرا در این مرحله از رشد، کنترل علف هرز تاثیری بر عملکرد دانه نخواهد داشت. در سال دوم تیمارهای شاهد با وجین علف هرز، کنترل علف هرز تاثیری بر عملکرد به میزان ۱/۶۴۰ کیلوگرم/هکتار بیشترین عملکرد را داشتند که با دیگر تیمارهای آزمایش تفاوت معنی داری را نشان دادند. در این آزمایش نشان داده شد که تاثیر علفکش ۲,۴-D+MCRA بسیار سریع بوده و پس از ۵ روز تاثیر قاطع آن در کنترل پیچک مشخص گردید در حالی که تاثیر علفکش گلیفوسیت بر روی علف هرز حدود ۱۵ روز بود.

واژه‌های کلیدی: کنترل، ۲,۴-D+MCRA، گلیفوسیت

مقدمه

پیچک صحرایی (*Convolvulus arvensis L.*)، خارشتر (*Alhagi persarum Bossi*)، شیرین بیان (*Glycyrrhiza glabra L.*) و گلرنگ (*Carthamus oxyacantha M.B.*) نقاط استان در زمان برداشت مشکل آفرین

یکی از مشکلات مهم در برداشت گندم در برخی از نقاط کشور وجود علف‌های هرز مزاحم برداشت است. به عنوان مثال در خوزستان علف‌های هرز نی (*Phragmites australis (Cav.) Trin.*)

اگر قبل از آيش تابستانه بکار رود پیچک را بهتر کنترل می کند. در این حالت افزایش عملکرد گندم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بود. از D, 2,4-D و MCPA و مخلوطی از این دو، دایکامبا و گلیفوسیت نیز در کنترل پیچک استفاده می شود. همچنین ترکیب گلیفوسیت و D, 2,4-D نیز می تواند تاثیر رضایت بخشی در کنترل پیچک داشته باشد (Banks *et al.*, 1979). نتایج تحقیقات حاکی از آن است که کاربرد علفکش گلیفوسیت در مزارع گندم، جو، نخود و عدس به صورت قبل از برداشت محصول و در زمانی که رطوبت دانه حدود ۳۰٪ یا کمتر می باشد، می تواند ضمن کنترل موثر علف های هرز چندساله از قبیل قیاق (Sorghum halepense (L.) Pers.), مرغ (Agropyron repens (L.) Beauv.) صحرایی، خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop) و برخی گونه های دیگر سهولت در برداشت محصول را نیز فراهم نماید (Cessna *et al.*, 1994, Darwent *et al.*, 1994 and Donald., 1992., Sheppard., 1984). دارونت و همکارانش (Darwent *et al.*, 1994) با انجام یک مطالعه پنج ساله در سه منطقه کانادا با بکار بردن علفکش گلیفوسیت در مقادیر بین ۱/۸ تا ۱/۴۵ لیتر در هکتار از ماده موثره در مزارع گندم در حدود یک تا دو هفته قبل از برداشت محصول ملاحظه نمودند که تعداد اندام های هوایی علف هرز خارلته نسبت به شاهد بدون کنترل بسته به منطقه مورد آزمایش و میزان گلیفوسیت مصرفی بین ۷۵ تا ۹۸ درصد کاهش یافت. مزارع مذکور در هنگام بهار نیز برای کنترل علف های هرز با علفکش متداول MCPA سمپاشی شده بود. کزنا و

می باشدند. این گونه علف های هرز به دلیل آنکه معمولاً پس از استفاده از علف کش های متداول برای کنترل علف های هرز گندم رشد می کند در حد مطلوبی کنترل نگردیده و در زمان برداشت علاوه بر مزاحمت در کار ماشین های برداشت بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی نیز اثر سوء می گذارند. در این آزمایش علف هرز پیچک صحرایی که در برخی نقاط خوزستان علف هرز مشکل آفرین محسوب می شود مورد مطالعه قرار گرفت. پیچک صحرایی یکی از ده علف هرز مسئله ساز دنیا و بومی اروپاست که از آنجا به سایر مناطق وارد شده است. پیچک در خاک های مرطوب و حاصلخیز رشد می کند و در تابستان های گرم و خشک در زمین های آیش زنده می ماند. در ماه های خشک و بی باران ممکن است در تیرماه به خواب رود ولی سپس مجددآ در شهریور ماه رشد خود را شروع کند نسبت به سرما و یخنیان مقاوم است و با وجودی که قادر است به طریق زایشی از طریق تولید بذر زیاد شود قادر است از طریق سیستم ریشه ای گسترده خود به صورت شعاعی نیز پراکنده شود و تکثیر رویشی حاصل کند. یک گیاه قادر است طی یک فصل رویشی فضایی به قطر ۳ متر و پس از دو فصل رویشی فضایی به قطر ۶ متر را اشغال کرده و تعدادی گیاه جدید نیز تولید کند. پیچک علف هرزی است که در مکان های جدید همواره در حال گسترش است ماشین آلات کشاورزی اغلب اوقات قطعات پیچک را به مناطق جدید حمل می کند (راشد محصل، ۱۳۷۹). گزارشات امریکای شمالی نیز کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصد عملکرد غلات را ناشی از پیچک گزارش داده اند. در مناطق گندم کاری استفاده از 2,4-D

۸۱-۸۲ به اجرا درآمد. تیمارهای مورد مطالعه عبارت بودند از:

- ۱- علفکش گلیفوسیت به میزان ۰/۴۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار
- ۲- علفکش گلیفوسیت به میزان ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار
- ۳- علفکش گلیفوسیت به میزان ۱/۲۳۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار
- ۴- علفکش گلیفوسیت به میزان ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار
- ۵- علفکش ۲,4-D+MCPA به میزان ۱/۳۵۰ گرم ماده موثره در هکتار
- ۶- شاهد بدون علف هرز
- ۷- شاهد با علف هرز

قبل از اعمال تیمارها مزرعه ای که آلدگی شدید به علف هرز پیچک داشت انتخاب گردید و کرت‌هایی به ابعاد ۳۶ متر در نظر گرفته شد و تیمار شاهد بدون علف هرز در محلی انتخاب شد که هیچگونه علف هرزی در آن وجود نداشت. رقم چمران به عنوان رقم غالب گندم کشت شده در منطقه بود که در اواسط پنجه زنی با استفاده از علفکش تری بنورون مدلی به میزان ۱۵ گرم ماده موثر در هکتار و کلودینافوب پروپارژیل به میزان ۶۴ گرم ماده موثر در هکتار بر علیه علف‌های هرز موجود سمپاشی گردیده بود. حدود ۲۰ روز قبل از برداشت گندم کرت‌های آزمایشی بوسیله میخ چوبی مشخص گردید و ارزیابی‌های بعدی در کرت‌های مشخص شده انجام گرفت. عملیات سمپاشی تیمارها با استفاده از سمپاش CP3 پشتی با فشار ۲ بار و میزان ۳۵۰ لیتر آب در هکتار

همکارانش (Cessna *et al.*, 1994) نیز در یک مطالعه دو ساله در چهار منطقه مختلف کانادا با مصرف علفکش گلیفوسیت در مقدار بین ۰/۴۵ تا ۰/۷ لیتر در هکتار از ماده موثره در مرحله قبل از برداشت گندم (در دامنه زمانی که رطوبت دانه بین ۵۲ تا ۱۲ درصد بود) ملاحظه نمودند که میزان باقیمانده این علفکش و عمدۀ ترین متابولیت آن یعنی متیل آمینو متیل فسفونیک اسید (AMPA) در دانه گندم‌های تیمار شده با افزایش میزان مصرفی افزایش اما با کاهش میزان رطوبت دانه کاهش یافت. در حداکثر میزان مصرف علفکش گلیفوسیت یعنی ۰/۷ لیتر در هکتار از ماده موثره در زمانی که رطوبت دانه ۴۰ درصد یا کمتر بود، مقدار باقیمانده مجاز آن ۵ میلی گرم در کیلوگرم بود که از نظر سلامت انسان فاقد تاثیر سوء می‌باشد. در آزمایشی که در مورد استفاده از علفکش‌های گلیفوسیت و دایکامبا بر کنترل علف هرز پیچک صورت گرفت، استفاده از علفکش گلیفوسیت در مرحله برداشت گندم سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه گندم گردید و به خوبی علف هرز پیچک در این مرحله کنترل گردید. در این آزمایش استفاده از علفکش دایکامبا سبب خسارت به محصول گندم گردید (Banks *et al.*, 1979).

مواد و روش‌ها

به منظور بررسی اثر علف کش‌های گلیفوسیت و ۲,4-D+MCPA به صورت قبل از برداشت گندم در کنترل علف هرز پیچک صحرایی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و ۷ تیمار در مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز (ایستگاه شاورور) در دوسال زراعی ۸۰-۸۱ و

با فشار ۲ بار و میزان ۳۵۰ لیتر آب در هکتار (پس از کالیبره کردن) در حدود ۲۰ روز قبل از برداشت گندم (نیمه اول اردیبهشت ماه) انجام گرفت. حدود ۲۰ روز پس از سمپاشی بوسیله دو کادر چوبی ۰/۵*۰/۵ در هر کاره گندم برداشت شد. مربع از هر کرت عملکرد دانه گندم برداشت شد. حدود ۳ ماه پس از اعمال تیمارها (واخر تابستان) میزان رشد مجدد پیچک با استفاده از کادر چوبی ۰/۵*۰/۵ در هر کرت با کف بر کردن پیچک و توزین آن اندازه گیری گردید. در پایان آزمایش سال دوم داده‌های بدست آمده با استفاده از برنامه آماری MSTATC و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن در سطح ۵٪ انجام گرفت.

نتایج و بحث

الف- آزمایش سال اول

تعداد علف هرز

میانگین متوسط تعداد علف‌های هرز در کلیه تیمارها به جز تیمار شاهد بدون علف هرز در حدود ۹۵ بوته در متر مربع بود (شاهد بدون علف هرز به گونه‌ای انتخاب گردید که تعداد پیچک در آن در حدود صفر بود. تعداد علف‌های هرز ۱۷ روز پس از سمپاشی در تیمار شاهد با علف هرز بیشترین مقدار بود که این تیمار با تیمارهای گلیفوستی آماری در یک گروه آماری قرار گرفتند که نشان دهنده عدم کنترل مطلوب تیمارهای علفکشی فوق می‌باشد. کمترین تعداد پیچک مربوط به تیمار شاهد بدون علف هرز ۲,۴-D+MCPA و بیشترین دز مصرفی گلیفوستی به میزان ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده

(پس از کالیبره کردن) انجام گرفت. دو هفته پس از سمپاشی بوسیله دو کادر چوبی ۰/۵ در هر کرت میزان تاثیر سوء علفکش‌ها بر پیچک، تعداد و وزن خشک آن اندازه گیری گردید و از ۴ متر مربع از هر کرت جهت عملکرد دانه گندم برداشت انجام گرفت. پس از برداشت از هر تیمار حدود نیم کیلوگرم بذر گندم جهت تاثیر سوء علفکش بر دانه گندم به موسسه تحقیقات گیاه پزشکی جهت آنالیز دانه فرستاده شد حدود ۳ ماه پس از اعمال تیمارها (واخر تابستان) میزان رشد مجدد پیچک با استفاده از کادر چوبی ۰/۵ در هر کرت با کف بر کردن پیچک و توزین آن اندازه گیری گردید. در پایان آزمایش سال اول داده‌های بدست آمده با استفاده از برنامه آماری MSTATC و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن در سطح ۵٪ انجام گرفت. مزرعه‌ای که در سال اول آزمایش انتخاب گردیده بود بدون تغییر کرت‌های آزمایشی در سال دوم نیز تکرار گردید. در اواخر آبان ۸۲ گندم مجدد اکست گردید و کرت‌ها بوسیله میخ چوبی که از سال قبل مشخص شده یود علامت گذاری گردید. کود مورد نیاز شامل ۲۰۰ کیلوگرم کوداوره (نیمی در ابتدای کشت و نیم دیگر در اواسط پنجه زنی گندم) و ۲۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم در ابتدای کشت به زمین داده شد. در اواسط پنجه زنی با استفاده از علفکش تری بنورون متیل به میزان ۱۵ کیلوگرم/هکتار و کلودینافوپ پروپارژیل به میزان ۶۴ کیلوگرم/هکتار بر علیه علف‌های هرز موجود سempاشی گردید. قبل از اعمال تیمارها در بهار تعداد علف‌های هرز و وزن خشک آنها بوسیله دو کادر چوبی ۰/۲۵ متر مربعی اندازه گیری گردید. عملیات سمپاشی تیمارها با استفاده از سمپاش CP3 پشتی

دادند که در حدود ۹۰ درصد بیشتر از علف کش ۲,4-D+MCPA و شاهد بدون علف هرز بود. اگر چه از نظر تعداد، تیمارهای ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت با شاهد با علف هرز تفاوت معنی داری نداشتند ولی بخاطر ضعیف کردن نسبی علف هرز پس از سمپاشی توسط این دو تیمار علف کشی، وزن خشک پیچک در این دو تیمار بعد از سمپاشی، کمتر از شاهد با علف هرز بود (جدول ۱).

میزان رشد مجدد علف هرز (وزن خشک پیچک)
میزان رشد مجدد پیچک که حدود ۳ ماه پس از برداشت گندم ارزیابی شد در تیمار شاهد با علف هرز بیشترین مقدار بود که با تیمار ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت تفاوت معنی داری نداشت ولی با دیگر تیمارهای آزمایش از نظر آماری معنی دار بود. کمترین میزان رشد مجدد بترتیب مربوط به تیمارهای شاهد بدون و ۱/۲۳۰ گلیفوسیت ۲,4-D+MCPA و ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار بود. تیمارهای ۱/۲۳۰ گلیفوسیت ۲,4-D+MCPA و ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. بدلیل سیستمیک بودن علف کش‌های مورد استفاده و تاثیر روی اندام‌های زیر زمینی پیچک، میزان رشد مجدد در تیمارهای فوق کمترین میزان بود. همچنین بدلیل کافی نبودن میزان ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت برای کنترل پیچک، دو تیمار فوق تاثیر ناچیزی بر اندام‌های زیر زمینی علف هرز داشت که میزان بالای رشد مجدد آن نشان دهنده این موضوع است (جدول ۱).

موثر در هکتار بود که این تیمارها نیز از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند و نشان داد که این تیمارها می‌توانند بخوبی علف هرز را کنترل نمایند. بین تیمارهای ۳ و ۴ و شاهد بدون علف هرز نیز تفاوت معنی داری دیده نشد و نشان داد که میزان ۱/۲۳۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار از علفکش گلیفوسیت نیز می‌تواند پیچک را بخوبی کنترل نماید (جدول ۱). در بین تیمارهای علفکشی از نظر تعداد علف هرز پس از سمپاشی کمترین مقدار به علف کش ۲,4-D+MCPA داشت (در حدود ۱۰۰٪ پیچک را کنترل نمود).

وزن خشک علف هرز
بیشترین و کمترین وزن خشک پیچک پس از سمپاشی بترتیب مربوط به تیمار شاهد با علف هرز و ۲,4-D+MCPA ۱/۲۳۰ بودین تیمارهای شاهد بدون علف هرز و ۲,4-D+MCPA تفاوت معنی داری دیده نشد. بخاطر کنترل مطلوب علف هرز پیچک توسط این علف کش، وزن خشک علف هرز پس از سمپاشی نیز کمترین مقدار بود و نتیجه حاضر در مورد وزن خشک قابل پیش‌بینی بود. تیمارهای ۱/۲۳۰ و ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار علف کش گلیفوسیت نیز در یک گروه آماری قرار گرفتند و پس از تیمارهای شاهد با و ۱/۶۴۰ کمترین تعداد علف هرز را داشتند. وزن خشک پیچک در تیمار ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت از نظر آماری در یک گروه آماری قرار گرفتند که با دیگر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری داشتند. این تیمارها وزن خشک بالای (در حدود ۹۰ گرم در متر مربع) از پیچک را به خود اختصاص

تعداد علفهای هرز بعد از سمپاشی:

پس از اعمال تیمارهای علف کش بالاترین تاثیر بر کنترل پیچک مربوط به تیمار 2,4-D+MCPA 2,4-D+MCPA بود که با دیگر تیمارهای آزمایش تفاوت معنی داری داشت و نسبت به تعداد علف هرز قبل از سمپاشی حدود ۹۶ درصد پیچک کنترل گردید. تیمار گلیفوسیت ۱/۲۳۰ و ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار نیز بترتیب ۶۶ و ۸۸ درصد پیچک را کنترل نمودند. کمترین درصد کنترل مربوط به تیمارهای ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت بود که بترتیب ۱۶ و ۲۱ درصد پیچک را کنترل نمودند (جدول ۲). علفکش 2,4-D+MCPA ضمن آنکه بالاترین درصد کنترل را نشان داد بسیار سریعتر (در حدود ۵ روز) نیز علف هرز پیچک را از بین برد این این میزان در تیمارهای گلیفوسیت بین ۱۵ تا ۲۰ روز بود.

وزن خشک علف هرز در بهار (قبل از سمپاشی)
تیمارهایی که در سال اول آزمایش توانستند بخوبی علف هرز پیچک را کنترل نمایند کمترین وزن خشک را در این نمونه گیری داشتند. وزن خشک پیچک قبل از سمپاشی در تیمارهای ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت بیشترین مقدار بود که با یکدیگر نیز تفاوت معنی داری نداشتند. کمترین وزن خشک در بین تیمارهای علف کش مربوط به علفکش 2,4-D+MCPA ۱/۶۴۰ بود که به جز با تیمار ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار با دیگر تیمارها تفاوت معنی داری داشت (جدول ۲).

بدلیل آنکه در سال اول آزمایش علف کش‌های 2,4-D+MCPA و گلیفوسیت ۱/۶۴۰ کیلوگرم

عملکرد دانه

بدلیل آنکه تیمارهای علفکشی قبل از برداشت و زمانی که رطوبت دانه‌ها در حدود ۳۰٪ بود استفاده گردید هیچگونه تاثیری بر عملکرد دانه نداشتند و به جز تیمار شاهد بدون علف هرز (به گونه‌ای انتخاب گردید که تقریباً علف هرزی در آن وجود نداشت) تیمارهای دیگر آزمایشی از نظر عملکرد با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. (جدول ۱).

ب-آزمایش سال دوم

تعداد علفهای هرز قبل از سمپاشی
بیشترین تعداد علف هرز پیچک مربوط به تیمار بدون وجین علف هرز بود (۱۲۲ بوته در متر مربع) که با دیگر تیمارهای آزمایش تفاوت معنی داری داشت و کمترین تعداد مربوط به تیمار گلیفوسیت ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتاربود که با دو تیمار گلیفوسیت ۱/۲۳۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار و 2,4-D+MCPA ۲,۴-۲,۴-D+MCPA تفاوت معنی داری نداشت (جدول ۲). استفاده از علف کش‌های فوق در سال اول آزمایش تراکم علف هرز را کاهش داده است ولی در تیمار بدون وجین علف هرز که سال اول آزمایش نیز سمپاشی نگردیده بود تراکم علف هرز پیچک در حدود ۳۰٪ افزایش یافته بود که می‌تواند از طریق بذر و ریزوم انجام گرفته باشد. بین دو تیمار گلیفوسیت ۰/۸۲۰ و ۱/۲۳۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار تفاوت معنی داری دیده نشد که با دیگر تیمارهای آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت تعداد علف هرز پیچک بیشتر از تیمار ۱/۶۴۰، 2,4-D+MCPA ۲,۴-۲,۴-D+MCPA کیلوگرم ماده موثر در هکتار بود که عدم کنترل مطلوب پیچک در سال اول آزمایش دلیل آن بود.

گیری شد و نتایج این مرحله از نمونه گیری نشان داد که بیشترین میزان وزن خشک پیچک مربوط به تیمار شاهد با علف هرز بود که این تیمار با تیمار ۰/۴۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت تفاوت معنی داری نداشت. بدلیل آنکه در دو سال مصرف ۰/۴۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت کمترین تاثیر را روی علف هرز پیچک داشت طبیعی بنظر می‌رسید که در این مرحله نیز بیشترین وزن خشک را داشته باشد.

کمترین میزان وزن خشک پیچک مربوط به ۲,4-D+MCPA بود که با تیمار شاهد با وجین علف هرز و گلیفوسیت ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (جدول ۱/۶۴۰). علفکش ۲,4-D+MCPA و گلیفوسیت ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار در این آزمایش بیشترین کنترل را به خود اختصاص دادند و کمترین وزن خشک علف هرز در مراحل بعد از سپاهشی و رشد مجدد علف هرز نیز نتیجه کنترل مطلوب پیچک توسط این دو علف کش بود.

عملکرد گندم
در تیمارهایی که در طول فصل رشد علف هرز پیچک با گندم رقابت می‌کرد کمترین عملکرد را داشتند. تیمارهای شاهد با علف هرز و ۰/۸۲۰ و ۰/۴۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت در سال دوم آزمایش کمترین عملکرد را داشتند که با یکدیگر نیز تفاوت معنی داری نداشتند. همچنین تیمارهای شاهد با وجین علف هرز، ۱/۶۴۰ ۲,4-D+MCPA و گلیفوسیت ۱/۶۴۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار بیشترین عملکرد را

ماده موثر در هکتار بیشترین کنترل را داشتند و همچنین میزان رشد مجدد آنها در تابستان کم بود این نتیجه دور از انتظار نبود. تیمارهایی که در سال اول نتوانستند به خوبی علف‌های هرز را کنترل کنند وزن خشک آنها نیز در این مرحله بیشترین مقدار بود.

وزن خشک پیچک پس از سپاهشی
نتایج حاصل از وزن خشک پیچک در زمان برداشت گندم گندم نشان داد که علفکش ۲,4-D+MCPA کمترین وزن خشک را در بین تیمارهای آزمایش دارد بگونه‌ای که با تیماری که بدون علف هرز انتخاب گردیده بود تفاوت معنی داری نداشت، میزان کاهش وزن خشک نسبت به قبل از استفاده از علف کش در حدود ۹۲ درصد بود. بیشترین وزن خشک نیز به تیمار شاهد (بدون وجین علف‌های هرز) که بدلیل عدم استفاده از علف کش این نتیجه طبیعی بنظر می‌رسد. پس از علفکش ۲,4-D+MCPA، تیمار گلیفوسیت بیشترین کاهش وزن خشک پس از سپاهشی را به خود اختصاص داد. در این تیمار وزن خشک در حدود ۷۵ درصد کاهش پیدا کرد و در تیمار ۱/۲۳۰ کیلوگرم ماده موثر در هکتار نیز میزان کاهش ۳۵ درصد بود. تیمارهای ۰/۴۱۰ و ۰/۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار گلیفوسیت در حدود ۶ درصد وزن خشک را کاهش داد که نشان داد که این دو میزان از علف کش نمی‌تواند علف هرز پیچک را کنترل نماید (جدول ۲).

میزان رشد مجدد علف هرز (وزن خشک پیچک در تابستان)

در حدود ۳ ماه پس از اعمال تیمارها (در تابستان ۱۳۸۲) میزان رشد مجدد علف هرز پیچک اندازه

"کترل علف هرز پیچک صحراوی (*Convolvulus arvensis* L.) در ..."

در صد عملکرد بیشتری نسبت به تیمار شاهد با علف هرز داشتند (جدول ۲).

داشته که از نظر آماری نیز با یکدیگر تفاوتی نداشتند.

علفکش‌های 2,4-D+MCPA و گلیفوست ۴۵ کیلوگرم ماده موثر در هکتار در حدود ۱/۶۴۰

جدول ۱: تاثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد گندم (تن در هکتار)، تعداد علف هرز بعد از سمپاشی (بوته در متر مربع)، وزن خشک علف هرز (گرم در متر مربع) و میزان رشد مجدد پیچک (گرم در متر مربع).

Table 1. Effect of trial treatments on yield of wheat (t/ha), number of weed after spray (plant/m²), dry matter (g/m²) and regrowth (g/m²) weed.

تیمارهای آزمایش Experiment treatments	عملکرد گندم (تن در هکتار) yield of wheat (t/ha)	تعداد علف‌های هرز بعد از سمپاشی (بوته در متر مربع) Number of weeds after spray (plant/m ²)	وزن خشک علف‌های هرز (گرم در متر مربع) Dry matter (g/m ²)	میزان رشد مجدد پیچک (گرم در متر مربع) regrowth (g/m ²) weed
شاهد با علف هرز Weed infestation	4.63 b	94.33 a	116.8 a	37.30 a
شاهد بدون وجین Weed free	6.03 a	3.67 d	6.80 d	7.24 e
2,4-D+MCPA	4.53 b	1.00 d	3.63 d	12.63 d
گلیفوست ۴۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 410 g ai /h	4.33 b	94.33 a	83.57 b	24.40 b
گلیفوست ۸۲۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 820 g ai /h	5.07 b	82.33 b	82.70 b	25.47 b
گلیفوست ۱۲۳۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 1230 g ai /h	4.60 b	17.67 c	24.87 c	17.60 c
گلیفوست ۱۶۴۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 1640 g ai /h	4.67 b	4.67 d	22.27 c	13.90 d

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون، اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۵ ندارند

Mean within a column followed by same letters are not significantly difference at $\alpha=0.05$

جدول ۲: تاثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد گندم (تن در هکتار)، تعداد پیچک قبل و بعد از سمپاشی (بوته در متر مربع)، وزن خشک پیچک قبل و بعد از سمپاشی (گرم در متر مربع) و میزان رشد مجدد پیچک (گرم در متر مربع).

Table 2. Effect of trial treatments on yield of wheat (t/ha), number of weed before and after spray (plant/m²), dry matter weed before and after spray (g/m²) and regrowth (g/m²) weed.

تیمارهای آزمایش						
Experiment treatments						
میزان رشد مجدد پیچک در تابستان (گرم در متر مربع)	وزن خشک پیچک بعد از سمپاشی (گرم در متر مربع)	Dry matter of weeds before spray (plant/m ²)	وزن خشک پیچک قبل از سمپاشی (گرم در متر مربع)	Dry matter of weeds before spray (plant/m ²)	تعداد علف‌های هرز بعد از سمپاشی (بوته در متر مربع)	تعداد علف‌های هرز قبل از سمپاشی (بوته در متر مربع)
46.17 a	139.1 a	131 a	135.3 a	122.7 a	3.53 c	شاهد با علف هرز Weed infestation
9.76 d	6.07 f	5 e	18.33 e	16.67 d	6.36 a	شاهد بدون وجین Weed free
8.96 d	5.86 f	57.03 d	3 g	81.33 c	6.06 a	توفوردی+ام ث پ ای 2,4-D+MCPA
43.27 a	106 b	112.9 b	78.67 b	93.33 b	3.67 c	گلیفوسیت ۰/۴۱۰ کیلو گرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 410 g ai /h
28.50 b	95.53 c	108.7 b	73.67 c	93.4 b	4.10 c	گلیفوسیت ۰/۸۲۰ کیلو گرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 820 g ai /h
16.27 c	52.93 d	80 c	27 d	80 c	4.83 b	گلیفوسیت ۱/۲۳۰ کیلو گرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 1230 g ai /h
8.90 d	18.67 e	69.37 cd	9.33 f	78.33 c	5.93 a	گلیفوسیت ۱/۶۴۰ کیلو گرم ماده موثره در هکتار Glyphosate 1640 g ai /h

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون، اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۵ ندارند

Mean within a column followed by same letters are not significantly difference at $\alpha = 0.05$

"کنترل علف هرز پیچک صحراوی (*Convolvulus arvensis* L.) در ..."

فهرست منابع

Reference

آمارنامه کشاورزی. ۱۳۸۱. سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.

راشد محصل، م.ح. ۱۳۷۹. پیچک. جهاد دانشگاهی مشهد. ۱۵ صفحه.

- Banks, A., L. V. Hill and P. W. Santelmann.** 1979. Control of Field Bindweed (*Convolvulus arvensis*) in Winter Wheat (*Triticum aestivum*) with Foliar and Subsurface Layered Herbicides, by P. A. Banks, L. V. Hill and P. W. Santelmann. Weed Sci.
- Cessna, A. j., A. L. Darwent, K. J. Kirkland, L. Towneley-Smith, K. N. Harker, and L. P. Lefkovitch.** 1994. Residues of glyphosate and its metabolite AMPA in wheat seed and foliage following preharvest applications. Can. J. Plant Sci. 74: 653-661.
- Darwent, A. L., K. J. Kirkland, M. N. Baig, and L. P. Lefkovitch.** 1994. Preharvest applications of glyphosate for Canada thistle (*Cirsium arvense*) control. Weed Technol. 8: 477-482.
- Donald, W. W.** 1992. Fall applied herbicides for Canada thistle (*Cirsium arvense*) root and root bud control in reduced tillage spring wheat. Weed Technol. 6: 252-261.
- Kirkland, K. J.** 1990. Preharvest quackgrass (*Agropyron repens*) control. Proc. Quackgrass Symp. London, ON. P. 127-134.
- Sheppard, B. W., M. C. Richards, and J. A. Pascal.** 1984. Agronomic effects from the control of *Agropyron repens* in barley by preharvest application of glyphosate. Weed Res. 24: 9-16.