

شناسایی مولکولی ژنهای حدت ompT، iss و iroN در جدایه‌های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع جوجه گوشتی استان گلستان

پیام حقیقی خوشخوا^{۱*}، سعید مخبری^۲

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

۲- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

*توسطنده مسئول: pkhoshkho@kiau.ac.ir

دوره سوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۱

صفحات ۱۴۳-۱۵۰

چکیده

از آنجایی که اشریشیا کلی‌های پاتوزن طیور مسئول ضررها اقتصادی قابل توجهی به صنعت پرورش طیور هستند لذا شناخت مولکولی و تعیین فراوانی عوامل حدت آنها می‌تواند زمینه ساز برای روش‌های پیشگیرانه همچون ساخت واکسن باشد. توانایی سوبه‌های اشریشیاکلی در بیماری زایی به واسطه داشتن عوامل حدت متنوعی می‌باشد که توسط ژنهای مختلف بیان می‌شوند. در این مطالعه تعداد ۶۰ جدایه اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز مزارع جوجه گوشتی استان گلستان انتخاب و پس از استخراج DNA به روش جوشاندن، حضور و فراوانی سه ژن مرتبط به حدت iroN، ompT و iss به کمک روش multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفت. ژن iss یکی از مهمترین ژنهای شناسایی شده در مقاومت به سرم می‌باشد. iroN در بیان سیستم اکتساب آهن نقش دارد و ompT سبب بیان پروتئازی می‌شود که در غیرفعال سازی کلی سین نقش دارد. فراوانی ژنهای iroN، iss و ompT به ترتیب ۳۸/۳٪، ۲۳/۳٪ و ۴۰٪ بود. آمد و در ۳۵٪ جدایه‌ها این سه ژن به طور همزمان وجود داشتند. با توجه به این نتایج و وجود تنوع در فراوانی این ژنهای در مناطق مختلف دنیا به نظر می‌رسد که عوامل حدت اشریشیاکلی در مناطق مختلف دنیا با هم متفاوت باشند زیرا عوامل حدت، پدیده‌ای چند عاملی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که این جدایه‌ها، اشریشیاکلی‌های فرست طلبی بوده‌اند که به دلیل وجود عوامل مستعد کننده توائسته‌اند سبب بیماری شوند.

واژه‌های کلیدی: اشریشیاکلی، کلی باسیلوز، ژنهای حدت، شناسایی مولکولی، ایران



JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

J.Vet.Clin.Res 3(3)143-150, 2012

Molecular detection of the iss, ompT and iroN genes in *E. coli* isolated from cases of avian colibacillosis in commercial broilers of Golestan province, Iran

Haghghi Khoshkho P.^{*1}, Mokhayeri S.²

1- Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2- Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

* Corresponding author: pkhoshkho@kiau.ac.ir

Abstract

Avian pathogenic *E. coli* (APEC) are responsible for significant economic losses in chicken industry, thus identification of virulence genes and their prevalence can be helpful to preventative methods such as productions of vaccine. The pathogenicity of APEC strains is due to a variety of several virulence factors that expressed by several genes. In this study, 60 *E.coli* strains were selected from cases of avian colibacillosis in commercial broilers from Golestan province. DNA was extracted by boiling method and three important virulence genes, iss, ompT and iroN, were detected by multiplex PCR. iss is one of the important gene in increased serum survival. iroN involves in iron acquisition mechanism and ompT encodes protease, which has been shown to cleave colicins. Prevalence of iss, ompT and iroN genes were detected in 38/3%, 43/3% and 40% of isolates respectively and 35% of isolates were positive for the presence of three genes altogether. With regard to final results and the existence of varieties in frequency of these genes in different parts of the world it concluded that virulence factors were different in different parts of the world because virulence factors are multifactorial phenomenon. It seems that these isolates are opportunistic *E.coli* and because of existence of predisposing factors they could cause disease in poultry.

Key words: Escherichia coli, Avian colibacillosis, Virulence genes, Molecular detection, Iran

مواد و روش کار	مقدمه
<p>نمونه های باکتری: ۶۰ جدایه اشريشياکلی از بانک باکتریابی بخش بیماری های طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انتخاب شد. این ۶۰ جدایه برگرفته از یک مطالعه بر روی الگوی مقاومت آنتی باکتریال در اشريشياکلی های جدا شده از جوجه های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز در استان گلستان بود(۱). در مطالعه فوق ۱۵۰ نمونه اشريشياکلی پس از تایید کلی باسیلوز بر مبنای علایم بالینی و كالبدگشایی، از خون قلب های مبتلا به پریکاردیت جوجه های گوشتی ۳۰ مزرعه (۵ نمونه از هر مزرعه) بر روی محیط مک کانکی (Merck Co, Germany) جدا شد و سپس با تست های بیوشیمیایی اختصاصی به تایید رسید. برای مطالعه حاضر نیز به طور اتفاقی دو نمونه اشريشياکلی از هر مزرعه (مجموعاً ۶۰ نمونه) انتخاب شد و در محیط کشت مغز و قلب (Brain Heart Broth=BHB, Merck Co, Germany) کشت و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شد.</p> <p>استخراج DNA: برای استخراج DNA از روش boiling استفاده شد. $1\mu\text{l}$ از اشريشياکلی رشد کرده در محیط BHB با $1\mu\text{l}$ $400\text{ }\mu\text{l}$ آب مقطر دو بار تقطیر مخلوط و در بن ماری ۱۰۰ درجه سانتی گراد بمدت ۱۰ دقیقه قرار داده شد. سپس DNA های استخراج شده به فریزر -20°C درجه سانتی گراد انتقال داده شدند تا از آنها به عنوان الگو استفاده شود.</p> <p>واکنش زنجیره ای پلی مراز به روش Multiplex مشخصات سه ژن هدف و پرایمرهای آنها در جدول ۱ آورده شده است(۱۲). واکنش PCR Multiplex در حجم نهایی $1\mu\text{l}$ با واکنشگر های PCR (جدول ۲) انجام شد. لازم به ذکر است که در این واکنش سه جفت پرایمر به طور همزمان استفاده شده است.</p>	<p>اشريشياکلی های پاتوژن طیور (Avian Pathogenic Escherichia coli=APEC) سبب بیماری های متنوعی در طیور می شوند که مسئول ضررهای اقتصادی قابل توجهی به صنعت طیور هستند(۸,۹). بیماری زایی سویه های مختلف APEC به واسطه بیان عوامل حدت متنوعی است (۸) که مهمترین آنها شامل چسبندگی، تولید توکسین، محافظت، مکانیسم های اکتساب آهن و تهاجم است(۳) و ژنهای متعددی مسئول بیان این فاکتورهای حدت می باشند. تعداد این ژنهای را تا ۴۶ عدد عنوان می کنند(۱۲) با این حال اکثر مطالعات حدود ۵ ژن iss, ompT, iroN, hlyF, iutA را که توسط پلاسمید حمل می شوند(۱۱,۱۲,۱۳) در تفریق جدایه های APEC از اشريشياکلی های مدفوعی طیور (Avian Fecal Escherichia coli=AFEC) کمک کننده می دانند و مطالعه بر روی این ۵ ژن را هم ارزش ژنتیپینگ ۴۶ ژن حدت می دانند(۱۲).</p> <p>ژن iss که پروتئین ISS را بیان می کند(۳) در مقاومت به APEC نقش دارد و به میزان بالاتری در جدایه های سرم نقص دارد و در میزان بالاتری در جدایه های AFEC جدا شده از پرندگان سالم وجود دارد (۱۴,۱۵,۱۲,۱۱,۷,۳). پروتئین ISS از رسوب کمپلکس حمله کمپلمان، با مکانیسم ناشناخته ای جلوگیری می کند(۷). ژن iroN که پروتئین IroN را بیان می کند به عنوان گیرنده سیدرفور عمل می کند و در مکانیسم اکتساب آهن دخالت دارد و ژن ompT سبب بیان OmpT می شود که نوعی پروتئین شکافتن کلی E1, E2, E3 و دخالت دارد(۱۸).</p> <p>گزارشی از میزان فراوانی ژنهای iroN و ompT در ایران تا به حال وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سه ژن مربوط به حدت iss, ompT و iroN در اشريشياکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز در سطح مزارع پرورشی جوجه گوشتی استان گلستان به کمک روش multiplex PCR بوده است.</p>

جدول ۱: سکانس پرایمرها و خصوصیات سه ژن مورد نظر

خصوصیات (فرانس)	سکانس پرایمر	اندازه قطعه (bp)	ژن
Episomal increased serum survival gene (۱۷)	۵'-CAGCAACCGAACCACTTGATG AGCATTGCCAGAGCGGCAGAA-3'	۲۲۳	iss
Episomal outer membrane protease gene (۱۷)	۵'-TCATCCCGAAGCCTCCCTCACTACTAT TAGCGTTGCTGCACTGGCTTGTATAC-3'	۴۹۶	ompT
Salmochelin siderophore receptor gene (۱۷)	۵'-AATCCGGCAAAGAGACGAACCGCCT GTTCGGGCAACCCCTGCTTGACTTT-3'	۵۵۳	iroN

جدول ۲: واکنشگرهای PCR

2.5 µl	10x PCR Buffer
0.3 µl	Taq DNA polymerase (5 U/µl) (Cinna Gen Co, Iran)
1 µl × 3	Forward Primer (20 pmole/µl)
1 µl × 3	Reverse Primer (20 pmole/µl)
1.5 µl	MgCl ₂ (50 mM)
1.5 µl	dNTP (10 mM) (Cinna Gen Co, Iran)
9.2 µl	dd H ₂ O
4 µl	Template DNA
25	Total volume

شانه گذاری شد. بعد از سفت شدن ژل، شانه خارج و ژل در دستگاه الکتروفورز قرار داده شد و بافر TBE تا پوشاندن کامل ژل در تانک ریخته شد. ۱۰ میکرولیتر از محصول PCR با یک میکرولیتر از بافر بار گذاری (Loading buffer) مخلوط و در گوده های ژل قرار داده شد. سپس الکترودها به منع تغذیه متصل و ژل در جریان ثابت ۱۰۰ ولت به مدت ۹۰ دقیقه قرار گرفت و نهایتاً ژل در ظرف مخصوص رنگ آمیزی حاوی ۰/۵ میکرولیتر در میلی لیتر اتیدیوم بر ماید به مدت ۲۰ دقیقه قرار داده شد و بعد از شستشو با آب مقطر، تحت نور UV حضور باند رویت و با دستگاه عکس برداری یو وی فلورسانس (Felix® 5050 Model, Biostep Co., Germany) عکس گرفته شد. لازم به ذکر است که از کنترل منفی و مارکر DNA (DNA ladder, 100 bp, Fermentas Co., Spain)

میکرو تیوب ها در ترموسایکلر (Swift maxi Model, ESCO Co, Singapour) قرار گرفت و برنامه حرارتی زیر برای آن اعمال شد: مرحله واسپرشن اولیه در ۹۴ درجه سانتی گراد بمدت ۲ دقیقه و سپس اجرای ۲۵ سیکل ۳ مرحله ای شامل: ۹۴ درجه سانتی گراد بمدت ۳۰ ثانیه (واسپرشن)، ۶۳ درجه سانتی گراد بمدت ۳۰ ثانیه (اتصال)، ۶۸ درجه سانتی گراد بمدت ۳ دقیقه (طویل شدن) و نهایتاً طویل شدن نهایی در ۷۲ درجه سانتی گراد بمدت ۱۰ دقیقه انجام شد.

الکتروفورز: جهت شناسایی و رویت محصول PCR از الکتروفورز (EPS-600Z, Paya pajooohesh pars Co, Iran) نمونه ها در روی ژل و بافر TBE استفاده شد. برای تهیه آگار ۱٪ ژل آگاروز با خلوص بالا (Ultra pure agarous) در بافر TBE با حرارت حل شده و سپس در قالب ریخته و

شناسایی مولکولی ژنهای حدت ompT, iss و iroN در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع ...

که ژن iss در ۲۳ جدایه (%۳۸/۳)، ژن ompT در ۲۶ جدایه مقایسه استفاده شد.

و ژن iroN در ۲۴ جدایه (%۴۰) موجود می باشد.

همچنین ۲۱ جدایه از ۶۰ جدایه (%۳۵) حاوی هر سه ژن

بودند در ۳۴ جدایه از ۶۰ جدایه (%۵۶/۶) هیچ کدام از این

ژنهای حدت وجود نداشتند. ۲ جدایه از ۶۰ جدایه (%۳/۳)

واجد ژنهای iss و ompT و فاقد ژن iroN بود و ۳ جدایه

از ۶۰ جدایه (%۵) از نظر وجود ompT و iroN مثبت بود


در حالی که ژن iss را نداشتند (جدول ۳ و تصویر شماره ۱).

نتایج

مشاهده باند های DNA و مقایسه آن با مارکر DNA با سایز باندهای ذکر شده در مقالات با این پرایمرهای محتوانی داشت. بر این اساس، سایز باند DNA برای ژن iss ۳۲۳ جفت باز، برای ژن ompT ۴۹۶ جفت باز و برای ژن iroN ۵۵۳ جفت باز بود. بررسی فراوانی این ۳ ژن حدت در ۶۰ جدایه از APEC ایران با تکنیک Multiplex PCR نشان داد

جدول ۳: چهار گروی فراوانی ژنهای حدت ompT, iss و iroN در جدایه های E.coli مورد مطالعه

شماره الگو	الگوی فراوانی	جدایه (درصد)
۱	iss ⁺ iroN ⁺ ompT ⁺	۲۱(% ۳۵)
۲	iss ⁺ iroN ⁻ ompT ⁺	۲(% ۳/۳)
۳	iss ⁻ iroN ⁺ ompT ⁺	۳(% ۵)
۴	iss ⁻ iroN ⁻ ompT ⁻	۳۴(% ۵۶/۶)



تصویر ۱ - محصول PCR ژنهای حدت ompT, iss و iroN در جدایه های E.coli در حضور مارکر DNA {۱: کنترل منفی، ۲ و ۴: ژنهای حدت iroN و iss و ompT و ۳: ژنهای حدت iroN, iss, ompT, iron, DNA مارکر باز، ۷: مارکر باز، باند درخشنان ۵۰۰ جفت باز می باشد}.

بحث و نتیجه گیری

فراوانی این ژن در این مطالعه $38/3$ درصد می‌باشد. فراوانی ژن‌های *ompT*, *iroN* به ترتیب در APEC در سه مطالعه در آمریکا $88/2$ - $80/5$ - $85/4$ درصد (۱۸)، درصد $70/5$ - $85/2$ - $78/5$ درصد (۱۲) گزارش شده است. این در حالی است که در این مطالعه فراوانی این ژنها به ترتیب $39/3$ - $42/6$ - $36/7$ درصد بدست آمده است. فراوانی *E.coli* در این مطالعه جدأ شده از موارد عفونی انسان معطوف شده که این امر نیازمند شناخت ژنهای حدت و تعیین فراوانی آنها در هر منطقه می‌باشد (۱۱,۷).

اگرچه در این مطالعه در $56/6$ درصد موارد APEC هیچ کدام از این سه ژن یافت نشدند، *Delicato* و همکاران هم گزارش کردند که در $27/5$ درصد جدایه‌ها هیچ کدام از هفت ژن معروف حدت وجود نداشتند (۶).

اگرچه این ژنها (*iss*, *ompT*, *iroN*) نقش مهمی در پاتوژنیته بازی می‌کنند، در فراوانی ژنهای حدت APEC در مناطق مختلف دنیا گزارشات و یافته‌های متنوعی موجود است (۲۰). به نظر می‌رسد در تفسیر این تفاوت‌ها دلایل زیر دخیل باشند:

۱- از آنجایی که موقع بیماری نتیجه‌ی تداخلات میزبان - عامل بیماری زا و محیط است، تغییر در یکی از این موارد میتواند بر موقع و شدت بیماری تاثیر گذار باشد. از آنجایی که هیچ کدام از این سه ژن حدت در $56/6$ درصد موارد یافت نشد، احتمالاً این اشریشیاکلی‌ها، از نوع فرصت طلب (Opportunistic) هستند که به علت وجود عوامل مستعد کننده بیماری یا شرایط نامطلوب محیطی و پرورشی توائسته‌اند منجر به بیماری شوند (۱۲). بر این اساس پیشنهاد می‌شود که نقش عوامل مستعد کننده و شرایط محیطی بر شدت کلی باسیلوز و فراوانی ژنهای حدت در موارد APEC بررسی شود.

۲- عوامل حدت، پدیده‌ای چند عاملی (Multifactorial phenomenon) با کنش- واکنش بر هم‌دیگر هستند (۲۱) برای مثال مقاومت اشریشیاکلی به کمپلمان مربوط به چندین فاکتور ساختاری از جمله کپسول، بخصوص *k* کپسول، لایه LPS و پروتئین‌های غشاء خارجی از جمله *TraT*, *ISS* و *ompA* است (۳). بنابراین

پیشگیری و کنترل کلی باسیلوز در طیور با استفاده از درمان‌های ضد میکروبی و بهینه سازی محل پرورش و شرایط مدیریتی امکان پذیر است با این حال به دلیل افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها و خطر باقیمانده دارویی در تولیدات طیور امروزه توجه به روش‌های جایگزین مانند ساخت واکسن معطوف شده که این امر نیازمند شناخت ژنهای حدت و تعیین فراوانی آنها در هر منطقه می‌باشد (۱۱,۷).

در مطالعات متعددی ارتباط بین حدت جدایه‌های APEC و وجود *ColV* پلاسمیدی نشان داده شده است (۱۱,۷). یک ناحیه 93 kb از *ColV* پلاسمید شناخته شده که شامل چندین ژن و اپران از جمله *ompT*, *iss* و *salmochelin* (*iroBCDN* operon) می‌باشد که در حدت نقش دارد (۱۱). مطالعات نشان داده که فراوانی سه ژن *T*, *ompT*, *iroN* ($18,12,11$) در اشریشیاکلی‌های پاتوژن طیور نسبت به اشریشیاکلی‌های جدا شده از پرنده‌گان سالم بیشتر است. بنظر می‌رسد که بررسی چندین ژن در ناحیه محافظت شده *ColV* پلاسمید می‌تواند در تفرقی APEC‌ها از سویه‌های هم سفره (Commensal) کمک کننده باشد (۱۸,۱۲,۱۱).

همچنین ارتباط بین مقاومت سرم و حدت نشان داده شده است (۱۳). فاکتورهای مقاومت به سرم در پیشرفت و حدت کلی سپتی سمی طیور موثرند زیرا که اجازه‌ی فرار باکتری از اثر باکتری کشی کمپلمان را می‌دهند (۱۶). یکی از ژنهای مهم اشریشیاکلی‌های پاتوژن طیور که در مقاومت به سرم نقش دارد *iss* می‌باشد (۱۹).

در اکثر مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا فراوانی *iss* در حدوود $72-82$ درصد در موارد APEC گزارش شده است (۱۹,۱۸,۱۷,۱۴,۱۲,۱۱,۹) با این حال فراوانی *iss* در APEC در چین $58/5$ درصد (۱۰)، در 2 مطالعه در مجارستان 57 و 63 درصد ($5,4$)، در کره $41/5$ درصد (۲۲) و در برزیل $38/5$ درصد (۶) گزارش شده است. این در حالی است که

References

- 1- Alinezhad I. (2008), Drug resistance patterns of *Escherichia coli* isolated from cases of avian colibacillosis in Golestan province, Iran, D.V.M thesis, Karaj Islamic Azad University, No. 862.
- Ananias M., Yano T. (2008) Serogroups and virulence genotypes of *Escherichia coli* isolated from patients with Sepsis. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 41: 877-883.
- 2- Barnes H. J., Nolan L. K. , Vaillancourt J. F. (2008) Colibacillosis: In Y. M. Saif et al., Diseases of poultry, 12th ed. Blackwell Publishing, Arres, IA. pp: 691–732.
- 3- Cătană N., Popa V., Fodor I., Măroiu G. (2008) Molecular screening regarding the presence of the iss genes, fim H and ompA at the *E. coli* isolated from the broiler chickens. Buletin USAMV Veterinary Medicine, 65: 310-315.
- 4- Cătană N., Popa V., Herman V., Fodor I. (2008) Phenotypical and genotypical characteristics of *E. coli* strains isolated from avian colibacillosis outbreaks. Lucr. St. Med. Vet., XXXXI: 340-343.
- 5- Delicato E.R., de Brito B.G., Gaziri L.C.J. and Vidotto M.C. (2003) Virulence associated genes in *Escherichia coli* isolates from poultry with colibacillosis. Veterinary Microbiology, 94: 97-103.
- 6- Dziva F. and Stevens M.P. (2008) Colibacillosis in poultry: unraveling the molecular basis of virulence of avian pathogenic *Escherichia coli* in their natural hosts, Avian Pathology, 37: 355–366.
- 7- Ganbarpour R., Sami M., Salehi M., Ouromie M. (2011) Phylogenetic background and virulence genes of *Escherichia coli* isolates from colisepticemic and healthy broiler chickens in Iran. Trop Anim Health Prod, 43: 153-157.
- 8- Jeffrey J.S., Nolan L.K., Tonooka K.H., Wolfe S., Gid-

عامل حدتی مانند فاکتور مقاومت به سرم، بایش از چند ژن کنترل می شوند که عدم حضور یک ژن الزاماً به معنای نبود فنوتیپی آن فاکتور حدت نیست و این بدان معنی است که سویه های مختلف APEC می توانند برای بیماری زایی از راههای جایگزین دیگری استفاده کنند (۲۱). بنابراین پیشنهاد می شود اثرات همپوشانی و راههای جایگزینی این فاکتورها و بالطبع ژنهای آنها بررسی شوند (۶).
۳- از آنجا که در بیشتر موارد یا این سه ژن به طور همزمان حضور داشتنند (۳۵%) یا اینکه هیچ کدام از این ژنهای حضور نداشتند (۵۶%) این فرضیه را قوت می بخشد که وقوع این ژنهای معمولاً به طور همزمان، در منطقه محافظت شده‌ی (Conserved portion ColV plasmid) ColV پلاسمید است که بیانگر وجود یا عدم وجود این پلاسمید در *E.coli* های مورد مطالعه است (۱۲,۱۱,۳).

- dings C.W., Horne S.M., Foley S.L., Lynne A.M., Ebert J.O., Elijah L.M., Bjorklund G., Pfaff-McDonough S.J., Singer R.S., Doetkott C.(2002) Virulence Factors of *Escherichia coli* from Cellulitis or Colisepticemia Lesions in Chickens. *Avian diseases*, 46: 48–52.
- 9- Jin W.J., Zheng Z.M., Zhang Y.Z., Qin A.J., Shao H.X., Liu Y.L., Wang J., Wang Q.Q. (2008) Distribution of Virulence-Associated Genes of Avian Pathogenic *Escherichia coli* Isolates in China. *Agricultural Sciences in China*, 7: 1511-1515.
- 10- Johnson T.J., Siek K.E., Johnson S.J. & Nolan L.K. (2006) DNA sequence of a ColV plasmid and prevalence of selected plasmidencoded virulence genes among avian *Escherichia coli* strains. *Journal of Bacteriology*, 188: 745-758.
- 11- Johnson T.J., Wannemuehler Y., Doetkott C., Johnson S.J., Rosenberger S.C. and Nolan L.K. (2008) Identification of minimal predictor of avian pathogenic *E.scherichia coli* virulence for use as a rapid diagnostic tool. *Journal of clinical microbiology*, 46: 3987-3996.
- 12- Mellata M., Dho-Moulin M., Dozois C.M., Curtiss III R., Brown P.K., Arné P., Breé A., Desautels C. & Fairbrother, J.M. (2003). Role of virulence factor in resistance of avian pathogenic *Escherichia coli* to serum and in pathogenicity. *Infect. Immun.*, 71: 536-540.
- 13- McPeake S.J.W., Smyth J.A., Ball H.J.(2005) Characterisation of avian pathogenic *Escherichia coli* (APEC) associated with colisepticaemia compared to faecal isolates from healthy birds. *Veterinary Microbiology*, 110: 245–253.
- 14- Nakazato G., de Campos T.A., Stehling E.G., Brocchi M., da Silveira W.D. (2009) virulence factors of avian pathogenic *Escherichia coli*(APEC).*Pesq. Vet. Bras.*, 29: 479-486.
- 15- Parreira V.R., Arns C.W., Yano T. (1998) Virulence factors of avian *Escherichia coli* associated with swollen head syndrome. *Avian Pathology*, 27: 148-154.
- 16- Pfaff-McDonough S. J., Horne S. M., Giddings C. W. , Ebert J. O., Doetkott C., Smith M. H. , and Nolan L. K. (2000) Complement resistancerelated traits among *Escherichia coli* isolates from apparently healthy birds and birds with colibacillosis. *Avian Dis.* 44:23–33.
- 17- Rodriguez-Siek K.E., Giddings C.W., Doetkott C., Johnson T.J., Nolan L.K. (2005) Characterizing the APEC pathotype, *Veterinary Research*, 36: 241–256.
- 18- Sampaio Baptista A.A., Kobayashi R.K.T., José Venâncio E., Vidotto M.C (2010) Cloning, expression and sequence diversity of iss gene from avian pathogenic *Escherichia coli* (APEC) isolated in Brazil. *Ciências Agrárias*, 31: 723-732.
- 19- Someya A., Otsuki K., Murase T. (2007) Characterization of *Escherichia coli* Strains Obtained from Layer Chickens Affected with Colibacillosis in a Commercial Egg-Producing Farm. *J. Vet. Med. Sci.* 69: 1009–1014.
- 20- Vandekerchove D. (2004) Colibacillosis in battery-caged layer hens: Clinical and bacteriological characteristics and risk factor analysis, Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor (Ph.D.) in Veterinary Sciences. Ghent University, Belgium.
- 21- Won G.Y., Moon B.M., Oh I.G., Matsuda K., Chaudhari A.A., Hur, J., Eo, S.K., Yu, I.J., Lee, Y.J., Lee, Y.S., Kim, B.S., Lee, J.H. (2009) Profiles of virulence-associated genes of avian pathogenic *E.scherichia coli* isolates from chickens with colibacillosis. *J. Poult. Sci.*, 46: 260-266.