

# گزارش شیوع نماتود زئونوز *Anisakis* sp. در ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) سد ارس استان آذربایجان غربی



امین خدادادی<sup>۱\*</sup>، سهراب رسولی<sup>۲</sup>، کاظم عبدالی<sup>۳</sup>، رستا عزیزی<sup>۴</sup>

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه

بیماری های آبریان، تهران، ایران

۲- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی و پیراپزشکی، گروه انگل شناسی،

ارومیه، ایران

۳- سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران

۴- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه دامپزشکی،

تهران، ایران

دوره چهارم، شماره سوم، پائیز ۱۳۹۲

صفحات ۲۲۱-۲۲۵

\*نويسنده مسئول: aminkhodadadi@ymail.com

## چکیده

در طول یک بررسی در تابستان سال ۱۳۹۱ بر روی ماهیان کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) سد ارس استان آذربایجان غربی تعداد ۵۰ قطعه ماهی بصورت تصادفی جهت اجرای فاز دوم یک مطالعه انتخاب گردیده بود که در بررسی سطح شکمی و احشایی این ماهیان شیوع نماتود آنیزاسکیس (*Anisakis* sp.) در محوطه بطنی ۲ قطعه از ماهی ها مشاهده گردید. با توجه به این مطلب که نماتود آنیزاسکیس یکی از انگل های مشترک بین آبریان و انسان می باشد و مصرف ماهی های آلوده به صورت نیم پز سبب ایجاد سندروم اتوزنوفیلیک گرانولوما در دستگاه گوارش انسان می گردد و چون کپور ماهیان یکی از منابع عمده اغذیه دریابی مصرفی در استانهای و شمال و شمال غرب کشور می باشد، احتمال شیوع این بیماری در بین مردم این استانها وجود دارد و لزوم این گزارش احساس گردید.

واژه های کلیدی: انگل، آنیزاسکیس، کپور ماهیان، بیماری مشترک



JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

J.Vet.Clin.Res 4(3)221-225, 2013

## Report of Anisakis sp. Nematode (zoonotic parasite) from common carp (*Cyprinus carpio*) from Aras dam, West Azerbaijan province

Khodadadi, A.<sup>1\*</sup>, Rasouli, S.<sup>2</sup>, Abdi, K.<sup>3</sup>, Azizi, R.<sup>4</sup>

1- Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Veterinary, Department  
of fish health& Diseases of Aquatics , Tehran, Iran (aminkhodadadi@ymail.com)

2- Faculty of veterinary medicine , Islamic Azad university , Urmia branch , Urmia , Iran

3- Specialist of Sanitation and Diseases of Aquatics - Director of Institution of Fisheries  
of Iran, Tehran, Iran

4- Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Veterinary,  
Department of Veterinary, Tehran, Iran

\* Corresponding author: aminkhodadadi@ymail.com

### Abstract

The aim of this survey from summer of 2012 we muster about 50 number of common carp (*Cyprinus carpio*) from Aras dam in west Azerbaijan province and them isolated a parasite that name is Anisakis sp. From two fish. That parasite are isolated from the muscle of abdomen and abdomen cavity for first time in the common carp (*Cyprinus carpio*) in iran. We know Anisakis parasite one of the most important disease human can be infected from sea aquatic animal and from fish. If the human have ate the fish are not complicity cooking, the parasite can translate to human body and live in G.I system and make a bad illness. The cyprinid family is the one of cheeped and widespread fish are growing in Iran and people are used in our foot. This survey showed the some common carp (*Cyprinus carpio*) fish of Aras dam are infected with zoonotic Anisakis sp. parasite and for first time report of common carp (*Cyprinus carpio*) fish in Aras dam of west Azerbaijan.

**Key words:** Parasite, Anisakis sp., *Cyprinus carpio*, zoonotic Disease

آنیزاكیده تاکنون دو جنس آنیزاكیس و کتراسکوم از نظر اهمیت انتقال به انسان شناسایی شده‌اند (۱). موارد انسانی بیماری بیشتر از کشورهای هلند، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و بریتانیا گزارش می‌شود. این نماتود انگل طبیعی وال‌ها، دلفین‌ها، فوک‌های دریایی، شیرهای دریایی، شاه ماهی، ماهی روغن، ماهی ماکرل، ماهی آزاد و ماهی مرکب می‌باشد. گزارش‌هایی در مورد آلودگی انسان به ۳ گونه از جنس آنیزاكیس در ایران وجود دارد که گونه *Anisakis simplex* جزو خطرناک ترین این گونه‌ها می‌باشد. لارو آنیزاكیس با هجوم به دستگاه گوارش انسان سندرومی به نام آئوزینوفیلیک گرانولوما را ایجاد می‌کند که در اروپا به آن کرم شگ ماهیان می‌گویند (۱).

#### یافته‌های بالینی

در طول یک بررسی در تابستان سال ۱۳۹۱ بر روی ماهیان کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) سد ارس استان آذربایجان غربی تعداد ۵۰ قطعه ماهی بصورت تصادفی جهت اجرای فاز دوم یک مطالعه انتخاب گردیده بود که در بررسی سطح شکمی و احشایی این ماهیان شیوع نماتودهای سفید شیری رنگ در سطح بطئی و عضلات مشاهده گردید (تصویر ۱ و ۲) که پس از نمونه برداری از انگل‌های مذکور و با استفاده از کلیدهای شناسایی Gardiner & Poynton ۱۹۹۹ و عبارتی ۱۳۹۰ اقدام به شناسایی گردید که نماتود آنیزاكیس (*Anisakis sp.*) بود (۱و۳). این نماتود جز نماتودهای مشترک بین انسان و آبزیان می‌باشد (تصویر ۳).

**مقدمه**  
خانواده کپور ماهیان یکی از بزرگترین خانواده‌های ماهیان استخوانی در جهان بوده و شامل حداقل ۱۷۰۰ گونه و بیش از ۲۰۰ جنس می‌باشد. جمعیت‌های طبیعی کپور ماهیان به طور وسیع در بیشتر رودخانه‌های آب شیرین، دریاچه‌ها و آبگیرها در آسیا، اروپا، آفریقا، ژاپن، جزایر هند شرقی و در طولهای جغرافیایی بیش از چهل درجه در آمریکای شمالی پراکنده شده‌اند. کپور ماهیان در مصب برخی رودخانه‌ها و آبهای لب شور از جمله دریای بالتیک و خلیج Bothnia یافت می‌شوند. انسان‌ها کپور ماهیان را از زیستگاه‌های طبیعی آنها خارج کرده و به طور مصنوعی تکثیر نموده‌اند. کپور ماهیان به طور ذاتی ماهیان مناطق استوایی و تحت استوایی هستند ولی در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای در مناطق سردسیر پرورش داده شده‌اند. کپور ماهیان به دلایل متعددی به زیستگاه‌های جدید از جمله سد ارس معرفی شده‌اند که می‌توان به علت منبع غذایی برای جمعیت‌های مهاجر و گونه مقاوم آبزی پروری اشاره نمود (۱). براساس گزارشات FAO در سال ۲۰۰۸ تولید کپور ماهیان در دنیا متجاوز از ۲۰ میلیون تن و ارزش اقتصادی آنها بیش ۲۶ میلیارد دلار بوده است. تولید ماهیان کپور معمولی در سال ۲۰۰۸ حدود ۲۹۸۷۴۳۳ تن و ارزش تجاری آن بیش ۶۹۶ میلیون دلار بوده است. کشور ایران از نظر تولید کپور معمولی در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است (۲). مشکل عمده‌ای که سیستم‌های پرورش ماهی با آن درگیر می‌شوند، خطر معرفی بیماری از طریق ماهی و یا آب همراه حمل و نقل آنها می‌باشد. در صورت انتقال بیماری از یک کشور به کشور دیگر و یا بین مناطق با آب و هوای متفاوت خطر ایجاد بیماری غیر بومی (اگزوتیک) وجود دارد (۱). نماتود آنیزاكیس (*Anisakis sp.*) یکی از انگل‌های آبزیان می‌باشد که حائز اهمیت زئونتیک می‌باشد. میزان قطعی این انگل پستانداران دریایی و یا پرندگان می‌باشد و از خانواده

### کاربرد بالینی

تاریخچه تحقیقات انگل شناسی در ماهیان آب شیرین در ایران که معرف تعداد زیادی انگل بود با تحقیقات جلالی و مولنار از سال ۱۹۹۰ آغاز گردید. پس از تحقیقات فراوانی از جمله تحقیقات جلالی (۱۹۸۷-۱۹۹۲)، مولنار و جلالی (۱۹۹۲)، Gussev و همکاران (۱۹۹۳)، جلالی و همکاران (۱۹۹۵) و Shamsi (۱۹۹۷) و ... که منجر به معرفی بیش از یکصد گونه از مونوژن‌های ماهیان آب شیرین برای کشور شد که بسیاری از آنها برای علم جدید بودند. در گام‌های بعدی مولنار و پازوکی (۱۹۹۵) و بسیاری دیگر از محققین از قبیل معصومیان، مخیر، عبدی، پیغان، ستاری، مغنه‌نی و... تعداد متنوعی از تک یا ختگان، نماتودها و سایر پریاختگان انگل ماهیان آب شیرین ایران را معرفی و عرصه وسیع و متنوع انگل‌های ماهیان آب شیرین کشور را در مناطق متفاوت اکولوژیک مشخص نمودند و غنای آنها را آشکار ساختند(۴).

در ایران نیز گزارشاتی مبنی بر شیوع این انگل در ماهیان از قبیل گزارش ستاری و همکاران در ماهی قره برون (Acipenser persicus) سواحل غربی دریای خزر و همچنین در دستگاه گوارش ماهیان خاویاری چالباش (Acipenser ndiventeris)، شیپ (Acipenser guldentstaedt) و فیل ماهی (Huso huso) نیز گزارش گردیده است (۱). در بررسی‌های دیگر مصباح و همکاران نماتود آنیزاسکیس را از ماهیان شیربت (Barbus grypus) رودخانه کرخه، معصومیان و همکاران از محوطه شکمی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل استانهای مازندران و گلستان، صیقلی و اسلامی گونه‌هایی از جنس آنیزاسکیس در اردک ماهی (Esox Lucius) دریای خزر (صیقلی ۱۳۵۲، اسلامی ۱۳۶۸، ۱۹۷۲) و اسلامی و مخیر همچنین لارو (Sander lucioperca) انگل در محوطه بطنی سوف (Sander lucioperca) (اسلامی، مخیر ۱۹۷۷) و عطایی و همکاران آنیزاسکیس را از ماهیچه سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) و



تصویر ۱- نماتود آنیزاسکیس (Anisakis sp.) جدا شده از عضلات ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) سد ارس



تصویر ۲- نماتود آنیزاسکیس (Anisakis sp.) جدا شده از محوطه بطنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) سد ارس



تصویر ۳- نماتود آنیزاسکیس (Anisakis sp.) جدا شده از ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) سد ارس

## References

1. Abdi. k. 2010. Text book of Health and diseases of Cyprinid fishes. First published. Publisher Partoveah vageah , Tehran , Iran.(in persian).
2. FAO. 2009. Fishery Statistics Yearbook. Catches and Landings. FAO, Rome. 74(63): 1759-1764.
3. Noga E. J. . 2010. Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Edition 1st published 2010. State University Press. Blackwell's publishing. USA. Pp. 223-226.
4. Pazooki J. , Masoumian M. , Jafari N. 2007. Check list of Iranian fish parasites. First published. Publisher Iran fisheries Research organization (IFRO). Tehran, Iran .(in persian).

صدری مهرآباد آنیزاسکیس را از لوله گوارش کیلکای معمولی (*Clupeonella cultriventris*) در استان آذربایجان غربی و اسلامی و پازوکی و همکاران آنیزاسکیس را از دستگاه گوارش سس ماهی بزرگ سر (*Barbus capito*) رودخانه ارس استان آذربایجان غربی و ابراهیم زاده آنیزاسکیس را در روده ماهی گستان (*Barbus xanthopterus*) تالاب هور العظیم و عطایی آنیزاسکیس را در عضله ماهی حوض تالاب انزلی گیلان و معصومیان (Carassius auratus) و همکاران آنیزاسکیس را از محوطه شکمی ماهی کلمه و همکاران آنیزاسکیس را از مازندران و پیغان و رادفر و مخیر آنیزاسکیس را از ماهیان هامور معمولی (*Epinephelus coioides*) از سواحل خلیج فارس و کنه شهری عضله ماهی سفید (*Leuciscus cephalus*) (۱۹۷۸) گزارش گردیده است (۴). با توجه به گزارشات موجود در سازمان دامپزشکی کل کشور و موسسه تحقیقات شیلات ایران تاکنون این انگل از ماهی کپور معمولی گزارش نگردیده بود (۱۰۴). سد ارس با تولید بالای چند تن ماهی در سال از خانواده کپور ماهیان و مخصوصاً کپور معمولی، قسمت اعظم اغذیه دریایی مردم مناطق شمال و شمالغرب ایران را تشکیل می‌دهد بنابراین ضروری می‌باشد که از تمام ماهیان بومی و معرفی شده این سد نمونه گیری و مطالعه گردد و همچنین مصرف کنندگان ماهی در نوع طبخ و نحوه طبخ دقت لازم را مبذول نمایند تا از شیوع بیماری‌های انگلی در جوامع انسانی جلوگیری به عمل آید.