

توانائی تولید افلاتوکسین های B₁, B₂, G₁ و G₂ در تعدادی از گونه های قارچ آسپرژیلوس به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC)

فاطمه اصغرنژاد^۱، صفرعلی مهدیان^{۲*}، بهنام امیری بشلی^۳، سید سامان سید جعفر نظری^۳

تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۱۹

تاریخ دریافت: ۹۳/۳/۱۱

چکیده

افلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه شدیداً سمی گونه های به خصوصی از قارچ آسپرژیلوس هستند که به دنبال رشد روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و غذائی تولید می شوند. در این بررسی به ارزیابی تولید افلاتوکسین های B₁, B₂, G₁ و G₂ در چند گونه قارچ *Asprgillus* شامل: *A. terreus*, *A. ustus*, *A. candidus*, *A. carneus*, *A. ostianus*, *A. auricomus*, *A. niger*, *A. fumigatus*, *A. parasiticus*, *A. caespitosus*, *A. awamori* و *A. sclerotiorum* در محیط کشتی مناسب و ساده (سیب زمینی دکستروز برات PDB) و به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC) پرداخته شده است. قارچ های یاد شده پس از جداسازی و خالص سازی مورد شناسایی قرار گرفتند و در ۵۰ میلی لیتر محیط PDB مایه زنی شدند. قارچ های مایه زنی شده در شرایط مشابه محیط طبیعی رشد قارچ در دمای ۲۶ درجه سانتیگراد، رطوبت ۸۰٪ و تاریکی به مدت ۲۲ روز نگهداری و سپس افلاتوکسین های حاصل از آنها استخراج شد. ترشحات قارچی نمونه ها توسط ۱۰ میلی لیتر کلروفرم از عصاره فیلتر شده محیط غذائی استخراج و پس از تبخیر حلال، رسوب حاصله در ۳ میلی لیتر متانول حل و فیلتر شده و به دستگاه HPLC تزریق گردید. نتایج آزمایشات نشان داد از میان ۱۳ گونه قارچ آسپرژیلوس، گونه *A. parasiticus* بیشترین میزان افلاتوکسین کل را تولید نمود. افلاتوکسین G₁ در گونه های *A. terreus*, *A. fumigatus* و *A. carneus*, *A. niger*, *A. ostianus*, *A. sclerotiorum* و *A. parasiticus* در گونه های B₂ در گونه های *A. carneus* و *A. sclerotiorum* و افلاتوکسین B₁ در گونه *A. ostianus* تولید نشدند. در گونه *A. parasiticus* میزان تولید افلاتوکسین B₁ بیشترین و افلاتوکسین G₁ کمترین مقدار در بین چهار نوع افلاتوکسین مورد آزمایش بود.

کلمات کلیدی: آسپرژیلوس، مایکوتوکسین، افلاتوکسین، ایمنی غذایی، HPLC

^۱ - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

^۲ - استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

^۳ - دانشجوی دکتری رشته شیمی تجزیه دانشگاه مازندران، ساری، ایران.

* - نویسنده مسئول مقاله: safaralim@gmail.com

مقدمه

مایکوتوکسین‌ها (Mycotoxins) یکی از بارزترین آلوده‌کننده‌های مواد غذایی هستند که بهداشت عمومی، امنیت غذایی و اقتصاد ملی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند (رحیمی و همکاران، ۱۳۸۷). مایکوتوکسین‌ها یکی از منابع آلوده‌کننده برخی از محصولات غذایی و به خصوص دانه‌های روغنی، غلات، سبزیجات و میوه‌ها هستند (Reddy et al., 2008). این سموم عمدتاً توسط پنج جنس از قارچ‌ها شامل گونه‌هایی از *Claviceps sp.*، *Alternaria sp.*، *Fusarium sp.*، *Penicillium sp.*، *Aspergillus sp.* و *Aspergillus flavus* تولید می‌گردند. یکی از مهمترین مایکوتوکسین‌ها، افلاتوکسین‌ها هستند که عمدتاً توسط گونه‌های مختلف اسپرژیلوس مانند *Aspergillus flavus* و *A. parasiticus* تولید می‌گردند. افلاتوکسین در اکثر محصولات گیاهی به ویژه در دانه‌های روغنی نظیر بادام زمینی، پسته، نارگیل، سویا، ذرت، پنبه دانه، برنج و گندم یافت می‌شود (D'Mello and MacDonald, 1997). امکان انتقال این توکسین از مواد غذایی کپک زده به زنجیره غذایی انسان نیز وجود دارد. قارچ اسپرژیلوس به ویژه گونه *A. flavus* می‌تواند در مزرعه به دانه غلات و حبوبات حمله کند و در آنها عفونت ایجاد کند. قارچ پس از آلوده نمودن محصولات تکثیر یافته و تولید زهرآبه می‌کند. اگر تنش‌های مختلف محیطی وجود داشته باشد تولید زهرآبه افزایش می‌یابد. بیشترین میزان آلودگی به افلاتوکسین در این گیاهان قبل از برداشت محصول و در حال رشد اتفاق می‌افتد (Almasian et al., 2008). شرایط موجود پس از برداشت محصولات کشاورزی نیز روی تولید این متابولیت‌های ثانویه تأثیرگذار بوده و معمولاً در مراحل حمل و نقل، فرآوری و انبارداری تولید این توکسین می‌تواند ادامه پیدا کند. از عوامل مؤثر در تولید افلاتوکسین‌ها می‌توان به عوامل ژنتیکی و محیطی مانند نوع قارچ، نوع بستر، رطوبت، دما، رشد و صدمات محصول، انبارداری و تهویه محصول، نور و pH اشاره کرد. رشد قارچ‌های اسپرژیلوس لزوماً به مفهوم تولید افلاتوکسین‌ها نیست. علاوه بر این رطوبت بالا و هوای گرم، برای تولید بالاترین میزان افلاتوکسین در مواد غذایی لازم است. کپک اسپرژیلوس در دمای ۲۸-۳۳ درجه سانتیگراد و در رطوبت ۸۳-۹۷ درصد رشد می‌کند. دمای بهینه برای تولید افلاتوکسین بین ۲۴-۳۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است. از میان ۱۸ نوع افلاتوکسین شناخته شده، افلاتوکسین‌های B₁، B₂، G₁ و G₂ توسط آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) در گروه A (سمی‌ترین) عوامل سرطانزا قرار گرفته‌اند. در این میان سمیت و سرطانزایی افلاتوکسین B₁ بیشتر از انواع دیگر گزارش شده است. افلاتوکسین‌های B₁، B₂، G₁ و G₂ متابولیت‌های سمی دی‌هیدروفوران-تتراهیدروفوران هستند که به حلقه کومارینی متصل می‌شود. افلاتوکسین، خاصیت سمیت حاد بازدارنده ایمنی، جهش‌زایی، ناهنجارزایی و سرطان‌زایی دارد (Ricordy et al., 2005). چندین روش برای سنجش کمی و کیفی تولید افلاتوکسین استفاده می‌شود. این روش‌ها شامل روش‌های مبتنی بر کشت، تجزیه دستگاهی، سرولوژیک و مولکولی است. روش‌های مبتنی بر کروماتوگرافی شامل کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) است. این تکنیک بسیار بالائی داشته و به همین دلیل کاربردهای متعددی بعنوان یک ابزار تشخیصی مناسب پیدا نموده‌اند. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High performance liquid chromatography; HPLC) به عنوان

Archive of SID

یک روش اندازه گیری افلاتوکسین با کاربردی ساده و حساسیت بالا در آنالیز افلاتوکسین های B و G در مواد غذایی با حساسیت تکنیک یک نانوگرم بر گرم است. مزیت اصلی HPLC سرعت بالا، اتوماسیون و دقت بالای آن است. این روش در مقایسه با سایر روش ها قابل اطمینان ترین و معمول ترین روش استفاده برای آنالیز و شناسایی افلاتوکسین است که به عنوان یک روش استاندارد و برتر در مقابل سایر روش های جدید شناخته شده است (Haung, 2007; Reddy et al., 2009). هدف اصلی این پژوهش تعیین کمی و کیفی تولید افلاتوکسین در تعدادی از گونه های اسپرژیلوس در شرایط محیطی تعریف شده بوده است. بدین منظور پس از استخراج افلاتوکسین تولید شده از محیط کشت، جداسازی، شناسایی و اندازه گیری آنها با استفاده از دستگاه HPLC انجام شد.

مواد و روشها**نمونه برداری و جدا سازی**

به منظور جداسازی قارچ اسپرژیلوس نمونه هایی از بذور گندم و ذرت از مراکز فروش منطقه ساری جمع آوری شدند. از هر فروشگاه خوراک دام مقدار ۵۰۰ گرم بذر گندم و ۵۰۰ گرم بذر ذرت خریداری شد و به آزمایشگاه منتقل شد. تعدادی از جدایه های قارچ اسپرژیلوس از آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری تهیه شدند. این نمونه ها از خاک مناطق مختلف کشور قبلاً جداسازی شده بودند. بذور گندم و ذرت با هیپوکلریت سدیم ۰/۵ درصد ضد عفونی شدند و به روش بلاتر در تشتک پتری حاوی سه لایه کاغذ صافی سترون مرطوب کشت داده شدند. پس از هفت تا ده روز قارچ اسپرژیلوس جداسازی و به روش تک اسپور خالص سازی شد. قارچ خالص شده روی محیط کشت چاپک داکس آگار کشت داده شد و با استفاده از کلید شناسایی بارت و همکاران (۱۹۷۹)، جنس اسپرژیلوس تشخیص داده شد. جهت شناسایی گونه های اسپرژیلوس، از محیط کشت های (چاپک عصاره مخمر آگار^۱، چاپک داکس آگار^۲، چاپک عصاره مخمر آگار سوکروز ۲۰ درصد^۳ و عصاره مالت آگار^۴) استفاده شد. قطعه ای پنج میلی متری از نمونه قارچ در سه نقطه تشتک آزمایش روی محیط کشت مایه زنی شد و درون اتاقک رشد با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، نور ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و طوبت نسبی ۸۰ - ۷۰ درصد به مدت یک هفته نگهداری شد (Agarwal and Sinclair, 1997). مشخصات مختلف ماکرو و میکرومورفولوژیکی نمونه ها (اندازه کلونی، رنگ کنیدیوم، رنگ میسیلیوم، رنگ معکوس (زیر تشتک)، ایجاد تراوش، تولید رنگدانه، تولید سختینه، شکل و اندازه وزیکول، تعداد لایه سلول ها روی وزیکول، اندازه، رنگ و وضعیت دیواره کنیدیوم و نیز پایه و مشخصات فرم جنسی در صورت تشکیل) بررسی و یادداشت شد و با استفاده از کلید شناسایی کلیک (Klick, 2002) تعداد ۱۳ گونه اسپرژیلوس از هم متمایز و تشخیص داده شدند (جدول ۱) و در آزمایش بعدی مورد استفاده قرار گرفتند.

¹. Czapek Yeast Agar(CYA)

². Czapek Dox Agar(CZ)

³. Czapek Yeast Agar with 20% Sucrose(CY20S)

⁴. Malt Extract agar(MEA)

Archive of SID

تولید افلاتوکسین

به منظور ارزیابی توانائی تولید افلاتوکسین در هر یک از گونه‌ها با استفاده از لوپ سترون، قطعه ایی از قارچ همراه با محیط PDA به قطر تقریبی پنج میلی متر در محیط مایع عصاره سیب زمینی دکستروز (PDB 50 ml) مایه‌زنی شدند. قارچ های مایه زنی شده در اتاقک رشد در محیط تاریک با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد، رطوبت ۸۰٪ و به صورت ساکن نگهداری شدند. در روز ۲۲ پس از کشت قارچ ها، به منظور آزمایش تولید و یا عدم تولید افلاتوکسین عصاره گیری انجام شد. این بررسی در غالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار قارچ اسپرژیلوس در محیط مایع PDB انجام شد.

استخراج افلاتوکسین

به منظور استخراج افلاتوکسین ها از محیط کشت مایع PDB ابتدا محتوای هر یک از فلاسک ها به طور یکنواخت مخلوط شد. مقدار ۲۵ میلی لیتر محیط کشت مایع حاوی هر یک از گونه های یاد شده از فیلتر کاغذی عبور داده شد. به این محلول ۱۰ میلی لیتر حلال کلروفرم (Reddy *et al.*, 2008; Fardos *et al.*, 2009) اضافه شد و مخلوط حاصل به مدت ۲۰ دقیقه درون قیف دکانتور به هم زده شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی فاز پایینی شامل حلال کلروفرم و افلاتوکسین های تولید شده جدا شد. این محلول (حاوی افلاتوکسین) به وسیله دستگاه تبخیر کننده چرخان (Rotary evaporator, Eyela N-1000, Japan) در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد و تحت خلاء حلال پرانی شد (Abbas *et al.*, 2006). باقیمانده در سه میلی لیتر حلال متانول (Merk KGaA, Germany) دارای خلوص HPLC حل و از فیلتر سرسرنگی ۰/۲۲ میکرومتر (Einmal filter, Germany) عبور داده شد. نمونه های تغلیظ شده در فریزر ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نمونه به دست آمده حاوی افلاتوکسین های تغلیظ شده به منظور شناسائی کیفی و اندازه گیری کمی به دستگاه HPLC تزریق شد. برای نمونه شاهد عملیات مشابه در محیط مایع PDB بدون مایه زنی قارچ انجام شد.

آزمایش با اشعه فرابنفش UV

نمونه های استخراج شده از محیط کشت مایع، جهت ارزیابی اولیه زیر نور UV (Kruss, Germany)، با طول موج ۳۶۵ نانومتر قرار داده شدند. نمونه های محلول از نظر تابش فلوروسنت زرد مایل به سبز آزمایش شدند. وجود افلاتوکسین در هر یک از نمونه ها با تابش نور زرد مایل به سبز مشخص شد (Fente *et al.*, 2001; Rodrigues *et al.*, 2009). نمونه شاهد فاقد تابش نور زرد مایل به سبز بود.

شرایط دستگاه HPLC و آنالیز نمونه ها

در این پژوهش از دستگاه HPLC شرکت واترز (Waters HPLC Empower system) با ستون تجزیه ای (250×4.6 mm, 10µm) ODS2 C₁₈ استفاده گردید. آشکارسازی افلاتوکسین های جداسازی شده توسط آشکارساز فلوروسنت در طول موج برانگیختگی ۳۶۵ و طول موج نشر ۴۲۵ نانومتر (Fente *et al.*, 2001) انجام شد. فاز متحرک مورد استفاده مخلوط متانول، آب، استونیتریل (Khanafari *et al.*, 2007) و اسیداستیک به ترتیب به مقدار ۲۰، ۵۹، ۲۰ و ۱ درصد حجمی بود که قبل از اجرای عملیات اقدام به گاز زدائی آن شد. کلیه حلال های مصرفی

دارای خلوص HPLC بودند. تزریق نمونه‌ها پس از ثابت گردیدن خط پایه و به حداقل رسیدن نویزهای دستگاهی با استفاده از میکروسرنج همیلتون (Micro Syringe 50µl, Hamilton and Socorex) انجام شد. در کلیه اندازه‌گیری‌ها حجم نمونه تزریق شده ۲۰ میکرولیتر بود. سرعت جریان فاز متحرک یک میلی‌لیتر در دقیقه بود (عباس و همکاران، ۲۰۰۶). شناسایی کیفی افلاتوکسین‌ها در نمونه مجهول از طریق مقایسه زمان بازداری پیک‌ها در نمونه استاندارد (محلول افلاتوکسین‌های B₁, B₂, G₁ و G₂ با غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر تهیه شده از موسسه استاندارد استان مازندران) و نمونه مجهول انجام شد. برای اندازه‌گیری کمی افلاتوکسین‌ها در نمونه‌های مجهول از مساحت سطح زیر پیک آن‌ها و مقایسه آن با سطح زیر پیک نمونه استاندارد استفاده شد. بدین منظور از سطح زیر پیک‌های افلاتوکسین‌ها در تزریق‌های تکراری نمونه و نیز سطح زیر پیک‌های افلاتوکسین در کروماتوگرام استاندارد میانگین‌گیری به عمل آمد. میانگین سطح زیر پیک افلاتوکسین در نمونه در غلظت استاندارد افلاتوکسین تزریق شده (۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) ضرب شد و عدد حاصله بر میانگین سطح زیر پیک افلاتوکسین استاندارد تقسیم شد. این عدد غلظت افلاتوکسین بر اساس واحد در سه میلی‌لیتر عصاره غلیظ محسوب شد (رابطه ریاضی (۱)).

رابطه ریاضی (۱)

$$C_x(3\text{ml}) = \frac{A_x \times C_s}{A_s}$$

A_s = میانگین سطح زیر پیک‌های افلاتوکسین در محلول استاندارد افلاتوکسین ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

C_s = غلظت استاندارد افلاتوکسین (۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر)

A_x = میانگین سطح زیر پیک‌های افلاتوکسین در نمونه استخراج شده

برای به دست آوردن غلظت افلاتوکسین در ۲۵ میلی‌لیتر محیط مایع PDB از رابطه ریاضی (۲) و برای تعیین میلی‌گرم افلاتوکسین ترشح شده در ۲۵ میلی‌لیتر محیط مایع رابطه ریاضی (۳) استفاده شد.

رابطه ریاضی (۲):

$$C_x(25\text{ml}) = C_x(3\text{ml}) \times \frac{3}{25}$$

$C_x(25\text{ ml})$ = غلظت افلاتوکسین در ۲۵ میلی‌لیتر از محیط کشت

رابطه ریاضی (۳):

$$\text{mg Af}(25\text{ml}) = \frac{25 \times \text{Cx}(25\text{ml})}{1000}$$

mg Af = میلی گرم افلاتوکسین ترشح شده در ۲۵ میلی لیتر از محیط کشت

بررسی کروماتوگرام‌ها

پس از تزریق و تهیه کروماتوگرام نمونه‌ها، کروماتوگرام حاصل از هر نمونه با کروماتوگرام نمونه استاندارد مقایسه شد. وجود یا عدم وجود افلاتوکسین‌های B_1 ، B_2 ، G_1 و G_2 و مقادیر آن‌ها در نمونه‌ها ارزیابی شد و گونه‌های مورد آزمایش از نظر تولید کمی و کیفی افلاتوکسین مقایسه شدند. با توجه به پیک‌های ظاهر شده در زمان بازداری، وجود و عدم وجود افلاتوکسین‌های B_1 ، B_2 ، G_1 و G_2 و میزان آن‌ها در گونه‌های مورد آزمایش در نظر گرفته شد. منحنی تغییرات برای هر نوع افلاتوکسین در طی دوره ۲۲ روزه وارد نرم افزار اکسل شد و با توجه به این منحنی، میزان تولید افلاتوکسین در بین گونه‌های شناسایی شده مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس داده‌های بدست آمده، تغییرات موجود در پیک‌ها و مقایسه گونه‌ها از نظر تولید کمی و کیفی افلاتوکسین ارزیابی شدند.

تجزیه و تحلیل آماری

میانگین و خطای معیار از میانگین نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و به وسیله آزمون توکی محاسبه و با هم مقایسه شدند. کلیه نتایج بر مبنای ۵۰ میلی لیتر محیط کشت مایع محاسبه، ارزیابی و گزارش شدند (محاسبات بر اساس ۲۵ میلی لیتر عصاره انجام شد و جواب بدست آمده از معادله ۳ در عدد ۲ ضرب شد تا در ۵۰ میلیتر محیط کشت بدست آید).

نتایج

شناسایی گونه‌های *Aspergillus sp.*

قارچ‌های آسپرژیلوس جدا شده از بذور گندم و ذرت و خاک مناطق مختلف با توجه به خصوصیات ماکرو و میکرومورفولوژیکی آنها با استفاده از کلید شناسایی کلیک (۲۰۰۲) از هم متمایز و شناسایی شدند. بر اساس مشخصات مورفولوژیکی جدایه‌ها که روی محیط کشت بدست آمد، تعداد ۱۳ گونه قارچ *Aspergillus* شامل: *A. niger*، *A. niveus*، *A. auricomus*، *A. ostianus*، *A. carneus*، *A. candidus*، *A. ustus terreus*، *A. sclerotiorum* و *A. awamori*، *A. caespitosus*، *A. parasiticus*، *fumigatus* (مشخصات کامل گونه‌ها در www.SID.ir منتشر است). گونه‌های شناسایی شده برای تولید افلاتوکسین مورد استفاده قرار گرفتند و اثبات اولیه تولید افلاتوکسین با نور UV مورد آزمایش قرار گرفت.


آزمایش اولیه با نور UV:

نتایج حاصل از ارزیابی مقدماتی وجود افلاتوکسین، با استفاده از لامپ UV با طول موج ۳۶۵ نانومتر نشان داد که ترکیبات فلئوئورسانس زرد مایل به سبز در کلیه گونه‌های قارچ آسپرژیلوس مورد آزمایش وجود داشتند. در نمونه شاهد ترکیبات فلئوئورسانس زرد رنگ مشاهده نشد. پس از این آزمایش جهت تشخیص تولید افلاتوکسین اقدام به بررسی نمونه‌ها با استفاده از دستگاه HPLC گردید.


تجزیه و تحلیل کروماتوگرام های دستگاه HPLC

به منظور تعیین کیفی افلاتوکسین نمونه های مورد آزمایش، پیک افلاتوکسین مورد نظر (B_1, B_2, G_1 و G_2) در کروماتوگرام هر گونه از طریق مقایسه با زمان بازداری افلاتوکسین مربوطه در کروماتوگرام استاندارد، شناسائی شد. در مقایسه نمونه شاهد (محیط PDB بدون مایه زنی) با نمونه استاندارد، هیچ گونه پیکی که مربوط به وجود انواع افلاتوکسین مورد بررسی باشد، مشاهده نشد (شکل ۱). بیشترین میزان تولید افلاتوکسین در گونه *A. parasiticus*، پس از آن در گونه *A. terreus* و کمترین میزان تولید افلاتوکسین در گونه *A. ostianus* مشاهده شد (شکل ۲).

نتایج حاصل از بررسی میزان تولید افلاتوکسین در گونه های مختلف قارچ آسپرژیلوس در جدول ۱ و شکل ۳ نشان داده شده است. در گونه قارچی *A. parasiticus* بیشترین میزان تولید افلاتوکسین های B_1, B_2 و G_2 مشاهده شد. میزان کل افلاتوکسین تولیدی در این گونه $40/85 \pm 354/16$ میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر محیط مایع سیب زمینی دکستروز برات بوده که بالاترین مقدار در بین گونه های مورد بررسی است. در این گونه تولید افلاتوکسین G_1 مشاهده نشد. پس از آن گونه های قارچی *A. terreus*، *A. candidus*، *A. sclerotiorum*، *A. ustus*، *A. niger*، *A. auricomus*، *A. niveus*، *A. caespitosus*، *A. carneus*، *A. awamori*، *fumigatus* و *A. ostianus* به ترتیب با $0/68 \pm 0/48$ ، $0/36 \pm 4/56$ ، $0/23 \pm 4/08$ ، $0/23 \pm 2/04$ ، $0/22 \pm 2/00$ ، $0/07 \pm 0/84$ ، $0/08 \pm 0/51$ ، $0/05 \pm 0/48$ ، $0/05 \pm 0/44$ ، $0/03 \pm 0/36$ ، $0/05 \pm 0/29$ و $0/02$ میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر محیط مایع سیب زمینی دکستروز برات به ترتیب بیشترین تا کمترین مقدار میانگین تولید مجموع چهار نوع افلاتوکسین را داشته اند.




ب




شکل ۱- کروماتوگرام افلاتوکسین های مختلف در الف) نمونه استاندارد ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر؛ ب) محیط مایع سیب زمینی دکستروز براث (شاهد). شرایط دستگاه HPLC: ستون: ODS2 C₁₈ (250×4.6 mm, 10μm)، فاز متحرک: متانول، استونیتریل، آب و اسید استیک با نسبت های حجمی ۲۰:۲۰:۵۹:۱ درصد، دمای محیط ۲۷ درجه سانتیگراد، سرعت جریان یک میلی لیتر بر دقیقه، آشکارساز فلورسنت: طول موج برانگیختگی ۳۶۵ و طول موج نشر ۴۲۵ نانومتر، حجم تزریق ۲۰


الف



ب



ج




شکل ۲- کروماتوگرام افلاتوکسین‌های مختلف در الف) گونه *A. parasiticus*؛ ب) گونه *A. terreus* و ج) گونه *A. ostium*. شرایط دستگاه HPLC: ستون: ODS2 C₁₈ (250×4.6 mm, 10μm)، فاز متحرک: متانول، استونیتریل، آب و اسید استیک با نسبت‌های حجمی ۲۰:۲۰:۵۹؛ ۱ درصد، دمای محیط ۲۷ درجه سانتیگراد، سرعت جریان یک میلی‌لیتر بر دقیقه، آشکارساز فلئورسانس: طول موج برانگیختگی ۳۶۵ و طول موج نشر ۴۲۵ نانومتر، حجم تزریق ۲۰ میکرولیتر.

مطابق این آزمایش‌ها در گونه‌های *A. awamori*، *A. auricomus*، *A. candidus* و *A. ustus* هر چهار نوع افلاتوکسین B_1 ، B_2 ، G_1 و G_2 تولید شده و میزان کل افلاتوکسین تولیدی در این گونه‌ها به ترتیب $0/84 \pm 0/07$ ، $0/36 \pm 0/03$ ، $2/04 \pm 0/23$ و $4/56 \pm 0/36$ میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر محیط PDB بود. در گونه *A. ostianus* تنها افلاتوکسین B_2 به میزان $0/01$ میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر محیط PDB تولید شد. گونه‌های *A. terreus*، *A. fumigatus*، *A. caespitosus* و *A. parasiticus* فاقد توانائی تولید افلاتوکسین G_1 در این شرایط بوده‌اند. گونه‌های *A. niveus* و *A. niger* فاقد توانائی تولید افلاتوکسین نوع G_1 و G_2 بودند. گونه *A. carneus* فاقد توانائی تولید افلاتوکسین نوع B_2 و G_1 بوده و گونه *A. sclerotiorum* فاقد توانائی تولید افلاتوکسین نوع B_2 و G_2 بود. تولید افلاتوکسین در گونه‌های مورد بررسی در سطح ۱٪ معنی دار بود (جدول ۱ و شکل ۳).

جدول ۱: مقادیر چهار نوع افلاتوکسین تولید شده در ۱۳ گونه قارچ اسپرژیلوس برحسب میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر محیط مایع سیب زمینی دکستروز برات

افلاتوکسین کل	افلاتوکسین				گونه قارچی
	AFG2	AFG1	AFB2	AFB1	
۱/۰۸	۰/۲۵	۰/۰۶	۰/۱۳	۰/۳۹	<i>A. awamori</i>
۰/۳۹	۰/۰۱	۰/۲۶	۰/۰۱	۰/۱۰	<i>A. auricomus</i>
۰/۱۰	.	.	۰/۱۰	.	<i>A. ostianus</i>
۵/۰۷	۰/۵۰	۰/۴۰	۰/۶۴	۳/۰۳	<i>A. candidus</i>
۵/۴۷	۰/۴۲	.	۰/۵۶	۴/۴۹	<i>A. terreus</i>
۲/۰۲	۰/۱۹	.	۰/۱۵	۱/۶۸	<i>A. fumigatus</i>
۰/۵۱	۰/۱۴	.	.	۰/۳۷	<i>A. carneus</i>
۰/۴۴	.	.	۰/۱۲	۰/۳۲	<i>A. niveus</i>
۰/۲۹	.	.	۰/۰۵	۰/۲۴	<i>A. niger</i>
۰/۴۷	۰/۰۸	.	۰/۰۷	۰/۳۲	<i>A. caespitosus</i>
۲/۰۶	۰/۲۲	۰/۶۲	۰/۳۶	۰/۸۶	<i>A. ustus</i>
۴/۱۱	.	۳/۹۵	.	۰/۱۶	<i>A. sclerotiorum</i>
۳۵۴/۱۸	۵/۷۵	.	۳۸/۸۶	۳۰۹/۵۷	<i>A. parasiticus</i>

Archive of SID



شکل ۳- دیاگرام میزان تولید افلاتوکسین کل در ۵۰ میلی لیتر محیط مایع PDB در ۱۲ گونه قارچ *Aspergillus sp.* گونه *A. parasiticus* نشان داده نشده است.

بحث

افلاتوکسین‌ها ترکیباتی هستند که به عنوان متابولیت‌های ثانویه عمدتاً به وسیله قارچ‌هایی چون *A. parasiticus* و *A. flavus* به دنبال رشد روی مواد غذایی مختلف تولید می‌شوند. دما و رطوبت نسبی برای رشد قارچ و تولید زهرابه قارچی اهمیت زیادی دارند. این عوامل محیطی برای تولید زهرابه‌های قارچی در مقایسه با رشد قارچ اهمیت بیشتری دارند و حتی ممکن است در مورد زهرابه‌های مختلف در یک گونه قارچی و گاه در مورد زهرابه‌های مشابه در بین چندین گونه قارچی متفاوت باشد (Gqaleni et al., 1997). این محققان بیان نمودند که دمای مناسب برای تولید افلاتوکسین B₁ دمای ۲۴-۳۵ درجه سانتیگراد است و با کاهش دما میزان تولید افلاتوکسین کاهش می‌یابد. آن‌ها هم چنین حداقل رطوبت نسبی مورد نیاز برای تولید افلاتوکسین B₁ در گونه قارچی *A. flavus* را ۸۷-۸۱٪ اعلام نمودند. آروس و همکاران (Arrus et al., 2005) در بررسی‌های خود اعلام کردند که دما و رطوبت نسبی نقش مهمی در آلودگی افلاتوکسین ایفا می‌نمایند. آن‌ها دمای ۲۵-۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۹-۹۷٪ را به عنوان دما و رطوبت بهینه برای تولید افلاتوکسین در خشکبار بیان نمودند. طیبی و همکاران (Tayebi et al., 2001) بیان نمودند دمای ۱۸-۳۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بیش از ۸۰٪ محیط مناسبی برای بیوسنتز افلاتوکسین در ذرت موجود در مزارع را فراهم نموده است. از این رو مطابق با تحقیقات فوق در این پژوهش دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و رطوبت ۸۰٪ برای محیط نگهداری قارچ‌های مایه زنی شده جهت ارزیابی تولید افلاتوکسین در گونه‌های قارچ آسپرژیلوس انتخاب گردید. شرایط تعیین شده اخیر از این نظر حائز اهمیت بود که تقریباً مشابه شرایط محیط طبیعی و شرایط تولید افلاتوکسین در طبیعت بوده است.

Archive of SID

میاحی و همکاران (Mayahi et al., 2007) اعلام کردند که غالب مواد غذایی که به مصرف انسان یا حیوانات می‌رسند محیط کشت مناسبی برای رشد قارچ اسپرژیلوس و تولید افلاتوکسین است. در پژوهش هانگ (Haug, 2007) بیان شد هر چه محیط رشد قارچ به محیط طبیعی نزدیک تر باشد تولید توکسین بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر محیط هائی مانند محیط سیب زمینی دکستروز آگار به عنوان یک محیط طبیعی محسوب می‌شوند، زیرا اغلب مواد غذایی خود را از عصاره های گیاهی و یا جانوری کسب می‌نمایند. در این پژوهش محیط مایع سیب زمینی دکستروز برات به عنوان محیط مناسب و ساده برای ارزیابی تولید افلاتوکسین در گونه های قارچ اسپرژیلوس انتخاب گردید. این محیط در مقایسه با سایر محیط های موجود جهت بررسی افلاتوکسین به میزان زیادی به محیط های طبیعی چون گندم و ذرت نزدیک می باشد و می توان نتایج حاصل از آن را قابل استناد به نتایج حاصل از اندازه گیری افلاتوکسین بر روی بذور و مواد غذایی دانست.

در بررسی اسچرم و همکاران (Scherm et al., 2005) افلاتوکسین را به عنوان متابولیت ثانویه تولید شده در اعضاء گروه *Aspergillus section Flavi* به ویژه گونه های قارچی *A. flavus*، *A. parasiticus* و *A. nomius* معرفی نمودند. در بررسی مهدی زاده و همکاران (Mehdizadeh et al., 2008) قارچ *A. flavus* به عنوان تولید کننده افلاتوکسین های B₁ و B₂ معرفی شده است. آن ها اعلام نمودند گونه های دیگر قارچ اسپرژیلوس به نام های *A. nomius* و *A. parasiticus* نیز افلاتوکسین های گروه B و G را تولید می کنند. در این بررسی در گونه قارچی *A. parasiticus* بیشترین میزان تولید افلاتوکسین های B₁، B₂ و G₂ مشاهده شده است، میزان کل افلاتوکسین تولیدی در این گونه ۷/۰۸ گرم در لیتر محیط مایع سیب زمینی دکستروز برات و در بالاترین مقدار در بین ۱۳ گونه مورد بررسی بوده است.

فنته و همکاران (Fente et al., 2001) خاصیت فلئورسانسی ۱۴ ایزوله گونه های اسپرژیلوس را در محیط کشت (Aflatoxin Producing Ability= APA) بررسی کردند، از بین ایزوله ها، هفت ایزوله از گونه *A. parasiticus* و پنج ایزوله از گروه *A. flavus*، خاصیت فلئورسانسی نشان دادند. این آزمایش روی محیط عصاره مخمر سوکروز آگار (YES) نیز با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC) انجام شد و نتایج بدست آمده مشابه نتایج این پژوهش بوده است. آن ها بیان نمودند تمام جدایه های گونه های قارچ اسپرژیلوس توانائی تولید افلاتوکسین را ندارند.

در سال ۱۹۸۸، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) افلاتوکسین B₁ را در لیست مواد سرطانزای انسان قرار داد، بر اساس گزارشات سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) هر ساله میلیون ها تن ماده غذایی در اثر آلودگی به میکوتوکسین ها از بین می روند. لذا سال ۱۹۸۸ برنامه ریزی های زیادی همراه با کارگاه های آموزشی برای کنترل بهداشتی مواد غذایی در دنیا صورت گرفت. ردی و همکاران (Reddy et al., 2009) در

Archive of SID

بررسی خود میزان آلودگی افلاتوکسین B₁ را در ۱۲۰۰ نمونه برنج با استفاده از روش ELISA تعیین کردند. آن‌ها اعلام نمودند بیشترین میزان آلودگی مربوط به گونه‌های *A. flavus*، *A. niger*، *A. ochraceus* و *A. parasiticus* بوده است. همچنین ۶۷/۸٪ از نمونه‌ها به افلاتوکسین B₁ به میزان ۳۰۸-۰/۱- آلوده گزارش شدند. ویلا و مارکزی (Villa and Markaki, 2009)، میزان آلودگی افلاتوکسین B₁ را در ۵۵ نمونه گندم با استفاده از روش HPLC و ستون ایمونوآفینیتی بررسی کردند. آن‌ها اعلام نمودند ۵۶/۳٪ از نمونه‌ها به افلاتوکسین B₁ به میزان ۱/۴۲ ng/g آلوده بودند. چان و همکاران (Chun et al., 2007) با بررسی ۸۵ نمونه خشکبار با استفاده از روش ELISA و HPLC اعلام نمودند در روش ELISA ۳۱٪ از نمونه‌ها به میزان ۰/۰۶٪ آلوده به افلاتوکسین بودند. در روش HPLC میزان آلودگی ۲۵-۱/۰۸- μg/kg گزارش شد. در این پژوهش میزان تولید افلاتوکسین B₁ در ۱۲ گونه قارچ آسپرژیلوس مورد بررسی غیر از گونه *A. flavus* در محدوده میزان آلودگی در محصولات کشاورزی تعیین شد، که این نتیجه با تحقیقات پیشین یاد شده مطابقت دارد. بیشترین میزان آلودگی به افلاتوکسین B₁ مربوط به گونه‌های قارچی *A. parasiticus*، *A. terreus*، *A. candidus* و *A. fumigatus* بود. این میزان توانائی تولید افلاتوکسین در گونه‌های قارچ آسپرژیلوس مورد بررسی با توجه به این که حد مجاز افلاتوکسین B₁ در ماده غذایی ۲۰ ppb اعلام شده است، قابل توجه است. این موضوع به این دلیل نیز دارای اهمیت است که معمولاً در محصولات کشاورزی و غذائی در صورت فعالیت چند گونه قارچ آسپرژیلوس با توانائی تولید افلاتوکسین و مساعد بودن شرایط محیطی، میزان افلاتوکسین تولید شده بسیار بحرانی خواهد بود. بهترین روش برای کنترل آلودگی به افلاتوکسین ها پیشگیری از طریق مدیریت قبل و بعد از برداشت محصول است.

References

1. Abbas KH, Cartwright DR, Xie W and Shier WT. 2006. Aflatoxin and fumonisin contamination of corn (maize, *Zea mays*) hybrids in Arkansas. *Crop Protection* 25: 1–9.
2. Agarwal VK and Sinclair JB. 1997. Seed treatment. pp. 423–460, *In*: VK Agarwal and JB Sinclair (eds). *Principles of Seed Pathology*. 2nd edition. Boca Raton: CRC Press.
3. Almasian S, Hoseini Gh, Sohani-Darban A and Malekzadegan F. 2008. Study of aflatoxin amount in corn meal. Paper Presented at: 18th National Congress of Food Industry; 15–17 October; Mashad, Iran.
4. Arrus K, Blank G, Abramson D, Clear R and Holley RA. 2005. Aflatoxin production by *Aspergillus flavus* in Brazil nuts. *Journal of Stored Products Research* 41: 513–527.
5. Barnett HL and Barry BH. 1979. *Illustrated Genera of Imperfect Fungi*. 4th ed. New York: APS Press. 218 p.
6. Chun HS, Kim HJ, Ok HE, Hwang JB and Chung DH. 2007. Determination of aflatoxin levels in nuts and their products consumed in South Korea. *Food Chemistry* 102: 385–391.
7. D'Mello JPF and MacDonald AMC. 1997. Mycotoxins. *Animal Feed Science and Technology* 69: 155–66.
8. Fardos B and Magda M. 2009. Trials towards reduction of fungal growth and aflatoxin G₁ production in Arabic coffee using different additives. *African Journal of Food Science* 3: 68–76.
9. Fente CA, Ordaz JJ, Vazquez BI, Franco CM and Cepeda A. 2001. New Additive for Culture Media for Rapid Identification of Aflatoxin -Producing *Aspergillus* Strains. *Applied and Environmental Microbiology* 67: 4858–4862.
10. Gqaleni N, Smith EJ, Lacey J and Gettinby G. 1997. Effects of temperature, water activity, and incubation time on production of aflatoxins and cyclopiazonic acid by an isolate of *Aspergillus flavus* in surface agar culture. *Applied and Environmental Microbiology* 63: 1048–1053.
11. Haung Ch. 2007. Mechanism of intraspecific toxin inhibition in *Aspergillus flavus*. [MSc]. [Baton Rouge (Louisiana)]: Louisiana State University.
12. Khanafari A, Soudi H and Miraboufathi M. 2007. Biocontrol of *Aspergillus flavus* and aflatoxin B₁ production in corn. *Journal of Environmental and Health Science* 4: 163–168.
13. Klick MA. 2002. *Identification of Common Aspergillus Species*. An Institute of the Royal Netherlands of Arts and Sciences, Dordrecht: Centraalbureau Voor Schimmelcultures (CBS) Publishing. 116 p.
14. Mayahi M, Jalali MR and Salamat N. 2007. Isolation of *Aspergillus* from fish powder, corn and soybean meal and measurement of their aflatoxin contents. *Science (Shahid Chamran University)* 17: 95–105.
15. Mehdizadeh M, Rabiei M, Moini Namin, M and Asghari Sh. 2008. Role of *Aspergillus* species in creating aflatoxicose. *Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd* 16: 100–107
16. Rahimi E, Kargar AR and Zamani F. 2008. Assessment of aflatoxin B₁ levels in animal feed of dairy farms in Chaharmahal & Bakhtiari. *Pajouhsh & Sazandegi* 79: 66–71

Archive of SID

17. Reddy KRN, Reddy CS and Muralidharan K. 2009. Detection of *Aspergillus* spp. and aflatoxin B1 in rice in India. Food Microbiolog. 26: 27–31.
18. Reddy KRN, Saritha P, Reddy CS and Muralidharan K. 2009. Aflatoxin B1 producing potential of *Aspergillus flavus* strains isolated from stored rice grains. African Journal of Biotechnology 8: 3303–3308.
19. Reddy SV and Waliyar F. 2008. Properties of aflatoxin and it producing fungi. [cited 2013 Jun 10]. Available from: www.aflatoxin.info/aflatoxin.asp.
20. Ricordy R, Cacci E, Augusti Tocco G. 2005. Aflatoxin B1 and cell cycle perturbation. pp. 213–231, In VR Preedy and R Watson (eds). Reviews in Food and Nutrition Toxicity, 4th ed. London: CRC Press.
21. Rodrigues P, Venâncio A, Kozakiewicz Z and Lima N. 2009. A polyphasic approach to the identification of aflatoxigenic and non-aflatoxigenic strains of *Aspergillus* section *Flavi* isolated from Portuguese almonds. International Journal of Food Microbiology 129: 187–193.
22. Scherm B, Palomba M, Serra D, Marcello A and Migheli Q. 2005. Detection of transcripts of the aflatoxin genes aflD, aflO, and aflP by reverse transcription–polymerase chain reaction allows differentiation of aflatoxin-producing and non-producing isolates of *Aspergillus flavus* and *Aspergillus parasiticus*. International Journal of Food Microbiology 98: 201–210.
23. Tayebi J and Mirabolfathi M. 2001. Infection of some hybrid corns to B₁ and B₂ aflatoxin and the casual fungus in the field. Journal of Applied Entomology and Phytopathology 69: 79–84
24. Villa P and Markaki P. 2009. Aflatoxin B₁ and ochratoxin A in breakfast cereals from Athens market: Occurrence and risk assessment. Food Control 20: 455–461.