



سال دوم، شماره‌ی ۶
بهار ۱۳۹۰، صفحات ۶۸-۶۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

تأثیر ماده شیمیای میپیکوات کلراید روی گیاه پنبه

عارف خیر جو

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
arefkheirjo@yahoo.com

شهرام شاهرخی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

حجت اسفرم مشگین شهر

کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

چکیده:

کاربرد مواد شیمیایی در کشاورزی برای متوقف ساختن رشد گیاه از جمله پنبه به همراه سرزنی درجهت حذف فعالیت غالیت انتها بی در گیاه به جای افزایش رشد رویشی در راستای اقدام به افزایش رشد گیاه از جمله پنبه به همراه سرزنی در نتیجه باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گردد. طرح تحقیقی در منطقه مغان با ارقام پنبه به عنوان فاکتور اول شامل: شیرپان - ورامین - اولتان و مهر و فاکتور دوم شامل: تیمار سرزنی در ۳۰ روز بعد از گل دهی - هورمون پاشی پیکس ۱۵ و ۳۰ روز بعد از گل دهی به همراه شاهد اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار صورت گرفت. نتایج بدست آمده در بررسی صفت ارتفاع بوته بر روی ارقام و تیمارها و اثر متقابل بین این دو فاکتور اختلاف معنی دار مشاهده شد. مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان داد که رقم ورامین × هورمون پاشی پیکس در ۳۰ روز بعد از گلدهی با کاهش میانگین ارتفاع ۷۰ cm نسبت به سایر ترکیب تیماری ها برتری داشت. صفات عملکرد روش و عملکرد دانه با توجه به نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری نشان نمی دهند و در بررسی عملکرد صفت بیست غوزه ترکیب تیماری رقم ورامین × پیکس ۱۵ روز بعد از گل دهی با میانگین ۱۳۸ گرم بیشترین عملکرد را داشته است. در این مطالعه رقم ورامین با تیمار هورمون پاشی نتیجه مطلوبی داد.

کلید واژه‌ی: سرزنی - هورمون پیکس (PIX) و پنبه.

مقدمه

۴: کاهش محلهای تغذیه برای حشرات در حال دیاپوز.

تنظیم کننده رشد در اوایل فصل، اهدافی چون کنترل رشد رویشی و افزایش تشکیل میوه حاصل شده است. این روش نه تنها عملکرد را افزایش می‌دهد و پوشش گیاهی را بازتر نگاه می‌دارد، بلکه برداشت را در مزرعه‌ای که رشد زیادی دارد آسانتر می‌کند. با کاربرد مواد تنظیم کننده در اواخر فصل می‌تواند باز شدن غوزه‌ها و ریزش غوزه‌های نرسیده را تسريع کرد. باز شدن زود و یکنواخت غوزه‌ها منجر به بیشترین بازدهی در برداشت اول می‌شود و کمک می‌کند تا هدف کامل شدن برداشت در یک مرحله پنهانی حاصل شود. این روش موجب صرفه جویی در هزینه می‌شود که حائز اهمیت است. این عقیده وجود دارد که کیفیت الیاف ممکن است با این استراتژی کمی افت کند اما انعطاف پذیری برای فروش محصولی که هزینه برداشت آن در مقابل کاهش ناچیز قیمت بازار کار کم باشد، مساله‌ای است که مدیران را به خود جلب می‌کند.

استفاده از تنظیم کننده رشد در پنبه

تحقیقات بسیاری به عمل آمده تا کاربرد تنظیم کننده‌های رشد شناسائی گردد و در عرض دو دهه گذشته تعداد بی‌شماری ترکیبات مصنوعی بوجود آمده و روی پنهان آزمایش گردیده که نتایج تاسف باری نیز نشان داده است. بخشی از دلایل آن مربوط به عدم تحقیقات پایه‌ای روی چگونگی تاثیراتین ترکیبات در سیستم تولید پنهانی باشد و همچنین ناسازگاری‌ها تنظیم کننده رشد می‌توانست ناشی از فاکتورهای محیطی همچون دما، رطوبت، وضعیت مواد مغذی، معادنی و زمان کاشت باشد [۷،۶،۱۲]. نمونه‌هایی از مواد تنظیم کننده رشد که در حال حاضر جهت کنترل رشد پنهانه مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل پیکس^۱، سایکوسل^۲، پی‌جی‌آر^۳، سیتوکنین^۴، پرورپ^۵، تیدیازوران^۶، اسید استیک^۷، اسید فسفویک و اسید آرسنیک می‌باشند. از آنجاییکه هر مواد و ترکیبی در اندام‌های مختلف گیاه اثراتی خواهد داشت لذا بسیار با اهمیت است که پس از انجام

پنبه گیاهی است گلدار (دولپه) از تیره مالواسه Malvaceae زیره طایفه Hibisceae و از جنس Gossypium. گیاهی است ذاتاً چند ساله که بصورت گیاه یک ساله مورد زراعت قرار می‌گیرد به علت آن که در دنیا امروز موارد مصرف گوناگونی دارد، از نظر اقتصادی و تجاری اهمیت فوق العاده ایست روز به روز براهمیت و سطح زیرکشت آن افزوده می‌گردد. هرگاه در کاشت و عملیات داشت و برداشت این گیاه دقت کافی مبذول شود محصول قابل توجهی تولید خواهد نمود چون مردم جهان به آن احتیاج دارند به آن طلای سفید هم می‌گویند. گرچه الیاف مصنوعی تا اندازه‌ای در صنایع نساجی جای پنهان را گرفته است لکن هنوز پنهان ارزش و مقام خود را حفظ کرده و مهم‌ترین و پرمصرف ترین الیاف صنعتی است چون دارای خصوصیاتی است که هیچ ماده سنتزی یا مصنوعی نمی‌تواند با آن رقابت کند. واين خصوصیات عبارتنداز: قابلیت شستشو، دوام، استحکام، در حالتی که مرطوب و خشک است، قدرت انتقال بخار، ثبات شیمیایی، نرمی، انعطاف، خصوصیات دیگری نیز در اثر کاربرد حاصل گردید که در نتیجه افزایش نهادهای تولید تحت شرایط پرورش بهینه اغلب گیاهان به طور مفرط رشد می‌کنند. رشد گیاهی مفرط می‌تواند منجر به ریختن میوه و افزایش مشکلات مربوط به حشرات و بیماری‌ها و کاهش بازده محصول، کیفیت فیبر و محصول پنهان شود (۱۱).

در دهه‌های اخیر مواد شیمیایی برای کنترل رشد رویشی و زایشی با هدف قرار دادن فرآیندهای هورمون گیاهی خاصی مورد تحقیق قرار گرفته است. امروزه نیز، به منظور جلوگیری از رشد رویشی پنهانه هورمون‌های جدید مثل پیکس را روی رشد پنهانه مورد آزمایش قرار دادند (۵).

مکانیسم رشد، کنترل با مواد شیمیایی

در زمینه کاربرد مواد شیمیایی برای متوقف ساختن رشد پنهان، ریختن میوه‌های در اوخر فصل و قطع اجباری گلدهی به موقیت‌های قابل توجهی دست یافتد. هدف عدمه تغییر گل دهی، میوه دهی و متوقف ساختن گل دهی بوسیله مواد شیمیایی عبارتند:

- ۱: ایجاد توازن بیشتر میان میوه دهی و رشد رویشی گیاهان پنهان.
- ۲: جلوگیری از تشکیل غوزه‌ها و غنچه دهی نهایی ناخواسته.
- ۳: پنهانه زودرس و برداشت زودتر از موعد.

¹. Pix
². Cycoceil(ccc)
⁴. Cytokines
⁵. Prep
⁷. Acetic acid

³. PG- R - IV
⁶. Tidiazuran

انتخاب گردد[۴].


بررسی و تحقیق کافی ترکیبات مناسب برای هر هدف و منظور

یون کلسیم در بافت و بون پتاسیم در ریشه گیاه می‌شود. افزایش کلروفیل در گیاه به معنی افزایش فتوستتر و در نتیجه افزایش عملکرد محصول و بهبود بخشیدن به عکس العمل گیاه در مقابل هر گونه آسترس و تسریع انجام فرایندهای فیزیولوژیکی می‌باشد. بر اساس آزمایشات به عمل آمده گیاه تیمار شده با پیکس ۸۰-۵۰ درصد بیشتر از گیاه معمول کلروفیل دارد پیکس رشد رویشی و زایشی را با کاهش غلظت اسید جیرلیک در گیاه که در نتیجه آن دراز شدن میان گرهی را مانع می‌شود، کنترل می‌کند. در واقع با کاهش خاصیت الاستسیتی دیواره اسکلتی امکان کشسانی به جهت رشد را محدود نموده و موجب افزایش سختی دیواره سلولی می‌شود که در نتیجه آن دراز شدن و تکثیر سلول‌ها را مانع می‌شود در نتیجه توقف طویل شدن سلول‌ها و شکستن گره‌ها باعث کاهش رشد بوته در طول و عرض می‌گردد. این روند ۴ هفته پس از محلول پاشی با پیکس شروع و تا مرحله برداشت محصول ادامه خواهد داشت. کاهش طول ساقه بیشتر از قسمت‌های وسط به طرف بالای بوته صورت می‌گیرد. در نتیجه قسمت‌های انتهایی گیاه رشد نمی‌کند. در گیاه محلول پاشی شده با پیکس تعادلی بین نسبت ریشه به اندام‌های هوایی گیاه حادث می‌شود که خود در تعادل کلی گیاه نقش عمده‌ای را بازی می‌کند [۸، ۹].

چندین مشخصه گیاهی سودمند از مصرف پیکس از جمله کاهش سطح برگ، کاهش طول میان گره، جابجای در مکان، قوزه پنبه و کاهش ارتفاع به دست آمده است [۹]. به منظور جلوگیری از رشد رویشی هورمون پیکس با تراکم‌های مختلف پنبه مورد استفاده قرار گرفت. کلیه خصوصیات پنبه مثل ارتفاع بوته از اولین مرحله شروع هورمون پاشی به فاصله هر ۱۵ روز یکبار، وزن متوسط غوزه‌ها، عملکرد و صفات تکنولوژی الیاف، درصد روغن، تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت، افزایش تراکم موجب افزایش معنی‌دار عملکرد و شد در واحد سطح شد. همچنین مصرف چهار بار هورمون پیکس در طول فصل رویش، به میزان ۲۵۰ سی سی در هر نوبت سبب افزایش عملکرد شد [۳].

مشخصات و مکانیزم عمل پیکس

تنظیم کننده رشد پیکس با نام عمومی میپیکوات کلراید (MC) Mepiquat chloride بصورت کریستال‌های قرمز روشن بی بوکه در آب بخوبی حل می‌شود.



میپیکوات کلراید (MC) توسط BASF توسعه یافته است و عمومی ترین تنظیم کننده رشد پنبه می‌باشد و مت Shank از ۴/۲٪ N-N dimethyl piperidinium chloride و یک ترکیب چهار جزیب Ammonia که درمانشدن از ستر (تولید) اسید gibberilic شرکت دارد میپیکوات کلراید از دهه ۱۹۸۰ برای استفاده در پنبه بر چسب خورده است [۱۰].

میپیکوات کلراید از دسته اسیدهای جیرلیک بوده که تحت نام Pix Ultra, Mepex PIX, Mepex Ginout در اوخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک تنظیم کننده رشد برای جلوگیری از رشد مفرط گیاه با کاهش ارتفاع گیاه و افزایش عملکرد و اجرای عملکرد به بازار ارائه شد. در کشندۀ این ماده برای موش LD₅₀- 690 mg/kg می‌باشد. استفاده از پیکس برای دام‌ها بی خطر است و عمدتاً توسط اندام‌های سبز گیاه جذب می‌شود. پیکس در خاک مزرعه به سرعت CO₂ و آب تجزیه می‌شود. نیمه عمر این ماده دو هفته است. بر روی میکروفلور موجودات زنده خاک چنانچه در حد توصیه شده مصرف شود بی اثر می‌باشد. آزمایشات انجام شده نشان داده است که تا ۳۳ برابر دز معمولی بر روی عملیات نیتریفیکاسیون در خاک بی اثر است. همانطور که اشاره شد ماده موثر تنظیم کننده رشد پیکس از طریق برگ‌ها جذب گیاه می‌شود. این ماده در ریشه متابولیزه نشده و آزمایش بقاوی گیاهی نشان می‌دهد ماده موثر تنظیم کننده رشد برگ گیاه را به رنگ سبز در می‌آورد این بخاطر تغییراتی است که در ساختمان کلروفیل برگ صورت می‌پذیرد و در نتیجه استحکام برگ حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. ضمناً میزان کلروفیل برگ‌ها افزوده شده و باعث افزایش تمرکز

تکمیلی انجام گرفت و کودهای مورد نیاز شامل: کود اوره ۱۵۰

کیلو گرم در هکتار به صورت سرک ۳ بار ارائه گردید. $\frac{1}{3}$ در

آبیاری اول، $\frac{1}{3}$ در آبیاری دوم، $\frac{1}{3}$ در آبیاری سوم داده شده و سوپرفسفات تریپل به مقدار ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار اضافه شد. پس از آماده سازی بستر بذر به صورت جوی پشتہ ای بذرها بر روی پشتہ ها در دهه آخر اردیبهشت کاشت شد. در این مطالعه: عملکرد دانه - ارتفاع بوته - عملکرد بیست غوزه و عملکرد چین اول، چین دوم و عملکرد کل مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه واریانس داده ها از نرم افزار C-MSTAT استفاده گردید.

مواد و روش ها:

این طرح تحقیقی در منطقه مغان با ارقام پنه به عنوان فاکتور اول شامل: شیرپان - ورامین - اولتان و مهر و فاکتور دوم شامل: تیمار سرزنی در ۳۰ روز بعد از گل دهی - هورمون پاشی پیکس ۳۰ روز بعد از گل دهی - هورمون پاشی پیکس ۱۵ روز بعد از گل دهی - شاهد بدون هورمون پاشی و سرزنی اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار صورت گرفت و مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت. غلظت هورمون یک در هزار در نظر گرفته شد. در پاییز زمین شخم دریافت گردیده و در بهار شخم

تجزیه واریانس تأثیر هورمون پیکس (pix) و سرزنی روی عملکرد ارقام مختلف پنه (Gossypium hirsutum L.) در منطقه مغان (۱)

متابع تغییر	درجه آزادی	سطح سبز	ارتفاع بوته	تعداد غوزه	وزن ۲۰ غوزه	عملکرد وش چین اول	عملکرد وش چین دوم	عملکرد وش چین کل	عملکرد دانه
میانگین مربوطات (MS)									
تکرار	۲	۴/۱۴۶	۰/۸۹۶	۳/۰۷۳	۱/۵۹۲				
فاکتور A	۳	۹/۶۸۸	۶۸۸/۷۳۵**	۳/۶۶۱	۶۳۶/۱۹۹.**				
فاکتور B	۳	۰/۲۴۳	۹۶۵/۹۲۶**	۲/۶۶۲	۳۳۸/۱۷۸**				
AB	۹	۲/۷۴۳	۳۵۴/۶۳**	۴/۰۰۵	۵۰۶/۱۰۴**				
خطا	۳۰	۳/۵۲۴	۸/۱۸۵	۲/۹۳۶	۱۶۵۰۰	۱۳۵۴۱۶/۶۶۷	۱۳۸۶۴۵۸۳۳	۴۷۵۶۲۵	۱۴۳۸۷۶/۵۶
(ضریب تغییرات) Cv%									

فاکتور A: ارقام (مهر، ورامین،

اولتان و شیرپان).

فاکتور B: تیمارهای سرزنی و

هورمون پیکس.


به ترتیب نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار و اختلاف معنی دار ** و *، ns

سطح احتمال ۰.۱٪ می باشد در


میپیکوات کلراید یعنی پیکس با کاهش طول میان گرهی در ساقه اصلی و شاخه‌های بارده و نیز کاهش سطح برگ، رشد گیاهی را کم می‌کند. صفات عملکرد چن اول، چن دوم و چن کل و عملکرد دانه با توجه به جدول شماره (۱) اختلاف معنی داری نشان نمی‌دهد. بررسی عملکرد صفت بیست غوزه طبق جدول شماره (۱) حاکی از وجود اختلاف معنی داری بین ترکیب‌های تیماری بود براساس مقایسه میانگین به روش دانکن (شکل ۲) تیمار رقم ورامین × پیکس ۱۵ روز بعد از گل‌دهی با میانگین ۱۳۸ گرم نسبت به سایر ترکیب تیماری‌ها برتر بود با نتایج غیور بستان آبادی و زحمتکش ۱۳۷۲ مشابه می‌باشد.

نتایج و بحث :

نتایج بدست آمده در طی جدول تجزیه واریانس آورده شده است: در بررسی صفت ارتفاع بوته بر روی ارقام و تیمارها و اثر مقابل بین این دو فاکتور اختلاف معنی دار مشاهده شد. مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن نشان داد که در طی شکل شماره (۱) رقم ورامین × هورمون پاشی پیکس در ۳۰ روز بعد از گل‌دهی با میانگین ارتفاع ۷۰ نسبت به سایر ترکیب تیماری‌ها برتری تیمار های اعمال شده بر روی رقم اولنان بی تاثیر بود. در گزارشات حاصل از مطالعات مختلف توسط استوارت در سال ۲۰۰۵ نیز مشخص گردید که تنظیم کنده‌های رشد مصنوعی حاوی



شکل ۱. تاثیر سرزنى و هورمون پاشی پیکس بر صفت ارتفاع بوته در ارقام مختلف پنبه



شکل ۲. تاثیر سرزنى و هورمون پاشی پیکس بر صفت وزن ۲۰ غوزه در ارقام مختلف پنبه

منابع:

- ۱- بی نام. ۱۳۷۴. پیکس، ماده تنظیم کننده رشد پنبه، نشریه شرکت گیاه‌بان ص. ۵۰-۶۴.
- ۲- غیورستان آبادی، د. و ف، زحمتکش. ۱۳۷۲. گزارش نهانی طرح مقایسه اثر استفاده از هورمون تنظیم کننده رشد پیکس در زراعت پنبه در شرایط زراعی. سازمان کشاورزی استان گلستان. صفحات ۴۰-۴۵.
- ۳- متکی، آثار هورمون پیکس و تراکم‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه، زیتون، شماره ۱۶۱، آذر. ص. ۲۶ تا ۲۴.
- ۴- نعمتی، ن. ۱۳۸۰. تنظیم کننده رشد (پیکس) در پنبه، انتشارات فنی معاونت ترویج. تمام صفحات.
- ۵-Cathey,G.W.,andR.O.Thomas.1986. Use of Plant Growth Regulators for Crop Modification, p. 136-42, In J. R. Mauney and J. M. Stewart, ed.Cotton Physiology.The Cotton Foundation ,Memphis ,TN. Practices, p. 451-488.
- 6-Cathey,G.W.,andW.R.Meredith.1988.Cotton response to planting date and mepiquat chloride. Agron. J. 80:463-466.
- 7-Kerby,T.A.,K. Hake, and M. Keeley.1986.Cotton fruiting modification with mepiquat chloride. Agron. J. 78:907-912.
- 8-Reddy,V.R.,H.F.Hodges, and D.N.Baker.1990.Temperature and mepiquat chloride effects on cotton canopy architecture. Agron. J. 82:190-195.
- 9-Shukla,G.K.1972.some statisticaed aspect of partitioning genotypex environmental components of variability .Heredity ,28:237-245 .
- 10-Stewart, S. 2005. Suggested Guidelines for Plant Growth Regulator Use on Louisiana Cotton.Louisiana Cooperative Extension Service Publication Number 2918.
- 11-Walter,H.,H.W.Gausman,F.R.Rittig,L.M.Namkin,D.E.Escobar, and R.R. Rodriguez. 1980. Effects of mepiquat chloride on cotton plant leaf and canopy structure and dry weights of its components. p. 32-35. In Proc. Beltwide Cotton Prod. Res. Conf., St. Louis, MO. 6-10 Jan. Natl. Cotton Counc. Am., Memphis, TN.
- 12-Wullscherger,S.D.and D.M.Oosterhuis.1990.Photosynthetic carbon production and use by developing cotton leaves and bolls. Crop Sci. 30:1259-1264.