

## بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود (استان مازندران) با استفاده از ماکروبتوزها

عبدالرحیم وثوقی<sup>۱\*</sup>، صابر وطن‌دوست<sup>۲</sup>، مائده بابازاده<sup>۱</sup>

### چکیده

کفزیان در اکوسیستم های آب جاری و ساکن نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این تحقیق در رودخانه کلارود بابل (استان مازندران) از آبان ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰ به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود با استفاده از شناسایی جامعه بی‌مهرگان کفزی در سطح خانواده پرداخته شده است و نتایج این بررسی با شاخص دیگری به نام نسب PT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) به Chironomidae مقایسه گردید. نمونه‌برداری در چهار فصل و شش ایستگاه به ترتیب در مناطق دیوا (ایستگاه اول)، بورا (ایستگاه دوم و سوم)، سفیدطور (ایستگاه چهارم)، شوبکلا (ایستگاه پنجم) و پل محمدحسن‌خان بابل (ایستگاه ششم) صورت گرفت. بی‌مهرگان کفزی به وسیله نمونه‌بردار کمی سوربر جمع‌آوری شده است. همزمان با نمونه‌برداری از ماکروبتوزها، متغیرهای هیدرولوژیک نیز در هر ایستگاه ثبت شد. به طور کلی کفزیان رودخانه از دو شاخه بندپایان و کرم‌های پهن شامل ۵ رده ۸ راسته و ۱۲ خانواده بودند که حداکثر تنوع و تراکم در فصل بهار و حداقل تنوع و تراکم را در فصل تابستان در تمام ایستگاه‌ها نشان داد، همچنین ایستگاه اول و ششم به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تنوع بودند. کیفیت آب رودخانه براساس راهنمای کیفی آب هیلسنهوف برای مقادیر مختلف آلودگی آلی، در بالادست دارای شرایط خیلی خوب (احتمال وجود آلودگی آلی در حد بسیار جزیی) و در میان دست و پایین دست با شرایط خوب (احتمال وجود آلودگی آلی در حد جزیی) ارزیابی شد.

کلید واژه: کفزیان، کیفیت آب، رودخانه کلارود.

۱- گروه شیلات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mohammad.mga93@gmail.com

۲- گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

## ۱- مقدمه


رودخانه‌ها که در طول تاریخ یکی از منابع عمده آب مصرفی بشر بوده‌اند، آبهای جاری از نقطه نظر بیولوژی و شیلات جالب توجه می‌باشد. اما انسان علیرغم استفاده‌های گوناگون از آب رودخانه‌ها به علت توسعه جوامع بشری و گسترش صنایع همواره از منابع مهم آلودگی و تخریب آبهای جاری بوده است. آلودگی آب رودخانه‌ها را در حقیقت می‌توان شاخص آلودگی محیط زیست در اثر فعالیت‌های انسانی به حساب آورد، زیرا رودخانه‌ها تنها منابع آبی هستند که مسیر طولانی را از میان شهرها، روستاها و مناطق صنعتی و کشاورزی طی می‌کنند و به انواع گوناگون آلاینده‌ها، آلوده می‌شوند و چون آب رودخانه‌ها بیش از آب هر منبع دیگری برای مصارف گوناگون مانند کشاورزی، تجاری، خانگی و صنعتی استفاده می‌شود، می‌تواند اثرات سوء گسترده‌ای بر محیط زیست داشته باشد. بنابراین از وقایع مهم در این اکوسیستم‌ها، مطالعه آثار آلودگی‌ها بر روی کیفیت آب و تنوع و پراکنش زیستی کفزیان رودخانه می‌باشد. بانمونه‌برداری از محیط‌های آبی و کفزیان آن، می‌توان پی به وضعیت آب برد. این روش که برای اولین بار در اروپا در سال‌های ابتدای قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفت تحت عنوان پایش زیستی، مبتنی بر بررسی جانوران آبی (مانند بی‌مهرگان کفزی و ماهی‌ها) به عنوان شاخص تعیین کیفیت آب می‌باشد (Rosenberg and Resh, 1993). آلودگی ناشی از مواد آلی معمولاً سبب محدودیت در تنوع بی‌مهرگان بزرگ کفزی می‌گردد، به طوری که تنها گونه‌ها بسیار مقاوم، آن هم در غلظت کم اکسیژن باقی خواهند ماند. از طرف دیگر تشکیل لجن و نفوذ مواد شیمیایی سمی نه تنها ممکن است سبب کاهش جمعیت گونه‌ها گردد، بلکه امکان دارد باعث حذف کامل جامعه بی‌مهرگان بزرگ کفزی در آن منطقه آلوده شود. البته در این میان، تلاطم رودخانه و غلظتیدن آب بر روی سنگها، مقدار بیشتری هوا و در نتیجه اکسیژن را در خود حمل نموده و سبب تسریع عمل اکسیداسیون مواد آلی و کاهش مواد سمی گردد (اصل خودپالایی رودخانه‌ها). با استفاده از مطالعات هیدروبیولوژیک می‌توان خصوصیات کیفی آبهای جاری را تعیین نمود (احمدی، نفیسی، ۱۳۸۰). هدف از این تحقیق به کارگیری جاندارانی است که تقریباً به طور دائم و در طول سال نمایندگان در اکوسیستم‌های آبی دارند و بررسی آنها می‌تواند به ما در ارزیابی دقیق، سریع و در عین حال ارزان منابع آب کمک‌های شایانی نماید.

## ۲- مواد و روش‌ها

در مجموع ۶ ایستگاه مطالعاتی در مسیر حدود ۶۰ کیلومتری رودخانه انتخاب (شکل ۱) و فون کفزیان بزرگ آن به صورت فصلی (از پاییز ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۰) در ۴ فصل و با ۳ تکرار در هر ایستگاه نمونه‌برداری شد. جهت تعیین موقعیت جغرافیایی از دستگاه GPS استفاده شد.

جدول ۱- موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های مطالعاتی

شماره ایستگاه	نام ایستگاه	موقعیت ایستگاه ها
ایستگاه ۱	دیوا	N 36 19.014' E 52 34.022'
ایستگاه ۲	دولت رودبار	N 36 20.067' E 52 34.032'
ایستگاه ۳	سرپورا	N 36 20.927' E 52 33.822'
ایستگاه ۴	پایین سفیدطور	N 36 21.674' E 52 35.850'
ایستگاه ۵	شوب کلا	N 36 26.276' E 52 35.907'
ایستگاه ۶	پل محمد حسن خان	N 36 31.468' E 52 39.842'



شکل ۱. بابلرود و شاخه‌های آن

برای نمونه‌برداری کمی از بی‌مهرگان کفزی از تور نمونه‌برداری سوربر با اندازه چشمه ۲۵۰ میکرون و ابعاد ۴۰×۴۰ سانتیمتر (سطح مفید ۱۶۰۰ سانتیمترمربع) استفاده شد (Standard method, 2006). همزمان با نمونه‌برداری از بی‌مهرگان کفزی برخی متغیرها از قبیل: دمای آب و سرعت جریان، وضعیت ظاهری آب، وضعیت بستر، عمق آب، عرض رودخانه که نقش مؤثری در پراکنش کفزیان دارند مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط فرمالین ۴٪ تثبیت و در آزمایشگاه با دقت کامل در زیر لوپ جداسازی، شناسایی و شمارش گردید. نگهداری نمونه‌ها در داخل ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای کوچک به ارتفاع تقریبی ۵-۶ cm و قطر ۳ cm (قوطی فیلم) و در داخل الکل اتیلیک ۷۵٪ انجام گردید (Mecafferty, 1981). جهت شمارش نمونه‌ها برای شناسایی خانواده‌های مختلف کفزیان نیز از کلید شناسایی (Mecafferty, 1981 Aquatic Entomology) و جهت شناسایی زیرخانواده‌های Chironomidae از کلید شناسایی (Nillson, 1997, Aquatic Insects of(north) Europe استفاده شد. جهت محاسبه شاخص زیستی تصحیح شده هیلسنهوف در سطح خانواده از فرمول زیر استفاده شد:

$$HFBI = \frac{\sum (X_i \times T_i)}{n}$$

در این فرمول

$X_i$ : تعداد افراد یک خانواده

$T_i$ : درجه مقاومت همان خانواده

$n$ : تعداد کل موجودات در نمونه

(Hilsenhoff, 1988; Bode *etal*, 1991, 1996; Rosenberg, 2004)

سپس از یک راهنمای کلی که برای کیفیت آب رودخانه‌ها می‌باشد استفاده (جدول ۱) و باتوجه به آن درجه آلودگی آلی نیز مشخص می‌شود. لذا از این شاخص جهت بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود و تعیین میزان بار آلودگی آلی (در ایستگاه‌های شش‌گانه) استفاده گردید.

جدول ۲- کیفیت آب براساس شاخص HFBI

میزان آلودگی آب	کیفیت آب	HFBI
عدم وجود آلودگی آلی	عالی	۰ - ۳/۷۵
وجود آلودگی آلی بسیار جزئی	خیلی خوب	۳/۷۶ - ۴/۲۵
وجود آلودگی آلی جزئی	خوب	۴/۲۶ - ۵/۰۰
وجود آلودگی آلی متوسط	نسبتاً خوب	۵/۰۱ - ۵/۷۵
وجود آلودگی آلی زیاد	نسبتاً بد	۵/۷۶ - ۶/۵۰
وجود آلودگی آلی بسیار زیاد	بد	۶/۵۱ - ۷/۲۵
آلودگی آلی شدید	خیلی بد	۷/۲۶ - ۱۰/۰۰

## ۳- نتایج

نتایج حاصل از اندازه‌گیری پارامترهای هیدرولوژیک رودخانه کلارود طی دوره بررسی در ایستگاه‌های مختلف در جدول (۳) و (۴) آورده شده است. کمترین میانگین سرعت آب رودخانه کلارود طی دوره بررسی برابر ۰/۵۷ متر بر ثانیه در فصل تابستانو بیشترین میانگین آن برابر ۰/۹۳ متر بر ثانیه در فصل زمستان اندازه‌گیری شد (جدول ۳). همچنین تغییرات این پارامتر در رودخانه کلارود از پاییز ۸۹ تا زمستان ۸۹ روند افزایشی داشت و پس از آن تا تابستان ۹۰ روند سرعت آب کاهشی بود.


جدول ۳. میانگین متغیرهای هیدرولوژیک و دمای اندازه‌گیری شده در رودخانه کلارود طی فصل ۴

فصل	متغیرهای هیدرولوژیک				دما
زمان نمونه‌برداری	سرعت (متر بر ثانیه)	عمق رودخانه (سانتی متر)	عرض رودخانه (متر)	دبی (متر مکعب بر ثانیه)	دما آب (درجه سانتی گراد)
بهار	۰/۶۴	۱۹/۱۶	۶/۳۳	۰/۷۶	۱۱
تابستان	۰/۵۷	۱۳/۵	۴/۸۳	۰/۳۵	۱۹/۶
پاییز	۰/۸۵	۲۴/۱۶	۷/۸۳	۱/۵۹	۹/۸۳
زمستان	۰/۹۳	۳۰/۸۳	۹	۲/۵۱	۷/۲۵
میانگین	۰/۷۴	۲۱/۹۱	۶/۹۹	۱/۳۰	۱۱/۹۲


جدول ۴. میانگین متغیرهای هیدرولوژیک و دمای اندازه‌گیری شده در رودخانه کلارود طی فصل ۴

مکان نمونه برداری	متغیرهای هیدرولوژیک				دما
ایستگاه	سرعت (متر بر ثانیه)	عمق رودخانه (سانتی متر)	عرض رودخانه (متر)	دبی (متر مکعب بر ثانیه)	دما آب (درجه سانتی گراد)
اول	۰/۸۲	۱۷	۵/۵	۰/۷۶	۱۱/۲۵
دوم	۰/۸۷	۲۵/۷۵	۱۰/۲۵	۲/۲۲	۱۲
سوم	۰/۷۲	۲۵	۴/۵	۰/۸۱	۱۳
چهارم	۱/۲۵	۱۲/۵	۴/۵	۰/۶۷	۹/۳۳
پنجم	۰/۵۶	۲۱/۲۵	۷	۰/۸۲	۱۱/۶۲
ششم	۰/۵۷	۳۰	۱۰/۲۵	۱/۷۵	۱۱/۷۵
میانگین کل	۰/۷۹	۲۱/۹۱	۷	۱/۱۷	۱۱/۴۹

میانگین سرعت آب در طول رودخانه کلارود برابر  $0/79$  متر بر ثانیه اندازه گیری شد. بیشترین میزان میانگین سرعت آب  $1/25$  متر بر ثانیه در ایستگاه چهارم و کمترین میزان آن  $0/56$  متر بر ثانیه در ایستگاه پنجم ثبت شد (جدول ۴). عمق آب رودخانه کلارود طی یک سال با میانگین  $21/91$  سانتی‌متر، حداکثر  $30/83$  سانتی‌متر در فصل زمستان و حداقل  $13/5$  سانتی‌متر در فصل تابستان اندازه‌گیری شد (نمودار ۱). بیشترین عمق آب در رودخانه کلارود طی دوره بررسی  $30$  سانتی‌متر در ایستگاه شش و کمترین آن  $16/66$  سانتی‌متر در ایستگاه چهارم با میانگین  $22/61$  سانتی‌متر مشاهده شد (نمودار ۲).



نمودار ۱. روند تغییرات میانگین عمق آب در رودخانه کلارود طی دوره بررسی، سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹




نمودار ۲. روند تغییرات میانگین عمق آب ایستگاه‌ها در رودخانه کلارود طی دوره بررسی، سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

تغییرات میانگین "دبی آب" در فصل‌های مورد بررسی بدین صورت که دامنه تغییرات دبی از ۰/۳۵ تا ۲/۵۱ متر مکعب بر ثانیه حداقل در فصل تابستان و حداکثر در فصل زمستان با میانگین ۱/۳۰ متر مکعب بر ثانیه اندازه‌گیری شد (جدول ۲). در این مطالعه در رودخانه کلارود کمترین دمای آب برابر ۷/۲۵ درجه سانتی‌گراد در فصل زمستان و بیشترین آن ۱۹/۶ درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان و میانگین دما ۱۱/۹۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد (شکل ۳).

نتایج بررسی انواع مشاهده شده جامعه بی‌مهرگان کفزی رودخانه کلارود شامل ۵ رده، ۸ راسته و ۱۲ خانواده می‌باشد.


طبقه‌بندی کامل این موجودات در (جدول ۵) نشان داده شده است. طی این مطالعات در مجموع، رده حشرات با ۵ راسته ۶ خانواده متنوع‌ترین گروه کفزیان رودخانه را به خود اختصاص داده است که از این بین Ephemeroptera (یکروزه‌ها) بیشترین تنوع و فراوانی را نشان داد (جدول ۵ و نمودار ۳). همچنین Plecoptera (بهاره‌ها) کمترین تنوع را در بین کفزیان رودخانه کلارود دارا بود (جدول ۴). میان کلیه خانواده‌های شناسایی شده بیشترین تنوع و فراوانی با میانگین ۱۰۳ نمونه و ۲۰/۸۹٪ متعلق به جنس Heptagenia و کمترین تنوع و فراوانی متعلق به خانواده Gammaridae مشاهده شد. راسته Trichoptera با ۸۱ نمونه و ۱۶/۴۳٪ بعد از راسته Ephemeroptera بیشترین فراوانی را دارا بود (نمودار ۳).



نمودار ۳. فراوانی جمعیت بی‌مهرگان کفزی شناسایی شده در رودخانه کلارود، طی دوره تحقیق، سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

نتایج بررسی تغییرات زمانی تنوع و فراوانی انواع ماکروفون‌ها در تناوب‌های زمانی نشان داد که فصل بهار با دارا بودن تعداد ۱۷۳ نمونه در مترمربع، ۷ راسته و ۱۲ خانواده بیشترین تنوع و تراکم و فصل تابستان با تعداد ۶۲ عدد نمونه در مترمربع، ۵ راسته و ۶ خانواده کمترین تنوع و تراکم را دارا بوده

است (نمودار ۴).



نمودار ۴. مجموع فراوانی جمعیت بی‌مهرگان کفزی رودخانه کلارود طی دوره تحقیق، سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

جدول ۵. تراکم گروه‌های مختلف بی‌مهرگان کفزی شناسایی شده در ایستگاه‌های شش‌گانه در رودخانه کلارود طی دوره تحقیق سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

رده و راسته	خانواده و جنس	ایستگاه ۱	ایستگاه ۲	ایستگاه ۳	ایستگاه ۴	ایستگاه ۵	ایستگاه ۶	جمع	میانگین
	Baetidae	۷	۱۷	۵	۷	۱۳	۵	۵۴	۹
	جنس Rhithrogena	۱۰	۱۷	۹	۱۱	۴	۴	۵۵	۹/۱۶
Ephemeroptera					۲۳	۲۴			
	جنس Heptagenia	۲۴	۲۴	۸			۰	۱۰۳	۱۷/۱۶
Plecoptera	Peridae	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰/۸۳
	Hydropsychidae	۲۴	۱۶	۱۷	۲	۲۲	۰	۸۱	۱۳/۵
Trichoptera									
	Tipulidae	۳	۰	۰	۰	۲	۰	۵	۰/۸۳
Diptera	Simulidae	۱۵	۰	۶	۰	۸	۰	۲۹	۴/۸۳
	Chironomidae	۲	۵	۳	۶	۱۰	۶	۳۲	۵/۳۳
Odonata		۱۱	۱۳	۵	۰	۷	۰	۳۶	۶
Amphipoda	Gammaridae	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰/۵
Oligochaeta رده	Lumbriculidae	۱۱	۸	۳	-	۴۰	۸	۷۰	۱۱/۶۶
Gastropoda رده		۱	۷	۰	۳	۹	۰	۲۰	۳/۳۳

با توجه به (جدول ۵) مشخص می‌شود که ایستگاه پنج بیشترین فراوانی را با ۱۳۹ تعداد نمونه




و ۱۰ خانواده و ۶ راسته به سایر ایستگاه‌ها دارا بوده و کمترین فراوانی و تنوع را نیز ایستگاه شش با ۴ خانواده و ۳ راسته و تعداد کل ۲۳ نمونه به خود اختصاص داده است و علاوه بر آن بیشترین تنوع در ایستگاه ۱ مشاهده شد. در ایستگاه اول خانواده‌های Heptageniidae و Hydropsychidae هر کدام با تعداد ۲۴ نمونه در مترمربع بیشترین تراکم را داشته و رده Gastropoda دارای حداقل تراکم در این ایستگاه می‌باشند. در این تحقیق جهت تعیین کیفیت آب رودخانه کلارود با استفاده از ماکروبتوزها (شاخص‌های ارزیابی زیستی) و شاخص هیلسنهوف مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تغییرات شاخص HFBI طی دوره بررسی یک ساله نشان داد که حداقل این شاخص در فصل پاییز سال ۱۳۸۹ با میانگین ۳/۹۹ بوده و حداکثر در فصل بهار سال ۱۳۹۰ با میانگین ۴/۶۲ و میانگین کل در دوره تحقیق ۴/۳۳ بوده است (نمودار ۵ و جدول ۶). که حداقل آن ۴/۰۳ مربوط به ایستگاه دوم و حداکثر ۴/۷۹ در ایستگاه ششم مشاهده گردید (جدول ۶).

در فصل بهار خانواده‌های Heptageniidae و Baetidae به ترتیب با تعداد ۴۰ و ۳۰ عدد در متر مربع بیشترین فراوانی را داشته و خانواده‌های Tipulidae و Gammaridae کمترین فراوانی را نشان می‌دهند. در فصل تابستان خانواده‌های Rhithrogenidae و Chironomidae با تعداد ۴ و ۷ نمونه در متر مربع کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

جدول ۶- تغییرات شاخص HFBI در ایستگاه های رودخانه کلارود طی دوره تحقیق ۱۳۸۹-۱۳۹۰

میانگین	تابستان ۹۰	بهار ۹۰	زمستان ۸۹	پاییز ۸۹	فصل ایستگاه
۴/۲۰	۴	۴/۲۸	۴/۲۹	۴/۲۵	ایستگاه اول
۴/۰۳	۴/۷۰	۴/۰۵	۴	۳/۴	ایستگاه دوم
۴/۰۴	۴	۳/۴۱	۳/۹۱	۴/۸۵	ایستگاه سوم
۴/۳۵	-	۵/۸۵	۴/۱۴	۳/۰۸	ایستگاه چهارم
۴/۶۸	۵/۰۴	۴/۶۰	۴/۵۴	۴/۵۴	ایستگاه پنجم
۴/۷۹	-	۵/۵۴	۵	۳/۸۵	ایستگاه ششم
۴/۳۳	۴/۴۳	۴/۶۲	۴/۳۱	۳/۹۹	میانگین

تغییرات شاخص HFBI در رودخانه کلارود طی دوره بررسی از پاییز سال ۸۹ تا بهار سال ۹۰ افزایش سپس در فصل تابستان کاهش پیدا کرده است.



در این مطالعه تغییرات شاخص نسبت EPT به Chironomidae نیز جهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه کلارود مورد بررسی قرار گرفت تا امکان مقایسه این شاخص با شاخص HFBI فراهم شود نتیجه این شاخص به شرح زیر می‌باشد. در این مطالعه مقادیر شاخص نسبت فراوانی سه راسته EPT به فراوانی خانواده شیرونومیده حداکثر در فصل پاییز با (۰/۹۵) و حداقل در فصل تابستان با (۰/۸۲) و با میانگین ۰/۸۹ محاسبه شد (جدول ۷). همچنین تغییرات این شاخص از پاییز ۸۹ تا تابستان ۹۰ به صورت روند کاهشی بوده است.

جدول ۷- تغییرات شاخص نسبت EPT به شیرونومیده طی دوره بررسی ۱۳۸۹-۱۳۹۰


خانواده	راسته	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	میانگین
Ephemeroptera		۸۸	۱۴	۴۰	۷۰	۵۳
Plecoptera		۰	۰	۵	۰	۱/۲۵
Trichoptera		۱۱	۱۸	۲۵	۲۷	۲۰/۲۵
Chironomidae		۱۵	۷	۳	۷	۸
EPT+Chironomidae		۱۱۴	۳۹	۷۳	۱۰۴	۸۲/۵
EPT/(EPT +Chironomidae)		۰/۸۶	۰/۸۲	۰/۹۵	۰/۹۳	۰/۸۹

در طول مسیر مورد تحقیق در رودخانه کلارود حداکثر مقدار شاخص EPT به شیرونومیده در ایستگاه اول (۰/۹۷) و حداقل (۰/۶) در ایستگاه ششم با میانگین (۰/۷۱) مشاهده شد. (جدول ۸ و نمودار ۶).

جدول ۸. تغییرات میانگین شاخص نسبت EPT به شیرونومیده در ایستگاه‌های رودخانه کلارود ۱۳۸۹-۱۳۹۰

خانواده	راسته	ایستگاه اول	ایستگاه دوم	ایستگاه سوم	ایستگاه چهارم	ایستگاه پنجم	ایستگاه ششم	میانگین
Ephemeroptera		۴۱	۵۸	۲۲	۴۱	۴۱	۹	۳۵/۳۳
Plecoptera		۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰/۸۳
Trichoptera		۲۴	۱۶	۱۷	۲	۲۲	۰	۱۳/۵
Chironomidae		۲	۵	۳	۶	۱۰	۶	۵/۳۳
EPT+Chironomidae		۶۷	۸۴	۴۲	۴۹	۷۳	۱۵	۵۵
EPT/(EPT+Chironomidae)		۰/۹۷	۰/۹۴	۰/۹۲	۰/۸۷	۰/۸۶	۰/۶	۰/۷۱

جدول ۸- تغییرات میانگین شاخص نسبت EPT به شیرونومیده در ایستگاه‌های رودخانه کلارود ۱۳۸۹-۱۳۹۰



نمودار ۶. روند تغییرات میانگین شاخص نسبت EPT به شیرونومیده در رودخانه کلارود طی دوره بررسی ۱۳۸۹-۱۳۹۰

#### ۴- بحث و نتیجه‌گیری

مقادیر متغیرهای فیزیکی اکوسیستم‌های آبی به طور عمده بازتابی از شرایط اکولوژیک در فصول مختلف و فعالیت‌های کشاورزی، شهری و صنعتی در مسیر رودخانه می‌باشد (Ehlinger et al., 2003). دمای آب یکی از مهمترین متغیرهای فیزیکی است که بر روی ساختار جمعیتی بی‌مهرگان کفزی تأثیر می‌گذارد. در رودخانه کلارود این متغیر با میانگین سالانه ۱۱/۴۹ درجه سانتی‌گراد از ۹/۳۳ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه چهارم تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه سوم نشان می‌دهد. مقادیر دمای آب در این رودخانه با بستر سنگلاخی حاکی از یک اقلیم خنک در تمام فصول می‌باشد و زیستگاه مناسبی برای گروه‌های سرما دوست از قبیل راسته یک روزه‌ها، راسته بال مو داران فراهم آمده‌است (McCafferty, 1981). در بررسی که انجام شد (لارو) حشرات آبی موجودات غالب فون کفزیان

رودخانه کلارود را تشکیل داده اند. در بررسی‌های انجام شده توسط شمالی و عبد مالکی (۱۳۷۴) که در رودخانه گرگان‌رود گیلان انجام شد حشرات آبی غالب بودند. بررسی فون کفزی رودخانه کلارود تنوع این موجودات را با ۱۲ خانواده نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد در صورت بررسی‌های کیفی خصوصاً در آب‌های حاشیه‌ای و مانداب‌ها تعداد گروه‌های کفزیان افزایش یابد همچنین بسیاری از رودخانه‌های موجود در دنیا که دارای شرایط اکولوژیک و اقلیمی تقریباً مشابه با رودخانه کلارود هستند، تنوع بالایی از بی‌مهرگان کفزی را در بر می‌گیرند. رودخانه طالقان در غرب تهران با ۳۴ خانواده (کاظمی، ۱۳۸۲)، رودخانه سنبل رود با ۱۴ خانواده (یداللهی، ۱۳۸۹)، رودخانه چی چی یوان در تایوان با ۳۴ خانواده (Shieh and Yang, 2000) و بسیاری از رودخانه‌های نیکاراگوئه با میانگین ۳۸ خانواده (Fenoglio et al, 2002) نمونه‌هایی از این رودخانه‌ها هستند. در رودخانه کلارود از بین بی‌مهرگان کفزی، رده حشرات آبی به خصوص جنس *Heptagenia* از راسته *Ephemeroptera* و خانواده *Hydropsychidae* از راسته *Trichoptera* به عنوان گروه‌های غالب شناسایی شدند. همچنین در اکثر آب‌های جاری بیشترین تنوع و تراکم متعلق به این گروه از کفزیان می‌باشد (Dodds, 2002). تغییر در تنوع و فراوانی موجودات کفزی در فصول مختلف ناشی از نوسان پارامترهای کمی و کیفی آب، تغذیه و رقابت است که در چرخه زندگی این موجودات تأثیر می‌گذارد (Quinn and Hickey, 1990). در رودخانه کلارود طی دوره تحقیق بیشترین تنوع و فراوانی بی‌مهرگان کفزی در فصل بهار و زمستان مشاهده شد. نتایج مطالعات عظیمی (۱۳۸۵) نیز بیان‌کننده این مطلب است. در رودخانه کلارود در فصول بهار و زمستان بیشترین تراکم متعلق به خانواده‌های *Baetidae* و *Heptagenia* از راسته *Ephemeroptera* و خانواده *Hydropsychidae* از راسته *Trichoptera* بود. نتایج حاصل از مطالعات انجام‌شده بر روی چرخه زندگی و پراکنش راسته یک روزه‌ها، بهاره‌ها و بال مو داران و دوبالان در برخی از رودخانه‌های ایران و بسیاری از رودخانه‌های جهان مانند نیوزیلند نیز با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارند (بادبره، ۱۳۷۷؛ برجی، ۱۳۷۸؛ هاشمی، ۱۳۸۱؛ رضوانی، ۱۳۷۸؛ رضایی، Quinn and Hickey, 1990). در فصل بهار خانواده *Baetidae* و جنس *Rhithrogena* یک افزایش را نسبت به فصل زمستان نشان می‌دهند، با توجه به رژیم غذایی آنها، این نوسان ناشی از افزایش دمای آب، بالا بودن مدت زمان تابش خورشید، افزایش تولید اولیه و رشد جلبک‌های بستر می‌باشد (Ehlinier et al, 1990). همبستگی شدیدی بین جمعیت بی‌مهرگان کفزی با تغییرات فصلی وجود دارد (Ehlinier et al, 1990). در این رودخانه در فصل بهار حداکثر تراکم موجودات کفزی مشاهده می‌شود. چون درجه حرارت آب برای رشد گیاهان آبی و جلبک‌ها بسیار مناسب می‌باشد (Quinn and Hickey, 1990). نتایج حاصل از بررسی‌های میانگین شاخص HFBI دوره تحقیق کیفیت آب رودخانه کلارود را در کلاسه کیفی خوب (۴/۳۳) قرار می‌دهد (جدول ۶). به

طور کلی مقادیر این شاخص طی چهار فصل نوسان چندانی نداشته و تحت تأثیر تغییرات فصلی نبوده است (نمودار ۵). مقادیر شاخص HFBI در طول رودخانه کلارود طی یک سال در ایستگاه‌های اول (۴/۲۰)، دوم (۴/۰۳) و سوم (۴/۰۴) نزدیک به هم بوده و در کلاس کیفی خیلی خوب قرار می‌گیرند و ایستگاه‌های چهارم (۴/۳۵)، پنجم (۴/۶۸) و ششم (۴/۷۹) در کلاس کیفی خوب قرار می‌گیرند. درجات بالاتر شاخص HFBI حاکی از فراوانی بیشتر جمعیت کفزیان بسیار مقاوم به آلودگی آلی مانند شیرونومیده‌ها، کم تاران و زالوها بوده و بالعکس مقادیر پایین این شاخص نشانه غالبیت فون کفزیان حساس به آلودگی مانند خانواده‌های بهاره و بسیاری از خانواده‌های یک روزه‌ها و بال موداران می‌باشد (Mandaville, 2002; Ehlinger et al., 2003) بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود از طریق شاخص EPT به Chironomidae در طول سال بیشترین مقادیر این شاخص را در پاییز ۱۳۸۹ (۰/۹۵) و زمستان ۱۳۸۹ (۰/۹۳) نشان می‌دهد که حاکی از شرایط مطلوب کیفیت آب می‌باشد. همچنین کمترین مقادیر آن در تابستان ۱۳۹۰ (۰/۸۲) مشاهده شده که تغییر قابل توجهی نسبت به سه فصل قبلی نشان داده است. (جدول ۷) نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده براساس این شاخص توسط Peitz در سال ۲۰۰۳ در رودخانه Pipstone creek نشان می‌دهد که با افزایش نمونه‌های سه راسته EPT جمعیت افراد خانواده شیرونومیده حاکی از شرایط استرس محیطی بوده و منجر به کاهش راسته‌های EPT می‌گردد.

#### فهرست منابع

۱. احمدی، م. و رئیسی، (۱۳۸۰)، شناسایی جانداران شاخص بی‌مهره آبهای جاری. انتشارات خبیر، تهران.
۲. بادپره، ل.، (۱۳۷۷)، بررسی موجودات بنتیک رودخانه اوین درکه با تأکید بر دو بالان (Diptera)، پایان نامه کارشناسی شیلات.
۳. برجی، م.، (۱۳۷۸)، بررسی موجودات بنتیک رودخانه جاجرود حد فاصل اوشان تا فشم، پایان نامه کارشناسی شیلات، ۹۶ ص.
۴. پرهیزگار رضوانی، ر.، (۱۳۷۸)، چرخه زیستی زودمیران (Ephemeroptera) در رودخانه اوین درکه، پایان نامه کارشناسی شیلات.
۵. حبیبی، ط.، (۱۳۷۶)، جانورشناسی عمومی: کرم‌ها و نرم‌تنان (جلد دوم). انتشارات دانشگاه تهران.
۶. رضایی پقرآباد، م.، (۱۳۷۷)، بررسی ماکروبتیک رودخانه کرج پایین دست ماهی‌سرا (با تأکید بر آلودگی)، پایان‌نامه کارشناسی شیلات.
۷. سازمان حفاظت محیط زیست، (۱۳۸۲)، ضوابط استانداردهای زیست محیطی، صفحه ۵۱.

۸. شمالی، م. م. و شعب‌الملکی. (۱۳۷۴). گزارش بررسی‌های زیستی و غیرزیستی رودخانه کارگان رود. مرکز تحقیقات شیلات گیلان بندر انزلی.
۹. کاظمی، ر.، (۱۳۸۲). مطالعه هیدروبیولوژی و اکولوژیک فون کفزیان رودخانه طالقان، پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، ۲۰۰ص.
۱۰. موسوی ندوشن، ر.، (۱۳۷۵). تعیین کیفیت آب رودخانه جاجرود به کمک شاخص‌های بیولوژیک و تعیین توان خود پالایی در آن، پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، ۱۳۹ص.
۱۱. هاشمی، م.، (۱۳۸۱). چرخه زیستی (Plecoptera) در رودخانه اوین درکه پایان‌نامه کارشناسی شیلات.
12. **APHA, AWWA, WPCE, (2007).** Standard methods for the examination of water and wastewater. 3<sup>rd</sup>. Washington DC, USA.
13. **Bode, R. W. (1996).** Quality Assurance Work Plan for Biological Stream Monitoring in New York State, NYS Department of Environmental Conservation Service, Albany, 89p.
14. **Dodds, D. A. (2002).** The effects of trout farm effluents on the taxa richness of the benthic macroinvertebrates *Aquaculture* 147: 37-55
15. **Ehlinger, B. R. (2003).** Biological Assessment of Stream water Quality- The Example of the Reka River. *ACTA CARSOLOGICA*, (15):201-202
16. **Ehlinier F. J., (1990) .** Macrofauna in relation to its ecology in Lake Zwemlust, afterbiomanipulation. I. Bottom fauna. *Archives of Hydrobiologia*, 123:337-347.
17. **Geoffrey R.S., Vaala D.A. and Haley A.D., (2001).** Distribution and abundance of macroinvertebrates within two temporary ponds *Hydrobiologia*, 497:161-167
18. **Heino J.,(2000).**Lentic macroinvertebrate assemblage structure along gradients in spatial heterogeneity, habitat size and water chemistry. *Hydrobiologia*, 418:229-242
19. **Hilsenhoff, W.L.(1988).**Rapid field assessment of organic pollution, with a family-level biotic index. *Jornal of north American Benthological Society*, 7(1):65-68.
20. **McCafferty W.P., (1981).** Aquatic entomology Jones & Bratlett Publishers. 448P
21. **Miller G .H , 2005,** year trends in water quality of river and streams in New York state on the basis of macroinvertebrates date 1972-1992: New York Department of Enviromental Conservation Technical Report , 196 p.
22. **Mondoville, R. I. (2002).** Aquatic Insects of California. University of California press, USA.
23. **Quinn T.S ,. and Hickey H, (1990).** Quality Assurance Work Plan for Biological Stream Monitoring in New York state. NYS Department of Enviromental Conservation Albany.
24. **Rosenberg, D. M. (2004).** Benthic macrofounal dynamics, production and dispersion in anoxygen-deficient estuary of west Sweden. *J. Exp. Mar. BioLEcoi*, 26, 107-13
25. **Rosenberg D.M. and Resh V.H., (1993).** Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 46P.
26. **Shieh M. R., and Yang, T ,. (2000).** How Important and Rate Species in Aquatic Community Ecology and Bioassessment ?, *Limnology and Oceanography* Volume.