

## بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کودشیمیایی و شیرابه کودگاو در استان مازندران

رضا پورغلام\*<sup>۱</sup>، حسن نصراله زاده ساروی<sup>۱</sup>، علی اصغر سعیدی<sup>۱</sup>، آسیه مخلوق<sup>۱</sup>،

فریبا واحدی<sup>۱</sup>، محمدتقی رستمیان<sup>۱</sup>

۱- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران، صندوق پستی: ۹۶۱

تاریخ پذیرش: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

تاریخ دریافت: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

### چکیده

این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای زیستی (تراکم و زی توده فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون) و غیر زیستی (خصوصیات فیزیکی شیمیایی) سه استخر پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کود شیمیایی، کود شیمیایی توام با شیرابه کودگاو و شیرابه کودگاو در استان مازندران صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر سه استخر میزان اکسیژن محلول در آب از حد مجاز کمتر نبوده و دامنه نوسانات pH قلیایی بوده است (۷/۹۴-۸/۵۴) که با دامنه نوسانات تعیین شده در پرورش ماهیان گرم آبی کاملاً مطابقت دارد. مقادیر آمونیم، نیترات و فسفات نیز در حد مطلوب ثبت گردید. شدت افزایش تراکم فیتوپلانکتون در استخر غنی شده با کود شیمیایی و شیرابه گاو بیشتر از دو استخر دیگر بوده است. تراکم و زی توده کل زئوپلانکتون و همچنین گروه‌های اصلی (روتیفرها، کوبه‌پودا، کلادوسرا) نیز در استخر ۲ بیش از استخرهای ۱ و ۳ افزایش نشان داد. نتیجه این که، به نظر می‌رسد که استفاده از شیرابه کودگاو به همراه کود شیمیایی، پتانسیل بالاتری را در ایجاد مواد غذایی اولیه برای پرورش ماهیان گرم آبی داشته‌است. ضمن آن که این روش از هزینه پرورش دهندگان برای خرید کودهای شیمیایی می‌کاهد.

**کلمات کلیدی:** استان مازندران، ماهیان گرم آبی، استخر پرورشی، شیرابه کودگاو، کودشیمیایی.

## مقدمه

پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان) معمولاً برای غنی کردن آب استخرهای پرورش به ازای هر هکتار در طول یک دوره پرورش بین ۱۲۰۰-۸۰۰ کیلوگرم کودهای شیمیایی و ۱۰-۱۲ تن کود خشک آلی (گاوی) استفاده می کنند. کودهای آلی همان مواد دفعی گاو، گوسفند، اسب و ماکیان بوده و همانند کودهای معدنی غنی از مواد پیوژن و ریز مغذی ها می باشد. این کودها علاوه بر استفاده در کشت و غنی سازی باغات و مزارع کشت قارچ و نیز به صورت کیک خشک به عنوان منبع تأمین سوخت و تولید گاز متان جهت ایجاد گرما و الکتریسیته برای غنی کردن و شکوفایی پلانکتونی آب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی نیز بکار می روند (Vijayaraghavan et al., 2006). در چین، بنگلادش و هند از سالیان گذشته از آن در صنعت آبی پروری استفاده می شده است (Javed et al., 1990; 1992). کودهای آلی به سرعت باعث تغییرات پلانکتونی می گردد (Sabir Ali et al., 2007). استفاده از کودهای ارگانیک (آلی) توأم با کودهای شیمیایی غیر آلی می تواند ضمن غنی سازی و شکوفایی آب استخرها از پلانکتون ها، باعث تسریع در رشد کپور ماهیان پرورشی گردد (FAO, 1996; Doria and Leonhardt, 1993; Gosh et al., 1994). Bhatnagar (۱۹۹۹) از دوزهای متفاوت (۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) کود گاوی برای غنی سازی آب استخرها استفاده کرده و نشان دادند که بیشترین میزان غنی سازی ضمن حفظ شرایط اکولوژیک (فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی) با دوز ۱۵۰۰۰ کیلوگرم در هکتار حاصل می گردد. Pulling و Schedadeh (۱۹۸۰) میزان ۲۰-۳۰ کیلوگرم کود گاوی

را در هر روز آفتابی به همراه دیگر کودهای غیر آلی (معدنی) در دمای ۲۷-۱۸ درجه سانتی گراد توصیه نموده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان تراکم و زی توده موجودات زیستی (فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون) استخر به عنوان منابع غذایی ماهیان گرم آبی و نیز خصوصیات فیزیکی شیمیایی آب سه استخر پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با ۱- کود شیمیایی ۲- کود شیمیایی توأم با شیرابه کود گاوی ۳- شیرابه کود گاوی در استان مازندران صورت پذیرفت. در صورت مطلوب بودن نتایج می توان پیش بینی نمود که استفاده از کودهای آلی می تواند بخشی از نیاز ما را به کودهای شیمیایی به ویژه فسفات که دارای اثرات زیست محیطی است، بکاهد و جایگزینی مناسب برای آن باشد.

## مواد و روش ها

نمونه برداری در سه استخر در یک دوره پرورش در منطقه قائم شهر (استان مازندران) از اردیبهشت تا مهر ۱۳۹۰ انجام گرفت. نمونه برداری از اردیبهشت تا مرداد، هر دو هفته یک بار (در هفته های اول و سوم هر ماه) و در ماه های شهریور و مهر به صورت ماهانه صورت گرفت. استخر شماره ۱ به مساحت ۳/۵-۴ هکتار، با ۱۰ تن شیرابه گاوی، استخر شماره ۲ به مساحت ۳/۵-۴ هکتار با ۱۰ تن شیرابه کود گاوی و ۲۰۰ کیلوگرم کود فسفات و استخر شماره ۳ (۱۳ هکتار) شده فقط با کود شیمیایی به میزان ۵ تن اوره و ۲/۵ تن فسفات بارور گردیدند. نمونه های آب در ظروف نیم لیتری جمع آوری شدند و پس از تثبیت با فرمالین (به میزان ۰/۵ تا ۲/۵ درصد) به آزمایشگاه منتقل و به مدت ۱۰ روز در تاریکی نگهداری شدند. نمونه ها پس از طی مراحل مختلف رسوب گذاری و تغلیظ با استفاده از منابع معتبر

شده به ترتیب با شیرابه کود گاوی، مخلوط شیرابه کود گاوی و کود شیمیایی و فقط کود شیمیایی در جداول ۲۰۱ آمده است. به طوری که عمده تراکم فیتوپلانکتون به ترتیب مربوط به شاخه‌های سیانوفیتا، کلروفیتا و باسیلاریوفیتا بوده است و سایر شاخه‌ها حدود ۶ درصد از تراکم را در استخرها شامل شدند و تغییرات تراکم سیانوفیتا بر تراکم کل اثر بارزی را داشته است. اما عمده زیتوده در طی دوره در استخرها به ترتیب از شاخه‌های کلروفیتا، باسیلاریوفیتا، سیانوفیتا و یوگلنوفیتا شکل گرفته است و سایر شاخه حدود ۲ درصد از زیتوده کل را تشکیل دادند. نتایج آزمون آماری ANOVA بر روی پارامترهای تراکم و زی توده (جدول ۶) نشان داد که تراکم فیتوپلانکتون کل و نیز سیانوفیتا دارای اختلاف معنی داری بین ماه‌ها بوده است، ضمن آن که زیتوده فیتوپلانکتون کل نیز اختلاف معنی داری را در بین ماه‌های نمونه برداری نشان داد ( $P < 0.05$ ).

میزان زی توده و تراکم زئوپلانکتون و گروه‌های اصلی آن نشان می‌دهد که عمده زیتوده (۹۵ درصد) آن به ترتیب مربوط به کوبه پودا و روتاتوریا بوده و سایر گروه‌ها حدود ۵ درصد در مجموع زیتوده کل مشارکت داشته‌اند. اما بیش‌ترین تراکم در استخرها مربوط به روتاتوریا بوده و پس از آن کوبه‌پودا در جایگاه دوم قرار داشته و سایر گروه‌ها حدود ۲ درصد از مجموع تراکم کل را شامل گردیدند (جدول ۳ و ۴). بررسی آماری نشان داد که از میان داده‌های مختلف زئوپلانکتون فقط تراکم و زیتوده کل زئوپلانکتون، پس از انتقال دارای توزیع نرمال بوده‌اند. لذا با ادامه آزمون آماری مشخص گردید که در بین استخرهای مختلف اختلاف معنی داری بین تراکم و زی توده کل

شناسایی گردیدند (Carmelo, 1997; Hartley *et al.*, 1996; Habit and Pankow, 1976; Tiffany and Britton, 1971). سپس تراکم و زیتوده (براساس اشکال هندسی هر موجود) طبق استاندارد APHA (۲۰۰۵) محاسبه گردیدند.

۶۰ لیتر نمونه آب بوسیله تور ۵۵ میکرون مخروطی زئوپلانکتون با قطر دهانه ورودی ۲۲/۵ سانتی‌متر فیلتر گردیده و با فرمالین ۴ درصد تثبیت شدند (APHA, 2005). شمارش نمونه‌ها بر روی لام شمارش Bogarov به دو روش کمی و کیفی بوسیله میکروسکوپ اینورت انجام گردید. وزن موجودات بر اساس شکل هندسی آن‌ها محاسبه شد.

کلیه پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای مورد نظر، شامل درجه حرارت آب، اکسیژن محلول، BOD<sub>5</sub>، pH، نیتريت، نترات، آمونیم، فسفات منطبق با استاندارد APHA (۲۰۰۵) انجام گردید.

آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 11/5 صورت گرفت. بطور کلی استخر و ماه‌ها به عنوان متغیرهای غیر وابسته، تراکم و زیتوده فیتوپلانکتون، پارامترهای فیزیکوشیمیایی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. آزمون پارامتریک (ANOVA)، در سطح ۵ درصد صورت گرفت (نصیری، ۱۳۸۸) و در ماه‌هایی که دو بار نمونه برداری انجام گردید (اردیبهشت، خرداد و تیر) میانگین‌ها به همراه خطای معیار ( $Mean \pm SE$ ) آورده شده است.

## نتایج

میانگین تراکم و زیتوده فیتوپلانکتون و شاخه‌های مختلف آن، تراکم و زیتوده زئوپلانکتون و آنالیز خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در استخرهای غنی

(پروتوزوا) و مواد جامد دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر رشد ماهیان موجود در استخر می‌باشد (Boyd, 1981). به گفته بانی (۱۳۷۵)، کود گاوی تازه به میزان ۰/۵-۰/۶ درصد نیترژن، ۰/۲-۰/۱۶ درصد فسفات دارا می‌باشد. در مطالعه سعیدی و همکاران (۱۳۸۹) در منطقه مازندران این میزان برای نیترژن ۰/۳۶-۰/۵۵ درصد و برای فسفات ۰/۰۲-۰/۱ درصد از شیرابه کود گاوی ارائه شده است. تحقیقات بانی (۱۳۷۵) نشان داد که در استخر کوددهی نشده تراکم فیتوپلانکتون حدود یک میلیون در لیتر بود در حالی که پس از اضافه نمودن کود گاوی این تعداد به بیش از ده میلیون رسید و میزان مواد آلی نیز پس از این کوددهی بیش از ۳ برابر افزایش نشان داد. در مطالعه حاضر افزایش تراکم فیتوپلانکتون به خصوص در شاخه سیانوفیتا و کلروفیتا پس از ۱-۳ ماه و در شاخه اگلنوفیتا ۳ ماه پس از کوددهی بوده است. در طی دوره مطالعاتی میانگین زیتوده در استخر کوددهی شده با کودهای شیمیایی (استخر شماره ۳) ۴ گرم در مترمکعب بود که از دو استخر دیگر کم تر بود. در این مطالعه استخرهای شماره ۱ و ۲ (دارای ۴-۳/۵ هکتار مساحت) که حدود ده تن شیرابه گاوی در یک مرحله دریافت کرده بودند، تراکم فیتوپلانکتون در استخرها پس از حدود یک ماه فاز تاخیری در خرداد به حداکثر میزان خود یعنی ۲۸ میلیون سلول در لیتر در استخر شماره ۱ و ۹۷ میلیون سلول در لیتر در استخر شماره ۲ رسید، چنان که آنالیز آماری نیز اختلاف معنی داری را بین تراکم و زیتوده فیتوپلانکتون در بین استخرها نشان داد (P<۰/۰۵). در استخر شماره ۲ افزایش تراکم فیتوپلانکتون پس از کوددهی (خرداد ماه) چند برابر استخرهای دیگر بوده است. به نظر می‌رسد که استفاده

وجود ندارد (P>۰/۰۵). اما این دو پارامتر (تراکم و زی توده کل زئوپلانکتون) در بین ماه‌ها اختلاف معنی داری نشان داده است (P<۰/۰۵) (جدول ۶).  
بر اساس نتایج بدست آمده در جدول ۵ و ۷، اگرچه درجه حرارت آب بین استخرها اختلاف معنی داری نداشته است (P>۰/۰۵) ولی تغییرات بین ماه‌ها به نحوی بود که سبب ایجاد اختلاف معنی دار گردید (P<۰/۰۵). BOD در استخرهای ۱ و ۲ در غالب موارد بیش از اکسیژن محلول بود و تنها در هفته اول اردیبهشت و نیز شهریور در استخر ۱ به ترتیب دارای میزان ۶/۴ و ۳/۸ میلی گرم در لیتر و در استخر ۲ در ماه‌های شهریور و مهر به ترتیب دارای میزان ۲/۲ و ۲/۵ میلی گرم در لیتر بوده است. در حالی که در استخر ۳ پارامتر فوق جز در هفته سوم تیر و مهر (بیش از اکسیژن محلول) از ۱/۵ تا ۸/۹ میلی گرم در لیتر تغییر نشان داد. pH در هر سه استخر در ماه‌های نمونه برداری قلیایی ضعیف تا قلیایی بوده است (جدول ۵) و میانگین تغییرات آن در ماه اختلاف معنی داری را نشان داد (P<۰/۰۵) (جدول ۷). ترکیبات معدنی ازت در آب بیشتر فرم نیترات بوده است و همچنین درصد ازت آلی (DON) قابل ملاحظه بوده است و میانگین تغییرات آن در ماه اختلاف معنی داری را نشان داد (P<۰/۰۵). در هر سه استخر میزان فسفر معدنی (ارتوفسفات) بیش از فسفر آلی (DOP) مشاهده گردید و میانگین تغییرات آن در استخرها اختلاف معنی داری را نشان داد (P<۰/۰۵) (جدول ۵).

## بحث

کود گاوی به جهت برخورداری از مواد بیوژن (برای تولید فیتوپلانکتون)، موجودات تک سلولی

کود گاوی (زمان، دفعات و میزان کود دهی) از جمله دلایلی بود که سبب گردید که در استخر غنی شده با شیرابه کود گاوی نسبت به استخر غنی شده با کودشیمیایی ترکیب مناسب از گروه‌های فیتوپلانکتون (کریپتوفیتا و کلروفیتا) برای تغذیه ماهیان فراهم گردد.

توام از کود شیمیایی و شیرابه کود گاوی بر افزایش تراکم فیتوپلانکتون موثرتر بوده است. برای نتیجه گیری مبتنی بر داده‌های آماری در هر استخر نیاز به تعداد بیشتری نمونه برداری و در تعداد بیشتری از استخرها می‌باشد. در مطالعه سعیدی و همکاران (۱۳۸۹) به نظر می‌رسد که مدیریت مناسب کوددهی با شیرابه

جدول ۱: تراکم (میلیون در مترمکعب) فیتوپلانکتون و شاخه‌های مختلف آن در استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

استخر	اردیبهشت		خرداد		تیر		مرداد		شهریور	مهر	فیتوپلانکتون
	±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean			
۱	۲۲۹۸	۸۰	۴۱۵۹	۶۵۱	۲۷۴۷	۲۵۴۰	۸۰۱	۵۸۱	۲۷۵۲	۴۰۶۵	Bacillariophyta
	۴	۲	۱	۱	۸	۸	۱	۱	۱۴	۱۱۶	Pyrrophyta
	۱۳۰۰	۵۳	۱۹۷۷۰	۱۸۴۷۷	۷۷۷۹	۲۹۸۷	۵۸۵۱	۳۲۵۰	۱۱۸۵	۱۳۸۳	Cyanophyta
	۳۴۶۰	۳۲۸	۳۷۷۰	۸۶۷	۷۴۹۲	۴۶۱۲	۳۹۰۲	۱۰۱۶	۱۵۲۰	۵۸۵۲	Chlorophyta
	۹	۷	۵۹	۵۷	۲۱۴	۷۱	۳۲۵	۲۵۱	۳۷۱	۲۴۳	Euglenophyta
	۱۷۵۲	۱۷۴۸	۵۷۶	۴۰۳	۵۸	۱	۰	۰	۲۳۰	۰	Xantophyta
	۴۹	۴۹	<۱	<۱	۱۴	۹	۰	۰	۰	۱	Chrysophyta
	۸۸۷۰	۲۱۷۰	۲۸۳۳۵	۱۶۶۱۴	۱۸۳۱۳	۱۰۰۶۰	۱۰۸۸۱	۵۰۹۶	۶۰۷۳	۱۱۶۶۰	کل
۲	۸۹۰	۱۱۸	۳۲۲	۲۹	۴۳۷۸	۳۸۹۸	۸۵۰۷	۱۷۷۷	۱۸۷۹	۱۰۲۷	Bacillariophyta
	۴	۱	۳	۱	۲	۱	۲۰	۱۹	۱۱۰	۰	Pyrrophyta
	۲۵۳۹	۱۷۶۹	۷۷۰۵۵	۱۴۳۶	۷۲۷۶	۵۳۶۶	۸۷۸۱	۷۴۷۰	۴۵۱۵	۱۱۶۵	Cyanophyta
	۱۴۲۰	۴۱۲	۱۲۶۴۵	۷۲۵۳	۵۰۳۷	۳۶۰۰	۱۲۳۳	۹۶۴	۵۶۲۸	۳۸۴۵	Chlorophyta
	۳۷	۸	۱۰۴۳	۱۰۳۵	۵۰۰	۴۲۸	۶۵۰	۴۸۱	۲۸۸	۲۳۳	Euglenophyta
	۱۱۷۲	۲۸۷	۶۱۲۰	۳۹۰۲	۴۸۱	۴۴۲	۱۶	۱۶	۱۹۷	۹۲۲	Xantophyta
	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۱	<۱	۰	۰	Chrysophyta
	۶۰۷۱	۱۷۷۲	۹۷۱۸۸	۲۹۱۸	۱۷۶۷۳	۱۳۷۳۵	۱۹۲۰۷	۴۹۴۴	۱۲۶۱۷	۷۱۹۲	کل
۳	۹۳۸	۹۱۳	۱۰۶۳	۹۸۸	۷۸۰۲	۲۳۹۵	۱۲۵۳	۹۶۸	۲۴۸۶	۵۹	Bacillariophyta
	۱	<۱	۲	۱	۲	۲	۳۴	۵	۷۶	۰	Pyrrophyta
	۳۶	۲۶	۵۳۰۸	۴۶۲۹	۵۵۴۶	۴۴۲۱	۴۰۸۶	۹۶۱	۵۷۶۰	۲۱۵۷۹	Cyanophyta
	۴۵۴	۴۴۳	۵۴۹۲	۵۴۱۸	۳۵۷۶	۲۵۳۷	۷۴۸۹	۶۹۲	۸۲۵۸	۱۸۳۰۳	Chlorophyta
	۱	<۱	۳۲	۱۷	۶۹	۴۸	۵۰۳	۱۵۱	۱۰۸	۲۶۹	Euglenophyta
	۷	۲	۶۲	۳۴	۱۲۵	۴۸	۴۱	۲	۱۹	۰	Xantophyta
	<۱	<۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	Chrysophyta
	۱۴۳۶	۱۳۷۷	۱۱۹۵۹	۱۰۹۸۵	۱۷۱۲۰	۹۳۵۴	۱۳۴۰۶	۲۴۷۲	۱۶۷۰۷	۴۰۲۱۱	کل

جدول ۲: زی توده (میلی گرم در مترمکعب) فیتوپلانکتون و شاخه‌های مختلف آن در استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

استخر	فیتوپلانکتون	اردیبهشت		خرداد		تیر		مرداد		شهریور	مهر
		±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean		
	Bacillariophyta	۱۵۴	۱۴۰۵	۴۶	۲۳۶۳	۲۲۳۴	۳۵۹	۳۳۲	۱۹۰۴	۳۸۸۳	
	Pyrrophyta	۸۹	۹۱	۱۰	۲۳۴	۲۱۶	۹	۹	۲۳	۱۴۶	
۱	Cyanophyta	۸۲	۸۸	۹۲۴۱	۱۹۳۶	۷۳۴	۱۶۶۵	۵۰۴	۲۴۹	۷۲۷	
	Chlorophyta	۳۳	۱۳۰۱	۳۰	۱۴۲۲	۱۹۲۶	۱۴۲۴	۳۴۴۱	۷۳۱	۲۶۹۱	
	Euglenophyta	۲۶	۳۰	۴۵۹	۹۰۱	۱۳۲	۱۲۰۹	۱۰۹۵	۲۰۹۶	۵۱۴	
	Xantophyta	۸۹	۸۹	۲۱	۳	۰	۰	۰	۱۲	۰	
	Chrysophyta	۷۳	۷۳	<۱	<۱	۲۲	۲۲	۰	۰	۱	
	کل	۷۲	۳۰۷۷	۹۶۱۴	۷۳۸۶	۲۹۸۷	۸۹۵۱	۵۳۶۳	۵۰۱۴	۷۹۶۲	
	Bacillariophyta	۲۵	۵۳۴	۱۹۳	۳۱۴۱	۲۹۵۶	۳۲۰۲	۱۶۹۷	۱۴۷۶	۸۲۴	
	Pyrrophyta	۱۳۲	۱۳۲	۶۰	۱۱	۱۰	۳۲	۲۹	۱۱۰	۰	
۲	Cyanophyta	۳۷	۹۹	۱۲۵۶	۱۱۱۲	۲۶۹	۱۰۵۴	۳۷۷	۱۴۱۹	۵۲۲	
	Chlorophyta	۲۹۷	۱۶۲۵	۲۲۷۰	۱۰۴۳	۶۱۱	۱۶۱۷	۱۶۱۷	۵۵۹۵	۱۰۳۲	
	Euglenophyta	۱	۹۶	۴۱۳۹	۴۴۲۳	۳۸۰۰	۲۸۳۸	۱۷۹۳	۳۱۷	۴۰۱	
	Xantophyta	۱۵	۶۰	۱۹۹	۲۵	۲۳	۳۷	۳۷	۱۰	۴۷	
	Chrysophyta	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	<۱	<۱	۰	۰	
	کل	۲۲۴	۲۵۵۹	۶۰۰۵	۹۷۵۶	۷۶۶۹	۸۷۸۰	۲۲۴۲	۸۹۲۸	۲۸۲۶	
	Bacillariophyta	۶۰۹	۶۲۱	۶۹۴	۴۹۶۵	۱۰۱۴	۱۱۵۲	۹۰۷	۱۷۳۸	۴۷	
	Pyrrophyta	۱	۱	۴۰	۵	۵	۲۱۰	۱۸۱	۲۷۸	۰	
۳	Cyanophyta	۴	۴	۴۳۱	۴۲۲	۳۷۱	۲۶۳۸	۶۰۷	۴۷۰	۱۵۶۵	
	Chlorophyta	۱۹۰	۱۹۳	۱۱۲۳	۱۴۱۸	۱۱۵۹	۱۵۵۲	۲۵۴	۶۸۳	۴۷۹۳	
	Euglenophyta	<۱	۳	۱۶۳	۱۳۰	۴۸	۱۵۹۶	۴۰۴	۳۲۹	۵۹۶	
	Xantophyta	<۱	<۱	۳	۵	۱	۲	<۱	۱	۰	
	Chrysophyta	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	کل	۸۰۴	۸۲۴	۲۴۵۵	۶۹۴۶	۲۵۹۶	۷۱۵۰	۱۰۳۷	۳۴۹۹	۷۰۰۰	

شاخص‌های محدود کننده در آبی‌زی پروری (تکثیر و پرورش آبزیان) است. Cossins (۱۹۸۳) بیان کرد که تغییر در فعالیت‌های فیزیولوژیک از جمله واکنش‌هایی است که در مقابل تغییر درجه حرارت آب در ماهی ایجاد می‌شود. درجه حرارت آب استخرهای پرورش در طی مدت بررسی بین ۲۰ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد متغیر بوده است.

بررسی زئوپلانکتون نشان داد که تراکم و زی توده کل آن در استخر ۲ تحت تاثیر روتیفرها بیش از دو استخر دیگر بوده است، که با شرایط طبیعی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان) قرابت دارد.

کیفیت فیزیکی شیمیایی آب در آبی‌زی پروری یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تکثیر و پرورش ماهی، انتخاب نوع گونه پرورشی و همچنین برنامه پرورشی می‌باشد. درجه حرارت آب، یکی از مهم‌ترین

جدول ۳: تراکم (تعداد در مترمکعب) زئوپلانکتون و گروه‌های مختلف آن در استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

استخر	فیتوپلانکتون	اردیبهشت		خرداد		تیر		مرداد		شهریور	مهر
		±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean		
۱	Rotatoria	۷۵۰	۷۵۰	۳۵۰	۱۱۵۰	۷۰۰	۳۵۰۰	۱۲۰۰	۰	۲۶۰۰	۱۳۰۰
	Copepoda	۶۳۵۰	۴۷۵۰	۱۹۵۰	۱۶۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۱۹۰۰	۱۰۰
	Cladocera	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	Other	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کل	۷۴۰۰	۳۷۰۰	۳۱۰۰	۱۳۰۰	۸۵۰	۳۶۵۰	۱۲۰۰	۰	۴۵۰۰	۱۴۰۰
۲	Rotatoria	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۸۰۰	۵۸۰۰	۲۲۰۰	۳۶۰۰	۳۳۵۰۰	۷۳۰۰
	Copepoda	۱۴۲۰۰	۸۳۰۰	۴۶۰۰	۱۲۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰۰
	Cladocera	۵۵۰	۴۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	Other	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کل	۱۴۸۵۰	۸۸۵۰	۴۸۰۰	۱۴۰۰	۶۳۵۰	۶۳۵۰	۲۱۵۰	۳۶۰۰	۳۳۵۰۰	۷۴۰۰
۳	Rotatoria	۴۰۵۰	۴۰۵۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۱۵۰	۲۰۲۰۰	۱۴۶۰۰
	Copepoda	۲۱۵۰	۱۲۵۰	۸۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۰	۰	۸۰۰
	Cladocera	۳۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰
	Other	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کل	۶۵۵۰	۲۷۵۰	۹۵۰	۴۵۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۳۰۰	۱۱۵۰	۲۰۲۰۰	۱۵۴۰۰

جدول ۴: زی توده (میلی گرم در مترمکعب) زئوپلانکتون و گروه‌های مختلف آن در استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

استخر	فیتوپلانکتون	اردیبهشت		خرداد		تیر		مرداد		شهریور	مهر
		±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean		
۱	Rotatoria	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۱۰	۰/۷۱	۰/۹۱	۳/۱۶	۰/۹۶	۰/۰۰	۲/۴۶	۰/۹۵
	Copepoda	۱۲۰/۶۶	۱۰۵/۴۴	۲۶/۳۰	۲۶/۳۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵/۴۰	۰/۲۰
	Cladocera	۶/۰۰	۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	Other	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	کل	۱۲۷/۰۴	۹۹/۰۷	۲۷/۰۱	۲۷/۰۱	۴/۱۱	۲۰/۵۱	۱/۸۶	۰/۹۶	۱۷/۸۶	۱/۱۵
۲	Rotatoria	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۵۳/۸۷	۵۳/۸۷	۵۰/۱۳	۲/۸۸	۳۰/۹۵	۵۴/۷۶
	Copepoda	۱۹۱/۸۹	۷۴/۸۹	۵۱/۳۵	۵۱/۳۵	۴۳/۱۵	۴۳/۱۵	۵/۳۰	۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۲۰
	Cladocera	۱۱/۰۰	۹/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	Other	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	کل	۲۰۲/۹۴	۸۳/۹۴	۵۳/۴۰	۵۳/۴۰	۵۹/۱۷	۴۵/۲۰	۴۶/۱۳	۲/۸۸	۳۰/۹۵	۵۴/۹۶
۳	Rotatoria	۳/۲۰	۳/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۴۸	۰/۴۸	۰/۴۸	۴/۴۸	۶۸/۵۰	۴۴/۰۹
	Copepoda	۳۵/۱۶	۲۹/۲۴	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	۱۵/۵۱	۱۵/۵۱	۱۵/۵۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲/۸۰
	Cladocera	۶/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۴/۰۰	۴/۰۰	۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	Other	۰/۸۸	۰/۸۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	کل	۴۵/۲۳	۲۷/۱۷	۱۳/۰۰	۱۳/۰۰	۱۹/۹۹	۱۹/۹۹	۱۹/۰۳	۴/۴۸	۶۸/۵۰	۶۶/۸۹

جدول ۵: میزان پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

مهر	شهریور	مرداد		تیر		خرداد		اردیبهشت		پارامتر	استخر
		±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean	±SE	Mean		
۲۰/۰	۲۷/۰	۰/۵	۳۲/۵	۱/۵	۳۱/۵	۲/۵	۲۵/۵	۰/۵	۲۱/۵	Water,Temp.°C	
۷/۵۰	۶/۵۰	۰/۴۰	۵/۵۰	۰/۲۵	۶/۴۵	۰/۵۵	۴/۹۵	۱/۲۰	۸/۴۰	O <sub>2</sub> mg/l	
۸/۳۱	۸/۱۳	۰/۱۳	۷/۹۸	۰/۱۱	۷/۸۰	۰/۲۴	۷/۷۸	۰/۰۴	۸/۲۷	pH	
۰/۱۱۵	۰/۱۱۰	۰/۰۰۳	۰/۰۹۵	۰/۰۲۳	۰/۱۰۶	۰/۰۱۵	۰/۰۹۵	۰/۰۱۶	۰/۰۸۸	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /Nmg/l	۱
۳/۴۷۹	۳/۴۹۲	۰/۳۷۷	۳/۳۹۳	۰/۱۴۵	۱/۷۷	۰/۱۴۰	۲/۲۶۱	۰/۲۷۷	۲/۷۳۳	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /Nmg/l	
۳/۵۹۵	۳/۶۰۴	۰/۳۸۲۵	۳/۴۹۷۵	۰/۱۶۹۵	۱/۸۸۶۵	۰/۱۲۷۵	۲/۳۷۹۵	۰/۲۲۹	۲/۸۵۷	DIN/N mg/l	
۳/۴۱۶	۴/۳۸۳	۰/۴۰۹	۳/۴۷۹	۰/۵۱۶	۳/۷۸۰	۰/۴۴۸	۴/۰۲۱	۰/۲۴۹	۳/۸۷۶	DON/N mg/l	
۷/۰۱۱	۷/۹۸۷	۰/۰۲۷	۶/۹۷۷	۰/۳۴۶	۵/۶۶۶	۰/۳۲۱	۶/۴۰۱	۰/۴۷۸	۶/۷۳۳	TN mg/l	
۰/۰۷۲	۰/۰۷۶	۰/۱۴۶	۰/۲۷۸	۰/۱۲۸	۰/۲۵۲	۰/۰۶۰	۰/۱۷۶	۰/۵۳۴	۰/۶۶۷	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /Pmg/l	
۰/۴۹۳	۰/۴۵۶	۰/۱۰۰	۰/۶۱۲	۰/۰۴۹۰	۰/۵۷۲	۰/۰۷۷	۰/۴۲۷	۰/۵۲۵	۰/۹۴۲	TP/P mg/l	
۲۰/۰	۲۷/۰	۰/۵	۳۱/۵	۰/۵	۳۰/۵	۲/۵	۲۵/۵	۰/۵	۲۱/۵	Water,Temp.°C	
۷/۴۰	۷/۰۰	۰/۱۵	۶/۴۵	۰/۶۰	۷/۰۰	۰/۴۰	۷/۲۰	۰/۵۰	۳۰/۸	O <sub>2</sub> mg/l	
۸/۲۶	۸/۰۴	۰/۰۲	۸/۱۶	۰/۰۶	۷/۹۰	۰/۴۹	۸/۴۵	۰/۰۳	۸/۱۲	pH	
۰/۰۸۳	۰/۰۵۷	۰/۰۰۳	۰/۰۸۱	۰/۰۱۴	۰/۰۲۲	۰/۰۰۳	۰/۰۴۳	۰/۰۵۹	۰/۱۵۶	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /Nmg/l	۲
۳/۴۸۳	۳/۴۶۳	۰/۲۱۰	۲/۲۶۱	۰/۰۶۷	۱/۹۱۹	۰/۶۰۳	۲/۸۰۸	۰/۹۳۸	۳/۱۶۳	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /Nmg/l	
۳/۵۶۸	۳/۵۲۳	۰/۲۰۹	۲/۳۴۸	۰/۰۵۳۵	۲/۱۳۳۵	۰/۶۰۴	۲/۸۷۲	۰/۹۸۳	۳/۳۳۷	DIN/N mg/l	
۳/۴۱۶	۳/۴۶۱	۰/۱۷۱	۳/۶۳۱	۱/۳۶۶	۳/۵۶۹	۰/۲۸۵	۳/۸۶۸	۰/۶۱۲	۳/۰۱۳	DON/N mg/l	
۶/۹۸۴	۶/۹۸۴	۰/۰۳۸	۵/۹۷۹	۱/۴۲۰	۵/۷۰۳	۰/۳۲۰	۶/۷۴۰	۰/۳۷۲	۶/۳۵۰	TN mg/l	
۰/۰۶۰	۰/۰۹۶	۰/۰۹۱	۰/۱۳۵	۰/۰۰۰	۰/۰۸۹	۰/۰۱۲	۰/۱۲۳	۰/۰۵۴	۰/۱۲۶	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /Pmg/l	
۰/۴۰۳	۰/۵۲۶	۰/۱۰۰	۰/۴۱۶	۰/۰۴۸	۰/۳۶۴	۰/۰۳۹	۰/۳۵۴	۰/۰۵۶	۰/۲۶۵	TP/P mg/l	
۲۰/۰	۲۸/۰	۰/۰	۳۱/۰	۰/۱	۳۰/۰	۰/۳	۲۵/۰	۰/۰	۲۱/۰	Water,Temp.°C	
۸/۲۰	۸/۰۰	۰/۲۰	۷/۴۰	۰/۶۰	۷/۲۰	۱/۰۵	۸/۳۵	۰/۷۵	۱۱/۲۵	O <sub>2</sub> mg/l	
۸/۲۲	۸/۳۴	۰/۰۲	۸/۳۱	۰/۱۶	۷/۹۶	۰/۰۰	۷/۸۰	۰/۱۰	۸/۱۳	pH	
۰/۱۴۳	۰/۰۳۸	۰/۰۰۳	۰/۰۷۹	۰/۰۰۵	۰/۰۸۷	۰/۰۵۷	۰/۲۸۰	۰/۱۵۸	۰/۱۸۵	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /Nmg/l	۳
۳/۳۱۵	۳/۳۲۱	۰/۸۶۷	۲/۱۵۱	۰/۰۳۴	۱/۷۱۸	۰/۵۱۱	۴/۴۶۰	۱/۶۹۰	۲/۱۱۹	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /Nmg/l	
۳/۴۶۲	۳/۳۶۳	۰/۸۷۳	۲/۲۳۶	۰/۰۲۹	۱/۸۱۶	۰/۳۸۷	۴/۸۲۴	۱/۸۴۱۵	۲/۳۱۸۵	DIN/N mg/l	
۲/۷۸۴	۱/۶۵۹	۰/۳۸۳	۳/۵۷۴	۱/۰۳۹	۳/۴۵۷	۰/۴۷۸	۴/۱۸۷	۱/۰۵۳	۱/۷۲۹	DON/N mg/l	
۶/۲۴۶	۵/۰۲۲	۰/۴۹۱	۵/۸۱۰	۱/۰۶۸	۵/۲۷۳	۰/۰۹۱	۹/۰۱۱	۲/۸۹۴	۴/۰۴۷	TN mg/l	
۰/۰۷۸	۰/۰۵۳	۰/۰۰۲	۰/۰۳۶	۰/۰۱۴	۰/۰۴۲	۰/۰۰۲	۰/۰۳۱	۰/۰۱۱	۰/۰۴۱	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /Pmg/l	
۰/۴۸۶	۰/۴۶۷	۰/۰۷۸	۰/۳۲۴	۰/۰۲۰	۰/۲۵۷	۰/۰۱۸	۰/۱۹۵	۰/۰۵۸	۰/۱۴۰	TP/P mg/l	



جدول ۶: نتایج آنالیز آماری (ANOVA) بر روی پارامترهای زیستی در آب استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

پارامتر	متغیر مستقل	زنوپلانکتون کل	فیتوپلانکتون کل	Bac.	Pyr.	Cya.	Chl.	Eug.	Xan.
تراکم	استخر	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
ماه	ماه	S	S	NS	NS	S	NS	NS	NS
زیتوده	استخر	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
ماه	ماه	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS

P<0/05 = S اختلاف معنی دار است. P>0/05= NS اختلاف معنی دار نیست.

جدول ۷: نتایج آنالیز آماری (ANOVA) بر روی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی استان مازندران

پارامتر	Water.Temp.	O <sub>2</sub>	pH	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	DIN	PO <sub>4</sub>	TP
متغیر مستقل	استخر	NS	S	NS	NS	NS	S	S
ماه	ماه	S	S	NS	S	S	NS	NS

P<0/05 = S اختلاف معنی دار است. P>0/05= NS اختلاف معنی دار نیست.

محلول در آب استخرهای پرورش در طول دوره ۴/۹۵-۱۱/۲۵ متغیر بوده است و در بیشتر موارد در ساعات روز، بیش از حد مطلوب بوده و حتی سبب جلوگیری از برخی خسارات احتمالی می‌گردد (اسماعیل ساری، ۱۳۷۹؛ پاپهن و حقوقی راد، ۱۳۸۲). میزان اکسیژن محلول در آب استخر شماره ۳ در مقایسه با استخرهای شماره ۱ و ۲ بین ۱/۵ تا ۲ میلی گرم افزایش را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد، شفافیت آب استخر شماره ۳، مقدار زیتوده فیتوپلانکتونی آن (۴/۶ گرم در متر مکعب) به عنوان یک عامل مصرف کننده اکسیژن، سطح تماس وسیع استخر شماره ۳ (۱۳ هکتار) با هوا، جریان باد و بلند شدن امواج در مقایسه با استخرهای شماره ۱ و ۲، این اختلاف را موجب شده است.

میزان BOD<sub>5</sub> در استخر شماره ۳ دارای میانگین ۳/۸ میلی گرم در لیتر بوده است در حالی که در استخرهای ۱ و ۲ عموماً بیش از اکسیژن محلول بوده است. این

با توجه به نزدیکی مکانی استخرها، اختلاف درجه حرارت آب استخرها (به خصوص استخر شماره ۳ با استخرهای شماره ۱ و ۲) عمدتاً تحت تاثیر وزش باد و تابش آفتاب بوده است. به نظر می‌رسد که استخر شماره ۳ با وجود سطح وسیع و دریافت بیشتر نورخورشید نسبت به دو استخر دیگر، به دلیل عدم وجود حصار و فضای مناسب برای وزش باد، دمای آب کمی پایین تر از دو استخر دیگر بوده است. به هر حال عدم وجود اختلاف معنی دار بین درجه حرارت استخرها (P>۰/۰۵) بیان گر عدم وجود ارتباط بین نوع کود مصرفی و درجه حرارت آب بوده است. به طور کلی بدون در نظر گرفتن ماه مرداد، در بقیه ماه‌ها در جه حرارت آب استخرهای پرورش در شرایط مناسب برای پرورش قرار داشته است.

کمبود اکسیژن در آب‌ها سبب تجمع فلزاتی مثل کادمیوم، کروم و سرب در آبشش می‌شود (Heath, 1987). طی بررسی‌های به عمل آمده، میزان اکسیژن

مقادیر فسفات (حداکثر میانگین غلظت کمتر از ۲/۱ میلی گرم بر لیتر) در حد مطلوب بوده است.

دامنه تغییرات درصد فسفر و نیتروژن در شیرابه کود گاوی (استفاده شده در تحقیق حاضر) به ترتیب ۰/۱-۰/۰۲ و ۰/۳۶-۰/۵۵ میلی گرم در لیتر بوده است (سعیدی و همکاران، ۱۳۸۹). این مقادیر با میزان نیتروژن و فسفر دو ترکیب معدنی اوره  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$  و فسفات آمونیوم  $\text{PO}_4^{3-}(\text{NH}_4^+)_3$  اختلاف زیادی دارد. به طوری که نیتروژن یک کیلوگرم اوره جامد با درجه خلوص ۴۸ درصد معادل نیتروژن ۷۳/۶ لیتر شیرابه کود گاوی است و یک کیلوگرم فسفر (فسفات آمونیوم) با درجه خلوص ۱۶٪ معادل ۱۴ لیتر شیرابه کود گاوی را شامل می‌گردد. به همین جهت در جایگزینی منابع تغذیه‌ای، شیرابه کود گاوی نیاز به حجم زیادی از آن در غنی‌سازی آب استخرهای پرورشی می‌باشد. درصد میزان برخی از عناصر مغذی مثل نیتروژن در شیرابه کود گاوی در این بررسی با مطالعه Koley (۲۰۰۷) که ۰/۳ درصد گزارش کرده قرابت وجود دارد ولی درصد میزان فسفر که ۰/۱۹ درصد بوده با درصد میزان این مطالعه اختلاف دارد. به نظر می‌رسد که این اختلاف به علت نوع تغذیه و اختلاف در ارقام غذایی جیره مورد استفاده باشد.

نتیجه‌گیری آن که، اثر کوتاه مدت کودهای شیمیایی در حاصل‌خیزی استخر (حدود ۵ روز پس از کوددهی)، ضرورت استفاده مکرر از آن (نودهی، ۱۳۷۵)، نقش کودهای حیوانی در افزایش مواد آلی و حاصل‌خیزی استخر (بانی، ۱۳۷۵)، نتایج اقتصادی رضایت بخشی در پرورش ماهیان گرم آبی (Kanwal et al., 2003; Garg and Bhatnagar, 1999) و نیز نتایج به‌دست آمده از پارامترهای زیستی و غیرزیستی

اختلاف احتمالاً به استفاده از کودهای آلی در استخرهای شماره ۱ و ۲ مربوط می‌باشد. زیرا شیرابه کود گاوی مواد آلی نیتروژن‌دار و دیگر مواد آلی را با خود دارد و در مقایسه با استخر شماره ۳ که فقط با کودهای شیمیایی غنی شده است، می‌تواند در افزایش میزان  $\text{BOD}_5$  اثر بگذارد. در پرورش ماهی، آبی که pH آن کمی قلیایی است، نسبت به آبی که کمی اسیدی است برتری دارد (Pillay, 2004). بدین ترتیب که میزان جذب فلزات سنگین با افزایش pH، کاهش می‌یابد. مثلاً سمیت روی مانند مس تابع عواملی مانند pH است که قابلیت جذب آن را تعیین می‌کند (McDonald et al., 1989). در مطالعه حاضر میزان pH با میانگین ۸/۱۰ (قلیایی) و دامنه ۸/۴۵-۷/۷۸ با دامنه نوسانات تعیین شده در پرورش ماهیان کاملاً مطابقت دارد (اسماعیلی ساری، ۱۳۷۹) و برای پرورش ماهیان گرم آبی بسیار مطلوب بوده است. اختلاف معنی‌دار آماری نیز در بین استخرهای مختلف در طول سال مشاهده نگردید ( $P > 0/05$ ). غلظت ترجیحی نیترات جهت پرورش ماهیان گرمابی ۱۰ میلی گرم در لیتر است، اما میزان مجاز آن تا ۱۵ میلی گرم در لیتر می‌باشد و افزایش غلظت آن تا ۸۰ میلی گرم در لیتر برای ماهیان سمی است (اسماعیلی ساری، ۱۳۷۹؛ پاپهن و حقوقی راد، ۱۳۸۲). باتوجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر، مقادیر نیترات (حداکثر میانگین غلظت کمتر از ۱۵ میلی گرم بر لیتر) در حد مطلوب بوده است و بین میزان یون آمونیوم، نیترات استخرهای مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار وجود نداشت ( $P > 0/05$ ).

غلظت مناسب فسفات جهت پرورش ماهیان گرمابی ۲ تا ۳ میلی گرم در لیتر است (اسماعیلی ساری، ۱۳۷۹). باتوجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر،

علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان. رشت، ۸۳ صفحه.

6. APHA (American Public Health Association), 2005. Standard method for examination of water and wastewater. Washington. USA: American public Health Association Publisher, 18th edition, 1113 p.
7. Boyd, C.E., 1981. Water Quality 111 Warm water Fish Ponds. Craftmaster Printers, Inc., Opelika, Alabama, 359 p.
8. Carmelo, R.T., 1997. Identifying marine phytoplankton. London: Publication Harcourt Brace Company, 558p.
9. Cossins, S.A., 1983. Pollution and the biological resource of the oceans.-Mansell Bookbinders Ltd. phycology. Blackwell publishing, 566p.
10. Doria, C.R.C., Leonhardt J.H., 1993. Analysis of growth of *Cyprinus carpio* in semi-intensive polyculture with artificial feeding and organic fertilizer. Revista UNIMAR, 15 (Supplement), pp. 223-31.
11. FAO. 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO, Rome, 295 p.
12. Garg, S.K., Bhatnagar, A., 1999. Effect of different doses of organic fertilizer (cow-dung) on pond productivity and fish biomass in still water ponds. Journal of Applied Ichthyology, Vol. 15, pp. 10-18.
13. Gosh, B.C., gosh, R., Mitra, N.B., Javad M.K., 1994. Influence of organic and inorganic fertilizer on the growth and nutrition rice and fish in a culture system Journal of Agriculture Science, Vol. 122, pp. 41-5.
14. Habit, R.N., Pankow, H., 1976. Algenflora der Ostsee II, Plankton. Gustav Fischer Verlag. Germany: Jena University Rostock publication, 493 p.
15. Hartley, B.H.G., Barber, J.R.C., Sims, P., 1996. An Atlas of British Diatoms. UK: Biopress Limited, Bristol, 601 p.
16. Heath, A.G., 1987. Water pollution and fish physiology. (2<sup>nd</sup> Ed.). CRC. Press. Boston, USA, 245 p.
17. Javed, M., Sial, M.B., Zafar, S.A., 1990. Fish pond fertilization (ii) influence of broiler manure fertilization on the growth performance of major carps. Pakistan Journal of Agriculture science, Vol. 27, pp. 212-5.
18. Javed, M., Hassan, M., Sial, M.B., 1992. Fish pond fertilization (iv) effect of cowdung on the growth performance of major carps. Pakistan Journal of Agriculture Science, Vol. 29, pp. 111-5.

این مطالعه می‌تواند از جمله دلایل استفاده از شیرابه کود گاوی به همراه با کود شیمیایی باشد و نهایتاً بخشی از نیازهای پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی را به مصرف کودهای شیمیایی بکاهد.

## سپاسگزاری

این تحقیق با حمایت مالی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انجام شده است. از زحمات آزمایشگاه‌های بخش اکولوژی و نیز سرکار خانم رحیمه رحمتی سپاسگزاری می‌گردد. همچنین از مدیریت مزارع پرورش ماهیان گرم آبی منطقه قائم شهر استان مازندران به خاطر همکاری در این پروژه تشکر و قدردانی می‌گردد.

## منابع

۱. اسماعیلی ساری، ع.، ۱۳۷۹. مبانی مدیریت کیفی آب در آبرزی پروری. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ۲۶۳ صفحه.
۲. بانی، ع.، ۱۳۷۵. بررسی ترکیب فیتوپلانکتونی حاصل از انواع بارور کننده‌ها (کودها) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ۱۰۷ صفحه.
۳. پاپهن، ف.، حقوقی راد، ن.، ۱۳۸۲. پرورش کپور ماهیان استخری. تالیف لازلوهورا و کریس سی گریو، انتشارات نوربخش. ۲۰۵ صفحه.
۴. نصیری، ر.، ۱۳۸۸. آموزش گام به گام SPSS17. تهران: مرکز فرهنگی نشر گستر. ۳۴۴ صفحه.
۵. نودهی، م.ا.ش.، ۱۳۷۵. بررسی اهمیت تغذیه فیتوپلانکتونی ماهی سیم (همراه با کپور ماهیان پرورشی). پایان نامه کارشناسی. مرکز آموزش عالی

23. Pullin, R.S.V., Schedadeh, Z.R., 1980. Integrated Aquaculture Farming System, Manila, Philippines, pp. 258.
24. Sabir Ali, S. K., Sasmal, S., Chair, M. S., Das, S., 2007, Effect of cattle urine on the population growth of Rotifer (*Brachionus calyciflorus*). Agriculture, Vol. 12, pp. 64-68
25. Tiffany, H., Britton, M.E., 1971. The algae of Illinois. New York, USA: Hafner publishing company, 407 p.
26. Vijayaraghavan, K., Ahmad, D., Bin Ibrahim, M. K., Naemmah Binti Herman, H., 2006. Isolation of hydrogen generating microflora from cow dung for seeding anaerobic digester, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 31, Issue. 6, pp.708-720.
19. Kolay, H. K., 2007, Manure and fertilizers, Atlantic Publisher, New Dehli, India, 173p.
20. Kanwal, S., Ahmed, I., Afzal, M., Sughra, F., Abbas, K., 2003. Comparison of Fresh and Dry Cowdung Manuring on Growth Performance of Major Carps, International Journal Agriculture Biology, Vol. 5(3), pp. 313-315.
21. McDonald, D.G., Reader, J.P., Dalziel, T.R.K., 1989. The combined effects of pH and heavy metals on fish ionoregulation, seminar series 34, Cambridge University Press UK, pp.221-242.
22. Pillay, T.V.R., 2004. Aquaculture and the environment. Former Programmed. Fishing News Books, Blackwell Publishing, Ltd. 189 p.

Archive of SID