

مقایسه ترکیبات شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب، ویتامینهای E و D در کبد
فیلماهی پرورشی و دریای خزر

زینب رضی کاظمی^{*}، محمد پور کاظمی^۲، ابوالحسن علوی^۱، محمود محسنی^۳

۱- گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵

^{۲۰}- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران، صندوق پستی: ۶۱۱۶-۱۴۱۵۵

^۴- موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت، ایران، صندوق پستی: ۳۴۶۴-۴۱۶۳۵.

تاریخ پذیرش: ۱۱ آذر ۱۳۹۳

تاریخ دریافت: ۵ مرداد ۱۳۹۳

چکیدہ

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی، پروفیل اسید چرب و همچنین مقادیر ویتامین‌های شامل در چربی شامل ویتامین E (آلفاتوکوفرول، بتا و گاما توکوفرول، دلتاتوکوفرول) و ویتامین D در کبد فیل ماهی (*Huso huso*) دریای خزر و فیلماهی پرورشی موردن بررسی قرار گرفت. در این راستا نمونه کبد فیل ماهی بالغ پرورشی (شرکت قرق طالش- استان گیلان) و نمونه کبد از فیل ماهی بالغ دریای خزر جمع آوری گردید. ترکیبات شیمیایی، کلسیم، فسفر، پروفیل اسیدهای چرب، ویتامین E و ویتامین D با استفاده از روش‌های استاندارد اندازه گیری شد. میزان متوسط درصد رطوبت، خاکستر، پروتئین، چربی کل، فسفر و کلسیم در کبد فیل ماهیان پرورشی به ترتیب $1,36 \pm 0,08$ ، $72,1 \pm 0,68$ ، $1,75 \pm 0,07$ ، $7,8 \pm 0,07$ ، $1,8 \pm 0,07$ ، $79,2 \pm 2,93$ ٪ و $1,78 \pm 0,07$ ، $77,2 \pm 0,07$ ، $1,8 \pm 0,07$ ، $79,2 \pm 0,07$ ، $1,5 \pm 0,09$ ، $85,8 \pm 4,09$ ٪، $11,06 \pm 3,84$ ٪، $2,6 \pm 0,13$ ٪، $62,36 \pm 6,56$ ٪ میانگین هفت اسید چرب بین نمونه‌های پرورشی و دریابی دارای اختلاف معنی دار ($P \leq 0,05$) بود. اسید چرب اشباع 0:16 و مونو اسید چرب غیر اشباع 1:18 با مقدار قابل توجهی در هر دو نمونه دریابی و پرورشی یافت شدند. در نمونه‌های پرورشی و دریابی مقدار امگا 3(n-3) به ترتیب $6,70 \pm 0,697$ ٪ و $6,6 \pm 0,697$ ٪ مقدار امگا 6(n-6) به ترتیب $15,71 \pm 0,34$ ٪ و $15,7 \pm 0,34$ ٪ بود. میزان آلفاتوکوفرول، در نمونه پرورشی و دریابی به ترتیب $1,04 \pm 0,04$ ، $1,05 \pm 0,05$ (میلی گرم بر کیلو گرم)، بتا و گاما توکوفرول ($0,041 \pm 0,058$ ، $0,058 \pm 0,058$ ، $0,058 \pm 0,058$ میلی گرم بر کیلو گرم) و دلتاتوکوفرول ($0,041 \pm 0,058$ ، $0,058 \pm 0,058$ ، $0,058 \pm 0,058$ میلی گرم بر کیلو گرم) و میزان ویتامین D در هر دو نمونه ناچیز بود. با توجه به مقادیر مناسب ویتامین E و امگا 3 می‌توان نتیجه گیری نمود که کبد فیل ماهی حتی در نمونه‌های پرورشی دارای ارزش غذایی و دارویی بوده و می‌توان با استخراج صنعتی آن ضمن تولید فرآورده‌های دارویی، موجب ارتقا ارزش افروده محصولات شیلاتی و کمک موثر در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی شد.

كلمات كليدي: فيلم ماهي، كيد، بروفيل اسيد چرب، ويتامين E.

Z.Razikazemi@yahoo.com .(✉) *

مقدمه

فعالیت آلفاتوکوفرول ویتامین E در حیوانات بسیار بیشتر از سایر فرم‌های است (Hamreh, 2011).

بنابراین ماهی منبع مناسبی از اسیدهای چرب ضروری و ویتامین‌ها است ولی مقادیر بسیار پایین از اسیدهای چرب اشباع و کلسترول را هم دارد (Stancheva *et al.*, 2010).

کبد مهم‌ترین ارگان ذخیره‌سازی چربی در ماهی است (Kozlova, 1998). در میان انواع ماهی‌های موجود در دنیا ماهیان خاویاری به دلایلی نظر جش بزرگ، سهولت در صید، گوشت بسیار لذیذ و خاویار مطبوع و بی‌نظیر و غنی از پروتئین و اسیدهای چرب اشباع نشده، خصوصاً اسیدهای چرب گروه امگا ۳ همواره به عنوان گونه‌های با ارزش تجاری، اقتصادی و شیلاتی مورد توجه بوده‌اند (Peter, 2000).

فیل ماهی یکی از بالرzes ترین ماهیان خاویاری در ایران است (Ovissipour and Rasco, 2011). تاکنون بیشترین مطالعه و بهره-برداری از فیل ماهی جهت تولید و استفاده از گوشت و خاویار بوده و در مورد سایر اجزای بدن آن از قیل روده، سر، کبد و... که ممکن است منبع غنی از امگا ۳ و ویتامین‌ها باشد گزارشات اندکی منتشر شده است. این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی و دارویی کبد با تأکید بر اسیدهای چرب و ویتامین‌های محلول در چربی (A و D) انجام شده و با توجه به کاهش شدید ذخایر فیلماهی در دریای خزر و روند نزولی صید آن، کبد فیل ماهی دریایی با کبد فیلماهی بالغ پرورشی مورد مقایسه قرار گرفته است. بدون شک با بهره‌برداری بهینه از انواع بافت و اندام‌های مختلف تاسماهیان، ضمن تولید فرآورده‌های دارویی، غذایی و همچنین افزایش درآمد صیادان و پرورش دهنده‌گان ماهی و ارتقاء بهره-

چربی‌ها ترکیبات مهمی در بدن ماهی‌ها هستند که منبع تولید انرژی و اسیدهای چرب ضروری برای بدن به شمار می‌روند. چربی ماهی‌ها به عنوان منبع غنی از زنجیره بلند اسید چرب امگا ۳ (n-3) شناخته شده است (GülHarlioğlu, 2012).

اسیدهای چرب امگا ۳ خانواده‌ای از اسیدهای چرب اشباع نشده هستند که اولین پیوند دوگانه آن‌ها بین سومین و چهارمین کربن در زنجیره کربنی قرار گرفته و موادی ضروری برای تنظیم فعالیت بدن انسان هستند. بدن انسان توانایی ساخت و سنتراسیدهای چرب n-3 را از مولکول‌های دیگر ندارد. مطالعات نشان می‌دهد افرادی که از ماهی به عنوان منبع امگا ۳ استفاده می‌کنند کمتر دچار بیماری‌های قلبی می‌شوند (Shahidi and Miraliakbari, 2004; Innis, 2004; Khoddami *et al.*, 2012).

روغن ماهی شامل دو اسید چرب مهم ایکوزاپنتانویک اسید (C20:5 n-3, EPA) و دوکوزا هگرانویک اسید (C22:6 n-3, DHA) است که آن را از روغن موجود در بافت‌های سایر حیوانات و همچنین Jittrepotch *et al.* (2006) روغن‌های گیاهی متمایز می‌کند. ماهی یکی از مهم‌ترین منابع ویتامین‌های (Cahu *et al.*, 2004). ویتامین E یکی از ویتامین‌های تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی و دارویی کبد با تأکید بر اسیدهای چرب و ویتامین‌های محلول در چربی (A و D) انجام شده و با توجه به کاهش شدید ذخایر فیلماهی در دریای خزر و روند نزولی صید آن، کبد فیل ماهی دریایی با کبد فیلماهی بالغ پرورشی مورد مقایسه قرار گرفته است. بدون شک با بهره‌برداری بهینه از انواع بافت و اندام‌های مختلف تاسماهیان، ضمن تولید فرآورده‌های دارویی، غذایی و همچنین افزایش درآمد صیادان و پرورش دهنده‌گان ماهی و ارتقاء بهره-

چربی‌ها در بدن نیز می‌شود (Wang *et al.*, 2000; Zimmer *et al.*, 1993). ویتامین E شامل هشت فرم است و در طبیعت به چهار توکوفرول و چهار توکوتربینول تقسیم می‌شود که

شده ۲ سی سی پتانولی ۲ مولار و ۲ سی سی نرمال هگزان (مرحله متیلاسیون) اضافه نموده و به مدت ۵-۱۰ دقیقه با مخلوط کن یا ورتکس هم زده شد. از فاز بالایی به میزان یک میکرولیتر برای تزریق در دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) شرکت YOUNGLIN استفاده شد. در قسمت دتکتور فشار گاز هیدروژن ۴۰ میلی لیتر بر دقیقه، فشار هوا ۴۵۰ میلی لیتر بر دقیقه و دما ۲۸۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد (AOCS, 1998).

برای اندازه گیری ویتامین E از دستگاه HPLC ساخت شرکت YOUNGLIN و دتکتور UV Visible استفاده گردید. اندازه گیری ویتامین D با استفاده از دستگاه HPLC ساخت شرکت Waper انجام گرفت. برای آنالیز آماری از test T با نرم افزار SPSS و Excell با احتمال ($P \leq 0.05$) استفاده شد.

نتایج

میزان متوسط درصدهای رطوبت، خاکستر، پروتئین، چربی کل، فسفر و کلسیم در کبد فیل ماهیان پرورشی به ترتیب 176 ± 0.08 , 72 ± 0.08 , 45.0 ± 0.07 , 18.7 ± 0.07 , 79 ± 0.07 , 11.0 ± 0.06 , 15.0 ± 0.05 , 8.5 ± 0.04 , 1.0 ± 0.03 , 0.0 ± 0.02 بود و اختلاف معنی داری ($P \geq 0.05$) بین نمونه های پرورشی و ماهیان صید شده در دریای خزر وجود نداشت. از ۲۰ متیل استر اسیدهای چرب (C₁₂ الی C₂₂) میانگین هفت اسید چرب C_{12:0}, C_{15:0}, C_{16:1}, C_{17:0}, C_{20:0}, C_{17:1} و C_{22:5n:3} بین نمونه های پرورشی و دریایی دارای اختلاف معنی دار ($P \leq 0.05$) بود.

وری، سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی، از ورود پسماندها و ضایعات شیلاتی به اکوسیستم های طبیعی جلوگیری می گردد.

مواد و روش ها

۴ نمونه کبد مولد فیل ماهی دریایی صید شده در دریای خزر (ناحیه ۴- استان گلستان) و ۴ نمونه کبد فیل ماهی بالغ پرورشی (از مرکز پرورش ماهی خاویاری قرق تالش استان گیلان) جمع آوری شدند. میانگین طول کل (سانتی متر)، وزن شکم پر (کیلو گرم)، وزن شکم خالی (کیلو گرم) و وزن کبد (گرم) فیل ماهیان پرورشی به ترتیب (۱۷۶, ۲۶, $32/75$, $226/7$) و فیل ماهیان دریایی به ترتیب (۲۸۷/۵, $20.1/25$, $164/25$, $20.1/25$) بود و نمونه ها تا زمان انجام آزمایش در فریزر نگهداری شدند. مقادیر متوسط رطوبت، خاکستر، پروتئین، چربی کل و فسفر به ترتیب با دستگاه های آون (Heareus)، کوره الکتریکی (Lenton) با دمای ۵۵ درجه سانتی گراد، کجل دال، سوکسله و اسپکتوفوتومتر، بر مبنای روش های استاندارد (AOAC, 1995) و (ISO, 1970) تعیین گردید.

برای اندازه گیری میزان کلسیم نیز از روش استاندارد (AOAC, 1995) استفاده شد. جهت استخراج روغن از کبد ماهی، ابتدا نمونه های کبد را از فریزر خارج نموده تا کاملا از حالت انجاماد خارج شوند. ۵ گرم نمونه بافت کبد را با دقت وزن نموده و ۲۰ سی سی میزان گینه های هگزان به آن اضافه کرده و با سپس ۲۰ سی سی هگزان به آن اضافه کرده و با دور ۲۵۰۰ به مدت ۲-۳ دقیقه سانتریفیوژ شدند. محلول بالایی (روغن کبد) که رنگ آن روشن تراست با دقت جدا نموده سپس به ۱ قطره از روغن کبد استخراج

(میلی گرم بر کیلو گرم) و دلتا توکو فرول (0.058 ± 0.056 ، 0.058 ± 0.040) (میلی گرم بر کیلو گرم) و ویتامین D در هر دو نمونه ناچیز بود.

بحث

کبد در تمام مهره‌داران یافت می‌شود. شکل آن، به طور قابل توجهی در گونه‌های مختلف متفاوت است و تا حد زیادی با شکل و ترتیب اندام‌های اطراف تعیین و در اکثر گونه‌ها به لوب راست و چپ تقسیم می‌شود. ساختار داخلی کبد در تمام مهره‌داران مشابه است. این اندام نقش‌های متعددی در بدن دارد. کبد در بدن ماهی مانند دیگر مهره‌داران بزرگ‌ترین ارگان بدن بوده و به صورت یک کارخانه و محل ذخیره‌سازی عمل می‌کند. برای مثال، مواد قندی پس از هیدرولیز در روده و انتقال به کبد، مجدداً به شکل ذخیره‌ای خود یعنی گلیکوژن در آمد و در آن ذخیره می‌گردند. در بعضی از ماهیان مانند ماهی کاد (Cod) یا هالیبوت (Halibut)، کبد محل ذخیره چربی بوده، مقدار قابل توجهی چربی در آن جمع و ذخیره می‌شود (رضوی شیرازی، ۱۳۸۰). ترکیبات شیمیایی کبد فیل ماهی دریایی و پرورشی با سایر مطالعات انجام شده روی کبد ماهی هالیبوت، تن (Sardinella lemuru) و ساردنین (Euthynnus affinis) Pugsley، 1939؛ Khoddami *et al.*, (2012؛ Khoddami *et al.*, 2009 مطابقت داشت).

میزان کلسیم در کبد فیل ماهی پرورشی و دریایی به ترتیب (0.076 ± 0.02) و (0.079 ± 0.019) درصد بود و با نتایج مطالعات قبلی برای گوشت گربه ماهی (Cat fish)، کاد، سالمون (Salmon)، هرینگ (Herring) و هالیبوت مطابقت داشت. درصد فسفر در کبد فیل ماهی مطابق با میزان فسفر موجود در گوشت گونه‌های *Lates*

جدول ۱: مقایسه پروفیل اسید چرب روغن استخراج شده از کبد فیل ماهی پرورشی و دریایی (میانگین \pm SD)

پارامتر	فیل ماهی دریایی (N=۴)	فیل ماهی پرورشی (N=۴)
C ₁₂ :0	0.19 ± 0.008^b	1.26 ± 0.009^a
C ₁₃ :0	0.29 ± 0.12^a	0.079 ± 0.06^a
C ₁₄ :0	0.024 ± 0.028^a	0.126 ± 0.009^a
C ₁₅ :AnteIso	0.41 ± 0.08^b	1.38 ± 0.52^a
C ₁₆ :0	17.05 ± 2.23^a	17.59 ± 2.06^a
C ₁₆ :1-C ₁₇ :0	0.75 ± 0.22^a	1.26 ± 0.46^a
C ₁₆ :1	1.41 ± 0.23^b	6.58 ± 1.42^a
C ₁₇ :0	0.46 ± 0.25^b	1.17 ± 0.21^a
C ₁₇ :1	0.29 ± 0.07^b	2.25 ± 0.56^a
C ₁₈ :0	5.3 ± 1.7^a	2.94 ± 0.57^a
C ₁₈ :1n:9	35.96 ± 5.49^a	31.42 ± 0.18^a
C ₁₈ :2n:6	13.54 ± 2.25^a	1.30 ± 0.28^a
C ₂₀ :0	0.46 ± 0.77^a	0.064 ± 0.054^b
C ₁₈ :3n:3	1.58 ± 0.51^a	0.44 ± 0.31^a
C ₂₀ :1	0.88 ± 0.61^a	0.75 ± 0.69^a
C ₂₀ :4 n:6(AA)	2.18 ± 1.1^a	2.34 ± 0.8^a
C ₂₀ :5 n:3(EPA)	1.02 ± 0.67^a	1.9 ± 0.76^a
C ₂₂ :4	0.19 ± 0.14^a	0.58 ± 0.40^a
C ₂₂ :5n:3(DPA)	0.29 ± 0.22^b	1.7 ± 0.67^a
C ₂₂ :6n:3(DHA)	3.8 ± 2.48^a	2.88 ± 0.58^a
Total n-6	۱۵/۷۱	۳/۶۴
Total n-3	۶/۶۹	۶/۹۱
n-3/n-6	۰/۴۲	۱/۹۰
SAFA	۲۴/۹	۲۵/۸۶
PUFA	۲۲/۶	۱۱/۱۴
MUFA	۳۸/۵۴	۳۴/۴۲
HUFA	۷/۲۹	۸/۸۲

*اعدادی که در هر ردیف دارای حروف مشابه هستند فاقد اختلاف آماری معنی دار می‌باشند.

میزان آلفا توکوفرول، در نمونه پرورشی و دریایی به ترتیب (1.04 ± 0.21 ، 1.05 ± 0.10) (میلی گرم بر کیلو گرم)، بتا و گاما توکوفرول (0.058 ± 0.041 و 0.058 ± 0.040)

می‌گردد (Hosseini *et al.*, 2010). در مطالعه حاضر مقدار پلی اسیدهای چرب غیر اشباع، لینولئیک اسید و لینولئیک اسید (C_{18:3} n-3) و DHA در کبد فیل ماهی پرورشی بیشتر از دریابی بود اما مقدار EPA کمتر بود. مقدار امگا ۳ و نسبت امگا ۳ به امگا ۶ در نمونه‌های دریابی بالاتر بود. نتایج حاصل از اندازه گیری ویتامین‌های E و D با گزارش Nunez (۲۰۰۷) برای کبد کوسه مطابقت داشت.

با توجه به وجود مقدار مناسبی از چربی، خصوصیات بیوشیمیایی، امگا ۳، نسبت امگا ۳ به امگا ۶ و ویتامین E، کبد فیل ماهی می‌تواند منبع خوبی برای استخراج چربی باشد. مهم‌ترین فایده استخراج چربی از کبد فیل ماهی ارزان‌تر بودن آن نسبت به گوشت ماهی است. علاوه بر آن از آن می‌توان به عنوان یک بافت مناسب برای تولید امگا ۳ و ویتامین E در حد پایلوت و سپس در حد صنعتی به منظور بهره‌برداری در صنعت دارو‌سازی و مکمل‌های غذایی استفاده نمود که این کار ضمن کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، امکان تولید محصولات دارویی به ویژه کپسول‌های مکمل غذایی را نیز فراهم می‌آورد.

سپاسگزاری

این تحقیق با حمایت مالی و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان گیلان به انجام رسید و از حمایت‌های جناب آقای دکتر متقدی طلب و سرکار خانم مهندس بلاالی تشكر و قدردانی می‌گردد.

منابع

- رضوی شیرازی، ح، ۱۳۸۰. تکنولوژی فرآورده‌های دریابی، اصول نگهداری و عمل آوری. انتشارات نقش مهر، ۳۳۸ صفحه.

Oreochromis niloticus و Bagrus bayad niloticus بود (Elagba *et al.*, 2010).

C_{16:0} بالاترین مقدار را در بین اسیدهای چرب اشباع شده در هر دو نمونه دریابی و پرورشی دارا بود. مقدار بالای پالمیتیک اسید (C_{16:0}) در کبد ماهی‌های تن و ساردين، گوشت فیل ماهی پرورشی و خاویار Khoddami *et al.*, 2012; Khoddami *et al.*, 2009; Ghomi *et al.*, 2013; Ovissipour and Rasco, 2012

میزان اولئیک اسید (C_{18:1} n-9) در کبد قابل توجه بود. بر اساس مطالعات قبلی نیز C_{18:1} n-9 رایج‌ترین مونو اسید چرب موجود در بافت‌های مختلف در ماهیان خاویاری و سایر ماهیان است (Czesny *et al.*, 2000; Mol and Turan, 2008; Ashton *et al.*, 1993; Gallagher *et al.*, 1998).

نتایج این مطالعه نشان داد مقدار مونواسیدهای چرب در نمونه‌های دریابی بیشتر از نمونه‌های پرورشی بود. مقدار لینولئیک اسید (C_{18:2} n-6) در نمونه‌های پرورشی بیشتر از نمونه‌های دریابی بود. این نتیجه همچنین در پروفیل چربی خاویار فیل ماهی مشاهده شد که به چربی موجود در جیره غذایی مصرفی ماهی بستگی دارد (Ovissipour and Rasco, 2011). حسینی و همکاران (۲۰۱۰) تاثیر سه جیره غذایی شامل روغن ماهی، روغن سویا و روغن کانولا روی پروفیل اسید چرب بافت ماهیچه فیل ماهی را مورد مقایسه قرار دادند و بیان فرمودند پروفیل اسید چرب ماهیچه ماهیانی که در جیره غذایی از روغن ماهی برای آن‌ها استفاده شد، مونواسید چرب بیشتری نسبت به روغن سویا دارد. انتخاب منبع چربی جیره مهم است و استفاده از روغن آفتاب‌گردان به جای روغن ماهی در جیره، باعث زیاد شدن مقدار لینولئیک اسید در بافت ماهیچه بلوگا

14. Hamreh, K., 2011. Metabolism, Interactions, Requirements and Functions of Vitamin E in Fish. National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), PO Box 2029, Bergen Norway, 1-18.
15. Hosseini, S., Abedian-Kenari, A., Regenstein, J., Rezaei, M., Nazari, R., et al., 2010. Effects of alternative dietary lipid sources on growth performance and fatty acid composition of beluga sturgeon (*Huso huso*), Juveniles. Journal of the World Aquaculture Society, 41, 471-489.
16. Innis, S.M., 2004. Polyunsaturated fatty acids in human milk: an essential role in infant development. Advances in Experimental Medicine and Biology, 554, 27-43.
17. ISO Recommendation, R1443., 1970. Meat and Meat Products, Determination of moisture content.
18. ISO Recommendation, R1443, 1970. Meat and Meat Products, Determination of total Fat.
19. ISO Recommendation, R1443., 2004. Animal and Vegetable Fats and Oils- Determination of tocopherol and tocotrienol Content by high-performance liquid chromatography.
20. Jittrepotch, N., Ushio, H., Ohshima, T., 2006. Oxidative stabilities of triacylglycerol and phospholipids fractions of cooked Japanese sardine meat during low temperature storage. Journal of Food Science., 99, 360-367.
21. Khoddami, A., Ariffin, A.A., Bakar, J., Ghazali, H.M., 2009. Fatty Acid Profileof the Oil Extracted from Fish Waste (Head, Intestine and Liver) (*Sardinellalemuru*). World Applied Sciences Journal, 7(1), 127-131.
22. Khoddami, A., Ariffin, A.A., Bakar, J., Ghazali, H.M., 2012. Fatty Acid Profile of the Oil Extracted from Fish Waste (Head, Intestine and Liver) (*Euthynnusaffinis*). African Journal of Biotechnology. 11(7), 1683-1689.
23. Kozlova, T.A., 1998. Lipid Class Composition of Benthic Pelagic Fishes (Cottocomephorus, Cottoidei) from Lake Baikal. Fish Physiology and Biochemistry., 19, 211-216.
24. Mol, S., Turan, S., 2008. Comparison of proximate, fatty acid and amino acid compositions of various types of fish roes. International Journal of Food Properties, 11, 669-677.
25. Nunez, G., 2007. Quality and Stability of Cuban Shark liveroil: Comparison with Icelandic Cod Liver Oil. UNU (The United Nations university) - Fisheries Training Programme, Final Project. 1-38, USA.
26. Ovissipour, M., Rasco, B., 2011. Fatty Acid and Amino Acid Profiles of Domestic and Wild Beluga (*Huso huso*) Roe and Impact on AOAC Official Methodes of Analysis, 1995. Ash of Animal Feed. In: D Firestone Editor. Assoc off Anal Chem Inc, VA, USA.
3. AOAC Official Methodes of Analysis, 1995. Calcium of Animal Feed. In: D Firestone Editor. Assoc off Anal Chem Inc, VA, USA.
4. AOAC Official Methodes of Analysis, 1995. Determination of Vitamin D in Selected Foods by Liquid Chromatography. In: D Firestone Editor. Assoc off Anal Chem Inc, VA, USA.
5. AOAC Official Methodes of Analysis., 1990. Protein (crude) in Animal Feed Automated Kjeldahl Method. In: D Firestone Editor. Assoc off Anal Chem Inc, VA, USA.
6. AOAC Official Methodes of Analysis., 1968. Total phosphorus, phosphorus in Animal Feed, Alkall metric Ammonium Molybdo phosphate Method. In: D Firestone Editor. Assoc Off Anal Chem Inc, VA, USA.sludge.
7. AOCS., 1997. Fatty acid composition of Marine oils by GLC (Ce 1b-89). Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists' Society (5th Ed.). AOCS Press, Champaign USA.
8. Ashton,HJ., Farkvan, DO., March, BE., 1993. Fatty acid composition of lipids in the eggs and alevis from wild and cultured chinook salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 50, 648-655.
9. Cahu, C., Sallen, P., Lurgeril, M., 2004. Farmed and wild fish in the prevention of cardiovascular diseases: Assessing possible differences in lipid nutritional values. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases., 14, 34-41.
10. Czesny, S., Dabrowski, K., Christensen, J., Van Eenennaam, J., Doroshov, S.I., 2000. Discrimination of wild and domestic origin of sturgeon ova based on lipids and fatty acid analysis. Aquaculture, 189, 145-153.
11. Elagba Mohamed, H.A., Al-Maqbaly, R., Mohamed Mansour, H., 2010. Proximate composition, amino acid and mineral contents of five commercial Nile fishes in Sudan. African Journal of Food Science, 4, 10, 650-654.
12. Gallagher, M., Paramore, L., Alves, D., Rulifson, R., 1998. Comparison of phospholipid and fatty acid composition of wild and cultured striped bass eggs. Journal of Fish Biology, 52, 1218-1228.
13. GülHarlıoğlu, A., 2012. Fatty Acid Composition, Fat Soluble Vitamins and Cholesterol Content of Farmed Rainbow Trout. Pakistan Journal of Zoology., 44(4), 1013-1019.

- cardiovascular disease and cancer. *Journal of Medicinal Food*, 7(4), 387- 401.
- 31. Stancheva, M., Dobreva, D., Merdzhakov, A., Galunska, B., 2010. Vitamin Content and Fatty Acids Composition of Rainbow trout. Plodiv. University, Paisii Hilendarski, Bulgaria Scientific Papers, Book. 5(37), 117-123.
 - 32. Wang, X.Y., Quinn, P.J., 2000. The Location and Function of Vitamin E in Membranes (review). *Molecular Membrane Biology*, 17, 143–156.
 - 33. Zimmer, G., Thu'rich, T., Scheer, B., 1993. Membrane Fluidity and Vitamin E. In: Vitamin E in Health and Disease (Packer, L Fuchs, J. eds), Marcel Dekker Inc., New York, Basel, Hong Kon, 207–222.
 - 34. Fertilization Ratio. *Journal Aquaculture Research and Development*, 2(3).
 - 27. Peter, S. M., 2000. Freshwater fish of Britain and Europe octopus Publishing. *Journal of Fish Biology*, 8, 423-441.
 - 28. Pourkazemi, M., 2006. Caspian Sea sturgeon conservation and fisheries: Past present and future. *Journal of Applied Ichthyology* 22 (s1), 12-16.
 - 29. Pugsley, L., 1939. Vitamin A and D Potencies of Liver and Intestinal Oils of Halibut). *Journal of the Fisheries Research Board of Canada*, 4b(5), 396-404.
 - 30. Shahidi, F., Miraliakbari, H., 2004. Omega-3 (n=3) fatty acid in health and disease: part1-