

تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس بر سطح گلوکز خون افراد

متلا به دیابت

مجتبی انصاری^۱/دکتر حسن شمس اسفندآباد^۲/دکتر محمد حکمی^۳

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ / تاریخ بررسی مقاله: ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ / تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵

چکیده

هدف این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در بعد کسب مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس بر میزان قند خون بیماران دیابتی است. جامعه مورد پژوهش مردان بیست تا شصت ساله دیابتی شهرستان کرج است که از این جامعه آزمودنی های این پژوهش را ۶۰ بیمار مرد دیابتی شهرستان کرج تشکیل می دهند. این افراد به دو گروه سی نفره (گروه کنترل و گروه آزمایشی) تقسیم شدند. مدت زمان آموزش شش هفته و هر هفته سه جلسه بود. که برای گروه آزمایش اجرا شد. ابتدا سطوح خونی قند، ناشتا (FBS)، قند ۲ ساعت پس از جذب (2HPP) و هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) اندازه گیری شد و مجدداً بعد از آموزش آزمایش دوباره اندازه گرفته. نتایج پیش و پس از آزمون گروه کنترل و آزمایش در متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از روش آماری کوواریانس مقایسه شد. طبق نتایج، آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس باعث کاهش معنا داری ($P < 0.05$) 2HPP، HbA1C FBS و 2HPP در افراد گروه آزمایشی می شود. بعد از دو ماه آموزش، آزمون پیگیری به عمل آمد که نتایج گروه آزمایشی کاهش معنا داری را نسبت به قبل از آموزش در مقایسه با گروه کنترل نسبت به گلوکز نشان می داد.

کلید واژه ها: کنترل خشم، مدیریت استرس، گلوکز، بیماران دیابتی مرد

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

^۲ دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

^۳ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مقدمه

دیابت شایع ترین اختلال متابولیک است. که نوعی نارسایی در تنظیم هموستاز کربوهیدرات توسط انسولین تعریف می‌شود و به دو نوع I و II طبقه بندی شده است. در دیابت نوع اول (IDDM)^۱ چون انسولین تولید نمی‌شود، ممکن است علائم خیلی سریع ظاهر شوند. در این حالت سطح کتون خون بالا می‌رود. در دیابت نوع ۲ (NIDDM)^۲ ترشح انسولین کاهش می‌یابد یا به اندازه طبیعی مؤثر نیست و سطح گلوکز خون آرام تر افزایش می‌یابد؛ پروتئین و چربی کم تری شکسته می‌شود و بنابراین، کتون کم تر تولید می‌شود و خطر کم تری دارد.

دیابت نوع اول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بیماران دیابتی به دیابت نوع اول مبتلا هستند.

این بیماری از توانایی بیمار می‌کاهد و باعث ناتوانی و مرگ زودرس می‌شود. همچنین عامل اصلی نایینایی، بیماری کلیوی پیشرفت و قطع عضو به ویژه در سنین فعال زندگی است (کاسترلو^۳ و همکاران، به نقل از رخشنده رو و همکاران، ۱۳۸۸). در حالت عادی، مقدار گلوکز^۴ بین ۷۰ الی ۱۱۰ میلی گرم در دسی لیتر است. دو اختلال عمده مربوط به گلوکز، یکی هیپرگلیسمی^۵ است که اغلب دیابت شناخته می‌شود و دیگری هیپوگلیسمی^۶ است که بر اثر پایین بودن قندخون عارض می‌شود (هنری^۷، ۲۰۰۶). دیابت نوع اول بیش تر در کودکان و نوجوانان شایع است. اما دیابت نوع دوم شایع تر از نوع اول است که شامل حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مبتلایان به دیابت در سراسر دنیا می‌شود. این بیماران در برابر

^۱ Insulin Dependent Diabetes Mellitus

^۲ Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus

^۳ Casterlao.

^۴ glucose

^۵ hyperglycemia

^۶ hypoglycemia

^۷ Henry, G.B.

انسولین مقاومت دارند و معمولاً دچار کمبود نسبی انسولین نیز هستند و نمی توانند انسولین ترشح شده را مصرف کنند (ملایی و همکاران، ۱۳۸۲).

بر اساس مطالعات محققان روی دو قلوهای همسان و شجره خانوادگی بیماران دیابتی، وراثت عامل مهمی در هر دو نوع دیابت است. هم چنین دیابت ممکن است بر اثر عوامل محیطی از جمله فشار روانی و استرس و رژیم غذایی عارض شود (ابوالحسنی و همکاران، ۱۳۸۴). امروزه بیماری دیابت به عنوان یک اولویت بهداشتی در کشور مطرح شده است و شمار افراد مبتلا به دیابت رو به افزایش است (مولایی و همکاران، ۱۳۸۲).

نتایج پژوهش ارن^۱ و ازکانکاو^۲ (۲۰۰۳) نشان می دهد که افراد مبتلا به دیابت نسبت به کسانی که دیابت ندارند استرس و اضطراب بیش تری دارند. هم چنین پژوهشگران دانشگاه دوک (۲۰۰۰) در پژوهشی نشان دادند که با آموزش کنترل استرس، قند خون افراد در حدی کاهش می یابد که آن ها از عوارض بلند مدت دیابت مصون می کنند. طبق نتایج پژوهش های گوناگون، اضطراب و خشم از هیجان های منفی شایع در افراد مبتلا به دیابت است که مدیریت این هیجان ها نقش مؤثری در کنترل و کاهش عوارض منفی این بیماری دارد. با توجه به آن چه گفته شد، هدف کلی تحقیق، بررسی تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس بر میزان گلوکز خون مردان بیست تا شصت ساله مبتلا به دیابت نوع اول و دوم در شهرستان کرج است.

^۱ Eren, I.
^۲ Ozcan kava.

روش

در این تحقیق طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است که جامعه آماری را بیماران دیابتی مرد بیست تا شصت ساله شهرستان کرج تشکیل می دهند.

روش نمونه گیری در این پژوهش حاضر، به صورت تصادفی چند مرحله ای بود. بدین صورت که ابتدا از بین ۲۰۰ بیمار دیابتی مرد شهرستان کرج (طبق آمار مرکز دیابت شهرستان کرج) ۶۰ نفر- که تنها مبتلا به دیابت بودند - انتخاب شدند و باز به صورت تصادفی به دو گروه سی نفره - سی نفر آزمایشی و سی نفر کنترل - تقسیم شدند.

بازار پژوهش، کیت تشخیص کمی گلوکز و دستگاه اتوآنالیزr^۱ بود که میزان قند خون را با استفاده از کیت گلوکز نشان می دهد. درباره خصوص مدیریت استرس و مهارت کنترل خشم نیز می توان گفت که با استفاده از روش آرام سازی یاکوسن^۲ آموزش در دوازده جلسه ۱۲۰ دقیقه ای (پنج جلسه آموزش مهارت کنترل خشم و سه جلسه آموزش مدیریت استرس و چهار جلسه برای پیگیری و بازخورد به آزمودنی ها و مرور کلی مهارت ها) صورت گرفت. مدیریت خشم در جلساتی به فاصله دو روز و جلسات پیگیری برای بازخورد هفته ای یکبار آموزش داده شد. در نهایت بعد از دو ماه آموزش، آزمون پیگیری به عمل آمد.

داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شد.

^۱. auto analazire
^۲. Yacosen.

یافته‌ها

جدول ۱: شاخص‌های توصیفی نمرات سطوح قند ناشتا (FBS) در بیماران دیابتی در دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

گروه کنترل		گروه آزمایش		گروه	متغیر
انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	آزمون آماری مرحله	قند ناشتا (FBS)
۷/۱۲	۱۱۱/۳۷	۸/۵۸	۱۱۳/۱۳	پیش آزمون	
۶/۰۸	۱۱۱/۲۳	۶/۱۸	۱۰۵/۶۳	پس آزمون	

بر اساس نتایج جدول ۱، در مرحله پیش آزمون، میانگین نمرات سطوح قند ناشتا (FBS) در دو گروه آزمایش و کنترل با هم تفاوت کمی دارند. اما در مرحله پس آزمون، میانگین سطوح قند ناشتا (FBS) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.

جدول ۲: شاخص‌های توصیفی نمرات سطوح قند دو ساعت پس از جذب (2HPP) در بیماران دیابتی در دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

گروه کنترل		گروه آزمایش		گروه	متغیر
انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	آزمون آماری مرحله	قند دو ساعت پس از جذب (2HPP)
۱۷/۹۹	۱۶۴/۳۳	۱۳/۳۵	۱۵۶/۷۰	پیش آزمون	
۱۸/۰۲	۱۵۹/۱۷	۱۴/۶۳	۱۲۹/۵۷	پس آزمون	

نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد که در مرحله پیش آزمون بین میانگین نمرات قند دو ساعت پس از جذب (2HPP) در دو گروه آزمایش و کنترل با هم تفاوت کمی دارند اما در

مرحله پس آزمون میانگین سطوح قند دو ساعت پس از جذب (2HbA1C) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.

جدول ۳: شاخص‌های توصیفی نمرات سطوح (HbA1C) در بیماران دیابتی در دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

گروه کنترل		گروه آزمایش		گروه	متغیر
انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	آزمون آماری	سطوح هموگلوبین خون (HG)
۰/۰۳	۰/۱۵	۰/۰۲	.۱۵	پیش آزمون	مرحله
۰/۰۳	۰/۱۴	۰/۰۲	۰/۱۰		پس آزمون

طبق نتایج جدول ۳، در مرحله پیش آزمون، میانگین نمرات سطوح (HbA1C) دو گروه آزمایش و کنترل با هم متفاوتند. اما در مرحله پس آزمون، میانگین سطوح هموگلوبین در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.

جدول ۴: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات قند خون ناشتا در دو گروه آزمایش و کنترل

معنا داری	F آماره	درجه آزادی	مجموع مجذورات	منابع تغییر
۰/۰۰۱	۱۴۶/۱۶۵	۱	۱۵۷۰/۰۵۷	پیش آزمون
۰/۰۰۱	۶۳/۱۰۷	۱	۶۷۷/۸۷۴	گروه
		۵۷	۶۱۲/۲۷۶	خطا
		۵۹	۲۶۵۲/۷۳۳	کل

با توجه به نتایج جدول ۴، مقدار F محاسبه شده برای نمرات پس آزمون قند خون ناشتا بیماران دیابتی در دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون معنا داراست ($P < 0.01$)، $F = 63/107 = 1.57$. درنتیجه، میانگین نمرات پس آزمون

قند خون ناشتای بیماران دیابتی در گروه آزمایش با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنا داری با گروه کنترل دارد.

مقایسه میانگین های تعديل شده دو گروه نشان می دهد که میانگین قند خون ناشتای بیماران دیابتی در گروه آزمایش ($M=105/05$) پایین تر از گروه کنترل ($M=111/82$) است. بنابراین، آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس در بیماران دیابتی گروه آزمایش که این برنامه را دریافت کرده اند در مقایسه با بیماران گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکرده اند، مؤثر بوده است؛ به طوری که از میزان قند خون ناشتای در بیماران دیابتی گروه آزمایش کاسته است. پس، آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس موجب کاهش قند خون ناشتای در بیماران دیابتی می شود.

جدول ۵: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات قند خون دو ساعت پس از جذب در دو گروه آزمایش و کنترل

متابع تغییر	مجموع مجلدات	درجه آزادی	F آماره	معنا داری
پیش آزمون	۱۳۱۹۳/۳۷۹	۱	۳۰۹/۹۵۷	۰/۰۰۱
گروه	۸۵۳۲/۱۷۷	۱	۲۰۰/۴۵۱	۰/۰۰۱
خطا	۲۴۲۶/۲۰۵	۵۷		
کل	۲۸۷۶۱/۹۳۳	۵۹		

با توجه به نتایج جدول ۵، مقدار F محاسبه شده برای نمرات پس آزمون قند خون دو ساعت پس از جذب در بیماران دیابتی دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون معنا دار است ($F(1,57) = 200/45 < 0.01$). درنتیجه میانگین نمرات پس آزمون قند خون دو ساعت پس از جذب در بیماران دیابتی گروه آزمایش با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنا داری با گروه کنترل دارد.

مقایسه میانگین های تعدیل شده دو گروه نشان می‌دهد که میانگین قند خون دو ساعت پس از جذب در بیماران دیابتی گروه آزمایش ($M=132/25$) پایین تر از بیماران گروه کترل ($M=156/48$) است. بنابراین، آموزش مهارت کترل خشم و مدیریت استرس در بیماران دیابتی گروه آزمایش که این برنامه را دریافت کرده اند در مقایسه با بیماران گروه کترل که این برنامه را دریافت نکرده اند، مؤثر بوده است. به طوری که از میزان قند خون دو ساعت پس از جذب در بیماران دیابتی گروه آزمایش کاسته است. بنابراین، آموزش مهارت کترل خشم و مدیریت استرس موجب کاهش قند خون دو ساعت پس از جذب در بیماران دیابتی می‌شود.

جدول ۶: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات سطوح هموگلوبین (گلیکوزیله) خون در دو گروه آزمایش و کترل

منابع داری	آماره F	میانگین مجددرات	درجه آزادی	مجموع مجددرات	منابع تغییر
.۰/۰۰۱	۷۱/۸۲۶	.۰/۰۱۹	۱	.۰/۰۱۹	پیش آزمون
.۰/۰۰۱	۵۸/۳۲۵	.۰/۰۱۶	۱	.۰/۰۱۶	گروه
		.۰/۰۰۱	۵۷	.۰/۰۱۵	خطا
		۵۹		.۰/۰۵۲	کل

با توجه به نتایج جدول ۶، مقدار F محاسبه شده برای نمرات پس آزمون سطوح هموگلوبین (گلیکوزیله) خون بیماران دیابتی در دو گروه آزمایش و کترل بعد از ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون معنا دار است ($F = 1.57, P = 58/328 < 0.01$). در نتیجه میانگین نمرات پس آزمون سطوح هموگلوبین خون بیماران دیابتی در گروه آزمایش با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنا داری با گروه کترل دارد. مقایسه میانگین های تعدیل شده دو گروه نشان می‌دهد که میانگین سطوح هموگلوبین (گلیکوزیله) خون بیماران دیابتی گروه آزمایش ($M=0/103$) پایین تر از میانگین سطوح هموگلوبین بیماران گروه کترل ($M=0/135$)

است. بنابراین، آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس بر بیماران دیابتی گروه آزمایش که این برنامه را دریافت کرده اند در مقایسه با بیماران گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکرده اند، مؤثر بوده است. به طوری که، موجب کاهش سطوح هموگلوبین خون بیماران دیابتی گروه آزمایش شده است. پس، آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس موجب کاهش سطوح هموگلوبین خون بیماران دیابتی می‌شود.

بحث

مهم ترین یافته‌های این تحقیق آن بود که می‌توان بدون استفاده از داروهای شیمیایی که صرف نظر از هزینه‌های مالی برای بیماران دیابتی در بلند مدت باعث عوارضی نیز می‌شوند، قند خون این بیماران را کنترل کرد و حتی در مواردی نیز کاهش داد با کنترل دیابت و نیز کاهش گلوکز خون بیماران دیابتی می‌توان از عوارض بلندمدت دیابت مثل زخم‌های دیابتی، کوری و آسیب دیدن سیستم عصبی جلوگیری کرد (ابوالحسنی و همکاران، ۱۳۸۴). افزایش انتقال گلوکز بعد از تمرین آرمیدگی شامل تمرین افزایش بیان پروتئین GIUTU (بانکس و همکاران، ۱۹۹۲؛ شرمن و همکاران، ۱۹۹۳) و افزایش تغییر مکان GLUTU (بروزینیک و همکاران، ۱۹۹۳) و همچنین بیشتر در معرض قرار گرفتن این پروتئین انتقالی در سطح سلول (آلگن و همکاران، ۱۹۹۷). هم چنان ایجاد سازگاری در آنزیم‌های درگیر در فسفوریلاسیون و اکسیداسیون گلوکز نیز دیده می‌شود (ایولی و همکاران، ۱۹۹۹؛ شرمن و همکاران، ۱۹۹۳).

شیوع بیماری دیابت را به دلیل وجود برخی مشکلات نمی‌توان به سادگی تخمین زد. علاوه بر آن برای تخمین بار جسمانی بیماری دیابت محدودیت‌هایی وجود دارد که تخمین گستره سنی بیماری دیابت و تخمین بیماری را از آن جمله است (ابوالحسنی و همکاران، ۱۳۸۴). سابقه خانوادگی دیابت طبق مطالعات اپیدمیولوژیک متعدد از جمله در

آسیا سابقه خانوادگی مثبت یکی از عوامل شناخته شده بروز دیابت است، طوری که حتی یک والد دیابتی استعداد بروز دیابت را در فرزندان تا حد پنج برابر افزایش می‌دهد (مجله دیابت و لیپید ایران، ۱۳۸۶). آموزش نقش مؤثری در خانواده دارد به حدی که می‌توان با آموزش از مبتلا شدن تعداد بیشتری اعضای خانواده به بیماری دیابت جلوگیری کرد. مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس و نیز کنترل متابولیک، دو شاخص مهم در درمان دیابت محسوب می‌شوند (نجاتی صفا و لاریجانی، ۱۳۸۶).

بر اساس نتایج مطالعات مربوط به عوارض و کنترل دیابت، به وضوح ثابت شده است که کنترل متابولیک مناسب و آموزش کافی، پیامد بالینی افراد دیابتی را بهبود می‌بخشد. آموزش بیمار عامل اساسی و مهمی در کنترل دیابت محسوب می‌شود (رخشنده رو و غفاری، ۱۳۸۸).

روز و همکاران (۲۰۰۲)، مدلی را برای تعیین نقش عوامل مختلف روانی اجتماعی در کنترل بیماری دیابت ارائه داده اند بر اساس این مدل، کنترل متابولیک و آموزش در جهت روان شناختی و بهبود کیفیت زندگی دو فاکتور مهم تلقی شدند.

برای تعیین تأییر برنامه‌های آموزشی بر کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی مطالعات متعددی انجام شده است که از آن میان می‌توان به مطالعه‌ای اشاره کرد که در آن، کارایی مداخله پرستاری کنترل شده با تأکید بر آموزش و مشاوره برای ارتقای کنترل متابولیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بررسی شد. نتایج این تحقیق، کاهش معنی داری را در HbAIC گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. (غفاری و همکاران، ۱۳۸۶).

در پایان، طبق نتایج پژوهشی حاضر می‌توان گفت که آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی با برنامه‌های آموزشی منسجم تا حد زیادی ارتقا می‌یابد و این امر به نوبه خود باعث بهبود کنترل متابولیک آن‌ها می‌شود. با ایجاد چنین تغییراتی در نگرش و عملکرد بیماران دیابتی می‌توان نتایج بالینی خوبی را برای آن‌ها انتظار داشت.

در کل، می توان موارد پیشنهاد کرد که: بالا بردن سطح آگاهی افراد درباره بیماری دیابت و درک آن خیلی مهم است. اگر شخص دیابتی از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت بیماری اش آگاه باشد و آموزش های ضروری مانند مهارت کنترل خشم، مدیریت استرس، رعایت بهداشت و همچنین اصول تغذیه مناسب را فرا گیرد، برای کنترل متابولیکی دیابت گام مؤثری برداشته است و می تواند بیماری دیابت را کنترل کند و از عوارض بلند مدت و کوتاه مدت بیماری مثل (زخم های دیابتی، کوری...) تا حد زیادی بکاهد؛ هم چنین به جنبه های غیر درمانی دیابت (ترزیق انسولین یا قرص) نیز توجه شود، چون تنها با درمان پژوهشی نمی توان این بیماری را کنترل کرد.

Archive of SID

منابع

- آقا ملایی، تیمور؛ سبحانی، علی رضا؛ یوسفی، هادی و فریبا اسدی نوچاپی. (۱۳۸۲). شیوع دیابت. **مجله پزشکی هرمزگان**، شماره ۳: ۱۱۱-۱۱۵.
- ابوالحسنی، فرید؛ مهاجرانی تهرانی، محمد رضا؛ طباطبایی ملاذی، عذررا و باقر لاریجانی. (۱۳۸۴). بار دیابت و عوارض آن براساس مطالعات دهه‌های اخیر در ایران. **محله دیابت و لیپید ایران**، دوره ۵: ۴۸-۳۵.
- پلنلت، ج. (?). **SPSS** (مترجم، علی رضا کاکاوند، ۱۳۸۹). کرج: انتشارات سرافراز.
- رششنده پور، سکینه؛ غفاری، محشیم؛ حیدری، علیرضا و اسدالله رجب. (۱۳۸۸). اثر بخشی مداخله رخشندۀ پور، سکینه؛ غفاری، محشیم؛ حیدری، علیرضا و اسدالله رجب. (۱۳۸۸). اثر بخشی مداخله آموزش بر کنترل متابولیک بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران. **محله دیابت و لیپید ایران**، دوره ۵: ۶۳-۵۷.
- زرگری علی. (۱۳۸۶). **گیاهان دارویی**. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- شریفی، حسن پاشا و نسترن. (۱۳۸۷). **روش‌های تحقیق در علوم رفتاری**. تهران: انتشارات سخن.
- عزیزی، فریدون و لیدا نوائی. (۱۳۸۰). بررسی شیوع دیابت و عدم تحمل گلوکز در روستاهای استان تهران. **محله پزشکی حکیم**، دوره ۹۹: ۴.
- لاریجانی، باقر و فرزانه زاهدی. (۱۳۸۷) همه گیر شناسی دیابت در ایران. **دیابت و لیپید ایران**، دوره ۱ شماره ۸: ۱-۸.
- موتابی، فرشته و لادن فتحی. (۱۳۸۵). **آموزش مهارت‌های زندگی**. تهران: انتشارات دانشه.
- نجاتی صفا، علی اکبر؛ لاریجانی، باقر؛ شریعتی، بهنام؛ امینی، همایون و عادله رضا قلی زاده. (۱۳۸۶).
- افسردگی، کیفیت زندگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت. **محله دیابت و لیپید ایران**، دوره ۱۹۲-۵: ۵-۱۹۲.
- Amos, A.C., carIy, D.J.,& Zimmer, p.o.(1997). The risiny YlobaL burden of diabetes and its Complica tions: estimates and projection to the years 2010. **Diabetes med**, 14:81-5.
- Astle, F. (2007). Diabetes and Depression:A review of the literature. **Nurs Clin N Am**, 42:67.
- Azizi, f. (1996) Diabetes meLIitus in the isalamic RepubLic of Iran. **IDf BuLL**, 41:38-9.

- Choup, L. (1994). A population survey on the prevalence of diabetes in kin Hu, kinmen. *Diabetes Care*, 17: 1655-580.
- Clark, D.A., & Beck, A. T. (1999). *Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression*. New York: Wileg.
- Cohen, S.T., Welch, G., Jacobson, A.M., De Groot, M.,& Samson, J. (1997). The association of lifeline psychiatric illness and increased relinopathy in patients with type I diabetes mellitus. *Psychosomatics*, 38: 98-108.
- Cost, A., & Goncalves, T. (2003). Prevalence of diabetes mellitus and impaired ylucose tolerance in the urban population ayed 6-30, yeas in Riberao preto (saopaulo), Brasil. *Saopaulo Medical Journal* , 121(6): 224-230.
- DDCT Research Group.(1996). Influence of intensive diabetes treatment on quality-of life outcomes in the diabetes control and complications trial. *Diabetes Care*, 19: 195-203.
- Eren, I., & Erdid, O. (2003). Relationship between blood glucose control and psychiative disorder in typ II diabetic pations. *Turkish Journal of Psychiatry*, 14:184-191.
- Esteyhamati, A .,Gouya, M.M., Abbasi, M., Deluvari, A., Alikhani, S.,& Alabini,F. (2008). prevalence of diabetes mellitus and impaired fasting ylucose in the adult poplation of iran:the national surveg of risk factors for non communi cable diseases of Iran.*Diabetes Care*,31(1)96-98.
- Henry, J.B. (1996). *Clinical Diaynosis and manayement by Iaboratory methodsny*.Hospital discharge ratas for nontraumatic Lower extremity amputatiox by diabetes status,un.,treer states 1997.
- Hsuwc, chiu., YH, chiu., Hc, Liou., HH, jen yyc.,& chen, T.H.(2005).Two-stage community-based screening modeL For estimating preualence of diabetic poiyneuropathy . *Neuroepidemaoloyy*:25.
- KaPIan,A.L.,& Pesce, A. J., KazmiercZc, S.C .(2003). *Clinical chemistry*. London publisher Andrew ALIen. Stillman RM Diabetic ulcers.
- A Available in Site last updataL: march 22,2005.
- Thomas,L. (1998). *Clinical Iaboratory Diaynostics*. UK&USA.
- World Bank, World development report .(1993). *investing in health*. Oxford university press.
- Geringer, E.S., Perlmuter, L.C., Stern, T.A.,&Nathan, D.M. (1988). Depression and diabetic neuropathology: A complex relationship. *J Geriar psgchiatry Neural*, 1: 11-15.
- Gourdy, P. (2001). Prevalence of type ll diabetes and impaired fasting glucose in the middle aged. *Diabetes Metabolism*, 347-358.
- Gupta, A.,& Gupta, R. (2003). Prevalence of diabetes impaired fasting ylucose and insulin resistance syndrome in an urban Indian population. *Diabetes research and clinical practice*, 61: 69-760.
- Hazauehei, M.M., Khani Jyhouni, A., Hasanzade, A., & Rashidi, M. (2008). Thee ffect of educational program on diabetic (ThpeII) eyes care in kazemi,s clinic, (shiraz). *Iranian Journal of Endocrinology& Metubolism*, 10(2):145-154.

Hermanw, H.,& kennedy, L. (2005). Underdiagnosis of peripheral neuropathy in Type ll diabetes. *Diabetes Care*, 28:148-150.

Hrris, M., Fegal, K.M. (1998). Prevalence of diabetes, impaired fastingal KM, cowiecc. prevalence of diabetes, impaired fasting ylucose and impaired glucose in to lerance in us adults. *Diabetes Care*, 21(4):518-524.

Archive of SID