

بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت (*Eriobotrya japonica* L.) میوه ازگیل ژاپنی

* مریم السادات محمدی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باگبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

سید عبدالحسین محمدی

عضو هیأت علمی گروه علوم باگبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

عبدالحسین ابوطالبی

عضو هیأت علمی گروه علوم باگبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

ازگیل ژاپنی (*Eriobotrya japonica*) از درختان میوه‌ی همیشه سبز مناطق نیمه گرمسیری است که علیرغم داشتن منابع غنی آنتی اکسیدانی، املاح و ویتامین‌های فراوان، به دلیل وجود بذرهاي زیاد و کوچک بودن اندازه میوه، تقاضا برای استفاده از آن کاهش یافته است. به منظور افزایش کیفیت و کمیت این میوه‌ها، با استفاده از جیبرالیک اسید (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) پس از مرحله تشکیل میوه به صورت محلول پاشی روی درخت و همچنین تکنیک‌های باگبانی شامل حلقه زنی، سربداری و تیمارهای ترکیبی، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی در شهرستان جهرم در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. میوه‌ها در ابتدای مرحله‌ی رسیدگی، برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه، نسبت به اندازه‌گیری وزن تک میوه، وزن بذر، وزن گوشت، میزان مواد جامد محلول، ویتامین ث، pH، اسید کل و نسبت قند به اسید اقدام گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تیمارهای حلقه زنی و سربداری شاخه بر تمامی صفات به جز نسبت وزن گوشت به هسته تأثیر معنی دار در سطح یک درصد داشتند. کاربرد جیبرالیک اسید در سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بر تمام صفات مورد بررسی تأثیر معنی دار در سطح یک درصد نشان داد. به طور کلی براساس نتایج جیبرالیک اسید به غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر پس از مرحله تشکیل میوه بهترین نتیجه در افزایش کمی و کیفی میوه ازگیل به همراه داشت.

کلمات کلیدی: ازگیل ژاپنی، حلقه زنی، سربداری، میوه گذاری

مقدمه

با توجه به شیوع بیماریهای مختلف در دنیا بخصوص انواع سرطان‌ها، نقش آنتی اکسیدان‌های طبیعی که در جلوگیری از ابتلا به بیماری و یا کنترل بیماریها دخیل می‌باشند در بهداشت و سلامت جامعه بشری بر کسی پوشیده نیست. وجود مواد طبیعی آنتی اکسیدان‌های طبیعی مانند رنگدانه‌های کارتنوئیدی و آنتوسیانین‌ها در میوه‌ها و سبزی‌ها این فرصت را به جامعه بشری داده است که با تغییراتی در نوع تغذیه خود و جایگزین کردن این مواد طبیعی در جیوه غذایی خود به سلامت خود اهمیت دهنده. از گیل از جمله میوه‌هایی است که در موقع رسیدن میزان بالایی از مواد کارتنوئیدی دارد. وجود آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم و همچنین مقدار زیادی ویتامین A این میوه را ارزشمند می‌سازد. این میوه فرازگرا و عمر کوتاهی پس از برداشت دارد به خصوص زمانیکه بدون دم از درخت چیده شود. از گیل ژاپنی حدود یک هفته در دمای معمولی دوام داشته و مدت نگهداری آن به طور کلی کوتاه مدت است (Sheikhi, 2005). یکی از معایب این میوه کوچک بودن اندازه و داشتن ۱ تا ۶ عدد بذر درشت می‌باشد که نسبت گوشت به بذر را کاهش می‌دهد و هرچه تعداد بذر در میوه کمتر باشد اندازه بذر بزرگتر است. در این رابطه عنوان شده است که مقدار گوشت ۳۰ عدد میوه از گیل با اندازه متوسط با میزان گوشت یک هلوی ۷۰ گرمی برابری نماید (Sheikhi, 2005). استفاده از تکنیک‌هایی که بتواند میزان گوشت میوه را افزایش داده و بذرهای درون میوه را کوچک و کمیت میوه را افزایش دهد، می‌تواند تقاضای استفاده از این میوه ارزشمند را بالا برده و با افزایش زمان ماندگاری میوه، مدت دوره طولانی‌تری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و در نهایت به نحوی در سلامت جامعه بشری نقش‌آفرین باشد. حلقه برداری شامل برداشتن نوار باریکی از پوست بعضی از اندام‌های درخت است که در بسیاری از درختان میوه مانند مرکبات، هلو، زیتون، انگور و میوه‌های دیگر انجام می‌شود که ممکن است از تن، بازو و شاخه میوه ده برداشته شود (Ahmedullah & Himclrick, 1990; Badr *et al.*, 2005; Christodoulou *et al.*, 1968). در اکثر ارقام معمولاً حلقه‌برداری روی تن و یا شاخه‌های میوه ده انجام می‌گیرد. اثر حلقه‌برداری بر روی تن، تمام قسمت‌های درخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما اگر حلقه‌برداری بر روی بازو صورت گیرد فقط همان بازوی حلقه‌برداری شده تحت تأثیر قرار می‌گیرد (Tafazoli,*et al.*, 1991; Weaver, 1976; Winkler, 1975). اثر آنی حلقه‌برداری این است که مانع جریان شیره‌ی پرورده از بالا به پایین شده و این مواد در بالای محل زخم انشسته می‌شوند. در اثر این فرآیند قند، نشاسته و هورمون‌های گیاهی بیشتری به

قسمت‌های بالای زخم می‌رسد (Ahmedullah & Himelrick, 1990; Tafazoli,*et al.*, 1991; Winkler, 1975). گزارش شده است که حلقه‌برداری شاخه‌های میوه‌دار در آغاز گلدهی افزایش وزن خوش و تعداد حبه و محصول را در پی داشته است (Kondrja, *et al.*, 1970). برخی پژوهش‌ها انجام حلقه‌برداری همراه با تنک و محلول پاشی با اسید جیبرلیک را مؤثرترین تیمار در ازدیاد وزن، طول و عرض حبه و خوش و رنگ و فرم یکنواخت‌تر میوه را گزارش کرده‌اند (Costacurta & Catalano, 1988; Danlta, 1982; Hajwa, *et al.*, 1977).

گزارش شده است که حلقه‌برداری روی حبه‌ساقمه‌ای نیز تأثیر نداشته، به ویژه همراه با محلول‌پاشی با جیبرالین باعث کاهش تعداد و افزایش حجم حبه‌های سبز رشد نکرده می‌شود. این موضوع در ارقام مختلف گلابی شامل پلت، موسکات و بنگالوریلو گزارش شده است (Hajwa, *et al.*, 1977; Khajuria & Bakhshi, 1988; Padmanabhaiah, *et al.*, 1977; Sharma & Jindal, 1983). در پژوهشی، دو رقم انگور تامپسون و روبي در مرحله تمام گل و مرحله تشکیل حبه حلقه‌برداری شدند که طی آن وزن رقم تامپسون افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد نشان داد (Hunter, *et al.*, 1991). حلقه‌برداری ارقام انگور کاردینال و روبي در مرحله تمام گل و آغاز رسیدن حبه‌ها باعث تسريع در رسیدن و بهبود اندازه حبه و خوش گردید، افزایش وزن خوش در رقم کاردینال ۹ تا ۲۱ درصد و در رقم روبي ۱۲ تا ۲۹ درصد بود (Reddy & Parkash, Roberto, *et al.*, 2004). در سال (1981) اثرات حلقه‌برداری، محلول‌پاشی با اتفان و ترکیب آنها را بر روی بوته‌های شش ساله رقم گلابی و انگور در مراحل مختلف رشد و نمو ارزیابی کردند و پی بردن که دو بار حلقه‌برداری، یا با محلول‌پاشی یا بدون محلول-پاشی با اتفان، یکی در دو هفته قبل از تشکیل میوه و دیگری در مرحله تغییر رنگ حبه موجب ایجاد بالاترین کیفیت، کمترین تعداد شات بری و تسريع بلوغ بمدت ۱۰ روز می‌گردد. در پژوهشی Hassanzadeh khankahdani, (2011) گزارش نمودند که هرس و حلقه‌برداری قادر است سال‌آوری را در نارنگی سیاهو بهبود بخشد.

امروزه توجه باعذاران شهرستان جهرم به کاشت ازگیل جلب شده است. از آنجائی که بازارپسندی میوه تولیدی درختان ازگیل در این شهرستان پایین است، هدف از این پژوهش بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کمیت و کیفیت میوه ازگیل ژاپنی بوده است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال ۱۳۹۱-۹۲ در سه منطقه از شهرستان جهرم با طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۳۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه و ۱۰۵۰ متر ارتفاع از سطح دریا

انجام گرفت. به منظور دقت هر چه بیشتر و به حداقل رسانیدن خطأ، درختانی که از نظر سن، قدرت رشد و اندازه یکنواخت بودند انتخاب گردیدند و پس از اعمال تیمارهای مورد نیاز علامت‌گذاری شدند. در هریک از محلهای آزمایش ۶ درخت از گیل ۵۰ ساله انتخاب و با انتخاب شاخه‌های گل‌دهنده در جهات مختلف هر یک از درختان، پس از عمل گردنه‌افشانی طبیعی، اعمال تیمارها صورت گرفت. تیمارها شامل محلول‌پاشی جیبرالین با سه غلظت صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر، حلقه زنی (برداشتن حلقه‌ای از پوست در ابتدای شاخه مرد نظر به قطر تقریبی نیم سانتی‌متر) به تنها یکی در ابتدای شاخه‌های گل‌دهنده، قطع سرشاخه‌های گل‌دهنده به تنها یکی، تیمار ترکیبی محلول‌پاشی جیبرالین با غلظت ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر به همراه حلقه‌زنی، تیمار ترکیبی محلول پاشی جیبرالین با غلظت ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر به همراه حلقه‌زنی و قطع سرشاخه‌های جوان بودند. برای مقایسه دو شاهد نیز در نظر گرفته شد که یکی شاخه تیمار نشده روی درختان تیمار شده و دیگر شاخه درختانی بود که هیچ تیماری روی آنها صورت نگرفته بود. پس از اعمال تیمارهای مذکور و در مرحله قبل از رسیدگی میوه نسبت به برداشت میوه‌ها به نحو صحیح اقدام و پس از انتقال به آزمایشگاه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، کل مواد جامد محلول بوسیله قندستنج دستی، ویتامین ث و اسید کل بروش تیتراسیون، پیاج آب میوه بوسیله پی آچ متر و وزن میوه، وزن گوشت، وزن بذر بوسیله ترازوی دیجیتال به دقت یک هزارم اندازه‌گیری شد و نسبت گوشت به بذر و قند به اسید محاسبه گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی و همه تیمارها در سه تکرار و هر تکرار شامل چهار شاخه گل‌دهنده در جهات مختلف درخت بود. در پایان آزمایش، اطلاعات بدست آمده توسط نرم‌افزار رایانه‌ای MSTAT-C تجزیه و تحلیل شد و میانگین‌ها بوسیله آزمون دانکن در سطح یک درصد مقایسه شدند.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها در رابطه با صفات مورد بررسی نشان داد که استفاده از تکنیک‌های باغبانی تیمار شاخه (حلقه زنی، سربرداری، حلقة زنی + سربرداری) تأثیر معنی داری را بر کلیه صفات به جز نسبت وزن گوشت به هسته دارد (جدول ۱ و ۲). نتایج این آزمایش با گزارش Barut & Eris در سال (1994) حاصل از بررسی اثرات حلقه برداری، تنک و استفاده از تنظیم کننده‌های رشد بر عملکرد، کیفیت و سال آوری گیاه زیتون مطابقت دارد. همچنین غلظت‌های مختلف تنظیم کننده رشد جیبرالیک اسید توانست اثرات معنی‌داری بر صفات وزن

تک میوه و وزن گوشت میوه در سطح یک درصد آزمون دان肯 نشان دهد (جدول ۳) که از نتایج مثبت این پژوهش بود. با توجه به اینکه جیبرالین‌ها نقش مؤثری در بزرگ شدن سلول و سنتز پروتئین دارند. این هورمون در بذر داخل میوه تولید شده و محلول پاشی آن باعث بالا رفتن کمیت و کیفیت میوه‌های مختلف شده است. نتایج حاصله با نتایج El-Nabawy و همکاران (1977) در رابطه با اثر اسید جیبرالیک روی خرمای رقم سامانی در افزایش اندازه میوه مطابقت دارد.

نتایج حاصله از تجزیه واریانس اثر متقابل تیمار شاخه و غلظت‌های جیبرالیک اسید بر کلیه صفات مورد بررسی تأثیر معنی‌داری در سطح یک درصد آزمون دان肯 نشان داد (جدول ۱).

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار شاخه و غلظت جیبرالیک اسید بر صفات وزن تک میوه و وزن گوشت میوه نشان داد که کلیه تیمارهای شاخه به تنها یی و یا به صورت ترکیبی و همچنین محلول‌پاشی جیبرالیک اسید توانستند وزن تک میوه و وزن گوشت میوه را نسبت به شاهد افزایش دهند (جدول ۴). این نتایج این با نتایج Hajwa و همکاران (1977) مطابقت دارد. کاهش وزن هسته مربوط به تیمارهای شاخه به تنها یی و یا بصورت ترکیبی بدون استفاده از تیمار شیمیایی نسبت به شاهد بدست آمد. کمترین مقدار وزن هسته مربوط به تیمار قطع سرشاخه به میزان ۲/۴۱ گرم بود (جدول ۴) که از نتایج مثبت این پژوهش تلقی میگردد و میتوان در پژوهش‌های بعدی مد نظر قرار گیرد. وجود هورمون جیبرالیک اسید می‌تواند باعث بزرگ شدن بذر و میوه گردد. از محل‌های تولید این هورمون برگ‌های جوان و نقاط مریستمی و همچنین بذرها می‌باشد. قطع سرشاخه‌ها میزان جیبرالین مورد نیاز بزرگ شدن هسته و تولید مجدد آن از بذر را کاهش داده و این امر باعث کاهش وزن هسته در تیمار سرباری گردیده است.

نتایج تجزیه واریانس مربوط به مقایسه اثر تیمارهای حاصل از اثر متقابل تیمار شاخه و غلظت جیبرالیک اسید بر صفت تعداد بذر نشان داد که بیشترین تعداد بذر در میوه با استفاده از تنظیم کننده رشد گیاهی جیبرالیک اسید بدست آمد. همچنین بیشترین مقدار وزن هسته نیز با تیمارهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر این تنظیم کننده رشد حاصل گردید (جدول ۴). این نتایج با نتایج اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی مطابقت دارد (Mohammadi Jahromi, et al., 2008).

کمترین تعداد بذر در میوه مربوط به تیمار قطع سر شاخه بدست آمد (جدول ۴). با توجه به اینکه تعداد بذر و وزن آنها می‌تواند باعث کاهش کیفیت در برخی از میوه‌ها و سبزی‌ها باشد، کاهش تعداد بذر حاصل از تیمار قطع سرشاخه می‌تواند در روند ادامه این پژوهش مدنظر قرار گیرد.

اثر متقابل تیمار شاخه و غلظت جیبرالیک اسید بر میزان صفات pH، TSS، اسید کل، نسبت قند به اسید و ویتامین ث آب میوه متفاوت بود و تیمارهای مختلف نسبت به شاهد افزایش و یا کاهش نشان دادند (جدول ۵). اثرات محیطی و تعذیه، میزان محصول و آبیاری و محلول‌پاشی با تنظیم کننده رشد می‌تواند در این صفات موجب تغییرات گردد. نسبت مواد جامد محلول در ارتفاعات پایین مناطق گرمسیری، به سرعت افزایش می‌یابد، در صورتی که در مناطق سرد و ساحلی خیلی کند، افزایش می‌یابد. مقدار اسید در نقاط کم ارتفاع گرمسیری به سرعت کاهش می‌یابد به همین دلیل آب میوه در این مناطق به علت فقدان اسیدیته بی‌مزه است. کاهش اسیدیته به میزان دما و تبخیر بستگی دارد. قند یکی از ترکیبات مهم تعیین کننده‌ی کیفیت میوه است. محتوای قندی میوه تحت شرایط محیطی، نور و رطوبت خاک قابل تغییر است. از طرفی دیگر ترکیبات قندی در میوه به وسیله درجه باردهی درخت قابل تغییر است (Khosh-khui, 2012).

منابع

- Ahmedullah, M., and Himelrick, D. C., (1990). Small fruit crop Management. CRC Press: 383 -410.
- Badr, N. S. A., Tufenkjian, J., and Ramming D. W., (2005). Effects of Pruning, Girdling and Gibberellic Acid application at bloom and berry set on yield and fruit quality of Sweet scarlet table grape cultivar. American Society of Enology and Viticulture Annual Meeting Abstracts: 47.
- Barut, E., and Eris, A., (1994). Research on the effects of girdling, thinning and plant growth regulators on yield, quality and alternate bearing in olive cv. Gemlik. Doga Turk Tarum ve Ormancilik Dergisi, 17: 953-970.
- Christodoulou, A. J., Weaver, R. J., and Pool, R. M., (1968). Relation of gibberellin treatment to fruit set, berry Development and cluster compactness in *Vitis vinifera* grapes. J. Amer. Soc. Hort. Sei, 92:301-310.

- Costacurta, A., and Catalano, V., (1988). Reaults of the use of Commercial qualities of th very early table grape trybrid Conegliano .Rivistiadi Viticul-tava e di Enologia, 41: 149- 157.
- Danlta, B. S., (1982). Effect of GA, pinching and ringing on The improvement of banch. berry size and quality on Delight Cultivar of grape (*Vitis vinifera*). prog. Hort, 14: 141-143.
- El- Nabawy S. M., El-Hammady, A. M., Marei, N. S., and Bondok, A.Z., (1977). Effects of some growth regulator on growth and development of Samani date fruits. Research Bulletin, Factually of Agriculture of Ain Shams University, 7: 29- 23.
- Hajwa, M. S., Deol, S. S.,and Kumar, H., (1977). Effect of girdling berry thinning and gibberellic acid on bunch and berry size, number of berries per bunch and quality of "Thompson Seedless" grape. In Viticul, in Tropies, HIS Bangalore: 250-288.
- Hassanzadeh khankahdani, H., Bahrami, H., and Hosseini, E., (2011). Check possible of reducing alternate bearing by pruning and girdling on Siaho tangering. National Conference on Agriculture Management, 26-27 May 2011, Jahrom Islamic Azad University: 368.
- Hunter, J. J., Villers, O. T., and Watts, J. E., (1991). The effect of partial de-foliation on quality characteristics of *Vitis vinifera* cv. Cabernet Sauvignon grapes. Vitie, 1: 42-50.
- Khajuria, H. N., and Bakhshi, J. C., (1988). Effect of different Growth regulat-ing compounds and girdling on shoot berry Formation in perlette (*Vitis vi-nifera*)grapes. Indian J. Agric. Res, 22: 150-154.
- Kondrja, S. M., Friza, F. A., and Zekov, E. A., (1970). Girdling the shoots of table grape varieties, Vinodelie Ivinogradar sivo, 30: 40- 42 .
- Mohammadi Jahromi, S. A. H., Abutalebi, A. H., Hassanzadeh, H., and Mo-hammadi, M., (2008), Effect of Plant Growth Regulators on Qualitative and Quantitative Traits of Shahani Date. Research in Agricultural Science, 4: 204-212.
- Padmanabhaiah, D. R., and Madhava, Rao, V. N., (1977). Effect of ringing and ethrel(2-chiro ethylphosphonic acid)on ripening and quality of grapes. In Viticulture in Tropics. HIS. Banglore: 263-269 .
- Reddy, B. M . C., and Parkash, G. S., (1981). Effect of girdling And ethrel treatment on berry weight, colour and quality of Gulabi grape. Indian J. Horticulture, 46: 19-22.

- Roberto, S. R., Yamashita, F., Kanai, H. T., Yano, M. Y., Macente, E. S., and Genta, W., (2004). Cluster maturation of 'Rubi' table grape girdled at different periods. *Revista Brasileria de Fruitculture*, 26: 180-182.
- Sharma, S., and Jindal, P. C., (1983). Effect of girdling and Ethepron application on quality improvement in grapes cv. Early Muscat. *Agric. Sci. Digest*, 3: 13-15.
- Sheikhi, A., (2005). Agriculture of Tropical and Subtropical Plant , Samenol-hoja: 511.
- Tafazoli , E ., Hekmati, and J., Firoozeh , P., (1991). Grapes, Shiraz University: 323.
- Weaver, R. J., (1976). Grape Growing. A Wiley-Interseience Pub. London: 371.
- Winkler, A. J., (1975). Genera viticulture University of Colifornia Press. BerKeley, Los Angeles, London: 633.

جدول ۱: جدول تجزیه واریانس مربوط به صفات بررسی شده

Table 1: Variance analysis of the characteristics studied

S.O.V	D.F	mean of square				
		single fruit weight	Pulp weight	weight of seed	weight of pulp/seed	Number of seed
Replication (R)	8	2.8 ^{ns}	1.4 ^{ns}	1.06 ^{ns}	1.712 ^{ns}	1.00 ^{ns}
Treatment of tree branches (A)	3	139.2 ^{**}	81.3 ^{**}	6.34 ^{**}	0.685 ^{ns}	16.11 ^{**}
concentration of gibberellic acid (B)	2	675.1 ^{**}	382.3 ^{**}	41.80 ^{**}	3.215 ^{ns}	5.95 ^{**}
Interaction of A×B	6	96.2 ^{**}	54.6 ^{**}	8.50 ^{**}	5.862 ^{**}	11.72 ^{**}
Error	88	5.6	4.0	1.07	1.205	0.92
C.V	-	11.6	12.6	24.8	26.7	30.07

ns غیرمعنی دار، * معنی دار در سطح ۰.۵٪، ** معنی دار در سطح ۰.۱٪

^{ns}, * and ** are non- significant and significant at 0.05 and 0.01 of probability level respectively.

جدول ۲: جدول تجزیه واریانس مربوط به صفات بررسی شده

Table 2: Variance analysis of the characteristics studied

S.O.V	D.F	mean of square				
		pH	TSS	TA	TSS/TA	Vitamin C
Replication (R)	8	0.008 ^{ns}	1.39 ^{ns}	0.0004 ^{ns}	2.6 ^{ns}	3.7 ^{ns}
Treatment of tree branches (A)	3	0.056 [*]	24.15 ^{**}	0.0640 ^{**}	60.0 ^{**}	92.6 ^{**}
concentration of gibberellic acid (B)	2	0.017 ^{ns}	8.22 ^{**}	0.0320 ^{**}	4.4 ^{ns}	94.5 ^{**}
Interaction of A×B	6	0.218 ^{**}	15.61 ^{**}	0.0860 ^{**}	100.4 ^{**}	478.9 ^{**}
Error	88	0.016	1.58	0.0030	3.0	12.3
C.V	-	3.3	12.2	17.8	20.6	15.9

ns غیرمعنی دار، * معنی دار در سطح ۰.۵٪، ** معنی دار در سطح ۰.۱٪

^{ns}, * and ** are non- significant and significant at 0.05 and 0.01 of probability level respectively.

جدول ۳: مقایسه اثر تیمارهای مختلف شاخه بر صفات مورد بررسی

Table 3: Comparison of different treatments on the characteristics of the branch.

Treatment of tree branches trait	control	girdling	Heading Back	girdling + Heading Back
single fruit weight (g)	23.42a	20.01b	19.32bc	18.16c
Pulp weight (g)	18.05a	16.54b	14.74c	14.27c
weight of seed (g)	4.84a	4.12ab	4.04b	3.86b
weight of pulp/seed (g)	4.00a	4.08a	4.04a	4.35a
Number of seed	4.2a	3.3b	2.7bc	2.4c
pH	3.79ab	3.73b	3.79ab	3.84a
TSS (%)	11.10a	10.84a	8.98b	10.23a
TA (mg)	0.302b	0.356a	0.280c	0.253c
TSS/TA	7.72b	7.92b	7.42b	10.64a
vitamin C	22.34ab	24.40a	20.04b	21.24b

میانگین های موجود در هر ردیف که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح ۰.۱٪ آزمون دانکن اختلاف معنی داری با هم ندارند.

Averages in each row having at least one common letter are not significantly different at the 1% level by Duncan test.

جدول ۴: مقایسه اثر تیمارهای حاصل از اثربارهای غلظت جیبرلیک اسید بر صفات مورد بررسی**Table 4:** Comparison of the interaction of treatment and the concentration of gibberellic acid treatment on the characteristics of the branch

Treatment of tree branches × GA ₃	trait	single fruit weight (g)	Pulp weight (g)	weight of seed (g)	weight of pulp/seed (g)	Number of seed
control	0	14.41g	11.74f	2.60de	4.74ab	2.3c
	50	27.05ab	20.05ab	5.99a	3.52b	5.1a
	100	28.79a	22.36a	5.94a	3.75b	5.0a
girdling	0	17.86cdef	13.55def	4.13bc	3.30b	4.3a
	50	23.95c	19.65b	4.16bc	4.75ab	2.8bc
	100	20.62d	16.42c	4.08bc	4.18ab	2.7bc
Heading Back	0	15.62fg	12.07f	2.41e	5.38a	1.8c
	50	25.36bc	19.32b	5.89a	3.31b	3.9ab
	100	16.98efg	12.83ef	3.83bcd	3.43b	2.3c
girdling + Heading Back	0	14.90fg	11.89f	2.86cde	4.43ab	2.6c
	50	20.46d	15.69cd	4.45b	4.31ab	2.4c
	100	19.12de	15.23cde	3.74bcde	4.32ab	2.2c

میانگین های موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح ۱٪ آزمون دانکن اختلاف معنی داری با هم ندارند.

Averages in each row having at least one common letter are not significantly different at the 1% level by Duncan test.

جدول ۵: مقایسه اثر تیمارهای حاصل از برهمنکش تیمار شاخه و غلظت جیبرلیک اسید بر صفات مورد بررسی**Table 5:** Comparison the interaction of treatment and the concentration of gibberellic acid treatment on the characteristics of the branch

Treatment of tree branches × GA ₃	trait	pH	TSS (%10	TA (mg)	TSS/TA	vitamin C
control	0	3.87ab	9.44cd	0.287cd	6.55efg	18.49efg
	50	3.96a	11.88a	0.347bc	8.04cde	19.07defg
	100	3.54d	11.97a	0.330bc	8.58cde	29.47b
girdling	0	3.61cd	11.04abc	0.369b	6.93defg	35.21a
	50	3.80ab	11.11abc	0.214e	12.11b	14.53g
	100	3.76bc	10.38abcd	0.511a	4.73g	23.44cd
Heading Back	0	3.85ab	8.90de	0.204e	9.63c	15.88fg
	50	3.70bed	10.68abc	0.314bcd	7.13def	22.22ede
	100	3.81ab	7.36e	0.322bcd	5.51fg	22.01ede
girdling + Heading Back	0	3.82ab	9.86bcd	0.250de	9.19ed	20.13def
	50	3.75bc	9.40cd	0.326bc	7.81cdef	25.03c
	100	3.94a	11.43ab	0.183e	14.92a	18.56efg

میانگین های موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح ۱٪ آزمون دانکن اختلاف معنی داری با هم ندارند.

Averages in each row having at least one common letter are not significantly different at the 1% level by Duncan test.

**The effect of physical and chemical treatments on quality
and quantity of Loquat fruit
(*Eriobotrya Japonica* L.)**

M. Mohammadi, S. A. H. Mohammadi, and A. H. Aboutalebi

Abstract

Japanese loquat (*Eriobotrya japonica*) is one of the evergreen fruit trees in tropical and subtropical regions, which despite having a rich source of antioxidant, vitamins and minerals, existence of large seed and small fruit size, have reduced demand for its use. In order to, increase quality and quantity of loquat fruits by using Gibberelic acid (G_A 3) (0, 50 and 100 mg^{L-1}) as well as horticultural techniques such as girdling and topping and their combinative treatments, an experiment was conducted as factorial arrangement based on in randomized complete block design in Jahrom Township in 2012. The fruits were harvested in the early ripening stage and transport to laboratory. The traits of single fruit weight, seed weight, pulp weight, total soluble solid (TSS), vitamin C, pH, total acid (TA) and TSS/TA ratio then were measured. Based on the analysis of variance results, girdling and topping treatments had significant influence ($p<0.01$) on the all traits except pulp/seed ratio. Application of 50 and 100 mg^{L-1} G_A 3 also had significant influence ($p<0.01$) on the evaluated traits. Generally, according to the obtained results application of 50 mg^{L-1} G_A 3 after fruit set stage achieved the best result in enhancement of quality and quantity of fruits.

Keywords: Fruit set, Girdling, Japanese Loquat, Heading Back.