

## بررسی فراوانی انتروسین‌های تولید شده در ایزوله‌های *انتروکوکوس فکالیس* جدا شده از

### فراورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد

الهه برزم<sup>۱</sup>، الهه تاج‌بخش<sup>۲\*</sup>، ابراهیم رحیمی<sup>۳</sup>

۱. دانش آموخته گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

۲. گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

۳. گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

\*نویسنده مسئول: ee\_tajbakhsh@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۵/۳

### چکیده

باکتریوسین‌ها پروتئین‌های تولید شده توسط باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک هستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و برای نگهداری غذا به کار می‌روند. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این باکتری‌ها در جهت بهره‌گیری از آن‌ها به عنوان نگه‌دارنده‌های مواد غذایی معطوف شده است. در این تحقیق تعداد ۱۲۰ نمونه فراورده شیر سنتی مختلف، پس از جداسازی باکتری و تشخیص قطعی در حضور پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن‌های *انتروسین* مورد بررسی قرار گرفتند. ژن مربوط به *انتروسین A* در ۱۴ ایزوله (۳۱/۸۱ درصد)، ژن مربوط به *انتروسین P* در ۱۳ ایزوله (۲۹/۵۴ درصد)، ژن مربوط به *انتروسین As-48* در ۹ ایزوله (۲۰/۴۵ درصد). وجود هم‌زمان چند ژن با همدیگر در ۶ ایزوله (۱۳/۶۳ درصد) مشاهده گردید به طوری که ژن مربوط به *انتروسین‌های A* و *P* در ۲ ایزوله (۴/۵۴٪)، ژن مربوط به *انتروسین‌های A* و *As48* در ۷ ایزوله (۱۵/۰۹ درصد)، ژن مربوط به *انتروسین‌های A*، *P* و *As48* در ۵ ایزوله (۱۱/۳۶ درصد) مشاهده گردید. با توجه به حضور تعداد نسبتاً زیادی از ژن‌های *انتروسین* در ایزوله‌های *انتروکوکوس فکالیس* جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی انجام تحقیقات جهت بررسی خواص ضد میکروبی *انتروسین‌های* تولید شده توسط این باکتری ضروری به نظر می‌رسد.

**واژگان کلیدی:** فراورده‌های شیر سنتی، *انتروکوکوس فکالیس*، *انتروسین*.

### مقدمه

*انتروکوکوس*ها به طور وسیعی در محیط پراکنده می‌باشند. این باکتری‌ها کاربردهای مهمی در صنعت شیر دارند و فراورده‌های شیر خصوصاً در پنیر دارند. *انتروکوکوس فاسیوم* و *انتروکوکوس فکالیس* گونه‌هایی هستند که بیشترین فراوانی را در بین سایر گونه‌ها به خود اختصاص می‌دهند و به طور فراوان در فراورده‌های شیر یافت می‌شوند (ÖzdenThnecer and Tuncer, 2013) وجود *انتروکوکوس*ها در محصولات لبنی، نتیجه شرایط غیر بهداشتی می‌باشد. اما به دلیل تولید باکتریوسین، از رشد باکتری‌های بیماری‌زا ممانعت به

*انتروکوکوس*ها به طور وسیعی در محیط پراکنده می‌باشند. این باکتری‌ها معمولاً در دستگاه گوارش انسان یا حیوانات، در سطح آب، خاک، گیاهان و سبزیجات ساکن می‌باشند (Furlaneto et al., 2014). ارگانیس‌هایی گرم مثبت، کاتالازمنفی، تخم مرغی شکل و غیر هاگ‌زا، بی‌هوازی اختیاری، جور تخمیر با احتیاجات غذایی پیچیده هستند (Ogier and Serror, 2008; Morandi et al., 2006; Girrafa, 2003; Suzziet al., 2000

میکروارگانسیم‌هایی می‌باشد که عمدتاً در روده یافت می‌شود حضور زیاد آن‌ها در مواد غذایی دلیلی بر آلودگی مدفوعی می‌باشد (Murray, 1990; Masud, 1989). جنبه مفید این باکتری نقش پروبیوتیکی آن‌ها می‌باشد و جنبه مضرشان نقش آن‌ها در مسمومیت غذایی می‌باشد. از بین تولیدات شیری، بستنی و پنیر از جمله محصولاتی می‌باشند که به صورت دست‌ساز و سنتی به طور گسترده توسط اقشار مختلف مردم استفاده می‌شوند. تراکم بیش از حد آن‌ها در مواد غذایی بیان‌گر وضعیت نامطلوب بهداشتی می‌باشد (Murray, 1990). هدف از انجام این تحقیق بررسی فراوانی ژن‌های انتروسین *Enterocin P*، *Enterocin A* و *Enterocin AS-48* در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد می‌باشد.

#### مواد و روش کار

در این تحقیق تعداد ۱۲۰ نمونه فرآورده شیر سنتی مختلف از قبیل ۲۰ نمونه شیر، ۲۰ نمونه دوغ، ۲۰ نمونه ماست، ۲۰ نمونه دوراغ، ۲۰ نمونه کشک و ۲۰ نمونه قارا از تیرماه تا مهر ۱۳۹۳ از فروشگاه‌های عرضه فرآورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد، به منظور بررسی ژن‌های انتروسین *Enterocin P*، *Enterocin A* و *Enterocin AS-48* مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از سویه انتروکوکوس فکالیس ATCC 29212 تهیه شده از مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید. به منظور شناسایی انتروکوکوس فکالیس نمونه‌های جمع‌آوری شده در محیط بلاد آگار (ساخت شرکت مرک، آلمان) و کشت داده شدند و بعد از ۲۴ ساعت گرم‌خانه گذاری، نمونه‌ها از لحاظ ریخت‌شناسی نوع پرگنه، رنگ‌آمیزی گرم، حرکت و تست کاتالاز مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تایید انتروکوکوس فکالیس از آزمون‌های بیوشیمیایی نظیر هیدرولیز محیط بایل اسکولین آگار (ساخت شرکت کیو لب)، رشد در ۶/۵ درصد نمک، تخمیر قندهای لاکتوز، سوربیتول، مانیتول، آرابینوز، سوربوز، استفاده گردید (بخشی، ۱۳۸۸؛ ادیب فر، ۱۳۷۵). به

عمل می‌آورند. به همین دلیل این باکتری‌ها از دیدگاه تکنولوژی حائز اهمیت می‌باشند (Mirhosseini et al., 2009).

باکتریوسین‌ها پروتئین‌هایی هستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و توسط گروه‌های مختلفی از باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک تولید می‌شوند و طیف گسترده‌ای از ممانعت‌کنندگی را دارا می‌باشند و برای نگهداری غذا به کار می‌روند. باکتری‌های اسید لاکتیک عمدتاً از محصولاتی مانند شیر و محصولات گوشتی منشاء می‌گیرند و طیف وسیعی دارند. این توانایی ضد میکروبی آن‌ها برای توسعه بسیاری از فرآورده‌های تخمیری به کار می‌رود. اگر چه ممکن است بسیاری از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی قادر به تولید باکتریوسین باشند ولی در سال‌های اخیر توجه ویژه بر روی شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و باکتریوسین‌های حاصله در صنایع غذایی در جهت بهره‌گیری از آن‌ها به عنوان نگهدارنده‌های مواد غذایی معطوف شده است (Gomez et al., 2002). باکتریوسین‌ها در باکتری‌های گرم مثبت کوچک بوده و سبب افزایش نفوذپذیری غشاء می‌شوند. باکتریوسین باکتری‌های گرم منفی بزرگ و پیچیده‌اند که به رسپتورهای<sup>۱</sup> ویژه‌ای روی غشاء خارجی سلول هدف باند می‌شوند. سازماندهی ژنتیکی باکتریوسین‌های تولید شده توسط باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی باهم متفاوت است، باکتری‌های گرم مثبت دارای ۸ تا ۱۲ ژن در مقایسه با ۲ تا ۳ ژن نیازمند برای باکتری‌های گرم منفی است (Uguen and Uguen., 2002). مطالعات متعدد نشان می‌دهد، انتروسین‌ها باعث کاهش باکتری‌های بیماری‌زا در دستگاه گوارش حیوانات می‌شوند. انتروکوکوس فکالیس به واسطه ترشح انتروسین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی استفاده می‌شود. اولین انتروسین خالص شده انتروسین AS-48 می‌باشد و توسط انتروکوکوس فکالیس تولید می‌شود (Pandey et al., 2013). انتروکوکوس فکالیس از جمله

<sup>1</sup>- Receptor

پرایمرهای نشان داده شده در (جدول ۱) صورت گرفت (میرحسینی، ۱۳۹۱). به منظور کمیت سنجی DNA استخراج شده از دستگاه بیوفوتومتر (اپندورف آلمان) استفاده شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و آزمون مربع کای انجام گردید.

منظور تشخیص مولکولی و تائید تشخیص باکتری‌های رشد کرده بر روی محیط کشت، استخراج DNA با استفاده کیت استخراج DNA ساخت شرکت سیناژن، مطابق دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت. ردیابی ژن‌های *16srDNA* و *انتروسین‌ها* *Enterocin A*، *Enterocin P* و *Enterocin As-48* در حضور زوج

جدول ۱- توالی پرایمرهای مربوط به ژن‌های *16srDNA* و انتروسین‌های *Enterocin A*، *Enterocin p*، *Enterocin As-48*

ژن	توالی پرایمر	دمای انلینگ	اندازه محصول	منبع	PCR برنامه دمایی
<i>16srDNA</i>	RW01 AACTGGAGGAAGGTGGGGAT DG74 AGGAGGTGATCCAACCGCA	۵۸	۳۷۰	۳	۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۴ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۸ درجه ۳۰ ثانیه، ۷۲ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
					۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۵ درجه ۳۰ ثانیه، ۷۲ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
<i>Enterocin A</i>	EntA F: TTGCTAATGCTAGTCCACGACC EntAR: CGTCAACACTTGCATTGCCGAA	۵۵	۱۳۷	۳	۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۵ درجه ۳۰ ثانیه، ۷۲ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
					۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۸ درجه ۳۰ ثانیه، ۶۱ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
<i>Enterocin p</i>	EntPF: GACAGACCCTCACGAATA EntPR: AGTTCATCATGCTGTAGTA	۶۱	۸۷	۳	۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۸ درجه ۳۰ ثانیه، ۶۱ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
					۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۶ درجه ۳۰ ثانیه، ۷۲ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
<i>Entrocin AS-48</i>	EntAs48F: AGCAAAAAGTTCAATCGTTGC EntAs48R: GTCTGTCTTTCACTGTTTCT	۵۶	۲۳۷	۳	۹۵ درجه ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل تکراری ۹۵ درجه ۹۰ ثانیه، ۵۶ درجه ۳۰ ثانیه، ۷۲ درجه ۴۵ ثانیه و ۱ سیکل انتهایی ۷۲ درجه ۷ دقیقه
					دقیقه

### نتایج

مطالعه حاضر با هدف تعیین انتروسین‌های *Enterocin A* و *Enterocin As-48* در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر صورت گرفت. انتروکوکوس فکالیس کوکسی گرم مثبت، کاتالاز منفی و بی‌حرکت می‌باشد. این باکتری قندهای سوربیتول، مانیتول و لاکتوز را تخمیر می‌کند، اما قادر به تخمیر قندهای آرابینوز و سوربوز نمی‌باشد. هم‌چنین قادر به هیدرولیز محیط بایل اسکولین آگار نیز می‌باشد. در این

واکنش PCR به صورت جداگانه برای هر ژن، در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر متشکل از DNA استخراج شده، ۲/۵ میکرولیتر 10x PCR buffer، ۰/۵ میکرولیتر Mix dNTP (10mM)، ۰/۷۵ میکرولیتر Mgcl2 (50mM)، ۲ میکرولیتر پرایمرهای F و R، ۰/۲ میکرولیتر آنزیم SmarTaq DNA Polymerase و ۱۸/۰۵ میکرولیتر آبمقطر صورت گرفت. برنامه دمایی PCR برای ژن‌های مذکور در جدول ۱ نشان داده شده است.


تحقیق از مجموع ۱۲۰ نمونه مورد مطالعه تعداد ۴۴ نمونه همان‌گونه که در جدول (۲) نشان داده شده‌است، بیشترین میزان آلودگی مربوط به شیر و ماست می‌باشد. (۳۶/۶۶ درصد) آلوده به باکتری انتروکوکوس فکالیس که

جدول ۲- تعداد و درصد موارد مثبت آلوده به انتروکوکوس فکالیس در فراورده‌های شیر شهرستان شهرکرد

نوع ماده غذایی	تعداد	درصد
شیر	۱۲	۲۷/۳٪
ماست	۱۲	۲۷/۳٪
دوغ	۴	۹/۱٪
دوراغ	۴	۹/۱٪
کشک	۸	۱۸/۲٪
قارا	۴	۹/۱٪
جمع کل	۴۴	۱۰۰٪

گرفتند. تمامی نمونه‌ها با داشتن باند ۳۷۰ جفت بازی مثبت تشخیص داده شدند. نتایج در شکل (۱) نشان داده شده‌است.

پس از استخراج DNA و بررسی کیفیت DNA های استخراج شده روی ژل آگارز ۲/۵٪ به منظور تشخیص قطعی باکتری انتروکوکوس فکالیس در حضور توالی ژن *16srDNA*، باکتری‌های جدا شده مورد بررسی قرار



شکل ۱- الکتروفورز محصولات PCR ژن *16srDNA* انتروکوکوس فکالیس. ستون M: مارکر ۱۰۰ جفت بازی فرمنتاز. ستون ۱: ستون کنترل منفی. ستون ۲ کنترل مثبت. ستون‌های ۳، ۴ و ۵ باند ۳۷۰ جفت بازی مربوط به نمونه‌های مورد بررسی.

به انتروسین‌های *A* و *P* در ۲ ایزوله (۴/۵۴ درصد)، ژن مربوط به انتروسین‌های *A* و *As48* در ۷ ایزوله (۱۵/۰۹ درصد)، ژن مربوط به انتروسین‌های *A*، *P* و *As48* در ۵ ایزوله (۱۱/۳۶ درصد) گزارش گردید. نتایج به تفکیک در جدول (۳) نشان داده شده‌است.

در این تحقیق از ۴۴ ایزوله انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی، ژن مربوط به انتروسین *A* در ۱۴ ایزوله (۳۱/۸۱ درصد)، ژن مربوط به انتروسین *P* در ۱۳ ایزوله (۲۹/۵۴ درصد)، ژن مربوط به انتروسین *As-* 48 در ۹ ایزوله (۲۰/۴۵ درصد). وجود هم‌زمان ژن مربوط

جدول ۳- فراوانی ژن‌های *Enterocin A, p, As-48* در ایزوله‌های *انتروکوکوس فکالیس* جدا شده از فرآورده‌های شیر سنتی

ژن	شیر	ماست	دوغ	دوراغ	کشک	قارا
انتروسین A	۳ (۰/۲۵)	۴ (۰/۳۳/۳۳)	۱ (۰/۲۵)	۱ (۰/۲۵)	۳ (۰/۳/۵)	۲ (۰/۵۰)
انتروسین P	۳ (۰/۲۵)	۴ (۰/۳۳/۳۳)	۱ (۰/۲۵)	۱ (۰/۲۵)	۲	۲ (۰/۵۰)
انتروسین As48	۲ (۰/۶۶/۱۶)	۲ (۰/۱۶/۶۶)	۱ (۰/۲۵)	۱ (۰/۲۵)	۱ (۰/۱۲/۵)	۲ (۰/۵۰)
انتروسین A+P	-	۲ (۰/۱۶/۶۶)	-	-	-	-
انتروسین A+As48	-	۲ (۰/۱۶/۶۶)	۱ (۰/۲۵)	-	۴ (۰/۵۰)	-
انتروسین As48A+P	-	۲ (۰/۱۶/۶۶)	-	۱ (۰/۲۵)	-	۲ (۰/۵۰)

گردید که نسبت به نتایج حاصل از تحقیق ما بسیار بیشتر می‌باشد (Aleksieva, 1980). در تحقیق دیگر انجام شده توسط Aleksieva که بر روی، ۲۷۰ نمونه شیر خام و پاستوریزه صورت گرفت، گونه‌های *انتروکوکوس فاسیوم* و *انتروکوکوس فکالیس* به ترتیب ۲/۴۳٪ و ۶/۲۴٪ گزارش گردید (Aleksieva, 1976). Dardir و همکاران فراوانی *انتروکوکوس فکالیس*، *انتروکوکوس فاسیوم*، *انتروکوکوس کالسی فلاوس*، *انتروکوکوس گالیناروم* و *انتروکوکوس هیره* در فرآورده‌های شیر را به ترتیب ۱۶/۳۶٪، ۱۶/۵۶٪، ۱۶/۱٪، ۳/۳٪ و ۱۶/۱٪ گزارش کردند (Dardir et al., 2011). تحقیقات انجام شده نشان دهنده فعالیت بازدارندگی *انتروسین‌ها* در برابر باکتری‌های دیگر می‌باشد. به طوری که فعالیت بازدارندگی *انتروسین‌ها* را در برابر باکتری *لیستریا مونوسی‌توزنز* و *استافیلوکوکوس ارئوس* و دیگر گونه‌ها را گزارش کردند (Aymerich et al., 1996). Ozdemir و همکاران فراوانی ژن‌های *انتروسین A, B, P* و *L50A/B* در ایزوله‌های *انتروکوک* جدا شده از

در تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون دقیق فیشر بین ژن‌های مورد نظر و نوع فرآورده شیر سنتی ارتباطی آماری معنی‌دار مشاهده نگردید (  $p\text{-value}=0/864 >$  ) .0/05

#### بحث

باکتریوسین‌ها به صورت پلی‌پپتیدهایی که دارای فعالیت باکتریوسیدالی هستند توسط ریبوزوم‌ها سنتز می‌شوند. توانایی سنتز یک یا چند باکتریوسین توسط باکتری یک برتری محسوب می‌گردد زیرا می‌تواند باکتری‌های رقیب را حذف کند و فرصتی را برای بقا و تکثیر خود فراهم کند. *انتروسین‌ها* غشاء سیتوپلاسمی را هدف اولیه قرار می‌دهند و باعث از بین رفتن آن می‌شوند (Strompfov et al., 2008). در این تحقیق از مجموع ۱۲۰ نمونه مورد مطالعه تعداد ۴۴ نمونه (۳۶/۶۶٪) آلوده به باکتری *انتروکوکوس فکالیس* گزارش گردید. در حالی که بررسی‌های انجام شده، توسط سایر محققین بر روی ۸۵ نمونه بستنی، آلودگی به *انتروکوک* ۸۱٪ گزارش

L50B بیشتر در هر دو سویه انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس یافت شدند (Strompfov et al., 2008).

در مطالعه‌ای دیگر انجام شده توسط میرحسینی که بر روی ۲۶ نمونه شیر و فراورده‌های آن با روش مستقل از کشت، حضور ژن‌های انتروسین *As-48*، *P*، *A* مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه در همه نمونه‌ها تنها انتروسین *A* گزارش گردید (میرحسینی، ۱۳۹۱). تولید باکتریوسین یک فرآیند تنظیم شده‌است. به عبارت دیگر شرایط محیطی در تولید باکتریوسین تأثیر دارند. تعدادی از باکتریوسین‌ها در محیط جامد تولید می‌شوند ولی در محیط مایع تولید نمی‌شوند. بنابراین فراوانی وجود ژن‌های ساختمانی می‌تواند بعد از به کارگیری متد ایده‌آل برای بررسی تولید باکتریوسین تخمین زده شود (میرحسینی، ۱۳۹۱).

نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات حضور تعداد زیادی از ژن‌های انتروسین در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر را نشان می‌دهد. و تأیید می‌کند که تولید انتروسین به طور وسیع در شیر و محصولات حاصل از شیر اتفاق می‌افتد. گسترش وسیع ژن‌های انتروسین در بین انتروکوک‌ها ممکن است به علت توانایی انتروکوک‌ها برای انتشار و دریافت مواد ژنتیکی بین سویه‌ها و هم‌چنین بین جنس‌ها باشد. (Strompfov et al., 2008). انتروسین *A* به طور وسیع در میان انتروکوک‌های گسترده است. و فعالیت ضد لیستریایی قوی نشان می‌دهد (Messi et al., 2009; Mirhosseini et al., 2006).

منابع مختلف را به ترتیب ۱۰۰٪، ۹۸/۱٪، ۷۲/۲٪ و ۶۲/۹٪ گزارش کردند (Ozdemir et al., 2011). در صورتی که در تحقیق ما ژن مربوط به انتروسین *A*، ۳۱/۸۱٪ و ژن مربوط به انتروسین *P*، ۲۹/۵۴٪ گزارش گردید که نسبت به مطالعه انجام شده از فراوانی کمتری برخوردار می‌باشد. در تحقیق ما فراوانی ژن انتروسین *As-48* ۲۰/۴۵٪ گزارش گردید. انتروسین *As-48* دارای فعالیت سایتولیزینی می‌باشد و تنها در ایزوله‌هایی که دارای فعالیت همولایزینی می‌باشند گزارش گردیده است. وجود هم‌زمان دو ژن با همدیگر در مطالعه Ozdemir و همکاران ۱۱/۱٪ موارد گزارش گردید (Ozdemir et al., 2011). در صورتی که در مطالعه حاضر وجود هم‌زمان چند ژن با همدیگر در ۱۳/۶۳٪ مشاهده گردید به طوری که ژن مربوط به انتروسین‌های *A* و *P* در ۴/۵۴٪، ژن مربوط به انتروسین‌های *A* و *As48* در ۱۵/۰۹٪، ژن مربوط به انتروسین‌های *As-48A* و *P* در ۱۱/۳۶٪ مشاهده گردید. در تحقیقی که بر روی ۶۱ ایزوله انتروکوک جدا شده از منابع مختلف صورت گرفت، فراوانی ژن‌های انتروسین ۵۷/۴٪ گزارش گردید که تقریباً مشابه نتایج حاصل از تحقیق ما می‌باشد (Pangallo et al., 2004). Strompfov و همکاران حضور ژن انتروسین *A*، *B*، *P* و *L50B* را در ۴۲۷ سویه انتروکوکسی (۳۶۸ انتروکوکوس فاسیوم و ۵۹ انتروکوکوس فکالیس) از منشا مختلف (حیوان، غذا) با استفاده از تکنیک PCR مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج PCR، ۲۳۴ سویه حاوی یک یا چند ژن ساختمانی انتروسین بودند. انتروسین *P* و *A* بیشترین ژن‌های ساختمانی یافت شده در میان سویه‌های انتروکوکوس بودند. انتروسین *A* بیشتر در انتروکوکوس فاسیوم یافت شد ولی ژن انتروسین *P*، *B* و

9. Furlaneto, L., Rocha, K., CarolaHenique, F., Giazzi, A., and Furlaneto, C. 2014. Antimicrobial resistance in *Enterococcus sp* isolated from Soft cheese in southern Brazil. *AdvMicrobiol.* 4:175-181.

10. Girrafa, G. 2003. Functionality of *enterococci* in dairy product. *Int J Food Microbiol.*88: 215-222.

11. Gomez, R., Munoz, M., Ancos, B., and cano, M.P. 2002. New procedure for the detection of lactic acid bacteria in vegetables producing antibacterial substances. *LebensWiss Technol.* 35: 284-288.

12. Huycke, M.N., Sahm, D.F, Gilmore, M.S. 1998. Multiple- drug resistant *enterococci*: The nature of the problem and an agenda for the future. *Emerg Infect Dis.* 4: 239-249.

13. Masud, T. 1989. Microbiological quality and public health significance of ice-cream. *J Pak Med Assoc.* 39: 102-104.

14. Messi, P., Guerrieri, E., Niederhäusern, S., Sabia, C., Bondi, M. 2006. Vancomycin resistant *enterococci* (VRE) in meat and environmental. *Int J Food Microbiol.* 107: 218-222.

15. Mirhosseini, M., Nahvi, I., Emtiazi, G., Tavasoli, M. 2009. Culture-dependent and culture in dependent qualitative analysis of dairy products for bacteriocin production by lactic acid bacteria. *World ApplSci J.* 5: 20-24.

16. Morandi, S., Brasca, M., Andrighetto, C., Lombardi, A., and Lodi, Roberta. 2006. Technological and molecular characterization of

## منابع

۱. ادیب فر، پرویز. (۱۳۷۵). میکروبیولوژی پزشکی. انتشارات نشر ایران، صفحه ۱۴۶-۱۴۵.

۲. بخشی، زهره و بخشی، محبوبه. (۱۳۸۸). باکتری شناسی تشخیصی عملی. چاپ اول، انتشارات جعفری، صفحه ۸۳-۸۲.

۳. میرحسینی، محبوبه. (۱۳۹۱). شناسایی *انتروکوکوس* تولیدکننده باکتریوسین در محصولات لبنی به وسیله PCR. *مجله زیست شناسی ایران*، دوره ۲۵، شماره ۳، صفحه ۳۵۷-۳۵۱.

۴. یوسفی، لیلا، عزت پناه، حمید و مزگانی، ناهید. (۱۳۹۰). بررسی ویژگی های شبه *انتروکوکوس* های تولید شده توسط دو سویه از *انتروکوکوس* های جدا شده از شیر میش و بز. *مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران*، شماره ۲۰، صفحه ۴۲-۳۳.

5. Aleksieva, V. 1976. Find of *enterococci* in sour cream and butter. *Vet Med Nauki.* 13(2): 49-59.

6. Aleksieva, V. 1980. *Enterococci* and coliform content in white brine cheese. *Vet Med Nauki.* 17: 85-91.

7. Aymerich, T., Holo, H., Havarstein, L.S, Hugas, M., Garriga, M., Nes, I.F. 1996. Biochemical and genetic characterization of enterocinA from *Enterococcus faecium*, a new anti listerial bacteriocin in the pediocin family of bacteriocins. *Appl Environ Microbiol.*62: 1676-1682.

8. Dardir, H.A, Aba-Alkhail, N.A, Abdel-All, A.A. 2011. Safety evaluation of *enterococcal* strains isolated from dairy products and clinical samples using RT- PCR. *WJDFS.* 6: 234-240.



21. Pandey, N., Malik, R.K., Kaushik, J.K., Singroha, G. 2013. Gassericin A: a circular bacteriocin produced by lactic acid bacteria *Lactobacillus gasseri*. World J Microbiol Biotechnol. 29: 1977-1987.
22. Pangallo, D., Harichova, J., Karellova, E., Drahovska, H., Chovanova, K., Ferienc, P., Turna, J., and Timko, J. 2004. Molecular investigation of *enterococci* isolated from different environmental sources. Biologia, Bratislava. 59: 829-837.
23. Stropfov, V., Laukova, A., Simonova, M., Marcinakova, M. 2008. Occurrence of the structural enterocin A, P, B, L50B genes in *enterococci* of different origin. Vet Microbiol. 132: 293-301.
24. Suzzi, G., Caruso, M., Gardini, F., Lombardi, A., Vannini, L., and Guerzoni, M.E., 2000. A survey of the *enterococci* isolated from an artisanal Italian goat's cheese (*Semicottocaprino*). J Appl Microbiol. 89: 267-274.
25. Uguen M, Uguen P. 2002. The LcnC homologue cannot replace LctT in lactacin 481 export. FEMS Microbiol Lett. 208: 199-103.
- enterococci* isolated from north-west Italian dairy products. Int Dairy J. 16: 867-875.
17. Murray, B.E. 1990. The life and times of *Enterococcus*. Clin Microbiol Rev. 3: 46-65.
18. Ogier, J.C., Serror, P. 2008. Safety assessment of dairy microorganisms: The *Enterococcus* genus. Int J Food Microbiol. 126: 291-301.
19. Ozdemir, G.B, Oryasin, E., Ozteber, M., Bozdogan, B. 2011. Phenotypic and genotypic characterization of bacteriocins in *enterococcal* isolates of different sources. Indian J Microbiol. 51: 182-187.
20. ÖzdenThncer, B., Tuncer, Y. 2013. Occurrence of enterocin genes, virulence factors, and antibiotic resistance in bacteriocin- producer *Enterococcus faecium* strains isolated from Turkish tulumcheese. Turk J Biol. 37: 443-449.



## Prevalence of enterocins produced by *Enterococcus faecalis* isolated from traditional dairy products in Shahrekord City

Barzam E<sup>1</sup>, Tajbakhsh E<sup>2\*</sup>, Rahimi E<sup>3</sup>

1- Under Graduated Of Microbiology, Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2- Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

3- Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

\*Corresponding author: [ee\\_tajbakhsh@yahoo.com](mailto:ee_tajbakhsh@yahoo.com)

### Abstract

*Bacteriocins* are proteins produced by bacteria especially Acid lactic bacteria having antimicrobial characteristics and used for food preservation. In recent years, especial considerations have been taken to detection of acid lactic bacteria and *Bacteriocins* in food industries to use them as food preservatives. In this study, 120 samples of different traditional dairy products were examined to investigate genes of *Enterocin*, *Enterocin A*, *Enterocin P* and *Enterocin AS-48*. After separation and detection of bacteria in presence of special primers related to *Enterocingenes*, their frequencies were studied. Among 120 samples, 44 (36.36%) were contaminated to *Enterococcus faecalis*. The gene related to *Enterocin A* in 14 isolates (31/81%), the gene related to *Enterocin P* in 13 isolates (29/54%), the gene related to *Enterocin As-48* in 9 isolates (20/45%), the simultaneous presence of the gene related to *Enterocin A* and P in 2 isolates (4/54%), the gene related to *Enterocins A* and As-48 in 7 isolates (15/09%) and the gene related to *Enterocins A*, P and As-48 in 5 isolates (11/36%) were observed. According to the presence of a lot of *Enterocingenes* in *Enterococcus faecalis* separated from dairy products, doing research on antimicrobial characteristics of *Enterocins* produced by this bacterium is of great necessity.

**Keywords:** Dairy products, *Enterococcus faecalis*, *Enterocin* genes.