

دسترسی در سایت <http://jnrm.srbiau.ac.ir>

سال سوم، شماره یازدهم، پاییز ۱۳۹۶

شماره شاپا: ۱۶۹-۰۱۶۸۲

JNRM

پژوهش‌های نوین در ریاضی



دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

## بعدهای همولوژیکی گرنشتاین نسبت به یک مدول شبه دوگانی روی حلقه گروه‌ها

عبدالناصر بهلکه\*

استادیار، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۰۲/۲۰ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۰۵/۰۲

### چکیده

فرض کنیم  $R$  یک حلقه جابجایی و نوتری و  $\Gamma$  یک گروه متناهی باشد. در این مقاله، ما بعدهای همولوژیکی گرنشتاین مدول‌ها نسبت به یک مدول شبه دوگانی روی حلقه گروه  $R\Gamma$  را مطالعه می‌کنیم. نشان داده خواهد شد که بعدهای همولوژیکی گرنشتاین  $R\Gamma$ -مدول  $M$  نسبت به مدول شبه دوگانی روی  $R$  و  $R\Gamma$  با هم برابر می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: مدول شبه دوگانی، بعد گرنشتاین، بعد  $C$ -تصویری گرنشتاین، بعد  $C$ -تزریقی گرنشتاین.

## ۱. مقدمه

$R \rightarrow \text{Hom}_R(C, C)$  یکرختی باشد و به‌علاوه برای

هر  $i > 0$ ،  $\text{Ext}_R^i(C, C) = 0$ . مدول‌های شبه دوگانی که تعمیم مدول‌های آزاد از پایه یک می‌باشند، توسط هلم<sup>۱۰</sup> و وایت<sup>۱۱</sup> [۱۳] روی حلقه‌های شرکت‌پذیر دلخواه تعریف شده‌اند. افراد زیادی خاصیت‌های مدول‌های شبه دوگانی را از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داده‌اند، به عنوان مثال به [۱۸، ۱۳، ۱۶] رجوع کنید. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در این مورد، مطالعه بعدهای گرنشتاین مدول‌ها نسبت به یک مدول شبه دوگانی می‌باشد. در این راستا گلد در [۱۱] با استفاده از مدول شبه دوگانی  $C$ ، پایایی را برای هر مدول متناهی مولد نسبت داد. او این پایا را که نظریه‌ای از بعد تصویری می‌باشد،  $G_C$ -بعد نامید. به کمک این پایا، گرکو<sup>۱۲</sup> در [۱۰] توصیفی برای حلقه‌های کوهن-مکالی ارائه کرد. با ایده گرفتن از مفهوم بعد تصویری گرنشتاین، هلم و یورگنسن<sup>۱۳</sup> در [۱۲]  $G_C$ -بعد را برای هر مدول دلخواه روی حلقه نوتری و جابجایی تعریف کرده و آن‌ها این پایا را بعد  $C$ -تصویری گرنشتاین نامیده‌اند. وایت در [۱۵] بعد  $C$ -تصویری گرنشتاین<sup>۱۴</sup> را روی حلقه‌های جابجایی که لزوماً نوتری نمی‌باشند، تعریف کرده است. فرض کنید  $R$  یک حلقه نوتری و جابجایی و  $M$  یک  $R$ -مدول دلخواه باشد. گویم  $M$ ،  $C$ -تصویری گرنشتاین است اگر برای هر  $i > 0$  و هر  $R$ -مدول تصویری  $P$ ،  $\text{Ext}_R^i(M, C \otimes_R P) = 0$  و همبافت دقیق از  $-R$  مدول‌های

$$0 \rightarrow M \rightarrow C \otimes_R P_{-1} \rightarrow C \otimes_R P_{-2} \rightarrow \dots$$

که در آن  $P_i$ ها تصویری بوده، موجود باشند به‌طوری‌که تابعگون  $\text{Hom}_R(-, C \otimes_R P)$  برای هر  $R$ -مدول تصویری  $P$ ، این همبافت را دقیق نگه دارد.

هلم و یورگنسن هم‌چنین مفهوم بعدهای  $C$ -تجزیه‌پذیری گرنشتاین<sup>۱۵</sup> و  $C$ -یکدست گرنشتاین<sup>۱۶</sup> را معرفی و مطالعه

در حدود نیم قرن پیش، اسلاندر<sup>۱</sup>، باکسبام<sup>۲</sup> [۳] و سر [۱۴] حلقه‌های موضعی منظم را توسط بعد تصویری رده‌بندی کرده‌اند. آن‌ها ثابت کرده‌اند که حلقه جابجایی نوتری و موضعی  $R$  منظم است اگر و تنها اگر بعد تصویری هر  $R$ -مدول متناهی مولد  $M$  متناهی باشد. از آن زمان، مسأله مشخص‌سازی حلقه‌های جابجایی براساس بعدهای همولوژیکی، یکی از جالب‌ترین موضوعات در جبر جابجایی بوده است. به منظور رده‌بندی حلقه‌های گرنشتاین، اسلاندر و بریدگر<sup>۳</sup> در [۲] مفهوم بعد گرنشتاین (که آن را  $G$ -بعد نیز گویند) را برای مدول‌های متناهی مولد روی حلقه‌های نوتری معرفی و مطالعه کرده‌اند. آن‌ها نشان داده‌اند که حلقه‌ی موضعی  $R$  گرنشتاین است اگر و تنها اگر  $G$ -بعد هر مدول متناهی مولد، متناهی باشد.

مفهوم  $G$ -بعد، که تعمیم بعد تصویری می‌باشد، توسط ایناکس<sup>۴</sup> و جندا<sup>۵</sup> در [۶] برای هر مدول (نه لزوماً متناهی مولد) تعریف شد و آن‌ها این پایا را بعد تصویری گرنشتاین نامیده‌اند. ثابت شده است که حلقه موضعی  $R$  گرنشتاین است اگر و تنها اگر بعد تصویری گرنشتاین هر مدول (متناهی مولد)، متناهی باشد. ایناکس و جندا به‌طور دوگانی مفهوم بعد تزریقی گرنشتاین را تعریف کرده‌اند. هم‌چنین، به منظور تکمیل مشابهت با بعدهای کلاسیک، ایناکس و همکارانش در [۷] بعد یکدست گرنشتاین مدول‌ها را معرفی و مطالعه کرده‌اند.

مدول‌های شبه دوگانی<sup>۶</sup> روی حلقه‌های جابجایی و نوتری اولین بار توسط فاکسی<sup>۷</sup> [۹]، گلد<sup>۸</sup> [۱۱] و واسکنسلوس<sup>۹</sup> [۱۵] به‌طور مستقل از هم، تعریف و مطالعه شده است.  $R$ -مدول متناهی مولد  $C$  را شبه دوگانی گویند هرگاه هم‌ریختی طبیعی

1. Auslander
2. Buchsbaum
3. Bridger
4. Enochs
5. Jenda
6. Semi-dualizing
7. Foxby
8. Golod
9. Vasconcelos

10. Holm
11. White
12. Gerko
13. Jørgensen
14. C-Gorenstein projective
15. C-Gorenstein injective
16. C-Gorenstein flat

**تعریف ۲:** فرض کنیم  $C$  یک  $\Lambda$ -مدول شبه دوگانی بوده و  $M$  یک  $\Lambda$ -مدول باشد. گوییم  $M$ - $C$  تصویری گرنشتاین است، اگر شرایط زیر فراهم باشد.

(i) برای هر  $i > 0$  و هر  $\Lambda$ -مدول تصویری  $P$ ،  $\text{Ext}_{\Lambda}^i(C, C \otimes_{\Lambda} P) = 0$ .

(ii) همبافت دقیق از  $\Lambda$ -مدولهای  $\mathbf{X}: 0 \rightarrow M \rightarrow C \otimes_{\Lambda} P_{-1} \rightarrow C \otimes_{\Lambda} P_{-2} \rightarrow \dots$  موجود باشد که در آن  $P_i$ ها تصویری بوده و تابعگون  $\text{Hom}_{\Lambda}(-, C \otimes_{\Lambda} Q)$ ، که در آن  $Q$  یک  $\Lambda$ -مدول تصویری می‌باشد، همبافت  $\mathbf{X}$  را دقیق نگه می‌دارد.

**تذکره ۳:** با توجه به تعریف بالا، واضح است که  $M, C$ - $\Lambda$  تصویری گرنشتاین است اگر و تنها اگر همبافت دقیق از  $\Lambda$ -مدولهای

$$\dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow C \otimes_{\Lambda} P_{-1} \rightarrow C \otimes_{\Lambda} P_{-2} \rightarrow \dots$$

موجود است که در آن برای هر  $i$ ،  $P_i$  تصویری بوده و  $M = \text{coker}(P_1 \rightarrow P_0)$  به علاوه تابعگون

$\text{Hom}_{\Lambda}(-, C \otimes_{\Lambda} Q)$  برای هر  $\Lambda$ -مدول تصویری  $Q$ ، همبافت بالا را دقیق نگه می‌دارد. (گزاره ۲، ۲ از [۱۷] را ملاحظه کنید).

**تعریف ۴:**  $\Lambda$ -مدول  $M$  را  $C$ -تزیقی گرنشتاین گوییم هرگاه

(۱) برای هر  $i \geq 1$  و هر  $\Lambda$ -مدول تزیقی  $I$ ،  $\text{Ext}_{\Lambda}^i(\text{Hom}_{\Lambda}(-, I), M) = 0$

(۲) همبافت دقیق از  $\Lambda$ -مدولهای  $\dots \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda}(C, I_1) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda}(C, I_0) \rightarrow M \rightarrow 0$

موجود باشد به طوری که  $I_i$ ها تزیقی بوده و تابعگون  $\text{Hom}_{\Lambda}(\text{Hom}_{\Lambda}(C, E), -)$  برای هر  $\Lambda$ -مدول تزیقی  $E$ ، این همبافت را دقیق نگه می‌دارد. (به تعریف ۲، ۲ از [۱۷] مراجعه شود).

**مثال ۵:** فرض کنیم  $I$  (به ترتیب،  $P$ ) یک  $\Lambda$ -مدول تزیقی (به ترتیب، تصویری) باشد. در این صورت  $\Lambda$ -مدولهای  $I$  و  $\text{Hom}_{\Lambda}(C, I)$  (به ترتیب،  $P$  و  $C \otimes_{\Lambda} P$ -تزیقی گرنشتاین (به ترتیب،  $C$ -تصویری گرنشتاین) می‌باشد. (به مثال ۸، ۲ از [۱۷] مراجعه شود).

کرده‌اند. آن‌ها نشان داده‌اند که این پایاها با بعدهای ایناکس و همکارانش روی حلقه‌های توسیع بدیهی  $R \propto C$  یکی می‌باشند. (به قضیه ۱۶، ۲ از [۱۲] رجوع شود).

فرض کنیم  $R$  یک حلقه جابجایی و نوتری و  $\Gamma$  یک گروه متناهی باشد. یکی از موضوع‌های مهم در کوهمولوژی گروه‌ها، انتقال خاصیت‌های همولوژیکی مدول از  $R$  به حلقه گروه  $R\Gamma$  می‌باشد. با در نظر گرفتن این مطلب و اهمیت پایاها بیان شده، هدف ما در این مقاله، مطالعه بعدهای همولوژیکی گرنشتاین نسبت به یک مدول شبه دوگانی روی حلقه گروه  $R\Gamma$  می‌باشد. قضیه اصلی این مقاله ثابت می‌کند که بعد  $R\Gamma \otimes_R C$ -تصویری گرنشتاین  $R\Gamma$ -مدول  $M$  برابر صفر است اگر و تنها اگر بعد  $C$ -تصویری گرنشتاین  $M$  به عنوان  $R$ -مدول برابر صفر باشد. به علاوه ثابت می‌شود که مشابه این قضیه برای بعد  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی نیز برقرار می‌باشد.

در طول این مقاله،  $R$  یک حلقه جابجایی و نوتری بوده و  $\Gamma$  یک گروه متناهی می‌باشد. به علاوه همه مدول‌ها، چپ مدول در نظر گرفته می‌شوند.

## ۲. تعاریف و قضایای مقدماتی

در این فصل برخی تعاریف و قضایای مقدماتی که در فصل بعد استفاده خواهد شد را بیان می‌کنیم. ما این فصل را با تعریف مدول شبه دوگان روی  $R$ -جبر نوتری شروع می‌کنیم.

**تعریف ۱:** فرض کنیم  $\Lambda$  یک  $R$ -جبر نوتری و  $C$  یک  $\Lambda$ -مدول متناهی مولد باشد. گوییم  $C$  شبه دوگانی است اگر

(i) همریختی‌های طبیعی  $\text{Hom}_{\Lambda}^{\text{op}}(C, C) \rightarrow \Lambda$  و  $\text{Hom}_{\Lambda}(C, C) \rightarrow \Lambda^{\text{op}}$  یکرختی باشند، که در آن  $\Lambda^{\text{op}}$  حلقه متضاد  $\Lambda$  می‌باشد.

(ii) برای هر  $i > 0$ ،  $\text{Ext}_{\Lambda}^i(C, C) = 0 = \text{Ext}_{\Lambda^{\text{op}}}^i(C, C)$ .

چون هر مدول تصویری، یکدست است، هر  $\Lambda$ -مدول  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی،  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. شایان ذکر است که تاکنون مثالی از یک مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین که  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی نباشد، ارائه نشده است.

در ادامه برخی نتایج مقدماتی روی حلقه گروه‌ها را بیان می‌کنیم.

**تذکره ۹:** فرض کنیم  $\Gamma$  یک گروه متناهی و  $R\Gamma$  حلقه گروه باشد. چون  $R\Gamma$  با حلقه متضاد آن،  $R\Gamma^{\text{op}}$ ، یکرخت می‌باشد. هر  $R\Gamma$ -مدول چپ، یک  $R\Gamma$ -مدول راست نیز می‌باشد و برعکس.

**تبصره ۱۰:** فرض کنیم  $M$  یک  $R$ -مدول باشد. در این صورت بنا به گزاره ۹،۵ از [۵]، یکرختی از  $R\Gamma - R\Gamma$  مدول‌های  $R\Gamma \otimes_R M \cong \text{Hom}_R(R\Gamma, M)$  برقرار می‌باشد. توجه شود که چون  $R\Gamma$  یک  $R\Gamma - R$  دو مدول می‌باشد،  $R\Gamma \otimes_R M$  یک  $R\Gamma$ -مدول (چپ) می‌باشد. به علاوه چون  $R\Gamma$  یک  $R\Gamma - R$  دو مدول می‌باشد،  $\text{Hom}_R(R\Gamma, M)$  یک  $R\Gamma$ -مدول (چپ) می‌باشد.

**گزاره ۱۱:** فرض کنیم  $C$  یک  $R$ -مدول شبه دوگانی باشد. در این صورت  $R\Gamma \otimes_R C$  یک  $R\Gamma - R$  دو مدول شبه دوگانی می‌باشد. برهان: به گزاره ۲،۳ از [۵] رجوع شود.

### ۳. قضایای اصلی

در این فصل ما بعدهای تعریف شده در فصل قبل را روی حلقه گروه‌ها مطالعه می‌کنیم. در طول این فصل، همواره  $C$  یک مدول شبه دوگانی برای  $R$  بوده و  $\Gamma$  گروهی متناهی می‌باشد.

**گزاره ۱۲:** فرض کنیم  $M$  یک  $R$ -مدول  $C$ -تزیقی گرنشتاین باشد. در این صورت  $\text{Hom}_R(R\Gamma, M)$  یک  $R\Gamma$ -مدول  $R\Gamma \otimes_R C$ -تزیقی گرنشتاین می‌باشد.

برهان: چون  $M$  یک  $R$ -مدول  $C$ -تزیقی گرنشتاین می‌باشد، بنابر تعریف همبافت دقیق از  $R$ -مدول‌های

$$\text{Hom}_R(C, \mathbf{I}): \cdots \rightarrow \text{Hom}_R(C, I_1) \rightarrow \text{Hom}_R(C, I_0) \rightarrow M \rightarrow 0$$

تبصره ۶: در قضیه ۸،۲ از [۱۷] ثابت شده است که رده مدول‌های  $C$ -تصویری گرنشتاین به‌طور تصویری، تحلیلی می‌باشند. یعنی اگر  $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow 0 \rightarrow M''$  یک رشته دقیق از  $\Lambda$ -مدول‌ها باشد به‌طوری که  $M''$   $C$ -تصویری گرنشتاین باشد، آنگاه  $M$   $C$ -تصویری گرنشتاین است اگر و تنها اگر  $M'$   $C$ -تصویری گرنشتاین باشد. به‌طور دوگان، می‌توان نشان داد که رده مدول‌های  $C$ -تزیقی گرنشتاین به‌طور تزیقی تحلیلی می‌باشند.

**تعریف ۷:** فرض کنیم  $M$  یک  $\Lambda$ -مدول و  $n$  یک عدد طبیعی نامنفی باشد. گوییم بعد  $C$ -تصویری گرنشتاین  $M$  کمتر یا مساوی  $n$  است و می‌نویسیم  $\text{Gpd}_\Lambda M \leq n - C$ ، اگر یک رشته دقیق از  $\Lambda$ -مدول‌ها به صورت

$$0 \rightarrow G_n \rightarrow G_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow G_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

موجود باشد که در آن برای هر  $0 \leq i \leq n$ ،  $G_i$   $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. اگر  $n$  کوچکترین عدد با این خاصیت باشد، آنگاه می‌نویسیم  $\text{Gpd}_\Lambda M = n - C$ .

اگر چنین  $n$  ای موجود نباشد، آنگاه می‌نویسیم  $\text{Gpd}_\Lambda M = \infty - C$ . به‌طور قرار داد، تعریف می‌کنیم  $\text{Gpd}_\Lambda 0 = -\infty - C$ .

بعد  $C$ -تزیقی گرنشتاین  $M$  که با نماد  $\text{Gid}_\Lambda M$  نمایش داده می‌شود، به‌طور دوگان تعریف می‌شود. توجه شود که اگر  $C = \Lambda$ ، آنگاه بعدهای  $C$ -تصویری گرنشتاین و  $C$ -تزیقی گرنشتاین همان بعدهای تصویری گرنشتاین و تزیقی گرنشتاین اینکس و جندا می‌باشند.

**تعریف ۸:** فرض کنیم  $C$  یک  $\Lambda$ -مدول شبه دوگانی و  $M$  یک  $\Lambda$ -مدول باشد. گوییم  $M$   $C$ -یکدست گرنشتاین قوی است، اگر

$$(i) \text{ برای هر } \Lambda\text{-مدول یکدست } F \text{ و هر } i > 0, \text{ Ext}_\Lambda^i(M, C \otimes_\Lambda F) = 0$$

(ii) همبافت دقیق از  $\Lambda$ -مدول‌های  $0 \rightarrow M \rightarrow C \otimes_\Lambda P_{-1} \rightarrow C \otimes_\Lambda P_{-2} \rightarrow \cdots$  موجود باشد به‌طوری که برای هر  $i$ ،  $P_i$  تصویری بوده و تابعگون  $\text{Hom}_\Lambda(-, C \otimes_\Lambda F')$  که در آن  $F'$  یک  $\Lambda$ -مدول یکدست است، این همبافت را دقیق نگه دارد.

که در آن  $ER\Gamma$ -مدول تزریقی است. بنا به فرض برای هر  $i > 0$   $\text{Ext}_R^i(\text{Hom}_R(C, E), M) = 0$  خواهیم داشت:

$$\text{Ext}_{R\Gamma}^i(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), \text{Hom}_R(R\Gamma, M)) = 0$$

برای هر  $i > 0$ . لذا حکم حاصل می‌شود.

**قضیه ۱۳:** فرض کنیم  $M$  یک  $R\Gamma \otimes_R C$ -تزریقی گرنشتاین باشد. در این صورت  $M$  به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تزریقی گرنشتاین می‌باشد.

**برهان:** ابتدا نشان می‌دهیم:

$$\text{Ext}_R^i(\text{Hom}_R(C, I), M) = 0$$

برای هر  $i > 0$  و هر  $R$ -مدول تزریقی  $I$ . چون  $I$  یک  $R\Gamma$ -مدول تزریقی است،  $\text{Hom}_R(R\Gamma, I)$  یک  $R$ -مدول تزریقی می‌باشد. لذا بنا به فرض

$$\text{Ext}_{R\Gamma}^i(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, \text{Hom}_R(R\Gamma, I)), M) = 0$$

$$\begin{aligned} & \text{برای هر } i > 0. \text{ یکرختی‌های زیر را در نظر می‌گیریم:} \\ & \text{Ext}_{R\Gamma}^i(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, \text{Hom}_R(R\Gamma, I)), M) \\ & \cong \text{Ext}_{R\Gamma}^i(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, R\Gamma \otimes_R I), M) \\ & \cong \text{Ext}_R^i(R\Gamma \otimes_R \text{Hom}_R(C, I), M) \\ & \cong \text{Ext}_R^i(\text{Hom}_R(C, I), \text{Hom}_R(R\Gamma, M)) \\ & \cong \text{Ext}_R^i(\text{Hom}_R(C, I), M) = 0 \end{aligned}$$

توجه شود که یکرختی اول بنا به تبصره ۱۰ برقرار بوده و یکرختی دوم از یکدست باوفا بودن  $R\Gamma$  به عنوان  $R$ -مدول نتیجه می‌شود. دومین یکرختی از قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  به دست می‌آید و یکرختی آخر به وضوح برقرار می‌باشد. اینک نشان می‌دهیم که یک همبافت دقیق از  $R$ -مدول‌ها به صورت

$$\cdots \rightarrow \text{Hom}_R(C, I_1) \rightarrow \text{Hom}_R(C, I_0) \rightarrow M \rightarrow 0$$

موجود است که در آن  $I_i$ ها،  $R$ -مدول‌های تزریقی می‌باشند. چون  $M$  یک  $R\Gamma$ -مدول  $R\Gamma \otimes_R C$ -تزریقی گرنشتاین می‌باشد، بنا به تعریف همبافت دقیق از  $R\Gamma$ -مدول‌های

$$\begin{aligned} Y: \cdots & \rightarrow \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, I_1) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, I_0) \\ & \rightarrow M \rightarrow 0 \end{aligned}$$

موجود است که در آن  $I_i$ ها،  $R\Gamma$ -مدول‌های تزریقی می‌باشند. بنا به قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  یکرختی‌های

موجود است به طوری که برای هر  $i$ ،  $I_i$ ها یک  $R$ -مدول تزریقی می‌باشد. چون  $R\Gamma$  به عنوان  $R$ -مدول، آزاد می‌باشد، همبافت دقیق از  $R\Gamma$ -مدول‌های زیر را داریم

$$\begin{aligned} \cdots & \rightarrow R\Gamma \otimes_R \text{Hom}_R(C, I_1) \\ & \rightarrow R\Gamma \otimes_R \text{Hom}_R(C, I_0) \\ & \rightarrow R\Gamma \otimes_R M \rightarrow 0 \end{aligned}$$

با استفاده از این واقعیت که  $R\Gamma$  به عنوان  $R$ -مدول صادق باوفا می‌باشد، نتیجه می‌گیریم که این همبافت یکرخت با همبافت

$$\begin{aligned} X: \cdots & \rightarrow \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, R\Gamma \otimes_R I_1) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, R\Gamma \otimes_R I_0) \\ & \rightarrow R\Gamma \otimes_R M \cong \text{Hom}_R(R\Gamma, M) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

می‌باشد. از طرفی چون  $\Gamma$  گروهی متناهی است، بنا به تبصره ۱۰،  $\text{Hom}_R(R\Gamma, I_i) \cong R\Gamma \otimes_R I_i$  یک  $R\Gamma$ -مدول تزریقی می‌باشد. حال فرض کنیم  $E$  یک  $R\Gamma$ -مدول تزریقی دلخواه باشد. نشان می‌دهیم تابعگون  $\text{Hom}_{R\Gamma}(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), -)$  را دقیق نگه می‌دارد. برای این منظور، یکرختی‌های زیر را در نظر می‌گیریم.

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{R\Gamma}(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), R\Gamma \otimes_R \text{Hom}_R(C, \mathbf{I})) \\ & \cong \text{Hom}_R(R\Gamma \otimes_R \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), \text{Hom}_R(C, \mathbf{I})) \\ & \cong \text{Hom}_R(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), \text{Hom}_R(C, \mathbf{I})) \\ & \cong \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma, E)), \text{Hom}_R(C, \mathbf{I})) \\ & \cong \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, E), \text{Hom}_R(C, \mathbf{I})) \end{aligned}$$

توجه شود که یکرختی اول بنا به قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  و تبصره ۱۰ نتیجه می‌شود. به علاوه یکرختی دوم به وضوح برقرار بوده و یکرختی سوم دوباره از قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  نتیجه می‌شود. چون  $E$  یک  $R\Gamma$ -مدول تزریقی است، به عنوان  $R$ -مدول نیز تزریقی است. حال بنا به فرض، همبافت آخر دقیق بوده و لذا همبافت اول نیز چنین می‌باشد. اینک نشان می‌دهیم که برای  $R\Gamma$ -مدول تزریقی  $E$ ,

$$\text{Ext}_{R\Gamma}^i(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), \text{Hom}_R(R\Gamma, M)) = 0$$

برای هر  $i > 0$ . برای این منظور، بنا به قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  یکرختی زیر را داریم. هم‌چنین با استفاده از قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  به آسانی یکرختی زیر را داریم:

$$\begin{aligned} & \text{Ext}_R^i(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, E), \text{Hom}_R(R\Gamma, M)) \\ & \cong \text{Ext}_R^i(\text{Hom}_R(C, E), M) \end{aligned}$$

**برهان:** ابتدا فرض می‌کنیم  $M$  یک  $R$ -مدول  $C$  -تصویری  
گرنشتاین باشد. نشان می‌دهیم  $M$  یک  $R$ -مدول  $C$  -  
تصویری گرنشتاین می‌باشد. رشته دقیق از  $R\Gamma$  -  
مدول‌های

$$\mathbf{X}: 0 \rightarrow M \rightarrow (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P_{-1} \\ \rightarrow (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P_{-2} \\ \rightarrow \dots$$

را در نظر بگیرید که در آن برای هر  $i$ ،  $P_i$  یک  $R\Gamma$  -  
مدول تصویری می‌باشد. چون  $R$  حلقه جابجایی می‌باشد،  
یکریختی‌های زیر را داریم

$$(R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P_i \cong (C \otimes_R R\Gamma) \otimes_{R\Gamma} P_i \\ \cong C \otimes_R P_i$$

$P_i$  به عنوان  $R$ -مدول نیز تصویری می‌باشد، چون  $R\Gamma$ ،  
یک  $R$ -مدول آزاد می‌باشد. به ویژه همبافت  $\mathbf{X}$  با  
همبافت

$$\mathbf{X}': 0 \rightarrow M \rightarrow C \otimes_R P_{-1} \rightarrow \\ C \otimes_R P_{-2} \rightarrow \dots$$

یکریخت می‌باشد. اینک فرض کنیم  $P$  یک  $R$ -مدول  
تصویری باشد. در این صورت  $R\Gamma \otimes_R P$  یک  $R\Gamma$  -  
مدول تصویری بوده و لذا بنا به فرض همبافت  
 $\text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} (R\Gamma \otimes_R P))$   
دقیق می‌باشد. اینک یکریختی‌های زیر را در نظر  
می‌گیریم.

$$\text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} (R\Gamma \otimes_R P)) \\ \cong \text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_R P) \\ \cong \text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, \text{Hom}_R(R\Gamma, C \otimes_R P)) \\ \cong \text{Hom}_R(R\Gamma \otimes_{R\Gamma} \mathbf{X}, C \otimes_R P) \\ \cong \text{Hom}_R(\mathbf{X}, C \otimes_R P)$$

بنابراین همبافت  $\text{Hom}_R(\mathbf{X}, C \otimes_R P)$  دقیق  
می‌باشد. حال چون همبافت  $\mathbf{X}$  روی حلقه  $R$  با  $\mathbf{X}'$   
یکریخت می‌باشد، همبافت  $\text{Hom}_R(\mathbf{X}', C \otimes_R P)$   
دقیق می‌باشد. حال نشان می‌دهیم که برای هر  $R$ -  
مدول تصویری  $P$ ،  $\text{Ext}_R^i(M, C \otimes_R P) = 0$  برای  
هر  $i > 0$  بنا به فرض داریم:

$$\text{Ext}_{R\Gamma}^i(M, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} (R\Gamma \otimes_R P)) = 0 \\ \text{برای هر } i > 0 \text{ لذا مشابه بالا، می‌توان دید} \\ \text{Ext}_R^i(M, C \otimes_R P) = 0 \text{ که برای هر } i > 0 \\ \text{بنابراین } M \text{ یک } R\text{-مدول } C\text{-تصویری گرنشتاین} \\ \text{می‌باشد.}$$

$$\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, I_i) \\ \cong \text{Hom}_R(C, \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma, I_i)) \\ \cong \text{Hom}_R(C, I_i)$$

برقرار می‌باشد. به علاوه به آسانی می‌توان دید که برای  
هر  $i, i \geq 0$  به عنوان  $R$ -مدول نیز تزریقی می‌باشد.  
بنابراین همبافت دقیق زیر از  $R$ -مدول‌های

$$\mathbf{X}: \dots \rightarrow \\ \text{Hom}_R(C, I_2) \rightarrow \text{Hom}_R(C, I_1) \rightarrow \\ \text{Hom}_R(C, I_0) \rightarrow M \rightarrow 0$$

موجود است. در نتیجه  $M$  به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تزریقی  
گرنشتاین می‌باشد. باید ثابت شود که برای هر  $R$ -مدول  
تزریقی  $E$ ، تابعگون  $\text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, E), -)$   
همبافت  $\mathbf{X}$  را دقیق نگه می‌دارد. چون همبافت  $\mathbf{X}$  و  
بر روی حلقه  $R$  یکریخت می‌باشند، کافی است نشان  
دهیم که تابعگون  $\text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, E), -)$   
همبافت  $\mathbf{Y}$  را دقیق نگه می‌دارد. بنا به فرض همبافت

$$\text{Hom}_{R\Gamma}(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, R\Gamma \otimes_R E), Y)$$

دقیق است. حال یکریختی‌های زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\text{Hom}_{R\Gamma}(\text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R C, R\Gamma \otimes_R E), Y) \\ \cong \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R \text{Hom}_R(C, E), Y) \\ \cong \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, E), \text{Hom}_{R\Gamma}(R\Gamma, Y)) \\ \cong \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, E), Y)$$

بنابراین  $\text{Hom}_R(\text{Hom}_R(C, E), Y)$  دقیق می‌باشد.  
لذا حکم تمام است.

**تبصره ۱۴:** فرض کنیم  $M$  یک  $R$ -مدول باشد. چون  
 $R\Gamma$  به عنوان  $R$ -مدول صادق باوفا است، بنا به لم ۵،۲  
از [۱۷]،  $M$  یک  $R$ -مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین است  
اگر و تنها اگر  $R\Gamma \otimes_R M$  یک  $R\Gamma$  -مدول  $R\Gamma \otimes_R C$  -  
تصویری گرنشتاین می‌باشد. به ویژه این مطلب نتیجه  
می‌دهد که برای هر  $R$ -مدول  $M$  تساوی

$$C - \text{Gpd}_R M = (R\Gamma \otimes_R C) \\ - \text{Gpd}_{R\Gamma}(R\Gamma \otimes_R M)$$

برقرار می‌باشد.

اینک می‌خواهیم قضیه اصلی این مقاله را بیان و ثابت  
کنیم.

**قضیه ۱۵:** فرض کنیم  $M$  یک  $R\Gamma$  -مدول باشد. در  
این صورت  $M$ ،  $R\Gamma \otimes_R C$  -تصویری گرنشتاین است  
اگر و تنها اگر  $M$  به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تصویری  
گرنشتاین باشد.

گرفت.  $R$ -مدول آزاد  $Q$  را چنان اختیار می‌کنیم به طوری که  $P \cong R\Gamma \otimes_R Q$ . یکرختی‌های زیر را در نظر می‌گیریم؛

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P) \\ & \cong \text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} (R\Gamma \otimes_R Q)) \\ & \cong \text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_R Q) \\ & \cong \text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, \text{Hom}_R(R\Gamma, C \otimes_R Q)) \\ & \cong \text{Hom}_R(R\Gamma \otimes_{R\Gamma} \mathbf{X}, C \otimes_R Q) \\ & \cong \text{Hom}_R(\mathbf{X}, C \otimes_R Q) \end{aligned}$$

یکریختی سوم بنا به تبصره ۱۰ برقرار بوده و یکرختی چهارم از قضیه الحاقی  $\text{Hom}$  و  $\otimes$  حاصل می‌شود. چون هم‌هسته هر یک از همریختی‌های  $\mathbf{X}$  به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد،  $\text{Hom}_R(\mathbf{X}, C \otimes_R Q)$  دقیق بوده و لذا

$$\text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P)$$

دقیق می‌باشد. برای اتمام اثبات، باید نشان دهیم که برای  $R\Gamma$ -مدول آزاد  $F$ ،

$$\text{Ext}_{R\Gamma}^i(M, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} F) = 0$$

برای هر  $i > 0$ . فرض کنیم  $F'$  یک  $R$ -مدول آزاد باشد به طوری که  $F \cong R\Gamma \otimes_R F'$  از آنجا مشابه بالا یکرختی‌های زیر را خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} & \text{Ext}_{R\Gamma}^i(M, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} (R\Gamma \otimes_R F')) \\ & \cong \text{Ext}_{R\Gamma}^i(M, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_R F') \\ & \cong \text{Ext}_R^i(R\Gamma \otimes_{R\Gamma} M, C \otimes_R F') \\ & \cong \text{Ext}_R^i(C \otimes_R F') \end{aligned}$$

چون  $M$  به عنوان  $R$ -مدول،  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد، برای هر  $i > 0$   $\text{Ext}_R^i(M, C \otimes_R F') = 0$  و لذا  $\text{Ext}_{R\Gamma}^i(M, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} F) = 0$  برای هر  $i > 0$ . بنابراین  $M$  یک  $R\Gamma$ -مدول  $C \otimes_R R\Gamma$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. لذا حکم حاصل می‌شود. به عنوان نتیجه مستقیم از قضیه بالا، مطلب زیر را بیان می‌کنیم.

**نتیجه ۱۶:** فرض کنیم  $M$  یک  $R\Gamma$ -مدول باشد. در این صورت

$$C - \text{Gpd}_R M = (R\Gamma \otimes_R C) - \text{Gpd}_{R\Gamma} M.$$

در ادامه می‌خواهیم مشابه قضیه ۱۵ را برای رده مدول‌های  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی بیان کنیم.

**قضیه ۱۷:** فرض کنیم  $M$  یک  $R\Gamma$ -مدول باشد. در این صورت،  $M$  یک  $R\Gamma \otimes_R C$ -یکدست گرنشتاین

برعکس: فرض کنیم  $M$  به عنوان  $R$ -مدول،  $C - \text{تصویری گرنشتاین باشد. نشان می‌دهیم } M \text{ یک } R\Gamma - \text{مدول } R\Gamma \otimes_R C \text{ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. چون } M \text{ یک } R - \text{مدول } C \text{ -تصویری گرنشتاین می‌باشد، بنا به گزاره ۹،۲ از [۱۷]، رشته دقیق از } R - \text{مدول‌های } 0 \rightarrow M \rightarrow C \otimes_R Q_{-1} \rightarrow L \rightarrow 0 \text{ که در آن } L \text{ } C \text{ -تصویری گرنشتاین و } Q_{-1} \text{ تصویری می‌باشد. بنا به ملاحظه ۲،۳ از [۱۷]، } Q_{-1} \text{ را می‌توان } R - \text{مدول آزاد فرض کرد. دیاگرام جابجایی زیر از } R\Gamma - \text{مدول‌ها با سطرهای دقیق را در نظر می‌گیریم.}$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & M & \rightarrow & R\Gamma \otimes_R M & \rightarrow & L' \rightarrow 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \theta & & \downarrow \varphi \\ 0 & \rightarrow & M & \rightarrow & R\Gamma \otimes_R (C \otimes_R Q_{-1}) & \rightarrow & L'' \rightarrow 0 \end{array}$$

بنا به لم مار،  $\varphi$  یک به یک بوده و  $\text{coker } \varphi = R\Gamma \otimes_R L$ . چون سطر بالا روی  $R$  شکافتنی می‌باشد، یکرختی  $M \oplus_{i=1}^{t-1} L' \cong M$  را داریم که در آن  $t$  مرتبه

گروه  $\Gamma$  می‌باشد. به ویژه  $L'$  یک  $R$ -مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. بنا به تبصره ۱۴،  $\text{coker } \varphi$  یک  $R\Gamma \otimes_R C$ -تصویری گرنشتاین بوده و در نتیجه بنا به قسمت اول به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. لذا بنا به تبصره ۶  $R\Gamma$ -مدول  $L''$  به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. حال با تکرار این روند برای  $L''$  به جای  $M$  و تکرار آن، همبافت دقیق از  $R\Gamma$  مدول‌های

$$\begin{aligned} \mathbf{X}: 0 & \rightarrow M \rightarrow (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_R Q_{-1} \\ & \rightarrow (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_R Q_{-2} \\ & \rightarrow \dots \end{aligned}$$

به دست می‌آید که در آن برای هر  $i$ ،  $Q_i$  یک  $R$ -مدول آزاد بوده و هم‌هسته هر یک از همریختی‌ها، به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین است. به آسانی می‌توان دید که برای هر  $i$ ، یکرختی

$$(R\Gamma \otimes_R C) \otimes_R Q_i \cong (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} Q'_i$$

برقرار می‌باشد که در  $Q'_i$  یک  $R\Gamma$ -مدول آزاد می‌باشد به طوری که  $Q'_i \cong R\Gamma \otimes_R Q_i$ . فرض کنیم  $P$  یک  $R\Gamma$ -مدول تصویری باشد. نشان می‌دهیم  $\text{Hom}_{R\Gamma}(\mathbf{X}, (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P)$  دقیق می‌باشد. بنا به ملاحظه ۳،۲ از [۱۷]، می‌توان  $P$  را آزاد در نظر

ترتیب،  $C$ -یکدست) گوییم، اگر  $R$ -مدول تصویری (به ترتیب، یکدست)  $P$  موجود باشد به طوری که

$$M = C \otimes_R P$$

فرض کنیم  $C$  یک  $R$ -مدول دوگانی باشد. در این صورت بنا به گزاره ۲.۳ از [۴]،  $R\Gamma \otimes_R C$  یک  $R\Gamma$ -مدول دوگانی می‌باشد. بنابراین نتیجه زیر را داریم.

**نتیجه ۱۹:** فرض کنیم  $C$  یک  $R$ -مدول دوگانی باشد. در این صورت رده  $R\Gamma$ -مدول‌های  $R\Gamma \otimes_R C$ -تصویری گرنشتاین و رده  $R\Gamma$ -مدول‌های  $R\Gamma \otimes_R C$  یکدست گرنشتاین قوی، بر هم منطبق می‌باشند.

**تبصره ۲۰:** همان طوری که بیان شد، وایت نشان داده است که رده  $R$ -مدول‌های  $C$ -تصویری گرنشتاین، به طور تصویری تحلیلی می‌باشند. همان روش بیان می‌کند که رده مدول‌های  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی نیز چنین می‌باشند. این مطلب و قضیه ۱۷ مطلب زیر را نتیجه می‌دهد.

**نتیجه ۲۱:** فرض کنیم  $M$  یک  $R\Gamma$ -مدول باشد. در این صورت

$$(R\Gamma \otimes_R C) - \text{SGfd}_{R\Gamma} M = C - \text{SGfd}_R M.$$

### سپاسگزاری

این پژوهش مستخرج از طرح تحقیقاتی به شماره ۶/۲۰۰۳ مصوب تاریخ ۹۵/۱۲/۰۸ دانشکده علوم پایه دانشگاه گنبد کاووس می‌باشد. لذا از مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه برای تامین مالی قدردانی می‌کنیم.

قوی است اگر و تنها اگر  $M$  به عنوان  $R$ -مدول،  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی باشد.

برهان: ابتدا فرض می‌کنیم  $M$  یک  $R\Gamma \otimes_R C$ -یکدست گرنشتاین قوی باشد. مشابه اثبات قضیه ۱۵ به آسانی می‌توان دید که  $M$  به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی می‌باشد. اینک فرض می‌کنیم  $R\Gamma$ -مدول  $M$  به عنوان  $R$ -مدول،  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی باشد. به آسانی می‌توان دید که رده مدول‌های  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی به طور تصویری، تحلیلی می‌باشد. لذا مشابه اثبات قضیه ۱۵، می‌توان همبافت دقیق از  $R\Gamma$ -مدول‌های

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow M \rightarrow (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P_{-1} \\ \rightarrow (R\Gamma \otimes_R C) \otimes_{R\Gamma} P_{-2} \\ \rightarrow \dots \end{aligned}$$

به دست آورد به طوری که هم‌هسته هم‌ریختی‌ها به عنوان  $R$ -مدول  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی می‌باشد. اینک فرض کنیم  $F$  یک  $R\Gamma$ -مدول یکدست باشد. بنا به قضیه لازارد [۱۴]، یک دستگاه مستقیم  $(Q_i)_{i \in I}$  از  $R\Gamma$ -مدول‌های آزاد و متناهی مولد موجود است به طوری که  $F \cong \lim_{i \in I} Q_i$ . برای هر  $i \in I$ ،  $R$ -مدول آزاد و متناهی مولد  $Q'_i$  را چنان اختیار می‌کنیم به طوری که  $Q_i \cong R\Gamma \otimes_R Q'_i$ . قرار می‌دهیم  $F' \cong \lim_{i \in I} Q'_i$ . با استفاده دوباره از قضیه لازارد  $F' \cong R\Gamma \otimes_R F'$  یک  $R$ -مدول یکدست بوده و  $F \cong R\Gamma \otimes_R F'$ . اینک استدلال به کار رفته در اثبات قضیه ۱۵، نشان می‌دهد که  $M$  یک  $R\Gamma$ -مدول  $R\Gamma \otimes_R C$ -یکدست گرنشتاین قوی می‌باشد.

**تذکره ۱۸:** همان طوری که بیان شد، هر  $R$ -مدول  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی،  $C$ -تصویری گرنشتاین می‌باشد. حال فرض کنیم  $C$  مدول دوگانی باشد (یعنی  $\text{id}_R C < \infty$ ). در این صورت بنا به قضیه ۸.۲.۴ از [۱۸]، بعد تصویری هر  $R$ -مدول یکدست، متناهی می‌باشد. بنابراین بعد  $C$ -تصویری هر  $R$ -مدول  $C$ -یکدست، متناهی می‌باشد. لذا در این حالت هر مدول  $C$ -تصویری گرنشتاین،  $C$ -یکدست گرنشتاین قوی می‌باشد. یادآوری می‌شود که  $R$ -مدول  $M$  را  $C$ -تصویری (به



translation in Sb. Mat. **192** (2001), no. 6, 2517-2552.

فهرست منابع

[11] Golod, S.E. (1984). *G-dimension and generalized perfect ideals*, Trudy Mat. Inst. Steklov. **165**, 62-66 (Russian). Algebraic geometry and its applications.

[12] Holm, H. and Jørgensen P. (2006). *Semi-dualizing modules and related Gorenstein homological dimensions*, J. Pure Appl. Algebra **205**, 423-445.

[13] Holm, H. and White D. (2007). *Foxby equivalences over associative rings*, J. Math. Kyoto Univ. **47**, 781-808.

[14] Lazard, D. (1969). *Autour de la paltitude*, Bull. Soc. Math. France. **97**, 81-128.

[15] Serre, J. P. (1955). *Sur la dimension homologique des anneaux at des modules noetheriens*, Proceedings of the international symposium on algebraic number theory, Tokyo & Nikko, (Tokyo), Science Council of Japan, 1956, pp. 157-189.

[16] Vasconcelos, W.V. (1974). *Divisor theory in module categories*, North-Holland Publishing Co., Amesterdam.

[17] Wagstaff, S. (2007). *Semi-dualizing modules and divisor class group*, Illinois J. Math. **51**, no. 1, 255-285.

[18] White, D. (2010). *Gorenstein projective dimension with respect to a semidualizing module*, J. Comm. Algebra **2**, 111-137.

[19] Xu, J. (1996). *Flat covers of modules*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. **1634**, Springer.

[1] Araya, T. and Takahashi, R. and Yoshino, Y. (2005). *Homological invariants associated to semi-dualizing bimodules*, J. Math. Kyoto Univ. **45**, no. 2, 287-306.

[2] Auslander, M. and Bridger, M. (1969). *Stable module theory*, Mem. Amer. Math. Soc., **94**.

[3] Auslander, M. and Buchsbaum, D.A. (1957). *Homological dimension in local rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **85**, 390-405.

[4] Bahlekeh, A. and Kakaie, T. (2017). *Generalized Gorenstein dimension over group rings*, J. Algebraic system. **5** no. 1, 53-64.

[5] Brown, K.S. (1982). *Cohomology of groups*, Graduate Texts in Mathematics, **37**, Berlin, Heidelberg, New York, Springer.

[6] Enochs, E. and Jenda, O.M.G. (1995). *Gorenstein injective and projective modules*, Math. Z. **220**, 611-633.

[7] Enochs, E. and Jenda, O.M.G. and Torrecillas B. (1993). *Gorenstain flat modules*, Nanjing Daxue Xuebao Shuxue Bannian Kan, **10**, 1-9.

[8] Enochs, E.E. and Yassemi, S. (2004). *Foxby equivalences and cotorsion theories relative to semi-dualizing modules*, Math. Scand. **95**, 33-45.

[9] Foxby, H.B. (1972). *Gorenstein modules and related modules*, Math. Scand. **31**, 267-284.

[10] Gerko, A.A. (2001). *On homological dimensions*, Mat. Sb. **192**, no. 8, 79-94;