

دسترسی در سایت <http://jnrm.srbiau.ac.ir>

سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۹۷

شماره شاپا: ۲۵۸۸-۵۸۸۸

JNRM
JOURNAL OF
NUMERICAL
RINGS AND
MODULES

پژوهش‌های نوین در ریاضی



دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مشخصه‌سازی n -همریختی‌های جردن روی جبرها

عباس زیوری کاظم‌پور^(۱)، اباصلت بداغی^(۲)*

^(۱) استادیار، بروجرد، دانشگاه آیت الله بروجردی، ایران.

^(۲) * دانشیار، گروه ریاضی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول).

(۲)

تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۱۲/۲۲ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۰۱/۲۹

چکیده

در این مقاله، نشان می‌دهیم که هر n -همریختی جردن φ از یک جبر یک‌دگر \mathcal{A} به یک جبر φ -جابجایی \mathcal{B} که در شرط زیر صدق می‌کند، یک n -همریختی است.

$$\varphi(a^2) = 0 \Rightarrow \varphi(a) = 0 \quad (a \in \mathcal{A}).$$

واژه‌های کلیدی: n -همریختی، n -همریختی جردن، جبر.

۱- مقدمه

فرض کنید \mathcal{A} و \mathcal{B} جبرهای مختلط و نگاشت $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ خطی باشد. φ یک n -همریختی نامیده می شود اگر برای هر $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{A}$ داشته باشیم

$$\varphi(a_1 a_2 \dots a_n) = \varphi(a_1) \varphi(a_2) \dots \varphi(a_n)$$

مفهوم n -همریختی روی جبرهای مختلط در مقالات [4]، [7] مطالعه شده است. هرشتاین در [8] مفهوم n -همریختی های جردن را معرفی نمود. در واقع یک نگاشت φ بین جبرهای \mathcal{A} و \mathcal{B} ، n -همریختی جردن نامیده می شود اگر

$$\varphi(a^n) = \varphi(a)^n \quad (a \in \mathcal{A}).$$

برای سادگی یک 2 -همریختی (2 -همریختی جردن) را همریختی (همریختی جردن) می نامیم. واضح است که هر n -همریختی یک n -همریختی جردن می باشد ولی عکس آن درست نیست. مثال هایی از n -همریختی جردن وجود دارد که n -همریختی نیستند. برای حالت $n = 2$ در [9] نشان داده شده بعضی همریختی های جردن روی حلقه های چند جمله ای وجود دارد که همریختی نمی باشند. در [5] نشان داده شده است که هر n -همریختی جردن بین دو جبر باناخ جابجایی یک n -همریختی می باشد که در آن $n \in \{2, 3, 4\}$. لی در [10] و گسلمان در [6] این مسئله را حالتی که n یک عدد طبیعی و دلخواه می باشد تعمیم داده و حل نمودند. اخیرا این چالش توسط بدائی و اینجیز با کمک ماتریس واندرموند در [2] حل شد که روشی متمایز با آنچه در [6] و [10] بود. برای حالت ناجابجایی، زلازکو نتیجه زیر را در [12] ارائه داد (همچنین مقاله [11] را برای روش دیگر ببینید).

قضیه ۱. فرض کنید \mathcal{A} یک جبر باناخ (نه به طور ضروری جابجایی) و \mathcal{B} یک جبر باناخ جابجایی نیم ساده باشند. در این صورت هر همریختی جردن $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ یک همریختی است.

یادآوری می کنیم یک جبر \mathcal{A} نیم ساده است هرگاه رادیکال جاکوبسون \mathcal{A} که اشتراک همه ایده آل های چپ مدولار ماکسیمال \mathcal{A} است، بدیهی باشد، به عبارت دیگر $\text{Rad}(\mathcal{A}) = \{0\}$. نتیجه فوق برای 3 -همریختی

جردن با شرط اضافی یکدار بودن \mathcal{A} در [14] و سپس برای n -همریختی جردن که n یک عدد طبیعی دلخواه می باشد، با همان شرط در [1] به اثبات رسید. همچنین برای هر $n \in \{3, 4\}$ این قضیه بدون شرط یکدار بودن \mathcal{A} و با شرط اضافی زیر در [3] ثابت شد.

$$\varphi(ab^2) = \varphi(b^2a). \quad (a, b \in \mathcal{A}) \quad (۱)$$

برای تمامیت کار مثالی ارایه می دهیم که در شرط (۱) صدق می کند به طوری که جبر \mathcal{A} یکدار نیست.

مثال ۲: فرض کنید

$$\mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} u & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} : u, a, b, c \in \mathbb{C} \right\}.$$

در این صورت \mathcal{A} با ضرب و جمع معمولی و نرم ماتریس ها یک جبر بوده که یکدار و جابجایی نیست. نگاشت $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ را با ضابطه زیر در نظر می گیریم:

$$h \left(\begin{bmatrix} u & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = u$$

برای هر $X \in \mathcal{A}$ داریم $h(X^3) = h(X)^3$. بنابراین h یک 3 -همریختی جردن است. در حقیقت، برای هر

$$X = \begin{bmatrix} u & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{A} \quad \text{داریم:}$$

$$X^3 = \begin{bmatrix} u^3 & u^2a & u^2b + uac \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

پس $h(X^3) = u^3 = h(X)^3$ یعنی h یک 3 -همریختی جردن است. از طرف دیگر برای هر

$$Y = \begin{bmatrix} v & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{A} \quad \text{و} \quad X = \begin{bmatrix} u & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{A}$$

خواهیم داشت:

$$X^2Y = \begin{bmatrix} u^2v & u^2\alpha & u^2\beta + uay \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$YX^2 = \begin{bmatrix} vu^2 & vua & vub + vac \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

در

نتیجه:

$\varphi(a) = \varphi(e)^{n-1}\varphi(a) = \varphi(a)\varphi(e)^{n-1}$.
برهان. فرض کنید φ یک همریختی جردن باشد. برای هر $a \in \mathcal{A}$ داریم:

$$\begin{aligned} \varphi((a+3e)^2 - 2(a+2e)^2 + a^2) &= \varphi(a+3e)^2 - 2\varphi(a+2e)^2 + \varphi a^2 \\ &= \varphi(a+3e)^2 - 2\varphi(a+2e)^2 + \varphi a^2 \end{aligned}$$

طبق فرض داریم $\varphi(e)^2 = \varphi(e)$. رابطه بالا نتیجه می‌دهد که: (۲)

$$2\varphi(a) = \varphi(a)\varphi(e) + \varphi(e)\varphi(a) \quad (a \in \mathcal{A}).$$

از طرف دیگر: (۳)

$$[\varphi(a), \varphi(e)] = \varphi(a)\varphi(e) - \varphi(e)\varphi(a) = 0 \quad (a \in \mathcal{A})$$

از روابط (۲) و (۳) نتیجه می‌شود که:

$$\varphi(a) = \varphi(a)\varphi(e) = \varphi(e)\varphi(a) \quad (a \in \mathcal{A}).$$

برای حالت $n = 3$ داریم: (۴)

$$\begin{aligned} \varphi((a+2e)^3 - 2(a+e)^3 + a^3) &= \varphi(a+2e)^3 - 2\varphi(a+e)^3 + \varphi(a)^3 \end{aligned}$$

چون $\varphi(e)^3 = \varphi(e)$. رابطه (۴) نتیجه می‌دهد که: (۵)

$$3\varphi(a) = \varphi(a)\varphi(e)^2 + \varphi(e)^2\varphi(a) + \varphi(e)\varphi(a)\varphi(e)$$

از φ -جابجایی \mathcal{B} داریم: (۶)

$$\varphi(a)\varphi(e) = \varphi(e)\varphi(a) \quad (a \in \mathcal{A}).$$

از روابط (۵) و (۶) نتیجه می‌شود که:

$$\varphi(a) = \varphi(a)\varphi(e)^2 = \varphi(e)^2\varphi(a).$$

به طور مشابه برای $n \geq 4$ نیز حکم برقرار است.

قضیه ۵. هر همریختی جردن φ از یک جبر یکدار \mathcal{A} به

یک جبر φ -جابجایی \mathcal{B} یک همریختی است اگر

$$\varphi(a^2) = 0 \implies \varphi(a) = 0 \quad (a \in \mathcal{A}). \quad (۷)$$

برهان. فرض کنید φ یک همریختی جردن باشد. برای هر

$a, b \in \mathcal{A}$ داریم: (۸)

$$\varphi(ab + ba) = \varphi(a)\varphi(b) + \varphi(b)\varphi(a).$$

$h(x^2y) = u^2v = vu^2 = h(yx^2)$
 توجه می‌کنیم که برای هر $n \geq 3$ و برای هر $X \in \mathcal{A}$ داریم:
 $h(X^n) = h(X)^n$.

بعضی نتایج قابل توجه و مهم در مورد همریختی جردن و پیوستگی خودکار آنها روی جبرهای باناخ توسط نویسندگان می‌تواند در منابع [13]، [15] و [16] قابل دسترس باشد.

در این مقاله تحت شرایط و فرضیات ویژه نشان می‌دهیم که یک n -همریختی جردن ψ بین جبرهای \mathcal{A} و \mathcal{B} یک n -همریختی است.

برای ساده شدن محاسبات در این نوشتار برای هر دو عنصر a و b ، ما از نماد ضرب لی $[a, b] = ab - ba$ استفاده می‌کنیم. فرض کنید $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ یک نگاشت بین جبرهای \mathcal{A} و \mathcal{B} باشد. گوییم \mathcal{B} ، φ -جابجایی است اگر برای هر $a, b \in \mathcal{A}$ داشته باشیم $[\varphi(a), \varphi(b)] = 0$. توجه کنید که هر جبر جابجایی یک جبر I -جابجایی است که در آن I نگاشت همانی می‌باشد.

مثال ۳: فرض کنید

$$\mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} u & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} : u, a, b, c \in \mathbb{C} \right\} \text{ و}$$

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{C} \right\}$$

نگاشت $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ را با ضابطه زیر در نظر می‌گیریم.

$$\varphi \left(\begin{bmatrix} u & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} u & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

در این صورت \mathcal{B} یک جبر غیر جابجایی بوده که φ -جابجایی است.

نتایج اصلی

در سراسر این مقاله عنصر یکه جبر یکدار \mathcal{A} را با e نمایش می‌دهیم. این بخش را با یک لم اساسی که همواره مورد نیاز است آغاز می‌کنیم.

لم ۴. فرض کنید φ یک n -همریختی جردن از یک جبر یکدار \mathcal{A} به یک جبر φ -جابجایی \mathcal{B} باشد. در این صورت برای هر $a \in \mathcal{A}$ داریم:

$$= \varphi(a) (\varphi(b)\varphi(e)^2)(\varphi(c)\varphi(e)^2) \\ = \varphi(a)\varphi(b)\varphi(c).$$

برای تعمیم قضایای ۵ و ۶ به لم بعدی نیاز داریم که برهان آن در [5] آورده شده است.

لم ۷. فرض کنید \mathcal{A} و \mathcal{B} دو جبر و \mathcal{A} یکدار با عنصر واحد e باشند. اگر $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ یک $-n$ همریختی جردن باشد، در این صورت برای هر $a \in \mathcal{A}$ داریم:

$$\varphi(a^2) = \varphi(a)^2 \varphi(e)^{n-2}.$$

در بخش مقدمه بیان نمودیم اسحاقی گرجی در [5] نشان داد که هر $-n$ همریختی جردن $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ یک $-n$ همریختی است که در آن \mathcal{A} یک جبر باناخ و \mathcal{B} یک جبر باناخ جابجایی نیمه ساده است. در قضیه بعدی، ما شرایط بیان شده روی \mathcal{B} را به ترتیب $-\varphi$ -جابجایی و رابطه (۷) کاهش می دهیم.

قضیه ۸. با شرایط قضیه ۵ هر $-n$ همریختی جردن φ از یک جبر یکدار \mathcal{A} به یک جبر $-\varphi$ -جابجایی \mathcal{B} یک $-n$ همریختی است.

برهان. نگاشت $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ را با ضابطه $f(a) := \varphi(a)\varphi(e)^{n-2}$ برای هر $a \in \mathcal{A}$ تعریف می کنیم. بنابر لم ۷، f یک همریختی جردن و \mathcal{B} یک $-f$ -جابجایی است. از این رو بنابر قضیه ۵، f یک همریختی است و در شرط (۷) صدق می کند. حال از قضیه ۵ و تعریف f نتیجه می شود که: (۱۴)

$$f(a)\varphi(e) = \varphi(a)\varphi(e)^{n-1} = \varphi(a).$$

بنابر لم ۴ و رابطه (۱۴) داریم:

$$\varphi(a_1 a_2 \dots a_n) = f(a_1 a_2 \dots a_n) \varphi(e) = \\ f(a_1) f(a_2) \dots f(a_n) \varphi(e) = \\ (\varphi(a_2) \varphi(e)^{n-1}) \dots (\varphi(a_n) \varphi(e)^{n-1}) \varphi(e) = \\ \varphi(a_1) \varphi(a_2) \dots \varphi(a_n) \varphi(e)^{(n-1)^2} = \\ \varphi(a_1) \varphi(a_2) \dots \varphi(a_n)$$

مثال ۹: فرض کنید φ نگاشت و \mathcal{A} و \mathcal{B} جبرهای مثال ۳ باشند. در این صورت φ یک $-n$ همریختی جردن و به

چون \mathcal{B} یک جبر $-\varphi$ -جابجایی است، (۸) نتیجه می دهد که: (۹)

$$\varphi(ab + ba) = 2\varphi(a)\varphi(b).$$

برای بدست آوردن نتیجه مطلوب کافیست نشان دهیم که $\varphi(ab - ba) = 0$ چون φ یک همریختی جردن است، لذا برای هر $a, b \in \mathcal{A}$

$$\varphi([a, b]^2) = [\varphi(a), \varphi(b)]^2.$$

از طرفی بنابر فرض

$$([a, b]^2) = [\varphi(a), \varphi(b)]^2 = 0 \quad (10)$$

با شرط (۷) از رابطه (۱۰) نتیجه می شود که $\varphi(ab - ba) = 0$ و از این رو رابطه (۹) و تساوی اخیر نتیجه دلخواه را نشان می دهد.

قضیه ۶. هر -3 همریختی جردن φ از یک جبر یکدار \mathcal{A} به یک جبر $-\varphi$ -جابجایی \mathcal{B} که شرط (۷) صادق باشد، یک -3 همریختی است.

برهان. فرض کنید φ یک -3 همریختی جردن باشد. برای هر $a \in \mathcal{A}$ داریم: (۱۱)

$$\varphi((a + e)^3 - a^3) = \varphi(a + e)^3 - \varphi(a)^3$$

چون برای هر $a \in \mathcal{A}$ داریم: $[\varphi(a), \varphi(e)] = 0$ رابطه (۱۱) نشان می دهد که: (۱۲)

$$\varphi(a^2) + 3\varphi(a) + \varphi(e) \\ = 3\varphi(a)^2 \varphi(e) \\ + 3\varphi(a)\varphi(e) + \varphi(e)^3.$$

از رابطه (۱۲) و لم ۴ داریم: (۱۳)

$$\varphi(a^2) = \varphi(a)^2 \varphi(e) \quad a \in \mathcal{A}$$

حال نگاشت $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ را با ضابطه:

$f(a) := \varphi(a)\varphi(e)$ برای هر $a \in \mathcal{A}$ تعریف می کنیم. بنابر رابطه (۱۳) نگاشت f یک همریختی جردن و \mathcal{B} یک $-f$ -جابجایی است. قضیه ۵ نشان می دهد که f یک همریختی و در شرط (۷) صدق می کند. از تعریف f و لم ۴ نتیجه می گیریم که:

$$\varphi(a)\varphi(e) = \varphi(a)$$

و

$$\varphi(abc) = f(abc)\varphi(e) \\ = f(a)f(b)f(c)\varphi(e) \\ = (\varphi(a)\varphi(e))(\varphi(b)\varphi(e))(\varphi(c)\varphi(e))\varphi(e)$$

$$\begin{aligned} \psi(a^k) &= \varphi(a^k)\varphi(e)^{\frac{n-k}{k-1}} \\ &= \varphi(a)^k\varphi(e)^{n-k}\varphi(e)^{\frac{n-k}{k-1}} \\ &= \varphi(a)^k\varphi(e)^{\frac{k}{k-1}(n-k)} = \psi(a)^k. \end{aligned}$$

بنابراین ψ یک k -همریختی جردن است که این برهان را تکمیل می‌کند.

ویژه یک n -همریختی است که در شرط (۷) صدق می‌کند در حالی که \mathcal{A} یک‌دار نیست. همان‌طور که در بخش پیشین متذکر شدیم هر n -همریختی جردن $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ بین دو جبر باناخ جابجایی یک n -همریختی می‌باشد. در پیامد بعدی این نتیجه را با یک شرط ضعیف‌تر یعنی φ -جابجایی روی \mathcal{B} بیان می‌کنیم.

قضیه ۱۰. هر n -همریختی جردن φ از یک جبر جابجایی \mathcal{A} به یک جبر φ -جابجایی \mathcal{B} یک n -همریختی است. علاوه بر آن اگر \mathcal{A} یک‌دار باشد، آن‌گاه نگاشت

$$\psi(a) := \varphi(a)\varphi(e)^{\frac{n-k}{k-1}} \quad (a \in \mathcal{A})$$

یک k -همریختی جردن برای هر $n \geq k + 1$ است.

برهان. اثبات قسمت اول حکم شبیه برهان‌های [1] و [10] است. برای قسمت دوم فرض کنید $k = 2$ و $n \geq 3$. همچنین فرض کنید $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ یک n -همریختی جردن باشد که بنا بر فرض یک n -همریختی است. از این‌رو داریم: (۱۵)

$$\begin{aligned} &\varphi(a_1 a_2 \dots a_n) \\ &= \varphi(a_1)\varphi(a_2) \dots \varphi(a_n) \quad (a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{A}). \end{aligned}$$

با قرار دادن $a_3 = \dots = a_n = e$ و $a_1 = a_2 = a$ در رابطه (۱۵) برای هر $n \geq 3$

$$\begin{aligned} &\varphi(a^2) = \varphi(a)^2\varphi(e)^{n-2} \\ &\text{به طور مشابه برای هر } k \text{ دلخواه و هر } n \geq k + 1, \\ &\text{خواهیم داشت: (۱۶)} \end{aligned}$$

$$\varphi(a^k) = \varphi(a)^k\varphi(e)^{n-k}.$$

فرض کنید $k \geq 2$ دلخواه و $n \geq k + 1$ از تعریف ψ و رابطه (۱۶) نتیجه می‌شود که:

فهرست منابع

- [13] A Zivari - Kazempour, (2014). A characterization of Jordan homomorphism on Banach algebras, Chinese J, Math.
- [14] A Zivari - Kazempour, (2016). A characterization of 3 - Jordan homomorphism on Banach algebras, Bull, Aust, Math.
- [15] A Zivari - Kazempour, (2018). A characterization of Jordan and 5-Jordan homomorphisms between Banach algebras, Asian - European J, Math.
- [16] A Zivari - Kazempour, (2018). Automatic continuity of n - Jordan homomorphisms on Banach algebras, Commun, Korean Math
- [1] G An, (2017). Characterization of n - Jordan homomorphism, Linear and Multilinear algebra.
- [2] A Bodaghi and H Inceboz, (2018). N - Jordan homomorphisms on commutative algebras, Acta, Math, Univ, Comenianae.
- [3] A Bodaghi and H.Inceboz, (2018). Extension of Zelazko's theorem of n - Jordan homomorphisms, Adv, Pure, Appl, Math.
- [4] J.Bracic and M.S Moslehian, (2007). On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras, Bull, Malaysian Math.
- [5] M Eshaghi Gordji, (2009). N - Jordan homomorphisms, Bull, Aust, Math.
- [6] E Gselmann, (2014). On approximate n - Jordan homomorphisms, Annales Math, Silesianae.
- [7] Sh Hejazian, M Mirzavaziri and M.S Moslehian, (2005). N - homomorphisms, Bull. Iranian Math.
- [8] I.N Herstein, (1956). Jordan homomorphisms, Trans. Amer. Math.
- [9] N Jacobson and C.E Rickart, (1950). Jordan homomorphisms of rings, Trans, Amer, Math.
- [10] Y.H Lee, (2013). Stability of n -Jordan homomorphisms from a Normed Algebra to a Banach Algebra.
- [11] T Miura, S.E Takahasi and G Hirasawa, (2005). Hyers – Ulam - Rassias stability of Jordan homomorphisms on Banach algebras.
- [12] W Zelazko, (1968). A characterization of multiplicative linear functionals in complex Banach algebras, Studia Math.