



## ایده‌آل‌های حالت توسعه یافته در $MV$ -جبرهای حالت

فرشته فروزش<sup>۱\*</sup>، زهرا دهقانی پشترودی<sup>۲</sup>، طیبه واعظی زاده<sup>۳</sup>، مهدیه ابراهیم پور<sup>۴</sup>

<sup>(۱)</sup> گروه ریاضی، دانشکده ریاضیات و محاسبات نرم، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

<sup>(۲)</sup> گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

<sup>(۳)</sup> گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

### چکیده

در این مقاله، ابتدا مفهوم ایده‌آل حالت توسعه یافته از  $I$  وابسته به  $B$  در  $MV$ -جبرهای حالت را معرفی می‌کنیم و سپس به بررسی پاره‌ای از ویژگی‌های مربوط به آن‌ها می‌پردازیم. در ادامه، یک قضیه ساختاری از ایده‌آل‌های حالت توسعه یافته در  $MV$ -جبر حالت را بیان می‌کنیم. در پایان، ثابت می‌کنیم کلاس  $S(B)$  مجموعه همه ایده‌آل‌های حالت توسعه یافته پایدار تحدید به  $B \subseteq A$ ، در  $MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$ ، یک مشبکه و یک جبر های‌تینگ است.

واژه‌های کلیدی: ایده‌آل حالت توسعه یافته،  $MV$ -جبر حالت، زنجیر حالت، پایدار.

۱- مقدمه

محققان تحقیقات گسترده‌ای در زمینه  $MV$ -جبرها انجام دادند. آنها مفاهیمی مانند ایده‌آل‌ها را تعریف کردند و انواع ایده‌آل‌ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در ادامه  $MV$ -جبر حالت و ایده‌آل حالت را تعریف کردند. در این مقاله، ابتدا پاره‌ای از مفاهیم اساسی و قضایای مربوطه، به اختصار آورده می‌شود. سپس، مفهوم ایده‌آل حالت توسعه یافته ایده‌آل  $I$  از  $MV$ -جبر  $A$  وابسته به زیرمجموعه  $B$  از  $A$  را معرفی می‌کنیم و یک شرط معادل برای ایده‌آل حالت توسعه یافته وابسته به  $B$  بیان و اثبات می‌کنیم. همچنین نشان می‌دهیم کلاس  $S(B)$  مجموعه همه ایده‌آل‌های حالت توسعه یافته پایدار  $B \subseteq A$  در  $MV$ -جبر  $A$  یک مشبکه و یک جبر هایتینگ است.

۲- پیشینه تحقیق

اولین بار  $MV$ -جبرها، بوسیله چانگ<sup>۱</sup> در سال ۱۹۵۸ معرفی شدند [2]. در واقع آن‌ها یک ساختار جبری از منطق بینهایت ارزشی لوکاسویچ هستند و نظریه آن‌ها بعد از سال ۱۹۸۶ توسعه داده شد [2]. نظریه ایده‌آل‌ها یک نقش اصلی در  $MV$ -جبرها بازی می‌کند و برای مشخص کردن  $MV$ -جبرها مفید است.

۴۰ سال بعد از بوجود آمدن  $MV$ -جبرها، حالت‌ها روی  $MV$ -جبرها بوسیله ماندیسی<sup>۲</sup> مطرح شدند و در جهت اندازه میانگین ارزش درستی گزاره‌ها در منطق لوکاسویچ که تعمیم اندازه احتمال روی جبرهای بولی هستند مورد استفاده قرار گرفتند. [14]

در دهه آخر، نظریه حالت‌ها روی  $MV$ -جبرها و ساختارهای نسبی آن‌ها توسط بسیاری از محققان

مانند: کهر<sup>۳</sup> و ماندیسی [13]، کروپا<sup>۴</sup> [12]، دورانسکیو راجانک<sup>۵</sup> [16]، جورجسکیو<sup>۶</sup> [10] و دیگران مورد مطالعه قرار گرفت. حالت‌ها روی  $MV$ -جبرها، توسط فلامینو<sup>۷</sup> و مونتانا<sup>۸</sup> عمیقاً مورد بررسی قرار گرفتند [8] و [9]. کیونگو<sup>۹</sup> مفهوم  $BL$ -جبر حالت را به عنوان تعمیمی از مفهوم  $MV$ -جبر حالت معرفی کرد [4]. همچنین، آن‌ها یک عمل یکتایی  $\sigma$  روی  $MV$ -جبرها تعریف کردند که خواص عادی حالت‌ها را حفظ می‌کند. مفهوم ایده‌آل‌های توسعه یافته در  $MV$ -جبرها و ویژگی‌های آن‌ها توسط فروزش بررسی شده است [5].

۳- پیش‌نیازها

در این بخش، به معرفی برخی از تعاریف اولیه و قضایایی که در بخش‌های بعدی مورد نیاز است، می‌پردازیم.

تعریف ۱،۳. [2] جبر  $(A, \oplus, *, 0)$  از نوع  $(2, 1, 0)$  یک  $MV$ -جبر است، اگر در شرایط زیر صدق کند:

- (1) یک تکواره آبدی است،  $(A, \oplus, 0)$
- (2)  $(a^*)^* = a$ ،
- (3)  $0^* \oplus a = 0^*$ ،
- (4)  $(a^* \oplus b)^* \oplus b = (b^* \oplus a)^* \oplus a$ .

ثابت ۱ و عمل‌های کمکی  $\odot$  و  $\ominus$  و  $\vee$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

- (1)  $a \odot b = (a^* \oplus b^*)^*$ .
- (2)  $a \ominus b = a \odot b^*$ .

<sup>3</sup> J. Kuhr

<sup>4</sup> A. Kroupa

<sup>5</sup> J. Rachunek

<sup>6</sup> G. Georgescu

<sup>7</sup> T. Flaminio

<sup>8</sup> F. Montagna

<sup>9</sup> L. C. Ciungu

<sup>1</sup> C. C. Chang

<sup>2</sup> D. Mundici

**تعریف ۵.۳.** [3] یک عضو  $x \in A$  دارای مرتبه  $n$  است، اگر  $n$  کوچکترین عدد طبیعی (در صورت وجود) باشد به قسمی که  $nx = 1$  و آن را به صورت  $ord(x) = n$  نشان می‌دهیم. در این حالت گوییم  $x$  دارای مرتبه متناهی است و می‌نویسیم:  $ord(x) \leq \infty$ .

**تعریف ۶.۳.** [15] یک جبر هایتینگ، یک مشبکه  $(A, \wedge, \vee)$  با  $\cdot$  می‌باشد به قسمی که برای هر  $a, b \in A$  عضو  $a \rightarrow b \in A$  موجود باشد به قسمی که برای هر  $x \in A$  اگر  $a \wedge x \leq b$  و تنها اگر  $b \leq a \rightarrow x$  در یک جبر هایتینگ  $A$ ، برای هر  $x \in A$   $x \odot x = x$  از اینرو  $x \odot y = x \wedge y = x \odot (x \rightarrow y)$

**لم ۷.۳.** [15] فرض کنید  $A$  یک جبر هایتینگ باشد. آنگاه برای هر  $x, y, z \in A$  شرایط زیر برقرارند:

- (1)  $1 \rightarrow x = x, x \rightarrow x = 1.$
- (2)  $x \rightarrow (y \rightarrow z) = (x \odot y) \rightarrow z = y \rightarrow (x \rightarrow z).$
- (3)  $x \rightarrow (y \wedge z) = (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow z)$

**تعریف ۸.۳.** [5] فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل از  $MV$ -جبر  $A$  و  $B \subseteq A$  باشد. ایده‌آل توسعه یافته از  $I$  وابسته به  $B$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:  
 $E_I(B) = \{x \in A \mid x \wedge b \in I, \forall b \in B\}$

اگر  $a \in A$ ،  $E_I(\{a\})$  را به صورت  $E_I(a)$  نمایش می‌دهیم.

**تعریف ۹.۳.** [3] فرض کنید  $M$  و  $N$  دو  $MV$ -جبر باشند.  $f: M \rightarrow N$  را یک همریختی  $MV$ -جبر گویند، اگر برای هر  $x, y \in M$  شرایط زیر برقرار باشند:

- (1)  $f(0) = 0.$

$$(3) 1^* = 0.$$

$$(4) a \wedge b = a \odot (a^* \oplus b) = b \odot (b^* \oplus a) \\ a \vee b = a \oplus (a^* \odot b) = b \oplus (a \odot b^*).$$

**تعریف ۲.۳.** [3] اگر  $L = (L, \wedge, \vee, 0, 1)$  یک مشبکه کراندار باشد. یک عضو  $a \in L$  را متمم‌دار گوییم، اگر یک  $b \in L$  موجود باشد بطوریکه دو شرط  $a \wedge b = 0$  و  $a \vee b = 1$  را داشته باشد. مجموعه تمامی عضوهای متمم‌دار  $L$  را با  $B(L)$  نشان می‌دهیم.

**لم ۳.۳.** [3] در هر  $MV$ -جبر  $A$ ، برای هر  $x, y \in A$  شرایط زیر برقرارند:

- (1)  $x, y \leq x \oplus y$  و  $x \leq nx = x \oplus x \oplus \dots \oplus x.$
- (2)  $x \odot y^* = 0$  اگر و تنها اگر  $x \leq y$ .
- (3)  $y \in A$ ، آنگاه برای هر  $x \in B(A)$  اگر  $x \wedge y = x \odot y.$
- (4) آنگاه  $x \oplus z \leq y \oplus t$  اگر  $x \leq y$  و  $z \leq t.$
- (5)  $x \wedge (x_1 \oplus \dots \oplus x_n) \leq (x \wedge x_1) \oplus \dots \oplus (x \wedge x_n)$
- (6)  $nx \wedge my \leq nm(x \wedge y).$
- (7)  $(x \odot y^*) \wedge (y \odot x^*) = 0.$

جاییکه  $B(A)$  مجموعه‌ی تمامی عناصر متمم‌دار  $A$  می‌باشد بطوریکه  $L(A)$  مشبکه توزیع پذیر با  $0$  و  $1$  در  $A$  می‌باشد.

**تعریف ۴.۳.** [2] فرض کنید  $I$  یک زیر مجموعه غیر تهی از  $A$  باشد.  $I$  را یک ایده‌آل از  $A$  گوئیم اگر و تنها اگر در شرایط زیر صدق کند:

- (1)  $0 \in I.$
- (2) آنگاه  $x \oplus y \in I$  اگر  $x, y \in I.$
- (3) آنگاه  $y \in A$  و  $x \in I$  اگر  $y \leq x.$

مجموعه تمام ایده‌آل‌های یک  $MV$ -جبر  $A$  را با  $Id(A)$  نشان می‌دهیم.

$$(a]_{\sigma} = \{x \in A \mid x \leq n(a \oplus \sigma(a)), n \geq 1\}$$

**تعریف ۱۵،۳.** [7] یک ایده‌آل حالت سره  $P$  از  $(A, \sigma)$  یک ایده‌آل حالت اول نامیده می‌شود اگر برای  $a, b \in A$  بطوریکه  $(a \oplus \sigma(a)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in P$ .

نتیجه شود  $a \in P$  یا  $b \in P$ .

**قرارداد.** مجموعه تمام ایده‌آل‌های حالت اول از  $(A, \sigma)$  را با  $Spec_{\sigma}(A)$  نشان می‌دهیم.

**نکته ۱۶،۳.** [7] فرض کنید  $I$  و  $J$  ایده‌آل‌های حالت از  $(A, \sigma)$  باشند. قرار می‌دهیم

$$I \wedge J = I \cap J$$

$$I \vee J = (I \cup J]_{\sigma} = \{x \in A \mid x \leq a \oplus c, \exists a \in I, c \in J\}.$$

**تعریف ۱۷،۳.** [6] ایده‌آل حالت سره  $I$  از  $(A, \sigma)$  را ایده‌آل حالت سرسخت گویند، اگر  $x, y \notin I$  و نتیجه شود  $\sigma(x) \odot \sigma(y)^* \in I$  و  $\sigma(y) \odot \sigma(x)^* \in I$  برای هر  $x, y \in A$ .

**قضیه ۱۸،۳.** [6] فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت سرسخت از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه  $I$  یک ایده‌آل حالت ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  است.

**تعریف ۱۹،۳.** [6] ایده‌آل حالت  $I$  از  $(A, \sigma)$  را ایده‌آل حالت بولی گویند، اگر  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (x^* \oplus \sigma(x^*)) \in I$ .

**قضیه ۲۰،۳.** [6] فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت اول و بولی از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه  $I$  یک ایده‌آل حالت سرسخت از  $(A, \sigma)$  است.

**تعریف ۲۱،۳.** [7] اگر  $I$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد، در این صورت اشتراک همه ایده‌آل‌های

$$(2) f(x \oplus y) = f(x) \oplus f(y),$$

$$(3) f(x^*) = (f(x))^*.$$

**تعریف ۱۰،۳.** [8] یک  $MV$ -جبر حالت، یک جفت  $(A, \sigma)$  است بطوریکه  $A$  یک  $MV$ -جبر است و  $\sigma: A \rightarrow A$  یک عمل یکتایی به روی  $A$  است که برای هر  $x, y \in A$  در شرایط زیر صدق می‌کند:

$$(1) \sigma(1) = 1,$$

$$(2) \sigma(x^*) = \sigma(x)^*.$$

$$(3) \sigma(x \oplus y) = \sigma(x) \oplus \sigma(y \ominus (x \odot y)).$$

$$(4) \sigma(\sigma(x) \oplus \sigma(y)) = \sigma(x) \oplus \sigma(y)$$

**لم ۱۱،۳.** [8] در یک  $MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$ ، برای هر  $x, y \in A$  ویژگی‌های زیر برقرار است:

$$(1) \sigma(x \oplus y) \leq \sigma(x) \oplus \sigma(y)$$

$$(2) \sigma(\sigma(x)) = \sigma(x)$$

$$(3) \sigma(x) \leq \sigma(y) \text{ آنگاه } x \leq y$$

$$(4) \sigma(\sigma(x) \odot \sigma(y)) = \sigma(x) \odot \sigma(y)$$

**تعریف ۱۲،۳.** [8] یک ایده‌آل حالت از  $MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$ ، یک  $MV$ -ایده‌آل بسته تحت  $\sigma$  است. مجموعه‌ی ایده‌آل‌های حالت از  $(A, \sigma)$  را با  $I_{\sigma}(A)$  نشان می‌دهیم.

**تعریف ۱۳،۳.** [8] یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  یک ایده‌آل حالت ماکسیمال نامیده می‌شود اگر اکیداً مشمول هیچ ایده‌آل حالت سره‌ای از  $(A, \sigma)$  نباشد. مجموعه‌ی ایده‌آل‌های حالت ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  را با  $ML_{\sigma}(A)$  نشان می‌دهیم.

**لم ۱۴،۳.** [7] فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت باشد و  $B$  یک مجموعه ناتهی از  $A$  باشد، آنگاه ایده‌آل حالت تولید شده توسط  $B$  را به این صورت نشان می‌دهیم:

$$[B]_{\sigma} = \{x \in A \mid x \leq n_1(b_1 \oplus \sigma(b_1)) \oplus \dots \oplus n_k(b_k \oplus \sigma(b_k)), b_i \in B, n_i \geq 1, k \geq 1\}$$

تعریف ۲۸،۳. [6]  $MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$  را زنجیر حالت گوئیم، اگر برای هر  $x, y \in A$   $\sigma(x) \leq \sigma(y)$  یا  $\sigma(y) \leq \sigma(x)$ .

۴- ایده‌آل‌های حالت توسعه یافته در  $MV$ -جبرهای حالت

در ادامه، فرض کنید  $A$  یک  $MV$ -جبر باشد. در این بخش، به معرفی ایده‌آل حالت توسعه یافته  $I$  وابسته به زیرمجموعه  $B$  از  $A$  می‌پردازیم و برخی از ویژگی‌های آنرا را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

قضیه ۱،۴. فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت از  $MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$  و  $B \subseteq A$  باشد. آنگاه مجموعه  $E_I^\sigma(B) = \{x \in A \mid (x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)), \in I, \forall b \in B\}$

یک ایده‌آل حالت از  $(A, \sigma)$  است به قسمی که  $I \subseteq E_I^\sigma(B)$

برهان. فرض کنید  $x, y \in E_I^\sigma(B)$  لذا برای هر  $b \in B$  نتیجه می‌شود

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I \text{ و } (y \oplus \sigma(y)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I.$$

آنگاه بنا به

$$\begin{aligned} & \text{لم ۱۱،۳ (۱) و لم ۳،۳ (۱) و (۵) و (۶)، داریم:} \\ & ((x \oplus y) \oplus \sigma(x \oplus y)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \leq \\ & (x \oplus y \oplus \sigma(x) \oplus \sigma(y)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \\ & \leq ((x \oplus \sigma(x)) \oplus (y \oplus \sigma(y))) \oplus \\ & (x \oplus \sigma(x)) \oplus (y \oplus \sigma(y)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \\ & = 2((x \oplus \sigma(x)) \oplus (y \oplus \sigma(y))) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \\ & \leq 2(((x \oplus \sigma(x)) \oplus (y \oplus \sigma(y))) \wedge (b \oplus \sigma(b))) \\ & \leq 2(((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b))) \oplus \\ & ((y \oplus \sigma(y)) \wedge (b \oplus \sigma(b)))) \in I \end{aligned}$$

در نتیجه  $x \oplus y \in E_I^\sigma(B)$  اگر  $x, y \in E_I^\sigma(B)$  و  $x \leq y$  آنگاه

حالت ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  شامل  $I$  را رادیکال حالت  $I$  تعریف می‌کنند و آن را با  $Rad_\sigma(I)$  نمایش می‌دهند.

قضیه ۲۲،۳. [7] فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $I \in I_\sigma(A)$  باشد. آنگاه  $Rad_\sigma(I) = \{x \in A \mid n\sigma(x) \odot \sigma(x) \in I, \forall n \geq 1\}$

تعریف ۲۳،۳. [7] فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد. در این صورت اگر  $Rad_\sigma(I) = I$  آنگاه  $I$  را یک ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  گویند.

تعریف ۲۴،۳۶. [1] فرض کنید  $(A, \tau)$  و  $(B, \sigma)$  دو  $MV$ -جبر حالت باشند آنگاه  $f: A \rightarrow B$  را یک  $MV$ -همریختی حالت گوئیم اگر  $f$  همریختی  $MV$ -جبری باشد و برای هر  $x \in A$   $f(\tau(x)) = \sigma(f(x))$

لم ۲۵،۳. [7] فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $a, b \in A$  باشند. آنگاه شرایط زیر برقرارند:

- (1)  $[a]_\sigma \subseteq [b]_\sigma$ ، آنگاه  $a \leq b$  اگر (1)
- (2)  $(\sigma(a))_\sigma \subseteq [a]_\sigma$ ،
- (3)  $(a \oplus \sigma(a))_\sigma = [a]_\sigma$ ،
- (4)  $[a]_\sigma \cap [b]_\sigma = ((a \oplus \sigma(a)) \wedge (b \oplus \sigma(b)))_\sigma$ ،
- (5)  $[a]_\sigma \vee [b]_\sigma = (a \oplus b)_\sigma$ .

گزاره ۲۶،۳. [7] اگر  $I_1, I_2 \in I_\sigma(A)$  آنگاه  $I_1 \hookrightarrow_\sigma I_2 = \{x \in A \mid I_1 \cap (x)_\sigma \subseteq I_2\}$

یک ایده‌آل حالت از  $(A, \sigma)$  است.

گزاره ۲۷،۳. [7] فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت باشد. آنگاه  $(I_\sigma(A), \cap, \vee, \hookrightarrow_\sigma, \{0\}, A)$  یک جبر هایپتینگ است.

$\odot$	$0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$1$
$0$	$0$	$0$	$0$	$0$	$0$	$0$
$a$	$0$	$a$	$0$	$a$	$0$	$a$
$b$	$0$	$0$	$0$	$0$	$b$	$b$
$c$	$0$	$a$	$0$	$a$	$b$	$c$
$d$	$0$	$0$	$b$	$b$	$d$	$d$
$1$	$0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$1$

آنگاه  $(A, \oplus, *, 0, 1)$  یک  $MV$ -جبر است [11].

نگاشت  $\sigma$  روی  $A$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\sigma(x) = \begin{cases} 0 & x = 0, b, d \\ 1 & x = 1, c, a \end{cases}$$

به راحتی می‌توان بررسی کرد که  $(A, \sigma)$  یک

$MV$ -جبر حالت و  $I = \{0, b, d\}$  یک ایده‌آل

حالت از  $(A, \sigma)$  می‌باشد و

$$E_I^\sigma(\{a, c\}) = I.$$

گزاره ۴،۴. فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر

حالت باشد،  $I, J \in I_\sigma(A)$  و  $B, C \subseteq A$ . آنگاه

شرایط زیر برقرارند:

(1)  $E_I^\sigma(C) \subseteq E_I^\sigma(B)$  آنگاه  $B \subseteq C$  اگر

(2)  $E_I^\sigma(B) \subseteq E_J^\sigma(B)$  آنگاه  $I \subseteq J$  اگر

(3)  $E_I^\sigma(B) = A$  اگر و تنها اگر  $B \subseteq I$ .

(4)  $B \subseteq E_I^\sigma(E_I^\sigma(B))$ .

(5)  $E_I^\sigma(J) \cap J = I$  آنگاه  $I \subseteq J$  اگر

(6)  $E_I^\sigma(E_I^\sigma(B)) \cap E_I^\sigma(B) = I$ .

(7)  $E_I^\sigma(B) = I$  آنگاه  $1 \in B$  اگر

(8)  $E_I^\sigma(B) = E_I^\sigma([B]_\sigma)$ .

برهان. (۱)-(۷) مشابه قضیه ۷،۳. در مقاله [5] (۸)

چون  $B \subseteq [B]_\sigma$  لذا بنا به قسمت (۱) داریم

$$E_I^\sigma([B]_\sigma) \subseteq E_I^\sigma(B)$$

اکنون فرض کنید  $x \in E_I^\sigma(B)$  در این صورت برای هر  $b \in B$  داریم:

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$$

و فرض کنید  $y \in [B]_\sigma$  در نتیجه بنا به لم ۱۴،۳،

$b_i \in B$  و  $n_i \geq 1$  و  $k \geq 1$  وجود دارند به‌قسمی که

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \leq (y \oplus \sigma(y)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$$

لذا  $x \in E_I^\sigma(B)$  اکنون، فرض کنید  $x \in E_I^\sigma(B)$

آنگاه بنا به لم ۱۱،۳ (۲) و لم ۳،۳ (۱) و (۶)، داریم:

$$(\sigma(x) \oplus \sigma(\sigma(x))) \wedge (b \oplus \sigma(b)) = 2\sigma(x) \wedge (b \oplus \sigma(b))$$

$$\leq 2(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b))$$

$$\leq 2((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b))) \in I,$$

$$\forall b \in B.$$

در نتیجه  $\sigma(x) \in E_I^\sigma(B)$  بنابراین

$$E_I^\sigma(B) \in I_\sigma(A) \text{ حال، اگر } x \in I \text{ آنگاه}$$

$$x \oplus \sigma(x) \in I \text{ در نتیجه برای هر } b \in B$$

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$$

$$x \in E_I^\sigma(B).$$

$$I \subseteq E_I^\sigma(B) \text{ بنابراین}$$

تعریف ۲،۴. فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت از

$MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$  باشد به قسمی که  $B \subseteq A$ .

مجموعه  $E_I^\sigma(B)$  را ایده‌آل حالت توسعه یافته از  $I$

وابسته به  $B$  گویند. اگر  $a \in A$ ،  $E_I^\sigma(\{a\})$  را به

صورت  $E_I^\sigma(a)$  نمایش می‌دهیم.

مثال ۳،۴. فرض کنید  $A = \{0, a, b, c, d, 1\}$

جاییکه  $0 < b < d < 1$  و  $0 < a, b < c < 1$ .

عمل‌های  $\odot$  و  $\oplus$  و  $*$  را به صورت زیر تعریف

می‌کنیم:

$*$	$0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$1$
	$0$	$d$	$c$	$b$	$a$	$0$

$\oplus$	$0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$1$
$0$	$0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$1$
$a$	$a$	$a$	$c$	$c$	$1$	$1$
$b$	$b$	$c$	$d$	$1$	$d$	$1$
$c$	$c$	$c$	$1$	$1$	$1$	$1$
$d$	$d$	$1$	$d$	$1$	$d$	$1$
$1$	$1$	$1$	$1$	$1$	$1$	$1$

آنگاه بنا به قسمت (۳) داریم  $E_I^\sigma(a) = I$  و چون داریم  $(a \oplus \sigma(a)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$  یعنی  $b \in E_I^\sigma(a)$  در نتیجه  $I \in Spec_\sigma(A)$

**قضیه ۶،۴.** فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $I$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه شرایط زیر معادلند:

- (1)  $I \in ML_\sigma(A)$ ,
- (2)  $E_I^\sigma(B) \in ML_\sigma(A)$  یا  $E_I^\sigma(B) = A$  برای هر  $B \subseteq A$ .

**برهان.** (1)  $\Rightarrow$  (2) فرض کنید  $E_I^\sigma(B) \neq A$  آنگاه  $I \subseteq E_I^\sigma(B) \neq A$  و چون  $I \in ML_\sigma(A)$  در نتیجه

$$E_I^\sigma(B) = I \in ML_\sigma(A)$$

(1)  $\Rightarrow$  (2) فرض کنید  $B = \{1\}$  آنگاه بنا به گزاره ۴،۴ (۷) و فرض داریم  $I = E_I^\sigma(1) \in ML_\sigma(A)$ .

**گزاره ۷،۴.** فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $\{J_i\}_{i \in I}, J \in I_\sigma(A)$  ،  $\{B_i\}_{i \in I} \subseteq A$  باشد. آنگاه

- (1)  $E_J^\sigma(\cup_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} E_J^\sigma(B_i)$ .
- (2)  $E_{\cap_{i \in I} J_i}^\sigma(B) = \cap_{i \in I} E_{J_i}^\sigma(B)$ .

**لم ۸،۴.** فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $I, J, K \in I_\sigma(A)$  باشد. آنگاه

- (1)  $E_I^\sigma(J) \cap J \subseteq I$ .
- (2)  $J \cap K \subseteq I$  اگر و تنها اگر  $K \subseteq E_I^\sigma(J)$ .

**برهان.** (۱) فرض کنید  $x \in E_I^\sigma(J) \cap J$  آنگاه  $x \in J$  و  $x \in E_I^\sigma(J)$  لذا برای هر  $b \in J$  نتیجه می‌شود.

$$y \leq n_1(b_1 \oplus \sigma(b_1)) \oplus \dots \oplus n_k(b_k \oplus \sigma(b_k)) = \bigoplus_{1 \leq i \leq k} n_i(b_i \oplus \sigma(b_i))$$

آنگاه بنا به لم ۱۱،۳ (۱) و (۲) و لم ۳،۳ (۱) و (۵) و (۶) داریم:

$$\begin{aligned} (x \oplus \sigma(x)) \wedge (y \oplus \sigma(y)) &\leq (x \oplus \sigma(x)) \wedge (\bigoplus_{1 \leq i \leq k} n_i(b_i \oplus \sigma(b_i)) \oplus (\bigoplus_{1 \leq i \leq k} 2n_i \sigma(b_i))) \\ &\leq ((x \oplus \sigma(x)) \wedge (\bigoplus_{1 \leq i \leq k} n_i(b_i \oplus \sigma(b_i)))) \\ &\oplus ((x \oplus \sigma(x)) \wedge (\bigoplus_{1 \leq i \leq k} 2n_i \sigma(b_i))) \\ &\leq \bigoplus_{1 \leq i \leq k} n_i((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b_i \oplus \sigma(b_i))) \\ &\oplus (\bigoplus_{1 \leq i \leq k} 2n_i((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b_i \oplus \sigma(b_i)))) \in I \end{aligned}$$

لذا  $x \in E_I^\sigma((B)_\sigma)$  بنابراین  $E_I^\sigma(B) = E_I^\sigma((B)_\sigma)$

**قضیه ۵،۴.** فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $I$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه شرایط زیر معادلند:

- (1)  $I \in Spec_\sigma(A)$ ,
- (2)  $E_I^\sigma(B) = A$  یا  $E_I^\sigma(B) = I$  برای هر  $B \subseteq A$ .
- (3)  $E_I^\sigma(a) = I$  برای هر  $a \in A \setminus I$ .

**برهان.** (1)  $\Rightarrow$  (2) فرض کنید  $E_I^\sigma(B) \neq I$  و  $x \in E_I^\sigma(B) \setminus I$  بنا براین برای هر  $b \in B$   $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$

بنا به تعریف ۱۵،۳، برای هر  $b \in B$  پس  $B \subseteq I$  آنگاه از گزاره ۴،۴ (۳) نتیجه می‌شود  $E_I^\sigma(B) = A$

(2)  $\Rightarrow$  (3) فرض کنید  $a \in A \setminus I$  از گزاره ۴،۴ (۳) نتیجه می‌شود  $E_I^\sigma(a) \neq A$  بنا براین بنا به قسمت (۲) داریم  $E_I^\sigma(a) = I$

(3)  $\Rightarrow$  (1) فرض کنید  $a, b \in A$  بطوریکه  $a \notin I$  و  $(a \oplus \sigma(a)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$

$$\begin{aligned} &(((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b))) \oplus \\ &\sigma((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)))) \\ &\wedge (b' \oplus \sigma(b')) \in I \end{aligned}$$

در نظر می‌گیریم  $b' = b$  و برای هر  $b \in B$  بنا به لم ۳،۳ (۱)، داریم:

$$\begin{aligned} &\left( \left( (x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \right) \oplus \right. \\ &\left. \sigma \left( (x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \right) \right) \wedge \\ &(b' \oplus \sigma(b')) \geq \left( (x \oplus \sigma(x)) \wedge \right. \\ &\left. (b \oplus \sigma(b)) \right) \wedge (b \oplus \sigma(b)) = \\ &(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I \end{aligned}$$

در نتیجه  $x \in E_I^\sigma(B)$  لذا  $E_{E_I^\sigma(B)}^\sigma(B) \subseteq E_I^\sigma(B)$  و در نتیجه  $E_{E_I^\sigma(B)}^\sigma(B) = E_I^\sigma(B)$  بنابراین  $E_I^\sigma(B)$  پایدار تحدید به  $B$  است.

اکنون، فرض کنید  $J$  یک ایده‌آل پایدار تحدید به  $B$  باشد بطوریکه  $I \subseteq J$  از گزاره ۴،۴ (۲) نتیجه می‌شود که  $E_I^\sigma(B) \subseteq E_J^\sigma(B) = J$

**نکته.** یادآوری می‌کنیم اگر  $I, J$  ایده‌آل‌های  $MV$ -جبر  $A$  باشند به قسمی که  $I \wedge J := I \cap J, I \vee := (I \cup J)$  مشبکه کامل توزیع پذیر است [15].

**نتیجه ۱۱،۴.** بنا به لم ۱۰،۴، داریم  $E_I^\sigma(B)$  یک ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $B$  است. از اینرو هر ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $B$  در  $S(B)$  قرار دارد، جاییکه  $S(B) = \{E_I^\sigma(B) \mid I \in I_\sigma(A)\}$  برای تمام عضوهای  $E_I^\sigma(B), E_J^\sigma(B) \in S(B)$  عمل‌های  $\Pi$  و  $\sqcup$  را به صورت  $E_I^\sigma(B) \Pi E_J^\sigma(B) = E_{I \wedge J}^\sigma(B)$  و  $E_I^\sigma(B) \sqcup E_J^\sigma(B) = E_{I \vee}^\sigma(B)$  (سوپریمم) یا  $E_{I \wedge J}^\sigma(B)$  (اینفیمم) می‌کنیم. جاییکه  $E_{I \wedge J}^\sigma(B)$  (یا  $E_{I \vee}^\sigma(B)$ ) اینفیمم (سوپریمم) از  $\{E_I^\sigma(B), E_J^\sigma(B)\}$  در  $S(B)$  می‌باشد. نشان می‌دهیم که  $E_{I \vee}^\sigma(B)$  سوپریمم از

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I .$$

در نظر می‌گیریم  $b = x$ ، داریم  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (x \oplus \sigma(x)) \in I$  از اینرو  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (x \oplus \sigma(x)) \in I$  در نتیجه بنا به ویژگی ایده‌آل  $x \in I$  بنابراین  $E_I^\sigma(J) \cap J \subseteq I$

(۲) فرض کنید  $x \in K$  و  $J \cap K \subseteq I$  آنگاه برای هر  $b \in J$ ، داریم  $(b \oplus \sigma(b)) \in J$  و  $(x \oplus \sigma(x)) \in K$ . طبق ویژگی مینیمم داریم  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \leq x \oplus \sigma(x), b \oplus \sigma(b)$

و چون  $J$  و  $K$  ایده‌آل هستند. پس

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in J \cap K .$$

آنگاه برای هر  $b \in J$  نتیجه می‌شود.

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I .$$

از اینرو  $x \in E_I^\sigma(J)$  یعنی  $K \subseteq E_I^\sigma(J)$ . اکنون، فرض کنید  $K \subseteq E_I^\sigma(J)$  طبق قسمت (۱)، داریم  $J \cap K \subseteq J \cap E_I^\sigma(J) \subseteq I$ .

**تعریف ۹،۴.** ایده‌آل حالت  $I$  پایدار تحدید به زیرمجموعه  $B$  از  $A$  نامیده می‌شود، اگر  $I = E_I^\sigma(B)$

**لم ۱۰،۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه  $E_I^\sigma(B)$  کوچکترین ایده‌آل پایدار تحدید به زیرمجموعه  $B$  از  $A$  است بطوریکه  $I \subseteq E_I^\sigma(B)$

**برهان.** بنا به گزاره ۱،۴، داریم  $E_I^\sigma(B) \subseteq E_{E_I^\sigma(B)}^\sigma(B)$  برعکس، فرض کنید  $x \in E_{E_I^\sigma(B)}^\sigma(B)$  آنگاه برای هر  $b \in B$  داریم

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in E_I^\sigma(B) .$$

از اینرو برای هر  $b' \in B$  داریم:



برهان.

(۱) بنا به گزاره ۴,۴ (۳) و چون  $I \subseteq I$  نتیجه می‌شود  $E_I^\sigma(I) = A$ . همچنین چون  $\{0\} \subseteq I$ ، همانند قبل  $E_I^\sigma(0) = A$ .  
 (۲) بنا به گزاره ۴,۴ (۴)، داریم  $B \subseteq E_I^\sigma(E_I^\sigma(B))$  و بنا به گزاره ۴,۴ (۱)، نتیجه می‌شود  $E_I^\sigma(E_I^\sigma(E_I^\sigma(B))) \subseteq E_I^\sigma(B)$ .

حال نشان می‌دهیم

$$E_I^\sigma(B) \subseteq E_I^\sigma(E_I^\sigma(E_I^\sigma(B))).$$

فرض کنید  $x \in E_I^\sigma(B)$  آنگاه برای هر  $b \in B$  داریم:

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I.$$

بنا به گزاره ۴,۴ (۴) چون  $B \subseteq E_I^\sigma(E_I^\sigma(B))$ ، لذا  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$

برای هر  $b \in E_I^\sigma(E_I^\sigma(B))$  در نتیجه  $x \in E_I^\sigma(E_I^\sigma(E_I^\sigma(B)))$ .

$$E_I^\sigma(B) = E_I^\sigma(E_I^\sigma(E_I^\sigma(B)))$$
 بنابراین

**قضیه ۱۳,۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد و  $B$  زیرمجموعه  $A$ ، آنگاه  $E_I^\sigma(B) \cap B \subseteq I$

**برهان.** فرض کنید  $x \in E_I^\sigma(B) \cap B$  آنگاه  $x \in B$  و  $x \in E_I^\sigma(B)$  لذا برای هر  $b \in B$  داریم:

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I.$$

برای  $b = x \in B$  نتیجه می‌شود

$$x \oplus \sigma(x) = (x \oplus \sigma(x)) \wedge (x \oplus \sigma(x)) \in I$$

$E_I^\sigma(B)$  و  $E_J^\sigma(B)$  در  $S(B)$  است. بنا به گزاره ۴,۴ (۲)، داریم  $E_I^\sigma(B), E_J^\sigma(B) \subseteq E_{I \vee J}^\sigma(B)$ . برای هر ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $B$  مانند  $E_K^\sigma(B)$ ، بطوریکه  $E_I^\sigma(B), E_J^\sigma(B) \subseteq E_K^\sigma(B)$  ثابت می‌کنیم:

$$E_{I \vee J}^\sigma(B) \subseteq E_K^\sigma(B).$$

فرض کنید  $x \in E_{I \vee J}^\sigma(B)$  آنگاه برای هر  $b \in B$  داریم  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I \vee J$ . لذا  $a \in I \subseteq E_I^\sigma(B)$  و  $c \in J \subseteq E_J^\sigma(B)$  وجود دارند بطوریکه  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \leq a \oplus c$  در نتیجه برای هر  $b \in B$  داریم:

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in E_I^\sigma(B) \vee E_J^\sigma(B) \subseteq E_K^\sigma(B).$$

لذا بنا به لم ۱۰,۴،  $x \in E_{E_K^\sigma(B)}^\sigma(B) = E_K^\sigma(B)$ ، یعنی  $E_{I \vee J}^\sigma(B)$  سوپریمومی از  $\{E_I^\sigma(B), E_J^\sigma(B)\}$  در  $S(B)$  است.

همچنین بنا به نکته قبل چون  $(A, \wedge, \vee)$  مشبکه کامل توزیع پذیر است، لذا داریم:

$$\begin{aligned} E_I^\sigma(B) \sqcap (E_J^\sigma(B) \sqcup E_K^\sigma(B)) &= \\ E_I^\sigma(B) \sqcap (E_{J \vee K}^\sigma(B)) &= \\ = E_{I \wedge (J \vee K)}^\sigma(B) &= \\ = E_{(I \wedge J) \vee (I \wedge K)}^\sigma(B) &= \\ = E_{I \wedge J}^\sigma(B) \sqcup E_{I \wedge K}^\sigma(B) &= \\ = (E_I^\sigma(B) \sqcap E_J^\sigma(B)) \sqcup (E_I^\sigma(B) \sqcap E_K^\sigma(B)). \end{aligned}$$

بنابراین  $(S(B), \sqcap, \sqcup)$  یک مشبکه توزیع پذیر است.

**نتیجه ۱۲,۴.** اگر  $I \in I_\sigma(A)$  و  $B \subseteq A$ ، آنگاه شرایط زیر برقرارند:

- (1)  $E_I^\sigma(I) = E_I^\sigma(0) = A$ .
- (2)  $E_I^\sigma(B) = E_I^\sigma(E_I^\sigma(E_I^\sigma(B)))$ .

$$E_{f(I)}^\sigma(B') = f(E_I^\tau(A')) = f(I).$$

فرض کنید  $x \in f(E_I^\tau(A'))$  آنگاه  $t \in E_I^\tau(A')$  وجود دارد به قسمی که  $x = f(t)$  لذا برای هر  $a \in A'$  داریم

$$(t \oplus \tau(t)) \wedge (a \oplus \tau(a)) \in I.$$

از اینرو برای هر  $b = f(a) \in B'$  داریم:

$$\begin{aligned} (x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) &= (f(t) \oplus \sigma(f(t))) \wedge (f(a) \oplus \sigma(f(a))) \\ &= (f(t) \oplus f(\tau(t))) \wedge (f(a) \oplus f(\tau(a))) \\ &= f(t \oplus \tau(t)) \wedge f(a \oplus \tau(a)) \\ &= f((t \oplus \tau(t)) \wedge (a \oplus \tau(a))) \in f(I). \end{aligned}$$

در نتیجه  $x \in E_{f(I)}^\sigma(B')$  برعکس، فرض کنید  $x \in E_{f(I)}^\sigma(B')$  چون  $f$  پوشاست،  $s \in A$  وجود دارد به قسمی که  $f(s) = x$  لذا داریم:

$$\begin{aligned} x \in E_{f(I)}^\sigma(B') &\Leftrightarrow (x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in f(I), \forall b \in B' \\ &\Leftrightarrow (f(s) \oplus f(\tau(s))) \wedge (f(a') \oplus f(\tau(a'))) \in f(I), a' \in A' \\ &\Leftrightarrow f((s \oplus \tau(s)) \wedge (a' \oplus \tau(a'))) = f(t), \exists t \in I, \forall a' \in A' \\ &\Leftrightarrow ((s \oplus \tau(s)) \wedge (a' \oplus \tau(a'))) \odot t^* \in Ker(f) \subseteq I, t \in I, \forall a' \in A' \\ &\Leftrightarrow (s \oplus \tau(s)) \wedge (a' \oplus \tau(a')) \leq t \vee ((s \oplus \tau(s)) \wedge (a' \oplus \tau(a'))) \\ &= t \oplus (t^* \odot ((s \oplus \tau(s)) \wedge (a' \oplus \tau(a')))) \in I, \forall a' \in A' \\ &\Leftrightarrow (s \oplus \tau(s)) \wedge (a' \oplus \tau(a')) \in I, \forall a' \in A' \\ &\Leftrightarrow s \in E_I^\tau(A'), \\ &\Leftrightarrow x \in f(E_I^\tau(A')). \end{aligned}$$

بنابراین  $f(I)$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $B'$  به  $B'$  است.

نتیجه ۱۶،۴. فرض کنید  $(A, \tau)$  و  $(D, \sigma)$  دو  $MV$ -جبر حالت و  $f: A \rightarrow D$  یک  $MV$ -همریختی

بنا به لم ۳،۳ (۱)، داریم  $x \leq x \oplus \sigma(x)$  و بنا به ویژگی ایده‌آل داریم  $x \in I$  بنابراین  $E_I^\sigma(B) \cap B \subseteq I$

$$E_{\{0\}}^\sigma(B) \cap B = \{0\}. \text{نتیجه ۱۴،۴.}$$

گزاره ۱۵،۴. فرض کنید  $(A, \tau)$  و  $(B, \sigma)$  دو  $MV$ -جبر حالت و  $f: A \rightarrow B$  یک  $MV$ -همریختی حالت باشد بطوریکه  $f(A') = B'$ ، جایکه  $A'$  و  $B'$  به ترتیب زیرمجموعه‌های  $A$  و  $B$  هستند.

آنگاه شرایط زیر برقرارند:

(۱) اگر  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $B'$  به  $B'$  باشد، آنگاه  $f^{-1}(I)$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $A'$  است.

(۲) اگر  $f$  پوشا باشد،  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $A'$  به  $A'$  و  $Ker(f) \subseteq I$  باشد، آنگاه  $f(I)$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $B'$  به  $B'$  است.

برهان. (۱) فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $B'$  به  $B'$  باشد. آنگاه  $I = E_I^\sigma(B')$  کافی است نشان دهیم

$$\begin{aligned} f^{-1}(I) &= f^{-1}(E_I^\sigma(B')) = E_{f^{-1}(I)}^\tau(A'). \\ x \in E_{f^{-1}(I)}^\tau(A') &\Leftrightarrow (x \oplus \tau(x)) \wedge (a \oplus \tau(a)) \in f^{-1}(I), \forall a \in A' \\ &\Leftrightarrow f((x \oplus \tau(x)) \wedge (a \oplus \tau(a))) \in I, \forall a \in A' \\ &\Leftrightarrow (f(x) \oplus f(\tau(x))) \wedge (f(a) \oplus f(\tau(a))) \in I, \forall a \in A' \\ &\Leftrightarrow (f(x) \oplus \sigma(f(x))) \wedge (f(a) \oplus \sigma(f(a))) \in I, \forall a \in A' \\ &\Leftrightarrow (f(x) \oplus \sigma(f(x))) \wedge (f(b) \oplus \sigma(b)) \in I, \forall b \in B' \\ &\Leftrightarrow f(x) \in E_I^\sigma(B') \\ &\Leftrightarrow x \in f^{-1}(E_I^\sigma(B')). \end{aligned}$$

(۲) فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار  $B'$  به  $B'$  باشد. بوضوح،  $f(I)$  یک ایده‌آل حالت از  $B'$  است. کافی است نشان دهیم که

است. در نتیجه بنا به قضیه ۱۸،۴،  $I$  پایدار تحدید به  $B$  است.

مثال زیر نشان می‌دهد هر ایده‌آل حالت پایدار از  $(A, \sigma)$  ممکن است یک ایده‌آل حالت سرسخت از  $(A, \sigma)$  نباشد.

**مثال ۲۰،۴.** فرض کنید  $A = \{0, a, b, 1\}$ ، جایگه  $0 < a, b < 1$ ، عمل‌های  $\odot$ ،  $\oplus$  و  $*$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$\odot$	0	a	b	1
0	0	0	0	0
a	0	a	0	a
b	0	0	b	b
1	0	a	b	1

$\oplus$	0	a	b	1
0	0	a	b	1
a	a	a	1	1
b	b	1	b	1
1	1	1	1	1

$*$	0	a	b	1
0	1	b	a	0

آنگاه  $(A, \oplus, *, 0, 1)$  یک  $MV$ -جبر است [15]. اکنون نگاهی به روی  $A$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\sigma(x) = \begin{cases} 1 & x = 1 \\ b & x = a \\ a & x = b \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

به راحتی می‌توان بررسی کرد که  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $I = \{0\}$  یک ایده‌آل حالت پایدار از  $(A, \sigma)$  می‌باشد چون  $b = b \odot b = a = a \odot a$  و  $\sigma(a) \odot \sigma(b)^* \notin I$  و  $\sigma(b) \odot \sigma(a)^* \notin I$  از اینرو  $I$  ایده‌آل حالت سرسخت از  $(A, \sigma)$  نمی‌باشد.

حالت پوشا باشد. آنگاه  $E_{Ker(f)}^{\tau}(B) = C \subseteq D$  بطوریکه  $f(B) = C$  برای  $f^{-1}(E_{\{0\}}^{\sigma}(C))$  بطوریکه  $f(B) = C$ .

**گزاره ۱۷،۴.** اگر  $I$  یک ایده‌آل حالت اول و  $E_I^{\sigma}(B)$  ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد، آنگاه  $I$  پایدار تحدید به  $B$  است.

**برهان.** فرض کنید  $I$  پایدار تحدید به  $B$  نباشد. آنگاه  $E_I^{\sigma}(B) \neq I$  و بنا به قضیه ۱،۴،  $x \in E_I^{\sigma}(B)$  وجود دارد به قسمی که  $x \notin I$  از اینرو برای هر  $b \in B$  داریم  $(x \oplus \sigma(x)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) \in I$  چون  $I$  ایده‌آل حالت اول است لذا  $b \in I$  در نتیجه  $B \subseteq I$  بنا به گزاره ۴،۴ (۳)، نتیجه می‌شود  $E_I^{\sigma}(B) = A$  این یک تناقض است. بنابراین  $E_I^{\sigma}(B) = I$ .

**قضیه ۱۸،۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت ماکسیمال و  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد، آنگاه  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت ماکسیمال و  $I$  پایدار تحدید به  $B$  است.

**برهان.** بنا به قضیه ۴،۱، نتیجه می‌شود  $I \subseteq E_I^{\sigma}(B)$  چون  $I$  یک ایده‌آل حالت ماکسیمال و  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  است، لذا نتیجه می‌شود  $I = E_I^{\sigma}(B)$ .

**قضیه ۱۹،۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت سرسخت و  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد، آنگاه  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت سرسخت و  $I$  پایدار تحدید به  $B$  است.

**برهان.** بنا به قضیه ۱،۴ چون  $I \subseteq E_I^{\sigma}(B)$  و بنا به تعریف ۱۷،۳، واضح است  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت سرسخت است. فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت سرسخت از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه بنا به قضیه ۱۸،۳،  $I$  یک ایده‌آل حالت ماکسیمال از  $(A, \sigma)$

**مثال ۲۵،۴.** در مثال ۲۰،۴، نگاشت  $\sigma$  روی  $A$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\sigma(x) = \begin{cases} 1 & x = 1, a \\ 0 & x = 0, b \end{cases}$$

به راحتی می‌توان بررسی کرد که  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -جبر حالت و  $I = \{0, b\}$  یک ایده‌آل حالت از  $(A, \sigma)$  و  $Rad_{\sigma}(I) = I$  است. از اینرو  $I$  یک ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  است اما  $I$  پایدار تحدید به  $B = \{a\}$  نیست چون برای  $a \in B$  داریم:

$$(1 \oplus \sigma(1)) \wedge (a \oplus \sigma(a)) = 1 \wedge 1 = 1 \notin I$$

**قضیه ۲۶،۴.** فرض کنید  $B \subseteq C$  و  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $B$  باشد. آنگاه  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $C$  است.

**برهان.** چون  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $B$  است، داریم  $I = E_I^{\sigma}(B)$ . در نتیجه بنا به قضیه ۱،۴ و گزاره ۴،۴ (۱)، داریم

$$I \subseteq E_I^{\sigma}(C) \subseteq E_I^{\sigma}(B) = I.$$

لذا نتیجه می‌شود  $I$  یک ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $C$  است.

**لم ۲۷،۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت و  $B$  زیر مجموعه‌ای از  $A$  باشد. آنگاه در جبر هایتینگ  $(I_{\sigma}(A), \cap, \vee, \hookrightarrow_{\sigma}, \{0\}, A)$  داریم

$$E_I^{\sigma}(B) = (B]_{\sigma} \hookrightarrow_{\sigma} I.$$

**برهان.** نشان می‌دهیم برای ایده‌آل حالت  $I$  و زیر مجموعه  $B$  از  $A$ ،  $E_I^{\sigma}(B) = (B]_{\sigma} \hookrightarrow_{\sigma} I$  فرض کنید  $x \in E_I^{\sigma}(B)$  ثابت می‌کنیم  $x \in (B]_{\sigma} \hookrightarrow_{\sigma} I$ .

**قضیه ۲۱،۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت اول و بولی،  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت سره از  $(A, \sigma)$  باشد، آنگاه  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت بولی و  $I$  پایدار تحدید به  $B$  است.

**برهان.** چون  $I$  یک ایده‌آل حالت بولی است و  $I \subseteq E_I^{\sigma}(B)$  بنا به تعریف ۱۹،۲، داریم  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت بولی است. فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت اول و بولی از  $(A, \sigma)$  باشد. آنگاه بنا به قضیه ۲۰،۳،  $I$  یک ایده‌آل حالت سرسخت از  $(A, \sigma)$  است. در نتیجه بنا به قضیه ۱۹،۴،  $I$  پایدار تحدید به  $B$  است.

**نتیجه ۲۲،۴.**  $x^* \in E_I^{\sigma}(B)$  اگر و تنها اگر  $I$  یک ایده‌آل حالت بولی از  $(A, \sigma)$  باشد.

مثال زیر نشان می‌دهد هر ایده‌آل حالت پایدار از  $(A, \sigma)$  ممکن است یک ایده‌آل حالت بولی از  $(A, \sigma)$  نباشد.

**مثال ۲۳،۴.** در مثال ۳،۳، به راحتی می‌توان ثابت کرد که  $I = \{0\}$  یک ایده‌آل حالت پایدار تحدید به  $B = \{b, c, d\}$  است اما  $I$  ایده‌آل حالت بولی از  $(A, \sigma)$  نیست چون

$$(c \oplus \sigma(c)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) = b \notin I.$$

**قضیه ۲۴،۴.** فرض کنید  $I$  یک ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  باشد، آنگاه  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال است.

**برهان.** چون  $I$  یک ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال است و  $I \subseteq E_I^{\sigma}(B)$  بنا به تعریف ۲۳،۳، داریم  $E_I^{\sigma}(B)$  یک ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال است.

مثال زیر نشان می‌دهد هر ایده‌آل حالت نیمه ماکسیمال از  $(A, \sigma)$  ممکن است یک ایده‌آل حالت پایدار از  $(A, \sigma)$  نباشد.

لم ۲۸،۳. یک  $MV$ -جبر حالت  $(A, \sigma)$  زنجیر حالت است اگر و تنها اگر برای  $x, y \in A$

$$(x \oplus \sigma(x)) \wedge (y \oplus \sigma(y)) = 0$$

آنگاه  $\sigma(x) = 0$  یا  $\sigma(y) = 0$ .

برهان. فرض کنید  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -زنجیر حالت و برای  $x, y \in A$  بنا به تعریف  $MV$ -زنجیر حالت داریم  $\sigma(x) \leq \sigma(y)$  یا  $\sigma(y) \leq \sigma(x)$ . در نتیجه  $\sigma(x) = 0$  یا  $\sigma(y) = 0$ . برعکس، برای هر  $x, y \in A$  نشان می‌دهیم  $\sigma(x) \leq \sigma(y)$  یا  $\sigma(y) \leq \sigma(x)$ .

در نظر می‌گیریم  $a = \sigma(x) \odot \sigma(y)^*$  و  $b = \sigma(y) \odot \sigma(x)^*$ . بنا به لم ۱۱،۳ (۴)، داریم  $\sigma(a) = a$  و  $\sigma(b) = b$  همچنین بنا به لم ۳،۳ (۶) و (۷)، داریم:

$$(a \oplus \sigma(a)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) = 2a \wedge 2b \leq 4(a \wedge b) = 0$$

در نتیجه

$$(a \oplus \sigma(a)) \wedge (b \oplus \sigma(b)) = 0.$$

بنا به فرض، داریم  $a = \sigma(a) = 0$  یا  $b = \sigma(b) = 0$ . در نتیجه  $\sigma(x) \odot \sigma(y)^* = 0$  یا  $\sigma(y) \odot \sigma(x)^* = 0$ . لذا بنا به لم ۳،۳ (۲)، نتیجه می‌شود  $\sigma(x) \leq \sigma(y)$  یا  $\sigma(y) \leq \sigma(x)$ . بنابراین  $(A, \sigma)$  یک  $MV$ -زنجیر حالت است.

قضیه ۲۹،۴.  $(S(B), \Pi, \sqcup, E_{\{0\}}^\sigma(B), A)$  یک جبر های‌تینگ است.

برهان. برای هر  $E_I^\sigma(B), E_J^\sigma(B), E_K^\sigma(B) \in S(B)$  کافی است نشان دهیم:

لذا کافی است ثابت کنیم  $(B]_\sigma \cap (x]_\sigma \subseteq I$ . فرض کنید  $t \in (B]_\sigma \cap (x]_\sigma$ ، آنگاه بنا به لم ۱۴،۳  $n_i \geq 1$  و  $k \geq 1$  و  $n \geq 1$  وجود دارند به قسمی که

$$t \leq n_1(b_1 \oplus \sigma(b_1)) \oplus \dots \oplus n_k(b_k \oplus \sigma(b_k))$$

$$و$$

$$t \leq n(x \oplus \sigma(x)).$$

بنا به لم ۳،۳ (۵)، داریم:

$$t = t \wedge t \leq (n_1(b_1 \oplus \sigma(b_1)) \oplus \dots \oplus n_k(b_k \oplus \sigma(b_k))) \wedge n(x \oplus \sigma(x))$$

$$\leq (n(x \oplus \sigma(x)) \wedge n_1(b_1 \oplus \sigma(b_1))) \oplus \dots \oplus (n(x \oplus \sigma(x)) \wedge n_k(b_k \oplus \sigma(b_k)))$$

چون  $x \in E_I^\sigma(B) \in I_\sigma(A)$  لذا بنا به ویژگی ایده‌آل و لم ۳،۳ (۶)، داریم:

$$n(x \oplus \sigma(x)) \wedge n_i(b_i \oplus \sigma(b_i)) \leq nn_i((x \oplus \sigma(x)) \wedge (b_i \oplus \sigma(b_i))) \in I$$

لذا

$$n(x \oplus \sigma(x)) \wedge n_i(b_i \oplus \sigma(b_i)) \in I.$$

$$(1 \leq i \leq k).$$

در نتیجه  $t \in I$  لذا  $(B]_\sigma \cap (x]_\sigma \subseteq I$  و داریم  $E_I^\sigma(B) \subseteq (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I$ . از اینرو بنا به لم ۲۵،۳ (۴)، برای هر  $b \in B$  داریم:

$$\left( (b \oplus \sigma(b)) \wedge (x \oplus \sigma(x)) \right]_\sigma = (b]_\sigma \cap (x]_\sigma \subseteq (B]_\sigma \cap (x]_\sigma \subseteq I.$$

در نتیجه برای هر  $b \in B$  داریم

$$(b \oplus \sigma(b)) \wedge (x \oplus \sigma(x)) \in I$$

$$و$$

$$x \in E_I^\sigma(B).$$

لذا  $(B]_\sigma \cap (x]_\sigma \subseteq E_I^\sigma(B)$ . بنابراین در جبر های‌تینگ  $I_\sigma(A)$  داریم  $E_I^\sigma(B) = (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I$

$$\begin{aligned} (1) E_I^\sigma(B) \hookrightarrow_\sigma E_J^\sigma(B) \in S(B) \\ (2) E_I^\sigma(B) \sqcap E_J^\sigma(B) \subseteq E_K^\sigma(B) \Leftrightarrow \\ E_I^\sigma(B) \subseteq E_J^\sigma(B) \hookrightarrow_\sigma E_K^\sigma(B) \end{aligned}$$

بنا به گزاره ۲۷،۳ و لم‌های ۲۷،۴ و ۷،۳ (۲)، داریم:

$$\begin{aligned} E_I^\sigma(B) \hookrightarrow_\sigma E_J^\sigma(B) &= \\ ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I) \hookrightarrow_\sigma ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma J) &= \\ (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I) \hookrightarrow_\sigma J) &= \\ = ((B]_\sigma \odot ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I)) \hookrightarrow_\sigma J &= \\ = ((B]_\sigma \wedge I) \hookrightarrow_\sigma J &= \\ = ((B]_\sigma \odot I) \hookrightarrow_\sigma J &= \\ = (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (I \hookrightarrow_\sigma J) \in S(B). \end{aligned}$$

بنا به گزاره ۲۷،۳ و لم‌های ۲۷،۴ و ۷،۳ (۳) و (۱)،

داریم:

$$\begin{aligned} E_I^\sigma(B) \sqcap E_J^\sigma(B) \subseteq E_K^\sigma(B) \\ \Leftrightarrow E_{I \wedge J}^\sigma(B) \subseteq E_K^\sigma(B) \\ \Leftrightarrow (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (I \wedge J) \subseteq (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma K \\ \Leftrightarrow (B]_\sigma \wedge ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (I \wedge J))) \subseteq K \\ \Leftrightarrow (B]_\sigma \wedge I \wedge J \subseteq K \\ \Leftrightarrow (B]_\sigma \wedge I \subseteq J \hookrightarrow_\sigma K \\ \Leftrightarrow (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma ((B]_\sigma \wedge I) \subseteq \\ (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (J \hookrightarrow_\sigma K) \\ \Leftrightarrow ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (B]_\sigma) \wedge ((B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I) \subseteq \\ (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (J \hookrightarrow_\sigma K) \\ \Leftrightarrow (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma I \subseteq (B]_\sigma \hookrightarrow_\sigma (J \hookrightarrow_\sigma K) \\ \Leftrightarrow E_I^\sigma(B) \subseteq E_J^\sigma(B) \hookrightarrow_\sigma E_K^\sigma(B) \end{aligned}$$

بنابراین  $S(B)$  مجموعه همه ایده‌آل‌های حالت

پایدار تحدید به  $B$ ، جبر های‌تینگ است.

[11] A. Iorgulescu, Algebras of logic as  $BCK$ -algebras, Academy of economic studies Bucharest, Romania, (2008).

[12] A. Kroupa, Every state on semisimple  $MV$ -algebra is integral. Fuzzy Sets Syst, 157 (2006), 2771-2782.

[13] J. Kuhr, D. Mundici, De Finetti theorem and Borel states in  $[0, 1]$ -valued algebraic logic. Int J Approx Reason, 46 (1986), 15-63.

[14] D. Mundici, Averaging the truth value in Lukasiewicz sentential logic. Studia Logica, 55 (1995), 113-127.

[15] D. Piciu. Algebras of fuzzy logic, Ed. Universitaria Craiova (2007).

[16] J. Rachunek, D. Salounova, State operators on  $MV$ -algebras, Soft Comput, 15 (2011), 327-334.

## فهرست منابع

[1] محمد سالار بارده، ایده‌آل‌های سرسخت  $n$ -لایه در  $MV$ -جبرها، پایان نامه ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، (۱۳۹۵).

[2] C. C. Chang, Algebraic analysis of many valued logic, *Trans. Amer. Math. Soc.*, (1958), 467-490.

[3] R. Cignoli, I. M. L. D'Ottaviano, D. Mundici, *Algebraic Foundations of Many-Valued Reasoning*, Kluwer Academic, Dordrecht, (2000).

[4] L. C. Ciungu, A. Dvurecenskij, M. Hycko, State  $BL$ -algebras, *Soft Comput.*, 15 (2011), 619-634.

[5] F. Forouzesh, Extended ideals in  $MV$ -algebras, Submitted.

[6] F. Forouzesh, A. Darijani, Some classes of state ideals in state  $MV$ -algebras, *Eurasian Mathematical journal*, 10 (2019), 37-48.

[7] F. Forouzesh, State radical of state ideals in state  $MV$ -algebras, Submitted.

[8] T. Flaminio, F. Montagna, An algebraic approach to states on  $MV$ -algebras. In: Novak V (ed) *Fuzzy Logic 2*, proceedings of the 5<sup>th</sup> EUSFLAT conference, September 1114, Ostrava, Vol II (2007), pp 201-206.

[9] T. Flaminio, F. Montagna,  $MV$ -algebras with internal states and probabilistic fuzzy logic. *Int J Approx Reason*, 50 (2009), 138-152.

[10] G. Georgescu, Bosbach states on fuzzy structures. *Soft Comput*, 8 (2004), 217-230.

