



مقاله اصلی

مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم

تاریخ دریافت: ۸۷/۹/۴ - تاریخ پذیرش: ۸۸/۳/۱۸

خلاصه

مقدمه

سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن یک معضل بهداشتی- اجتماعی در کشورهای خاورمیانه نظیر ایران می باشد. قاچاقچیان ممکن است سرب را به مواد مخدر در طی تولید مواد مخدر اضافه نمایند، که این کار به منظور افزایش وزن آن جهت منافع بیشتر می باشد. علاوه بر این وجود علایم غیراختصاصی بسیاری در وابستگان به مواد مخدر علایم مسمومیت با سرب را تقلید می کند. گزارش‌های محدودی از مسمومیت سرب ناشی از مصرف مواد مخدر وجود دارند، ولی در محدوده بررسی متابع پزشکی در دسترس، این اولین مطالعه می باشد که به مقایسه سطح سرب خون در وابستگان به مواد مخدر با افراد سالم پرداخته است. بنابر این هدف اصلی این مطالعه، مقایسه سطح سرمی سرب خون افراد وابسته به مواد مخدر با گروه سالم می باشد.

روش کار

این مطالعه مورد-شاهدی در مرکز ترک اعتیاد بیمارستان مرادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۸۶ و ۸۷ انجام شده است، سطح سرب خون در ۴۴ نمونه در دو گروه مورد و شاهد با میانگین سنی $38/8 \pm 6/7$ بررسی شد. گروه مورد شامل افرادی بودند (۲۲ نفر) که مواد مخدر خوراکی مصرف می کردند. گروه کنترل (۲۲ نفر) از نظر سن و جنس با گروه مورد با توجه به معیارهای خروج، همسان سازی شدند. اطلاعات هر گروه در پرسشنامه ثبت شد و توسط آزمون تی تست و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

نتایج

در این مطالعه سطح سرمی سرب خون در ۴۴ نمونه اندازه گیری شد. سطح سرمی سرب خون در گروه مورد ($69/90 \mu\text{g}/\text{dl}$) با میانگین $6/20 \pm 21/9$ و در گروه کنترل ($17/4 \pm 4/1$) با میانگین $3/5 \pm 8/6$ بود. اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود ($p < 0.0001$). در گروه مورد BLL ارتباط معناداری با میزان مصرف مواد مخدر داشت ($p < 0.01$ ، $R = 0.65$). گرچه ارتباط معناداری بین طول مدت مصرف و سطح سرمی سرب خون دیده نشد.

نتیجه گیری

نتایج این بررسی افزایش قابل ملاحظه سطح سرمی سرب خون را در وابستگان به مواد مخدر در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. بنابراین غربالگری غلظت سرب خون در افراد وابسته به مواد مخدر خصوصاً با شکایات غیراختصاصی مفید می باشد.

کلمات کلیدی: مواد مخدر، سطح سرمی سرب، مردان

- ^۱ حسین صالحی*
- ^۲ احمد رضا صیادی
- ^۳ رقیه زارع
- ^۴ نرگس سلطانپور
- ^۵ آیدین حسین پور

۱- استادیار جراحی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۲- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۳- ۴- دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۵- پژوهش عمومی، مشاور آماری بیمارستان حضرت فاطمه (س)، تهران، ایران

*رفسنجان - دانشگاه علوم پزشکی، گروه جراحی، رفسنجان، ایران
فاکس: +۹۸-۳۹۱۸۲۲۰۰۲۲

email: hosseinsalehi@yahoo.com

مقدمه

سرب فلز سنگینی است که در طبیعت یافت می شود و می تواند باعث مسمومیت حاد یا مزمن شود (۱، ۲). مهمترین منابع در معرض سرب قرار گرفتن آلودگی های صنعتی، خاک ها، دود ماشین ها و غذاهای آلوده می باشند. تماس با سرب از طریق هر کدام از این منابع از طریق خوراکی، استنشاقی یا تماس پوستی می تواند باعث مسمومیت شود. تطاهرات مسمومیت با سرب غیر اختصاصی می باشد، که شامل: درد شکمی غیر اختصاصی، یبوست، تحریک پذیری، درد عضلاتی، سردرد، بی اشتہایی، کاهش میل جنسی، اختلالات تمرکز وغیره می باشد. درد شکمی غیر اختصاصی در این موارد می تواند با کوله سیستیت، پانکراتیت و شکم حاد اشتباه شود. در این موارد ممکن است بررسی های گوارشی و حتی اعمال جراحی غیر ضروری انجام شود (۳). در سالهای اخیر، با افزایش سطح ایمنی شغلی بروز مسمومیت با سرب ناشی از شغل کاهش یافته است. اما گزارشات متعدد یافته های مسمومیت با سرب را در وابستگان به اپیوم گزارش کرده اند (۴-۸).

سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن یک معضل بهداشتی-اجتماعی در کشورهای متعدد نظر ایران می باشد (۹). علاوه بر این وجود علایم غیراختصاصی سیاری در وابستگان به مواد مخدر علایم مسمومیت با سرب را تقلید می کند. بنابر این بررسی سطح سرب خون (BLL^۱) وابستگان به مواد مخدر ضروری به نظر می رسد. این مطالعه، به بررسی سطح سرب خون در دو گروه وابسته و شاهد برای درک تفاوت BLL در این دو گروه پرداخته است.

روش کار

در این مطالعه مورد-شاهدی که به صورت مقطعی انجام شده است، سطح سرب خون در ۴۴ نمونه در دو گروه مورد و شاهد در مرکز ترک اعتیاد بیمارستان مرادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۸۶ و ۸۷ بررسی شد. گروه مورد شامل ۲۲ بیمار بودند که مواد مخدر خوراکی مصرف می کردند. گروه مورد به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از بین ۲۲۵ وابسته انتخاب شدند. گروه کنترل نیز ۲۲ نفر بودند که هیچ سابقه ای از اعتیاد نداشتند و نظر سن و جنس با گروه مورد با توجه به معیارهای خروج تعیین شده، همسان سازی شدند.

با استفاده از پرسشنامه تمامی اطلاعات هردو گروه شامل اطلاعات دموگرافیک، وضعیت سلامت و نحوه زندگی جمع آوری شد. مجوز انجام این پژوهش از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در تاریخ ۱۴/۴/۲۳ ۸۶ اخذ شد و رضایت کتبی شرکت در طرح از تمایم شرکت کنندگان گرفته شد و افرادی که در کارخانجات باطری سازی کار می کردند، یا مشاغلی مانند لحیم کاری، سیم کشی، سفال سازی، مهمات سازی، رادیات سازی و رنگ سازی داشتند از طرح خارج شدند (۱۰، ۲). برای ارزیابی سطح سرب خون، ۵ میلی لیتر خون وریدی از گروه های مورد مطالعه در لوله های استریل مخصوص خون (حاوی EDTA به عنوان ماده ضد انعقاد) جمع آوری گردید. Atomic absorbtion spectrophotometry GBCavanta توسط دستگاه spectrophotometry ارزیابی شد. در این روش بعد از جداسازی سرم از خون، پروتئین های موجود در سرم به وسیله TCA^۲ جدا شدند و محلول حاصل به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ شد و محلول شفاف حاصل داخل دستگاه جذب اتمی تزریق گردید و پس از کالیبراسیون دستگاه سطح سرب اندازه گیری شد (۱۱).

تمامی اطلاعات توسط آزمون تی تست و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. ارتباط بین سطح BLL و میزان مصرف ماده مصرفی از طریق آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

در این مطالعه BLL در ۴۴ نمونه اندازه گیری شد. گروه مورد (افراد وابسته) شامل ۲۲ مرد ۵۰-۲۶ ساله با میانگین سنی ۳۸/۸±۶/۷، با سابقه ۵-۲ ساله از اعتیاد می شد. گروه کنترل (افراد سالم) از نظر سن و جنس با گروه مورد همسان سازی شدند. BLL در گروه مورد $\mu\text{g}/\text{dl}$ ۶۹/۹۰ - ۷/۲ با میانگین ۱۳/۲ و در گروه کنترل $4/1-17/4$ با میانگین $8/6\pm 3/5$ بود. میانگین BLL در گروه کنترل بیشتر از گروه شاهد بود که تفاوت بین این دو گروه از نظر آماری معنی دار بود ($t=4/56$ ($p=4/0001$)). تشخیص مسمومیت با سرب بر پایه ارزیابی سطح سرب خون بیشتر از $25 \mu\text{g}/\text{dl}$ می باشد (۱۲) (جدول ۱). بر این اساس ۹ نفر (۴۰٪) بیماران سطح توکسیک داشتند اما BLL بالاتر از $25 \mu\text{g}/\text{dl}$ در گروه شاهد یافت نشد (جدول ۲).

² Trichloroacetic acid

¹ Blood lead level

طور کلی هیچگونه ماده ای را به مواد مخدر اضافه ننماید. در مجموع نتایج این بررسی افزایش قابل ملاحظه BLL را در بیماران وابسته به مواد مخدر در مقایسه با گروه کنترل نشان داد، بنابراین غربالگری غلط سرب خون در افراد وابسته به مواد مخدر خصوصاً با شکایات غیراختصاصی می‌تواند مفید باشد و همچنین مطالعات مشابهی در گروه‌های بزرگتر در وابسته به مواد مخدر (شامل خوراکی و استنشاقی) برای تایید این تفاوت مشخص، پیشنهاد می‌شود.

تشکر و قدردانی

از شورای پژوهشی و کمیته اخلاق و کلیه افرادی که در این مطالعه همکاری کردند نهایت سپاس و تشکر می‌گردد.

References:

- 1-Lochitch G. Perspectives on lead toxicity. Clin Biochem 1993; 26:371-381.
- 2-US Department of Health and Human Services. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Lead. Atlanta:GA, Public Health Service; 1999.p.587.
- 3-Fischbein A. Occupational and environmental exposure to lead. In: Rom WN, ed. Environmental and Occupational Medicine. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.p.973.
- 4- Chia BL, Leng CK, Hsii FP, Yap MH, Lee YK. Lead poisoning from contaminated opium. Br Med J 1973; 1:354.
- 5-Beattie AD, Mullin PJ, Baxter RH, Moore MR. Acute lead poisoning: an unusual cause of hepatitis. Scott Med J 1979; 24: 318 – 321.
- 6-Fitzsimons EJ, Dagg JH. Lead poisoning in a drug addict. The intravenous injection of suppository extracts. Br J Clin Pract 1982; 36:284 – 285.
- 7- Parras F, Patier JL, Ezpeleta C. Lead-contaminated heroin as a source of inorganic-lead intoxication. N Engl J Med 1987; 316:755.
- 8-D'Alessandro-Gandolfo L, Macri A, Biolcati G, Rossi F, Cirelli A, Barlattani A, et al. An unusual mechanism of lead poisoning. Presentation of a case. Recenti Prog Med 1989; 80: 140–141.
- 9-Momtazi S. Family and addiction. Zanjan: Mahdis; 2003.p.1-5.
- 10- Centers for Disease Control (CDC) and Prevention: Potential risk for lead exposure in dental offices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001; 50: 873 – 874.
- 11- NIOSH, Manual of Analytical Methods [NMAM], 4th ed.1
- 12- Masoodi M, Zali MR, Ehsani-Ardakani MJ, Mohammad-Alizadeh AH, Aiassofi K, Aghazadeh R, et al. Abdominal pain due to lead-contaminated opium: a new source of inorganic lead poisoning in Iran. Arch Iran Med 2006; 9:72-75
- 13- Farzin L, Amir M , Shams H. Blood levels of lead, cadmium, and mercury in residents of Tehran biol. Biol Trace Elel Res 2008; 123:14–26.
- 14- Abdollahi M, Shohruti M, Nikfar Sh, Jalili N. Monitoring of lead poisoning in bus drivers of Tehran. Iran J Med Sci 1995; 20:29-33
- 15- Abdollahi M, Ebrahimimehr M, Nikfar Sh, Jalili N. Monitoring of lead poisoning in simple workers of a copying center by flame atomic absorption spectroscopy .Med J Islam Repub Iran 1996; 10:69-72.
- 16- Abdollahi M, Sadeghi A, Jalali N. Lead toxicity of employees of paint factory. Med J Islam Repub Iran 1996; 16:203-206.
- 17- Algora M, Martin-Castillo A, Zabala P, Fernandez MN. Lead poisoning due to drug addiction: a new source of poisoning with clinical interest and important epidemiological consequences [in Spanish]. An Med Interna 1989; 6:483 – 485.
- 18- Beattie AD, Briggs JD, Canavan JS, Doyle D, Mullin PJ, Watson AA. Acute lead poisoning: five cases resulting from self-injection of lead and opium. Q J Med 1975; 44:275 – 284.
- 19- Antonini G, Palmieri G, Millefiorini E, Spagnoli LG, Millefiorini M. Lead poisoning during heroin addiction. Ital J Neurol Sci 1989; 10:105–108.
- 20- Aghaei-Afshar M, Khazaeli P, Behnam B, Rezazadehkermani M, Ashraf-Ganjooei N. Presence of lead in opium. Arch Iran Med 2008; 11:553-554.
- 21- Kebriaeezadeh A, Abdollahi M, Sharif zadeh M. BLL of residents of different areas in Tehran city. Pajohandeh(Persian journal)1997; 5:67-72.
- 22- Wolf C, Binder R, Barth A, Konnaris C, Rudiger HW. Chronic anemia and abdominal pain as a sequela of lead poisoning [in German]. Dtsch Med Wochenschr 2001; 126:556– 558.
- 23- Dequanter D, Lefebvre JC, Takieddine M, Belva P, Vaneukem P. An acute pseudo-cholecystitis [in French]. Rev Med Brux 2001; 22:439 - 441.
- 24- Anderson NR, Gama R, Kapadia S. Herbal remedy poisoning presenting with acute abdomen and raised urine porphyrins. Ann Clin Biochem 2001; 38:408 - 410.

غیراختصاصی در بیماران وابسته به مواد مخدر بالا می‌باشد (۲۲-۲۴). به نظر می‌رسد که شاید سطح بالای BLL بتواند وجود این یافته‌ها را در افراد وابسته به مواد مخدر توجیه کند. بنابراین غربالگری غلط سرب خون در افراد وابسته به مواد مخدر خصوصاً با شکایات غیراختصاصی می‌تواند مفید باشد. هیچ ارتباط مشخصی بین BLL با طول مدت مصرف مواد مخدر در گروه مورد مشاهده نشده که این مورد با توجه به نیمه عمر ۳۶ روزه سرب و طول مدت مصرف مواد مخدر در بیماران (حداقل دو سال) قابل انتظار می‌باشد (۱۳).

البته در تعمیم دادن این یافته‌ها باید بسیار محاط بود زیرا افزایش BLL در این بیماران بستگی به میزان آلودگی مواد مخدر به سرب دارد و از طرف دیگر فروشنده‌گان مواد مخدر ممکن است مواد مخدر را به غیر از موادی مثل سرب آلوده نمایند یا به