



مقاله اصلی

بررسی علل مراجعه به اورژانس بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء مشهد

«مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

تاریخ دریافت: ۸۸/۳/۱۰ - تاریخ پذیرش: ۸۸/۶/۲۵

خلاصه

مقدمه

اورژانس‌های چشم پزشکی یکی از شایعترین مشکلات در بخش‌های اورژانس می‌باشد اما مروری عمومی بر اورژانس‌های چشم پزشکی بندرت در متنون گزارش شده است. این مطالعه موارد مراجعه ناشی از اورژانس‌های چشمی را که طی یک دوره شش ماهه به بخش اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء (مشهد) به منظور ارائه طرح استراتژی سلامت و موازنی چشم جهت جلوگیری از صدمات چشمی صورت گرفته است، بررسی می‌کند.

روش کار

این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت گذشته نگر بر بیمارانی که با شکایتها چشمی به بخش اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در فاصله ماههای فوریه دین تا شهریور ۱۳۸۵ مراجعه کرده اند، انجام شد. تشخوصهای چشمی و موارد بسترهای علاوه بر متغیرهای مرتبط جمع آوری شد و به طور جداگانه با نرم افزار اکسل و مینی تب آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

در دوره مطالعه ۲۸۳۱۲ بیمار با شکایتها چشمی به بخش اورژانس مراجعه کردند. شایعترین تشخیصها در بیمارانی که اخیراً مراجعه کردند در دو گروه آسیهای جراحی (۶۱٪) و اختلالات التهابی (۲۲٪) دسته بندی شدند. نسبت مرد به زن حدود ۲/۵ به ۱ ارزیابی شد. مراجعه در هر دو جنس در ده سوم زندگی به اوچ می‌رسد. میزان مراجعه در اوخر بهار و اوائل تابستان افزایش نشان می‌داد. مجموع موارد بسترهای ۴۳۱ مورد (۱/۵ درصد از موارد مراجعه) بود که بخش عمده آنها در نتیجه پیامدهای آسیهای جراحی و به خصوص پارگی کره چشم (۳۸٪ موارد بسترهای) نیاز به بسترهای پیدا کرده بودند. تخمین زده می‌شود حوادث شغلی چشمی مسئول ۴۳٪ تمامی آسیهای جراحی که بین سنین ۲۰ تا ۵۹ سال اتفاق می‌افتد باشد.

نتیجه گیری

مردان جوان از نظر حوادث چشمی به خصوص در محیط کار با خطر بیشتری مواجه هستند. افراد زیر ۱۰ سال تخمین زده می‌شود به طور ویژه‌ای در معرض خطر آسیهای شدید چشمی از قبیل پارگی کره چشم هستند. توجه بیشتر نسبت به این دو گروه در معرض خطر و هدایت آموزشها و آمادگیهای حفاظتی با استفاده صحیح از عینکهای محافظه چشمی و آموزش بهداشت بر جنبه‌های پیشگیری در محیط کار و مدارس پیشنهاد می‌گردد.

- ۱- حمید قرایی*
۲- میرنقی موسوی
۳- مجید روحبخش زائری
۴- ابوذر قائم پناه

۱- استادیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان خاتم الانبیاء، مشهد- ایران

۲- دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان خاتم الانبیاء، مشهد- ایران

۳- چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء- مشهد- ایران

۴- پزشک عمومی، بیمارستان خاتم الانبیاء- مشهد- ایران

*مشهد - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)، مشهد، ایران
تلفن: +۹۸-۰۵۱-۷۷۸۱۴۰۱
email:garaeem@mums.ac.ir

کلمات کلیدی: آسیب جراحی چشمی، جسم خارجی، عفونت چشمی

مقدمه

در حال رشدی از تروماتی چشمی به خصوص در مراکز شهری امریکایی و در میان آمریکاییهای آفریقایی می باشد. همچون سایر آسیهای تروماتیک چشم بیش از ۸۰ درصد قربانیان تروماتی چشمی مرتبط با نزاع، مذکر هستند و اکثر قربانیان زیر ۳۵ سال سن دارند. آسیب به پلکها و دستگاه اشکی پس از تروماتی نافذ و غیرنافذ و گازگرفتگی شایع است. تروماتی اوریت ممکن است هم غیرنافذ و هم نافذ باشد. احتمال جسم خارجی باقی مانده باید تا زمانی که خلاف آن ثابت شود مدنظر باشد (۶). سوختگیهای شیمیایی نوعی از اورژانسهای چشمی هستند که در آنها هر یک دقیقه اهمیت دارد. پیش آگهی وابسته به سرعت آغاز درمان، مدت تماس، غلظت محلول و پی اچ آن می باشد. آسیهای سطحی چشم و واکنش چشمی به مواد خارجی (از قبیل آرژنهای، داروها، توکسینها) همراه با عالم درد، اشک ریزش و احساس جسم خارجی می باشد که در گزارشات آماری مختلف، در گروه آسیهای تروماتی چشم، به عنوان شایعترین علت مراجعه به اورژانس معروف شده اند (۱، ۳).

پارگیهای قرنیه ای صلیه ای بخش مهمی از تروماتی چشمی را شکل می دهد و ممکن است منجر به عوارض دائمی چشمی شود (۷). تروماتی غیرنافذ به کره چشم شامل التهاب عنیه ناشی از تروماتی هایفما می شود (۸). بیشتر آسیهای منجر به اجسام خارجی داخل چشمی در نتیجه ضربه فلز بر فلز به وجود می آیند (۹).

بلفاریت را می توان به دو نوع قدامی و خلفی تقسیم کرد. هوردئولوم یک التهاب حاد لوكال در غدد زایس (هوردئولوم خارجی یا قدامی) یا غدد میوبوین (هوردئولوم داخلی یا خلفی) می باشد.

سلولیت پره سپتال مربوط به عفونت بافت نرم پلکها و منطقه پری اوریتال در قدام سپتوم اوریتال می باشد. سلولیت اوریتال عفونت بافت نرم داخل اوریت در خلف سپتوم اوریت می باشد (۱۴).

یوئیت به عنوان التهاب یوه آ تعریف می شود. یوئیت ممکن است تنها پدیده ای مربوط به چشم باشد یا به عنوان تظاهری از یک پاتولوژی گسترده تر ظهور یابد.

نشانه های کونزنکتیویت شامل پرخونی ملتحمه، اشک ریزش، کموزیس، کموزیس خونریزی کننده و ترشح می باشد. کراتیت

اورژانسهای چشم پزشکی سهم قابل توجهی از بار مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی چشم پزشکی را بر عهد دارند (۲). به طور معمول در یک تقسیم بندی عمومی اورژانسهای چشم پزشکی را به دو گروه اصلی مراجعات ناشی از تروما و مراجعات ناشی از حالات التهابی یا مراجعات وابسته به تروما و مراجعات غیروابسته به تروما تقسیم می کنند (۱، ۳). در بین اورژانسهای چشم پزشکی تنها دو تشخیص (سوختگیهای شیمیایی و انسداد شریان شبکیه ای) نیاز به درمان فوری (در عرض چند دقیقه) دارد (۴).

چنان که از لیست پایان نامه های پزشکی به انجام رسیده موجود در کتابخانه دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر می آید تاکنون بررسی عمومی موارد و ترکیب جنسی و سنی و تشخیصهای پزشکی که مجموعه مراجعات به اورژانس چشم پزشکی را تشکیل می دهد، توجهی بر نینگیخته است.

خطر فراوان تروماتی شدید در بین خردسالان در بسیاری از مطالعات گزارش شده است: مطالعه شین^۱ در درمانگاه چشم و گوش ماساچوست چنین مطرح کرد که اگرچه موارد زیر ۱۵ سال تنها ۸ درصد جمعیت تحت مطالعه را تشکیل می دهند اما یک سوم موارد آسیهای جدی مربوط به آنهاست که این شامل ۲۵ درصد تمامی موارد آسیب باز کره چشم می باشد (۵). محققان مختلفی گزارش کرده اند سقوط علت پیشو در تروماتی باز کره چشم در افراد مسن می باشد و گاه عوارض جراحی (احتمالاً تروماتی واردہ به زخم جراحی قدیمی) بر این مورد افروده شده است. برای بالغین جوان تصادفات رانندگی، تروماتی شغلی و نزاع علل مهم آسیهای چشمی جدی هستند. براساس یک مجموعه گزارش اخیر، در بین کودکان حوادث خانگی، بازی و یا ورزشهای جمعی مسؤول بیش از ۷۰ درصد آسیهای باز کره چشم هستند.

مطالعاتی که در غرب پیش از اعمال مقررات جدید محیط کاری به انجام رسیده اند نشان می دهند آسیهای چشمی شغلی تا ۷۰ درصد تمامی موارد آسیب چشمی را شامل می شدند (۵). ارزیابی های آسیهای چشمی مشخص می کند که آسیهای وابسته به ورزش هم شایع و هم جدی هستند. نزاع مسئول بخش

^۱ Schein

تاریخ مراجعه، جنسیت، سن، شغل، مورد بیماری، بستری یا عدم بستری، در صورت بستری تشخیص هنگام بستری روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و مراحل انجام کار: در قدم دوم و درباره نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری نیز داده‌ها پس از این که از دفتر ثبت پرستاری اورژانس عمده‌تا با استفاده از نرم افزار اکسل وارد کامپیوتر شدند، با استفاده از نرم افزارهای آماری مانند اکسل و مینی تب آمار توصیفی، جداول و نمودارهای مربوط به دست آمدند. در قدم نهایی نتایج حاصله مرتب شده و در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه مورد بحث و تجزیه و تحلیل فرار گرفتند.

نتایج

براساس اطلاعات ثبت شده از دفتر ثبت اطلاعات چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانیا در مدت شش ماهه نخست سال ۱۳۸۵، تعداد ۲۸۳۱۲ مورد مراجعه به این مرکز وجود داشته است. به این ترتیب به طور میانگین ماهانه بیش از ۴۷۱۸ مورد و روزانه بیش از ۱۵۲ مورد مراجعه وجود داشته است. این موارد شامل مراجعات جدید و مراجعات پیگیری و نیز مراجعه خود بیمار یا مشورت و اعزام از سایر مراکز درمانی می‌باشد. با توجه به این که اورژانس مرکز چشم پزشکی خاتم الانیا تنها مرکز اورژانس تخصصی چشم پزشکی در شهرستان مشهد می‌باشد با اطمینان خوبی می‌توان اظهار داشت آمار فوق، بخش عمده مراجعات چشم پزشکی و تمامی موارد ارجاع و اعزام بیماران اورژانسی چشم پزشکی را در این شهر در بر می‌گیرد. موارد مراجعه در سال ۸۵ به رقمی بیش از ۵۵۵۰۰ نفر تخمین زده خواهد شد. با توجه به تعدد و پراکندگی تشخیص‌های ثبت شده در دفتر ثبت اطلاعات اورژانس برای بیماران مراجعه کننده (حدود ۱۷۰ مورد)، به منظور تجزیه تحلیل و درک بهتر اطلاعات، موارد بیماری ثبت شده دسته بندی شد.

در نمودار ۱ میزان موارد هر کدام از گروههای بیماری در مقایسه با موارد دیگر نمایش داده شده است.

آسیبهای جراحی در بین مراجعه کنندگان به اورژانس، با احتساب کلیه موارد مراجعه ۵۱ درصد، بدون احتساب موارد مراجعه بدون تشخیص ثبت شده ۵۴/۹۶ درصد و بدون احتساب این گروه از بیماران و نیز موارد پیگیری ۶۱/۹۳ درصد موارد از مراجعین به اورژانس را تشکیل می‌دهد.

به وسیله ارگانیسمهای باکتریال، ویرال، قارچی یا انگلی به وجود می‌آید و اغلب در اورژانس دیده می‌شود. اندوفتالمیت عفونت داخل چشمی است. استافیلوکوک کوآگولاز منفی شایعترین ارگانیسم مسئول اندوفتالمیت است و همچنین شایعترین ارگانیسمی است که در ملتحمه ساکن (کولونیزه) است.

گلوكوم اولیه ناشی از نقصی ناشناخته یا تکاملی است در حالی که گلوكوم ثانویه ناشی از یک ناهنجاری همراه یا اکتسابی می‌باشد. علاوه بر این گلوكوم را می‌توان براساس وضعیت زاویه اتاق قدامی تقسیم کرد.


رنینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی علاوه بر ایجاد خونریزی زجاجیه ممکن است به صورت کاهش بینایی ناگهانی ناشی از درگیری ماکولا به وسیله ایسکمی یا جدایی شبکیه ای کششی و نایینایی ناشی از نورونپاتی اپتیک (به اصطلاح پاپیلوپاتی دیابتیک) بروز کند. آمروزیس فوگاکس معادل لاتین نایینایی زودگذر، یک کاهش دید یک چشمی گذرا می‌باشد که از چندین ثانیه تا چندین دقیقه طول می‌کشد. شایعترین علت آمبولی شریانی می‌باشد و معمولاً در بیماران مستر با بیماری تصلب شرائین رخ می‌دهد. انسداد شریان مرکزی شبکیه و انسداد شاخه شریانی شبکیه علتها کاهش بینایی شدید یک چشمی هستند (۱۵).

روش کار


مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که با استفاده از اطلاعات ثبت شده در فرم مخصوص و دفتر ثبت اطلاعات درمانگاه اورژانس بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانیا به انجام رسیده است.

در قدم اول اطلاعات مربوط به تمامی بیمارانی که از ساعت‌های بامداد اول فروردین ۱۳۸۵ لغایت ساعت پایانی شامگاه سی و یکم شهريور ۱۳۸۵ به اورژانس بیمارستان خاتم الانیا مراجعه کرده اند و اطلاعاتشان در دفتر ثبت پرستاری این اورژانس قيد شده است در این تحقیق وارد شدند.


مجموعه جمعیتی که اطلاعات ثبت شده آنان در این مطالعه وارد شده است ۲۸۳۱۲ نفر می‌باشد که درباره هر کدام از ایشان براساس دفتر ثبت اطلاعات اورژانس هفت داده در این مطالعه وارد شده است:



نمودار ۱ - میزان موارد مراجعه به اورژانس چشم پزشکی بر حسب نوع بیماری



نمودار ۲ - میزان موارد بیماران مراجعه کننده به اورژانس بر حسب سن



نمودار ۳ - میزان موارد مراجعه به اورژانس بر حسب گروههای شغلی مختلف

این سه گروه بر روی هم ۵۸/۴۰ درصد از موارد بیماران مراجعه کننده به اورژانس را که شغلشان ثبت شده است تشکیل می‌دهند. گروه شغلی آزاد با توجه به این که اطلاعی از نوع و محیط فعالیت شغلی افراد در اختیار نمی‌گذارد و احتمال حضور افراد با مشاغل پرخطر از نظر حادثه چشمی در آن وجود دارد از نظر آماری

بیماریهای التهابی در بین مراجعه کنندگان به اورژانس، با احتساب کلیه موارد مراجعه ۱۹ درصد، بدون احتساب موارد مراجعه بدون تشخیص ثبت شده ۲۰/۲۹ درصد موارد و بدون احتساب این گروه از بیماران و نیز موارد پیگیری ۲۲/۸۷ درصد موارد از مراجعات به اورژانس را تشکیل می‌دهد. همچنین قابل توجه است که گفته شود جسم خارجی قرنیه، شایعترین بیماری واحد (متعلق به گروه بیماریهای آسیب‌های جراحتی) در میان علل مراجعه به اورژانس می‌باشد. جسم خارجی قرنیه با تعداد ۷۵۵۶ درصد به تنها ۲۶/۶۸ درصد از کلیه موارد مراجعه به اورژانس را تشکیل می‌دهد.

کوتزنکتیویت (اعم از آرژیک و عفونی) با تعداد ۴۵۳۸ مورد ۱۶/۰۲ درصد از کلیه موارد مراجعه را تشکیل می‌دهد. از مجموعه ۲۸۳۱۲ بیمار مراجعه کننده به اورژانس، تعداد ۸۰۳۰ نفر زن (۲۸/۳۶ درصد) و تعداد ۲۰۲۷۷ نفر مرد (۷۱/۶۱ درصد) بوده اند. در این مطالعه برای تسهیل در امر تجزیه تحلیل و مقایسه داده‌ها سن بیماران در گروههای ۱۰ ساله طبقه‌بندی شده است. با توجه به تعدد و تنوع مشاغل ثبت شده برای بیماران مراجعه کننده به اورژانس (حدود ۴۰ مورد)، برای تسهیل در امر تجزیه تحلیل و مقایسه مشاغل گوناگون اقدام به دسته بندی مشاغل شد. در نمودار ۳ میزان موارد هر کدام از گروههای شغلی مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. در این نمودار گروه شغلی سنتی کودکان پیش دبستانی با عنوان ثبت نشده نمایش داده شده است. چنان که از نمودار ۳ بر می‌آید پرشمارترین گروههای شغلی مراجعه کننده به اورژانس به ترتیب مشاغل آزاد، زنان خانه دار و گروه محصل می‌باشد.

شایعترین تشخیصهای بستری به پارگی کره چشم و سایر عوارض ناشی از آسیب‌های جراحتی مربوط می‌شود (نمودار ۴). این دو مورد بیشترین موارد بستری در بخش از بیماران مراجعه کننده به اورژانس را تشکیل می‌دهند. پس از این دو، موارد بستری مرتبط با فشار داخل چشم و سپس اندوفتالمیت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بحث

چنانچه پیش از این ذکر شد براساس اطلاعات درج شده در دفتر ثبت اطلاعات در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۵ تعداد ۲۸۳۱۲ مورد مراجعه وجود داشته است. از این تعداد ۸۰۳۰ نفر زن و ۲۰۲۷۷ نفر (۷۱/۰۶٪) مرد بوده اند. در مطالعه منصوری و همکاران از تعداد ۵۰۲ نفر بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فارابی ۸۰/۹٪ را مردان تشکیل می‌دادند (۱۶). در مطالعه ریاضی و همکاران نیز ۹۰٪ مراجعه کنندگان شامل مردان بودند (۱۷). در مطالعه حاضر بیشترین مراجعه کنندگان مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال (۳۰/۳۲٪) بوده و در مطالعه شجاع و همکاران نیز بیشترین رده سنی مراجعه کنندگان نیز همین گروه می‌باشدند (۱۸). در مطالعه نیک اقبالی و همکاران نیز ۲۴٪ بیماران ترومایی زیر ۱۰ سال بودند (۱۹).

در مطالعه حاضر گروه سنی زیر ۵ سال در حالی که تنها ۹/۵ درصد از کل موارد مراجعه را تشکیل می‌دهد، ۱۹/۷ درصد از موارد بستری و ۳۱/۲ درصد از موارد بستری به علت پارگی کره چشم را تشکیل می‌دهد.

موارد حادثه شغلی در این مطالعه ۱۶ درصد از کل موارد مراجعه به اورژانس را تشکیل می‌داده است. براساس مطالعه ای که در تایوان بر مراجعین به اورژانس انجام شده است ۳۷/۱ درصد از جراحات چشمی در گروه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در محیط کار رخ داده بوده است. در مطالعه حاضر موارد حادثه شغلی ۴۳ درصد از موارد آسیب‌های جراحتی را در سنین ۲۰-۵۹ سال تشکیل می‌دهد. این میزان قابلیت مقایسه خوبی با آمار مطالعه فوق دارد و به آن نزدیک است. در مطالعه شجاع و همکاران، ۱۵٪ جراحات چشمی ناشی از حوادث کار بوده اند (۱۸).

چنانچه پیش از این شرح داده شد این تحقیق به طور اولیه براساس اطلاعات ثبت شده در دفتر ثبت اطلاعات انجام شده است و در این قسمت شاید بیش از هر محدودیت دیگری باید به


یک گروه مخدوش کننده محسوب می‌شود که باعث کم شمار جلوه دادن سایر مشاغل به خصوص مشاغل پرخطر می‌شود. گروههای شغلی زنان خانه دار و محصلین نیز به طور متداول جزو گروههای شغلی و صنفی محسوب نمی‌شوند و زیرمجموعه مباحث مربوط به مسائل شغلی و حرفة‌ای قرار نمی‌گیرند.

به این ترتیب طبق جدول ۱ نخستین گروههای شغلی که پس از این موارد قرار می‌گیرند و پرشمارترین گروههای شغلی متداول در میان مراجعه کنندگان هستند گروههای شغلی صنایع فلزی و ساختمانی و فنی می‌باشند.

جدول ۱- تعداد و موارد کلیه گروههای شغلی

گروه شغلی	تعداد موارد	درصد
اداری	۲۴۹۵	۸/۱۰
آزاد	۶۷۵۷	۲۳/۸۶
کودکان پیش دبستانی	۱۶۳۰	۵/۷۵
خانه دار	۵۱۱۳	۱۸/۰۵
صنایع فلزی	۳۱۴۰	۱۱/۰۹
ساختمانی و فنی	۲۶۱۵	۹/۲۳
کشاورزی	۵۳۳	۱/۸۸
متغیره	۱۲۷۹	۴/۵۱
محصل	۳۷۱۳	۱۳/۱۱
نامشخص	۱۲۲۷	۴/۳۶
تعداد کل موارد	۲۸۳۱۲	۱۰۰

این دو گروه بر روی هم ۲۱/۵۶ درصد از موارد بیماران مراجعه کننده به اورژانس را که شغلشان ثبت شده است تشکیل می‌دهند. از مجموع ۲۸۳۱۲ نفر مراجعین به اورژانس چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانیا در نیمه اول سال ۸۵ طبق اطلاعات ثبت شده در دفتر ثبت اطلاعات تعداد ۴۳۱ مورد بستری در بخش انجام شده است (۱/۵۲٪ درصد کلیه موارد مراجعه به اورژانس).



نمودار ۴- میزان موارد بستری در بخش از میان بیماران مراجعه کننده به اورژانس

محدودیتهایی که در این زمینه وجود داشته است عدم ثبت اطلاعات در درصدی از موارد بوده است. اورژانس چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانیاء با تخمین سالانه بیش از ده های دوم و سوم زندگی مردان اکثریت قابل توجه موارد بستری را تشکیل می دهند. گروه سنی زیر ده سال در حالی که تنها ۹/۵ درصد از کل موارد مراجعه را تشکیل می دهد، ۱۹/۷ درصد از موارد بستری و ۳۱/۲ درصد از موارد بستری به علت پارگی کره چشم را تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر موارد حادثه شغلی ۱۶ درصد از کل موارد مراجعه به اورژانس را تشکیل می دهند. موارد حادثه شغلی ۴۳ درصد از موارد آسیب‌های جراحی را در سینه ۲۰-۵۹ سال تشکیل می دهد.

نتیجه گیری

با توجه به میزان قابل توجه مراجعه به اورژانس چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانیا پیشنهاد می شود مدیریت اورژانس و بیمارستان، تمهیدات متناسبی برای اداره مطلوب این میزان مراجعه کننده در نظر بگیرد. همچنین نظر به سهم قابل توجه آسیب‌های جراحی در موارد مراجعه به اورژانس چشم پزشکی و قابلیت پیش گیری در بسیاری از موارد جراحت چشمی، آموزش و اطلاع رسانی عمومی و نیز تمهیدات پیش گیرانه به خصوص درباره سنین زیر ده سال و گروههای شغلی پرخطر مانند مشاغل صنایع فلزی و مشاغل ساختمانی و فنی، پیشنهاد می شود. با توجه به سهم قابل توجه موارد مراجعه در دهه های دوم و سوم و چهارم زندگی در مراجعات به اورژانس که خود به طور عمده از مردان تشکیل می شوند، پیشنهاد می شود حتی الامکان در ابتدای دوره فعالیت شغلی و هنگام آغاز به آموزش شغلی و فعالیت حرفه ای (در حدود سنین ۱۵ تا ۲۰ سالگی) در گروههای شغلی پرخطر این اقدامات انجام شود.

تشکر و قدردانی

از زحمات سرکار خانم سحابی منشی محترم گروه چشم که در این طرح با ما همکاری نموده اند تشکر و قدردانی می شود.

کاستیهایی که ممکن است درباره نحوه ثبت اطلاعات در دفتر ثبت اطلاعات رخ داده باشد ارجاع داده شود. یکی از اولین محدودیتهایی که در این زمینه وجود داشته است عدم ثبت اطلاعات در درصدی از موارد بوده است.

اورژانس چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانیا با تخمین سالانه بیش از ۵۵۵۰ مراجعته، بیماران فراوانی دارد و گمان می رود این مقدار مراجعته رو به افزایش باشد. گروه بیماریهای آسیب‌های جراحی (تروما) مسؤول ۵۱ درصد موارد مراجعته به این اورژانس است و از این جهت در رتبه نخست قرار دارد. در رتبه بعد گروه بیماریهای التهابی مسؤول ۱۹ درصد موارد مراجعته می باشد. در بین مراجعته کنندگان به این اورژانس نسبت مرد به زن ۲/۵ به ۱ می باشد. اختلاف جنسیتی در مراجعته به اورژانس به طور عمده مربوط به گروه بیماریهای آسیب‌های جراحی می باشد. در گروه بیماریهای التهابی نیز مراجعته مردان به طور نسبی بیشتر از زنان است. در گروه بیماریهای مرتبط با فشار داخل چشم تعداد زنان مراجعته کننده به طور مختصر بیشتر از مردان مراجعته کننده می باشد. میزان مراجعته به اورژانس چشم پزشکی خاتم الانیا در دهه سوم زندگی اوچ می گیرد. این طرح سنی به طور عمده تحت تأثیر الگوی سنی وقوع آسیب‌های جراحی چشمی می باشد. در دهه های دوم و سوم و چهارم زندگی، مردان اکثریت قابل توجه مراجعته کنندگان می دهند. زنان خانه دار (۲۵٪) شایعترین مراجعته کنندگان در میان طبقات اجتماعی هستند و پس از ایشان طبقه محصل (۱۸٪) قرار دارد. اما اولین گروه شغلی حرفه ای در میان مراجعته کنندگان به اورژانس فلزکاران (۱۵٪) و سپس مشاغل ساختمانی و فنی (۱۲٪) هستند. در مطالعه ریاضی و همکاران شایعترین گروه شغلی حرفه ای در بیماران تراشکاران و جوشکاران بودند (۱۷٪).

موارد بستری که از طریق اورژانس چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانیا انجام شده اند به طور عمده ناشی از عوارض آسیب‌های جراحی و به خصوص پارگیهای کره چشم می باشد. بستری بیمارستانی در سه دهه ابتدایی زندگی در بالاترین حد قرار دارد ولی از دهه چهارم کاهش مشخصی پیدا می کند تا این که در دهه های هفتم و هشتم دوباره به طور مختصر افزایش می یابد. در

References:

- 1- Edwards RS. Ophthalmic emergencies in a district general hospital casualty department. Br J Ophthalmol 1987; 71:938-942.
- 2- Kaimbo WK, Spileers W, Missotten L. Ocular emergencies in Kinshasa (Democratic Republic of Congo). Bull Soc Belge Ophtalmol 2002; 49-53.
- 3- Tsai CC, Kau HC, Kao SC, Liu JH. A review of ocular emergencies in a Taiwanese medical center. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 1998; 61:414-420.
- 4- MacCumber MW, Kerrison JB, Pieramici DJ, Goldberg MF. Emergent clinical scenarios: differential diagnosis and recommended guidelines for timing of specialized evaluation. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 1-8.
- 5- Congdon NG, Schein OD. The epidemiology of ocular trauma: a preventable ocular emergency. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 9-26.
- 6- Kerrison JB, Iwamoto MA, Merbs SL, Iliff NT. Orbital trauma. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 107-15.
- 7- Edwards MG, Pieramici DJ, Fekrat S, Azar DT, Stark WJ, MacCumber MW. Corneoscleral lacerations and ruptures. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 207-25.
- 8- Raja SC, Goldberg MF. Injuries of anterior segment. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 227-32.
- 9- Humayun MU, Santos A, Juan JR. Management of intraocular foreign bodies. In: MacCumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 309-318.
- 10- Asgari M. Evaluation of cases of ocular trauma requiring admission in ophthalmology department of Gaem Hospital. Medical doctorate thesis, MUMS, 1377.
- 11- Ganai Omid. Evaluation of admitted patients due to ocular trauma and their management between 1378-1380. Medical doctorate thesis, MUMS, 1381.
- 12- Bohrani Maryam. Evaluation of corneal foreign bodies, causes and symptoms in 100 patients conferred to khatam-al-anbia eye hospital. Medical doctorate thesis, MUMS, 1382.
- 13- Kalani Toktam. Epidemiologic and demographic evaluation of chemical burn cases reffering to khatam-al-anbia hospital in 1383. Medical doctorate thesis, MUMS, 1384.
- 14- Sadda SR, Iliff NT .Infections of the lacrimal system, eyelids and orbit .In: Mac Cumber MW,editor. Management of ocular injuries and mergencies. Phladelphia:Lippincott-Raven;1998.p.117-134.
- 15- Rivellese MJ, Ma Cumber MW, Schachat AP. Sudden nontraumatic visual loss and visual disturbances. In: Mac Cumber MW, editor. Management of ocular injuries and emergencies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.p.333-349.
- 16- Mansuri M. Evaluation of patients conferring to emergency department of Farabi eye hospital. Iran ophthalmol J 1998; 2: 53-56.
- 17- Riazi Esfahani M. Evaluation of work related ocular trauma in Yazd Rahahan Hospital (1997-88). Bina J ophthalmol 1999.
- 18- Shoj M. Evaluation of work related eye injuries in Farabi eye hospital emergency department (1998). Iran J ophthalmol 2000; 1, 2: 48-57.
- 19- Nikeghbali A.Traumatic scleral laceration and prognostic factors. Iran J Ophthalmol 1996.