

بررسی رابطه تروما و سقط جنین در موارد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی تهران در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۰

دکتر پروانه بشیری*

متخصص پژوهشی قانونی، سازمان پژوهشی قانونی کشور

دکتر امیر محمد مهاجر پور

متخصص پژوهشی قانونی، مرکز پژوهشی قانونی جنوب تهران

دکتر فخر الدین تقىسى نژاد

متخصص پژوهشی قانونی، استادیار دانشگاه علوم پژوهشی تهران

دکتر فریبا موسوی پور

متخصص زنان و زایمان

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۳/۸/۷

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص سقط متعاقب ضربه یکی از وظایف اصلی و مهم پژوهشکار قانونی است. در این مطالعه سعی شده است تا حد امکان رابطه بین تروما و سقط جنین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فرود کیفر و راهکار مناسبی در برخورد با موارد خاص بروانه گردید. روشها: این مطالعه به صورت آبینه نکر، توصیفی و مقطعی انجام گرفته است و مجموعاً ۵۰ خانم باردار که به دیالیز ایجاد تروما به بدن و اذیان سقط جنین به بخش معایبات سرتاسری سازمان پژوهشی قانونی در طی ۸ ماه مراجعت نموده بودند مورد بررسی فرود گرفتند. یافته های این از افزایش SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها: بیشترین تعداد مراجعته کنندگان در گروه سنی ۲۰-۳۰ سال قرار داشتند. ۲۶ نفر (۷۲ درصد) تهرانی و ۱۴ نفر (۲۸ درصد) شهرستانی بودند. از نظر شغلی اغلب خانه دار و از نظر تحصیلی غالباً دبیلم و زیر دبیلم بودند. سایده سقط قلبی در ۵ نفر (۱۰ درصد) و نیست فامینی تزدیک با همسر در ۶ نفر (۱۲ درصد) وجود داشت. متوسط سن حاملکی در مراجعته کنندگان ۱۳۸ هفتاد و متوسط تعداد (زمیان) ۱۱ از سیار اثمار ضرب و جرح در نواحی شکم و لکن در ۶ نفر (۱۲ درصد) و اثمار تروما در سایر قسمتهای بدن در ۲۵ نفر (۵۰ درصد) وجود داشت. علائم تهدید به سقط به صورت خونریزی و از بین در ۳۲ نفر (۶۶ درصد) وجود داشت که در ۳۱ مورد فاصله زمانی بین تروما و علایم تهدید به سقط کمتر از ۲۴ ساعت و در ۲ مورد بیش از ۲۴ ساعت بود. در ۱۴ نفر (۲۸ درصد) رابطه بین تروما و سقط جنین با زایمان زودرس موردن تأیید قرار گرفته بود. در ۲۱ نفر (۴۲ درصد) اذیان تروما و سقط جنین مورد قبول واقع نشده بود. در ۱۵ نفر (۳۰ درصد) علائم تهدید به سقط و اثمار تروما در بدن وجود داشت و نیز سقط رخ نداده بود.

نتیجه گیری: تروماهای وارد به بدن خانم های باردار در صورتی می تواند منجر به سقط جنین و زایمان (زودرس شوند) که نولا نسنا شدید باشند. ثالیا علایم تهدید به سقط به فاصله اندکی پس از وارد آمدن به بدن ایجاد شده باشد.

وازگان کلیدی: تروما، سقط، علایم تهدید به سقط

* نویسنده پاسخگو: تهران - خ بهشت - سازمان پژوهشی قانونی کشور
دورنگار: ۴۴۲۱۱۹۱۸ (۰۲۱) pamo47@yahoo.com سمت الکترونیک:

مقدمه

توسط اسپکلوم انجام می گرفت. در صورت نیاز به انجام سونوگرافی یا آزمایشات پاراکلینیک نظیر اندازه گیری $\beta\text{-HCG}$ مراجعه کنندگان به بیمارستان میرزا کوچک خان ارجاع می شدند و سپس نتیجه معایینات انجام شده در آن بیمارستان جهت بررسی به بخش زنان فرستاده می شد.

با توجه به اطلاعات جمع اوری شده در پرسشنامه و نتیجه معایینات و آزمایشات به عمل آمده تصمیم گیری نهایی یا در بخش معایینات زنان به عمل می آمد یا جهت بررسی بیشتر و تخصصی تر، مورد به کمیسیون تخصصی پزشکی ارجاع می شد و در نهایت تصمیم گیری در مورد اغلب مراجعه کنندگان به دلیل حساسیت مسأله در کمیسیون پزشکی و با حضور متخصصان پزشکی قانونی و متخصصان زنان و زایمان صورت می گرفت. پس از پایان زمان مطالعه پرسشنامه ها و متغیرهای آن مورد بررسی قرار گرفتند و پس از تحلیل و پردازش اطلاعات نتایج زیر حاصل گردید.

نتایج

از نظر سنی بیشترین تعداد مراجعین یعنی ۱۵ نفر (۳۰ درصد) در گروه سنی ۲۵-۳۰ سال قرار داشتند. کوچکترین آنها ۱۷ ساله و بزرگترین آنها ۴۵ ساله بودند. ۳۶ نفر (۷۲ درصد) از مراجعه کنندگان تهرانی و ۱۴ نفر (۲۸ درصد) شهرستانی بودند. از نظر شغفی ۳۹ نفر (۷۸ درصد) خانه دار و ۱۱ نفر (۲۲ درصد) شاغل بودند. از نظر میراث تحصیلات ۶ نفر (۱۲ درصد) بیسواد، ۱۶ نفر (۳۲ درصد) تحصیلات متوسطه، ۲۱ نفر (۴۲ درصد) دبیل و ۷ نفر (۱۴ درصد) تحصیلات دانشگاهی در حد لیسانس داشتند.

بیماری زمینه ای در ۳ نفر (۶ درصد) وجود داشت که شامل یک مورد بیماری ریوی، یک مورد دیابت قندی وابسته به انسولین و یک مورد نارسایی سرویکس بود. متوسط سن حاملگی در زنان مراجعه کننده ۱۳/۸ هفته بود و متوسط تعداد زایمان در آنها ۱/۱ زایمان بود.

نسبت فامیلی نزدیک با همسر در ۶ نفر (۱۲ درصد) وجود داشت. سابقه سقط قبلی در ۵ نفر (۱۰ درصد) وجود داشت که در یک مورد ۳ سقط متواتی، در یک مورد ۲ سقط متواتی و در بقیه موارد یک سقط وجود داشت. تمامی بارداری ها از روی رضایت و میل بود (ناخواسته نبود) و از مایش بارداری مشتب در همه موارد وجود داشت. آثار ضرب و جرح به دنبال ترومما در نواحی شکم و لگن در ۶ نفر (۱۲ درصد) وجود داشت. آثار ضرب و جرح به دنبال ترومما در سایر قسمتهای بدن در ۲۵ نفر (۵۰ درصد) وجود داشت. علایم تهدید به سقط به صورت خونریزی واژینال در ۳۷ نفر (۷۴ درصد) از مراجعه کنندگان وجود داشت.

براساس نتایج بدست آمده از کمیسیون پزشکی مراجعه کنندگان در سه گروه عمده قرار گرفتند.

سقط جنین ختم بارداری قبل از زمانی است که جنین انقدر تکامل یافته باشد که خود قادر به ادامه حیات در خارج از بدن مادر باشد. در ایالات متحده ختم حاملگی قبل از هفتاد هفته بیست بارداری و یا تولد نوزاد با وزن کمتر از ۵۰۰ گرم را سقط محسوب می کنند. از نظر پزشکی قانونی تازمانی سقط جنین اطلاق می شود که جنین قابلیت ادامه حیات در خارج رحم را نداشته باشد. این مدت معمولاً کمتر از ۶ ماه یا ۲۴ هفته است. خنم حاملگی پس از این زمان، زایمان زودرس نایمده می شود. همه روزه افراد زیادی به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه می کنند و مدعی هستند که باردار بوده اند و به دنبال ضربه فیزیکی و یا تصادف رانندگی و وارد آمدن ضربه به بدن دچار سقط جنین یا زایمان زودرس شده اند (۱-۳).

سقط جنین در تمام دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. در قوانین اسلامی نیز به این مسأله اهمیت بسزایی داده شده است. بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس عاملاً و عامدآ به واسطه ضرب یا اذیت و ازار دادن زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد (۱).

در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز دیه جنین در مراحل شش کانه تکامل جنین ذکر شده است. براساس این قانون دیه جنینی که سن او بیش از ۱۶ هفته و ولوج روح در او صورت گرفته باشد برابر یک انسان کامل است. با توجه به متعدد بودن علل سقط جنین و نیز از حلوفی زیاد بودن ادعاهای سقط به دنبال حوادث، تشخیص اینکه ترکوما واقعاً منجر به سقط جنین شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رد یا تأیید ادعاهای سقط های ضربه ای از ظایف اصلی پزشکان قانونی است و بی بردن به این مطالب از ضایع شدن حق دیگران جلوگیری کرده و به اجرای هر چه بهتر عدالت کمک می کند (۱).

مواد و روشها

این مطالعه از نوع اینده نگر، توصیفی و مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه تمامی خانم های باردار مدعی سقط متعاقب ضربه بودند که از ابتدای مهرماه ۱۳۷۹ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ به بخش معایینات زنان سازمان پزشکی قانونی تهران مراجعه نمودند. متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه ای منتظر گردید، در بخش معایینات قرار داده شد و توسط پژوهشک زنان بخش معایینات تکمیل می گشت. نحوه مراجعه بین ترتیب بود که خانم های مدعی سقط ضربه ای پس از مراجعته به بخش زنان ابتدا توسط پژوهشک بخش معایینات از نظر ظاهری وجود آثار ترومما بر روی بدن مورد بررسی قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت بررسی خونریزی واژینال معاینه نواحی تناسلی



می تواند نشاندهنده این مسأله باشد که تروما در هر سنی از حاملگی می تواند منجر به سقط جنین یا زایمان زودرس شود. برخلاف سایر فاکتورهای اتیولوژیک سقط جنین از قبیل ناهنجاری‌های کروموزومی که بیشتر باعث سقط های زودرس زیر دوازده هفته می شوند (۵,۶). آثار ناشی از تروما در ۱۱ نفر وجود داشت که در ۵ نفر اثار تروما هم در شکم و لگن و هم در سایر نقاط بدن دیده شد. در ۶ نفر مابقی آثار در اندامها و سر و صورت و نواحی غیر از شکم و لگن وجود داشت و تنها در سه مورد آثار ضرب و جرح و تروما مشهود نبود که هر سه نفر مدعی بودند ضربات شدیدی به نواحی شکم و پهلوهای خود داشته اند و با توجه به اینکه در فاصله زمانی کوتاهی دچار علایم تهدید به سقط شده بودند ادعایشان می تواند مورد قبول واقع شود. به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که در صورت ایجاد سقط ضربه ای حتماً علایمی که نشان دهنده وارد آمدن ضربه نسبتاً شدید به بدن باشد

گروه اول

در این گروه که مشتمل بر ۱۴ نفر (۲۸ درصد) بودند با توجه به شواهد و مدارک و علایم موجود در سونوگرافی ها و معاینات به عمل آمده رابطه بین ضربه و سقط یا زایمان زودرس توسط کمیسیون پزشکی مورد تأیید قرار گرفته بود (جدول شماره ۱). این گروه از نظر عوامل مؤثر و زمینه ساز سقط جنین یا زایمان زودرس مثل سقط قبلی، پاریتی بالا، سن مادر، بیماری خطیر زمینه ای و نسبت فامیلی با همسر مورد بررسی قرار گرفتند. در این گروه سابقه سقط قبلی یا بیماری خطیر زمینه ای وجود نداشت. هیچ یک از مراجعه کنندگان با همسرشان نسبت فامیلی نداشتند. متوسط تعداد زایمان ۱/۹ بود و افراد این گروه بیشتر در ده سنی زیر ۳۵ سال قرار داشتند. از نظر سن حاملگی ۵ نفر سن حاملگی بین ۶-۱۲ هفته، ۳ نفر ۱۲-۲۴ هفته و شش نفر بیش از ۲۴ هفته داشتند. این موضوع

جدول شماره ۱- اطلاعات گروه اول که رابطه سقط و ضربه در آنها تأیید شده بود.

ردیف علایم تهدید به سقط	علایم سونوگرافی	فالسله بین تروما و سقط جنین (روز)	آثار ضرب و جرح	تعداد زمینان	سن بارداری (هفتاه)
۱	هماتوم خلف جفت	۲۴	شکستگی ساعد دست راست	۸	۲۶ ۱
۱	دکولمان حفت	۱	ضربه شدید به ناحیه شکم	۰	۲۲ ۲
.	عدم مشاهده فتال پل در سونوگرافی اولیه و کندگی مختصر جفت و خونریزی در محل ساک در سونوگرافی بعدی	۲	کبودی سرین و پهلوی چپ	۰	۱۲ ۳
۱	کندگی جفت	۱	شکستگی قوس فوفانی و نحتانی عanke چپ و شکستگی ساعد راست	۱	۱۸ ۴
.	سقط فراموش شده	۴۲	ساییدگی اریج زانو و سیاد شدگی سرین و قفسه سینه	۰	۸ ۵
.	عدم مشاهده فتال پل در سونوگرافی اولیه خونریزی خلف جفت در سونوگرافی بعدی	۲	کبودی رانها پهلوها و اندام فوفانی چپ	۲	۲۰ ۶
.	عدم مشاهده فتال پل در سونوگرافی اولیه و خونریزی مختصر در ساک حاملگی در سونوگرافی بعدی	۴	کبودی روی شکم و اندام تحتانی راست	۲	۱۰ ۷
.	هماتوم جفت و خونریزی در محل ساک حاملگی و مجاور ان	۱۰	شکستگی استخوان های ساق چپ کبودی گونه راست	۱	۶ ۸
۱	دکولمان جفت	۱۸	ضربه شدید به تنہ و اندام	۱	۲۶ ۹
۱	IUD	۲	کبودی زانوها و خراسیدگی صورت	۵	۲۴ ۱۰
.	خونریزی ساک کوریونیک و علایم ماسراتسیون در جنین	۷	کبودیهای متعدد و خراسیدگی صورت	۴	۲۴ ۱۱
۱	سقط ناقص	۱	کبودی ران راست	۰	۸ ۱۲
.	هماتوم در خلف جفت	۴	کبودی تنہ و اندام فوفانی راست	۱	۱۶ ۱۳
۱	IUD	۱	ضربه شدید لگد به شکم و لگن	۲	۱۸ ۱۴

در گروه اخیر در فاصله ۴۲ روز موید سقط فراموش شده و در دو مورد دیگر به صورت همان‌توم خلف جفت بود که در نهایت منجر به زایمان زودرس شده بود.

گروه دوم

در این گروه که ۲۱ نفر (۴۲ درصد) بودند به علت عدم وجود شواهد و مدارک کافی ادعای ضربه و سقط جنین مورد قبول واقع نشده بود (جدول شماره ۲).

وجود دارد ولی عدم مشاهده اثار ناشی از ضربه در صورت وجود شواهد دیگری به طور کامل رد کننده نیست. در این گروه تمامی افراد علایم تهدید به سقط به صورت خونریزی واژیال، به دنبال وارد امدن تروما به بدن داشتند که این علایم در فاصله زمانی کمتر از ۲۴ ساعت از وارد امدن ضربه به بدن ایجاد شده بود. در ۱۱ نفر در فاصله زمانی کمتر از ده روز از وارد شدن ضربه، سقط یا زایمان زودرس با جنین مرده ایجاد شده بود و در سه نفر در مدت زمانی بیش از ده روز یعنی به ترتیب پس از ۱۸، ۲۲ و ۴۲ روز سقط ایجاد شده بود که شواهد سونوگرافی

جدول شماره ۲ - اطلاعات گروه دوم که به علت عدم وجود شواهد و مدارک کافی رابطه ضربه و سقط جنین مورد قبول واقع شده بود

نمره (ردیف)	سن بارداری (حقنه)	تعداد زایمان	اثر ضرب و جرح	فاصله بین تروما و سقط جنین (روز)	علایم تهدید به سقط	شواهد سونوگرافی
۱	۲۴	۱	ضربه سر فاقد آثار	سقط نداشته	—	جنین زنده
۲	۲۰	۲	فاقد آثار	۵	IUTD	—
۳	۱۸	۳	کبودی در اطراف چشم راست	بیش از ۱۰ روز	—	—
۴	۱۶	۴	کبودی صورت	بیش از ۱۰ روز	—	—
۵	۲۸	۵	کبودی اندامها، شکستگی پوپیس (تصادف)	سقط نداشته	—	جنین زنده
۶	۱۵	۶	پارگی و بریدگی در اندامها	سقط نداشته	—	جنین زنده
۷	۱۶	۷	کبودی اطراف چشم، شکستگی بینی (تصادف)	سقط نداشته	—	مشاهده فتال پل
۸	۳۲	۸	ترس و اضطراب	سقط نداشته	—	جنین زنده
۹	۲۸	۹	کبودی سرین چب	سقط نداشته	—	جنین زنده
۱۰	۱۱	۱۰	ضریبه سر و مغز فاقد آثار	سقط نداشته	—	جنین زنده
۱۱	۸	۱۱	کبودی اندامها	سقط نداشته	—	جنین زنده
۱۲	۱۲	۱۲	فاقد آثار	۴ روز	۱۴ روز	سقط فراموش شده
۱۳	۱۲	۱۳	فاقد آثار	۷ روز	۵ روز	سقط فراموش شده
۱۴	۹	۱۴	فاقد آثار	۸ روز	+ ۵ روز	سقط ناقص
۱۵	۸	۱۵	فاقد آثار	۲ روز	۲۰ روز	سقط فراموش شده
۱۶	۸	۱۶	کبودی در صورت	سقط نداشته	—	جنین زنده
۱۷	۶	۱۷	ضریبه کمر (بدون آثار) (تصادف)	۲ ماه	—	عدم مشاهده فتال پل
۱۸	۱۶	۱۸	کبودی اندامها	سقط نداشته	—	جنین زنده
۱۹	۳۳	۱۹	شکستگی قوس فوقانی و تحانی پوپیس (تصادف)	۲۱	زنده زایمان زودرس	—
۲۰	۸	۲۰	ترس و اضطراب	سقط نداشته	—	+
۲۱	۸	۲۱	فاقد آثار	۴	—	+

جدول شماره ۳ - اطلاعات گروه سوم که واجد علایم ترومما بر روی بدن بودند ولی سقط جنین حادث نشده بود.

سن بارداری (هفت)	تعداد زایمان	اثار ضرب و جرح	علائم تهدید به سقط	شواهد سونوکرافی
۲۸	۰	بریدگی انگشت	۱	جنین زنده و سالم
۴	۱	سیاه شدگی اندام ها	۴	جنین زنده و سالم
۶	۲	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۱۶	۰	کبودی صورت	۵	جنین زنده و سالم
۹	۰	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۶	۰	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۱۶	۳	کبودی تنہ و اندام ها	۵	جنین زنده و سالم
۸	۰	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۱۲	۰	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۸	۰	کبودی صورت	۵	جنین زنده و سالم
۲۰	۳	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۶	۱	فاقد اثار	۵	جنین زنده و سالم
۱۲	۳	کبودی و خراش صورت	۵	جنین زنده و سالم
۶	۴	کبودی صورت و تنہ	۵	جنین زنده و سالم
۸	۰	کبودی دراندام ها	۵	جنین زنده و سالم

به ندرت سبب از بین رفتن بارداری پس از جایگزینی تخم می‌شود و در سیاری از موارد علیرغم شکستگی لگن و با سایر ضایعات بارداری ادامه می‌باشد. بنابراین غیر محتمل به نظر می‌رسد که ضربه مسؤول موارد زیادی از سقط ها باشد و ذکر شده است که ترومahuای فیزیکی در سنین بالاتر حاملگی غالباً باعث جدا شدن زودرس جفت و زایمان زودرس می‌شود. در ترومahuای غیرنافذ احتمال مرک جنین در اثر شوک هموزاییک مادر، آسیب جفت، شکستگی لگن و هیپوکسی بیشتر می‌شود (۳۰-۴).

آسیب جنین و مرگ ان نادر است در صورت آسیب به جنین، صدمه به جمجمه و مغز از همه شایعتر است و اگر سر انگاره شده باشد در اثر ضربه به لگن مادر احتمال شکستگی آن وجود دارد. در ترومahuای نافذ احتمال آسیب به جنین بیشتر است و در $\frac{2}{3}$ موارد جنین آسیب می‌بیند (۵.۶): صدمات احتمالی در ۲۰ درصد موارد وجود دارد (۵.۶).

نتیجه گیری

از بررسی و تحلیل نتایج و یافته های به دست امده از گروه اول می‌توان چنین نتیجه گرفت که ترومای وارد به بدن خانم های باردار

کروه سوم

در این گروه که ۱۵ نفر (۳۰ درصد) بودند اثار ضرب و جرح بر روی بدن و علایم تهدید به سقط به دنبال ترومای درگیری وجود داشت ولی در زمان مراجعه سقط جنین صورت نگرفته بود (جدول شماره ۳).

بحث

در بررسی متون علمی و مقالات، مطالب مختلف و گاه ضد و نقیضی در مورد ترومahuای فیزیکی و سقط جنین به چشم می‌خورد. در کتب پژوهشی فانوئی امده است که برای اینکه سقطی ناشی از ترومای شناخته شود لازم است از زمان وارد امدن ترومای زمان سقط علایمی دال بر تهدید به سقط از قبیل خونریزی واژینال یا کرامپ شکمی وجود داشته باشد. نظر بر این است که اگر زنی سالم باشد و حاملگی او نیز سالم و بدون عیب و نقص باشد ترومای وقتی می‌تواند باعث سقط شود که به شکم و لگن وارد شود. ولی در حاملگی های مساله دار وارد آمدن ضربه به هر نقطه بدن باعث ایجاد سقط جنین خواهد شد (۲.۱). در کتب مرجع زنان نیز اشاره شده است که ضربه به نواحی شکم

که تروما تنها تحت شرایط خاصی که فبلا ذکر گردید می‌تواند منجر به سقط جنین شود.

پیشنهاد‌ها

۱- در بررسی این گونه مراجعه کنندگان بهتر است عوامل سبب ساز مؤثر در سقط های عادتی با وسعت و گستردگی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم مراجعت کنندگان به مراکز تخصصی ترجیح داشته باشند.

۲- در صورتی که این مطالعه در مدت زمان طولانی تر و با موارد بیشتری انجام شود نتایج بهتر و فابل قبول تری بدست خواهد امد.

تقدیر و تشکر

از کارکنان محترم بخش بایگانی مرکز پژوهشی قانونی تهران که در بررسی پرونده‌ها امکانات خوبی را در اختیار ما نهادند فدردانی و تشکر می‌شود.

در صورتی می‌تواند منجر به سقط جنین و زایمان زودرس شوند که اولاً نسبتاً شدید باشد، ثانیاً علایم تهدید به سقط به فاصله اندکی پس از وارد آمدن تروما به بدن ایجاد شده باشد و همچنین در فاصله اندکی پس از بروز علایم تهدید به سقط، سقط جنین یا زایمان زودرس ایجاد شده باشد و در صورتی که مدت زمان طولانی بین شروع علایم و سقط جنین وجود داشته باشد، شواهد سونوگرافی دال بر مرگ جنین در زمان وارد آمدن ضربه وجود داشته باشد (۴).

در بررسی نتایج بدست آمده از گروه دوم که رابطه میان سقط و تروما مورد تأیید قرار نگرفته بود مشخص می‌گردد که این گروه فاقد شرایط مورد پذیرش سقط ضربه ای بودند که در گروه اول وجود داشت. در مواردی شواهدی از سقط جنین و علایم تهدید به سقط وجود داشت ولی آثار ضرب و جرح بر روی بدن که نشان دهنده وارد آمدن تروما بر بدن بود وجود نداشت و در مواردی که آثار ضرب و جرح بر روی بدن وجود داشت علایم تهدید به سقط بلا فاصله پس از تروما ایجاد نشده بود و یا اصولاً سقط انجام نشده بود و در گروه سوم نیز که اصولاً سقط جنین صورت نگرفته بود ولی آثار ضرب و جرح و شواهد تهدید به سقط وجود داشت. به هر حال چنین به نظر می‌رسد

مراجع

- 4- Wilson Robat and et al. obstetric and Gynecology, 5th edition, 1997.
- 5- Knight Bernard. Forensic Pathology, second edition; 1996.
- 6- Al-Ansary La. Risk factors for spontaneous abortion among Saudi woman; 1995 Dec.

۱- توفیقی حسن. برگریده پژوهشی قانونی، تجدید نظر چهارم، تهران، مهر ماه ۱۳۷۶.

۲- میرحقانی، ضربه و سقط جنین، مجله پژوهشی ثانوی، سال دوم، شماره ۸، صفحه ۷۸

- 3- Cunningham Mc Dorland Williams. Obstetrics, 20th edition. Appleton and Lange; 1997.