

## مقاله پژوهشی

# به کارگیری روش آینده‌نگر «تحلیل حالات و اثرات خطا» برای بهبود فرآیند تریاژ در بخش اورژانس

دکتر شهرام توفیقی\* - دکتر محمدرضا ملکی\*\* - مصطفومه خوشگام\*\*\* - فرناز عطار جانثار نوبری\*\*\*\*

\*پژوهش، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (ع)

\*\*دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران

\*\*\*کارشناس ارشد آمار زیستی، مرتبی گروه آمار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران

\*\*\*\*کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران

## چکیده

**زمینه و هدف:** تریاژ و ارزیابی اولیه بیماران، به عنوان ریشه بسیاری از مسائل مدیریت رسیک (خطر) در بخش اورژانس مطرح شده است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی خطاهاي فرآيند ترياژ در بخش اورژانس بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و ارایه اقدامات پیشنهادی به منظور بهبود اين فرآيند است.

**روش بررسی:** در این پژوهش توصیفی، خطاها به روش کیفی-کمی «تحلیل حالات و اثرات خطا» یا FMEA شناسایی و تحلیل شدند. FMEA، روشی تیم محور، سیستماتیک و آینده‌نگر است که برای پیشگیری از مشکلات مربوط به فرآیندهای تولیدی یا خدماتی قبل از وقوع خطا و اشتباہ بکار می‌رود. گردآوری داده‌ها به صورت مصاحبه گروهی با تشکیل جلسات هفتگی تیم FMEA بود که نتایج آن در کاربرگ نهایی FMEA ثبت گردید.

**یافته‌ها:** به کمک متدولوژی FMEA، ۲۹ حالت خطا در ۱۱ فعالیت فهرست شده تریاژ شناسایی و ثبت گردید. با قابلیت اطمینان ۸۵٪ (یعنی کاهش رسیک خطاهاي با عدد اولویت رسیک بالاتر از ۱۵۰ به کمتر از ۱۵۰)، به ترتیب چهار خطای «ورود با تأخیر بیمار/همراه بیمار به اتاق تریاژ» با عدد اولویت رسیک ۲۵۲ («بررسی بسیار کوتاه مدت جهت اولویت‌بندی اولیه بیمار» و «ثبت نادرست میزان اکسیژن خون بیمار» هر دو با عدد ۲۴۵ و «تأخیر در گرفتن نوار قلب بیمار» با عدد ۱۶۰، به عنوان خطاهاي با رسیک بالا در فرآیند مورد مطالعه شناسایی شدند. برای کم کردن عدد رسیک خطاهاي «ورود با تأخیر بیمار/همراه بیمار به اتاق تریاژ»، اقداماتی در جهت کاهش احتمال وقوع یکی از علل آن صورت گرفت که موجب کاهش عدد رسیک آن از ۲۵۲ به ۱۱۲ گردید.

**نتیجه‌گیری:** یافته‌ها حاکی از آن بود که متدولوژی FMEA برای شناسایی و اولویت‌بندی نقاط قابل بهبود فرآیند تریاژ جاری در بخش پرمشغله و پیچیده‌ای نظیر بخش اورژانس (بدون در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به داده‌های کمی)، و نیز پیش‌بینی اقداماتی مؤثر برای کاهش رسیک، از کارایی و اثربخشی بالایی برخوردار است.

**واژگان کلیدی:** مدیریت رسیک، تحلیل حالات و اثرات خطا یا FMEA بخش اورژانس، تریاژ

وصول مقاله: ۱۳۸۸/۲/۲۱

نویسنده پاسخ‌گو: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان ظفر، نبش کوچه شهید بهرامی، پلاک ۱، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران  
f.jannesar@gmail.com

زیان می‌رسانند، که این زیان می‌تواند به صورت‌های گوناگون از بالا بردن طول اقامت تا مرگ متغیر باشد (۱).

به طور کلی در بررسی خطاهاي انسانی که عمدۀ خطاهاي سیستم‌های خدماتی از جمله بیمارستان است، دو نگرش وجود دارد: نگرش شخصی و نگرش سیستمی. در نگرش شخصی کانون توجه روی خطاهاي انسان‌ها است و همواره افراد به دلیل فراموشی، عدم توجه، انگیزه کم، بی‌احتیاطی، غفلت، بی‌باکی و ضعف‌های اخلاقی سرزنش

## مقدمه

آمارهای متفاوتی از بروز و شیوع خطاهاي پزشکی در بیمارستان‌های مختلف منتشر شده است. طبق برآوردهای انجام شده، تقریباً از هر ۱۰ نفری که در بیمارستان‌ها پذیرش می‌شوند، یک نفر رویداد ناگواری را تجربه می‌کند که حدود نیمی از آن‌ها قبل پیشگیری هستند. همچنین حدود یک سوم از این رویدادها به بیمار

فرآیند تریاژ بخش اورژانس مجتمع آموزشی-درمانی حضرت رسول اکرم(ص) انجام پذیرفت که اطلاعات آن، از طریق انجام مصاحبه گروهی<sup>۱</sup> به صورت تشکیل جلسات هفتگی تیم FMEA (شامل یک نفر استادیار طب اورژانس، دو نفر دستیار طب اورژانس، یک پرستار، یک منشی، یک نفر کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، یک نفر مسؤول آزمایشگاه، یک نفر مسؤول پذیرش و یک نفر مسؤول ترخیص و حسابداری و با حضور تیم محقق) گردآوری شد و نتایج هر مرحله در کاربرگ نهایی FMEA ثبت گردید. همچنین از تکنیک‌های بارش افکار<sup>۲</sup>، استخوان ماهی<sup>۳</sup> و تصمیم‌گیری گروهی نیز در مراحل FMEA استفاده شد.

متدولوژی به کار رفته FMEA یک ابزار نظام یافته بر پایه کار تیمی است که در تعریف، برای شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، حذف یا کنترل حالات، علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم، فرآیند، طرح یا خدمت، پیش از آن که محصول یا خدمت نهایی به دست مشتری برسد، بکار گرفته می‌شود<sup>(۹)</sup>; به بیان دیگر، یک تکنیک بهبود سیستمی از طریق افزایش ایمنی سیستم است<sup>(۸)</sup>. از سوی دیگر، «خطا»<sup>۴</sup> طبق تعریف IEC50(191) عبارت است از: «اتمام توانایی یک قسمت از سیستم برای انجام دادن یک فعالیت مشخص»<sup>(۱۰)</sup>.

مراحل طی شده پژوهش، بر اساس<sup>۴</sup> مرحله تبیین شده متدولوژی FMEA از سوی کمیته مشترک ارزیابی سازمان‌های مراقبت از سلامت JCAHO<sup>۵</sup> به شرح زیر صورت پذیرفت:

**۱ - ترسیم نمودار جریان<sup>۶</sup> فرآیند:** در این مرحله فرآیند تریاژ مورد مطالعه (از ورود بیمار به بخش اورژانس تا خروج او از اتاق تریاژ به منظور پذیرش الکترونیکی) از نمودار بازبینی شده جریان کلی بیمار در اورژانس حضرت رسول اکرم (ص) استخراج و فعالیت‌های آن به ترتیب فهرست گردید. این در حالی بود که درستی نمودار کلی جریان بیمار و فعالیت‌های فهرست شده تریاژ از سوی افراد تیم در ۳ مرحله با تصمیم‌گیری گروهی تصحیح و مورد تأیید قرار گرفت.

**۲ - تحلیل حالات و اثرات خطا:** در این مرحله خطاهای بالقوه یا خطاهای ممکن الوقوع به روش چارچوبی و با توجه به فعالیت‌های فهرست شده در فرآیند تریاژ شناسایی شدند. چارچوب فهرست نمودن این خطاهای «عدم انجام»، «انجام ناقص»، «نجام با تأخیر» و «نجام اشتباہ» هر فعالیت بود که پس از بررسی عینی بودن این خطاهای با توجه به محیط مورد مطالعه و حذف خطاهایی که عملًا امکان وقوع آن وجود نداشت، هر یک از خطاهای به همراه اثرات، علل و کنترل‌های آن، با اجماع نظرات اعضای تیم در کاربرگ نهایی ثبت گردید.

- 1- Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
- 2- Focus Groups
- 3- Brainstorming
- 4- Fishbone Diagram
- 5- Failure
- 6- Joint Commission on Accreditation of Health Organizations(JCAHO)
- 7- Flow Diagram

می‌شوند؛ چون طبق مفروضات این نگرش، همیشه خطاهای انسانی عامل اتفاقات ناگوار هستند. اما تمرکز نگرش سیستمی روی شرایطی است که انسان‌ها تحت آن شرایط کار می‌کنند. طبق مفروضات این نگرش انسان‌ها جایز الخطأ هستند، و بروز خطأ حتی در بهترین سازمان‌ها نیز اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب برای درمان خطاهای طبق این نگرش، بیشتر از این که به تغییر دادن اشخاص پرداخته شود، تلاش می‌شود تا شرایط کاری افراد بهینه‌سازی شود<sup>(۲)</sup>. در واقع هم‌زمان با ورود تفکر سیستمی در شناسایی و بهبود خطاهای بخش بهداشت و درمان، استفاده از روش‌های مختلف مدیریت ریسک در این بخش متداول شده است.

با توجه به این که مدیریت و کنترل ریسک از دیدگاه سیستمی در دو مرحله ارزیابی و مدیریت ریسک انجام می‌گردد<sup>(۳)</sup>، در این پژوهش از روش «تحلیل حالات و اثرات خطا»<sup>۷</sup> یا FMEA به عنوان یکی از ابزارهای ارزیابی و مدیریت ریسک که نگرش سیستمی به خطاهای دارد، برای شناسایی و پیشگیری از خطاهای استفاده شده است. این روش با رویکردی پیشگیرانه و آینده‌نگر به سازمان کمک می‌کند تا مشکلات بالقوه را شناسایی و قبل از آن که این مشکلات بر سیستم، خدمات و مشتریان تأثیر بگذارند، آن‌ها را برطرف کند<sup>(۴)</sup>. در واقع با به کارگیری فرآیند FMEA در نظام بهداشت و درمان نوعی تفکر سیستماتیک

جهت ایمنی فرآیند مراقبت بیمار پایه‌ریزی می‌شود<sup>(۵)</sup>.

همچنین با توجه به طبقه‌بندی بخش اورژانس جزء مناطق با ریسک بالا در بیمارستان به دلیل وجود شرایط بحرانی در اکثر بیماران اعزام شده به این بخش<sup>(۶)</sup>، وجود محدودیت‌های ارتباطاتی بین بیماران و ارایه‌کنندگان خدمات فوری درمانی در بخش اورژانس، دسترسی کم به پیشینه پزشکی بیمار و در نتیجه حساسیت فرآیند ارزیابی بیمار به عنوان منشاء بسیاری از مسایل مدیریت ریسک در این بخش<sup>(۷)</sup>، فرآیند تریاژ به عنوان فرآیند با ریسک بالا در بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، برای شناسایی و تحلیل خطاهای و بررسی نقاط قوت و قابل بهبود آن انتخاب گردید. این در حالی است که طبق مشخصه‌های فرآیندهای با میزان ریسک بالا نظری و رودی‌های متنوع، پیچیدگی، امکان کم استاندار دسازی، پیوستگی و وابستگی زیاد مراحل فرآیند به یکدیگر، وابستگی به مداخلات انسانی و سرانجام محدودیت زمانی<sup>(۸)</sup> نیز، ضرورت کاهش خطاهای فرآیند تریاژ جهت بهینه‌سازی اکثر فرآیندهای بخش اورژانس، نمایان می‌شود.

## روش بررسی

پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی است که به صورت ترکیب کیفی-کمی، حالات و اثرات خطا را با متدولوژی FMEA مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهد. منطق انجام پژوهش از نوع استقرایی است که بر اساس نتایج در طبقه کاربردی قرار می‌گیرد. مطالعات این پژوهش در مقطع زمانی اردیبهشت تا آخر آبان سال ۱۳۸۷ بر روی

## جدول ۲ - جدول امتیازدهی به شاخص میزان وقوع خطا (O)

امتیاز	میزان وقوع
۱۰	بیش از یکبار در ۸ ساعت
۹	یکبار در روز
۸	یکبار در ۳ روز
۷	یکبار در هفته
۶	یکبار در ماه
۵	یکبار در ۳ ماه
۴	یکبار در ۸ ماه
۳	یکبار در ۲ سال
۲	یکبار در ۶ سال
۱	یکبار در بیش از ۶ سال

به صورت جداگانه مطابق با جدول ۲، امتیازدهی شد و میانگین گردید. این امتیازات با احتساب ضریب ۳ برای امتیاز پرستار تریاژ (به عنوان صاحب فرآیند تریاژ)، ضریب ۲ برای امتیاز دستیار و منشی (به عنوان صاحبان فرآیند بعدی تریاژ) و بدون ضریب برای سایر افراد، به عنوان امتیاز نهایی میزان وقوع هر علت خطا محاسبه شد. سرانجام، میانگین امتیازات نهایی همه علل یک حالت خطا محاسبه و در ستون O کاربرگ نهایی ثبت گردید.

قابلیت کشف هر حالت خطا نیز با توجه به دستورالعمل‌ها یا روش‌های کنترلی موجود در بخش اورژانس مورد مطالعه برای پیشگیری از بروز خطاها یا اثرات آن بر بیمار که در ستون «روش‌های کنترلی» کاربرگ نهایی ذکر شده بود، طبق جدول ۳ توسط تک تک افراد تیم به صورت جداگانه امتیازدهی شد و میانگین گرد شده این امتیازات در ستون D کاربرگ نهایی وارد گردید.

۳- تعیین عدد اولویت ریسک (RPN)<sup>۱۵</sup>: در این پژوهش، با توجه به متغیر بودن شدت اثر خطا روی سه دسته از بیماران برای هر حالت خطا، ۳ نوع RPN محاسبه گردید. به این ترتیب که حاصل ضرب امتیاز شاخص میزان وقوع (O) در قابلیت کشف (D)، به صورت جداگانه در امتیاز شاخص شدت اثر خطا (S) بر بیمار بحرانی، اورژانسی و یا فوری، و غیر فوری ضرب گردید. سرانجام میانگین ۳ نوع RPN برای هر حالت خطا (برای سه وضعیت بیمار) محاسبه شد. سپس به ۸- Critical  
9- Emergent  
10- Urgent  
11- Non-Urgent (Fast)  
12- Severity (S)  
13- Occurrence (O)  
14- Detectability (D)  
15- Risk Priority Number (RPN)

- تشریح اثرات برای هر حالت خطا: در ستون «اثرات» در کاربرگ نهایی، اثر بلافضل و مستقیم خطا بر روی فرآیند درمان بیمار به تفکیک نوع بیمار اورژانسی در سه دسته بیماران بحرانی<sup>۸</sup>، بیماران اورژانسی<sup>۹</sup> و فوری<sup>۱۰</sup> و سرانجام بیماران سرپایی<sup>۱۱</sup> یا غیر فوری ثبت گردید.

- تشریح علل برای هر حالت خطا با استفاده از نمودار استخوان ماهی: به طور کلی علل زمینه‌ساز بروز خطاها مربوط به «تریاژ با کیفیت پایین» که طی یک جلسه بارش افکار در قالب نمودار استخوان ماهی گردآوری شده بود، در ستون «علل» کاربرگ نهایی برای هر یک از خطاها، ثبت گردید.

- امتیازدهی شاخص‌های شدت اثر<sup>۱۲</sup> (S)، میزان احتمال وقوع<sup>۱۳</sup> (O)، قابلیت کشف (D)<sup>۱۴</sup> هر حالت خطا با مقیاس ۱ تا ۱۰: در مورد شاخص شدت، شدت اثر بلافضل هر حالت خطا به تفکیک نوع بیمار اورژانسی و طبق جدول ۱ با نظرات تخصصی ۳ نفر از افراد تیم (یک نفر استادیار طب اورژانس، یک نفر دستیار طب اورژانس و یک پرستار) به صورت جداگانه امتیازدهی شد و میانگین گرد شده این امتیازات در ستون S کاربرگ نهایی وارد گردید. در ضمن با توجه به تفاوت‌های بخش درمانی با سایر بخش‌های غیر درمانی، جدول شدت به صورت ماتریسی در سه ستون میزان «آسیب‌رسانی»، «رضایتمندی» و «هزینه» برای بیمار (به ترتیب اهمیت آن‌ها با ضرایب ۱، ۰/۴ و ۰/۶ در ۵ ردیف تنظیم گردید، به طوری که حداکثر امتیاز گرد شده این جدول، عدد ۱۰ به دست می‌آمد. طراحی این جدول به صورت ماتریسی که از ابتکارات این پژوهش است، این مزیت را دارد که برآورده همزمان شدت اثر خطا را از سه جنبه متفاوت امکان‌پذیر می‌نماید. این در حالی است که در پژوهش‌های پیشین مشابه در بخش بهداشت و درمان، جداول تعیین شدت اثر به صورت ماتریسی و وزنی طراحی نشده‌اند و همگی به صورت ستونی و طبقه‌ای هستند. احتمال وقوع هر یک از علل خطاها، توسط هر یک از افراد تیم

## جدول ۱ - جدول ماتریسی امتیازدهی به شاخص شدت اثر خطا (S)

هزینه	هزینه جiran ناظر	شکایت به دادگاه جسمی و روانی	۱	۴/۰	۶/۰
امتیاز	آسیب‌رسانی	رضایتمندی	ضریب		
۵	مرگ، آسیب دائمی شکایت به دادگاه	هزینه جiran ناظر			
۴	آسیب بلند مدت، قابل توجه شکایت کتبی به بیمارستان	هزینه زیاد			
۳	آسیب کوتاه مدت، شکایت شفاهی متوسط	هزینه متوسط			
۲	آسیب کم نارضایتی	هزینه کم			
۱	عدم آسیب عدم نارضایتی	بدون هزینه			

۱۶- بیماران اورژانسی و فوری<sup>۱۶</sup>  
 - بیماران سرپایی یا غیر فوری  
 این در حالی بود که آن دسته از بیمارانی که اورژانسی نبوده و حتی در طبقه بیماران سرپایی یا غیر فوری در اورژانس قرار نمی‌گرفتند، توسط پرستار اورژانس به درمانگاه یا مرکز درمانی مربوطه راهنمایی می‌شدند. نحوه تصمیم‌گیری در فرآیند تریاژ مورد مطالعه طبق سه مدل کلاسیک تریاژ، در مدل جامع یا فراگیر قرار می‌گیرد، چرا که پرستار تریاژ بر حسب مورد، معاینات تعریف شده‌ای نظیر اندازه‌گیری فشار خون را در اتاق تریاژ، قبل از معاينه پزشک (۱۲) انجام می‌داد.  
 در مرحله دوم، ۲۹ حالت خط‌در طول ۱۱ فعالیت فرآیند تریاژ به روش چارچوبی شناسایی شد. از آنجا که طبق نمادهای نمودار جریان ترسیم شده تریاژ، جنس فعالیت‌های فهرست شده بر حسب فراوانی از نوع تصمیم‌گیری (لوژی)، عملکرد (مستطیل) و سپس ثبت سند بود، خطاهای شناسایی شده نیز بر حسب فراوانی به ترتیب از نوع خطاهای تشخیصی (۱۱) مورد، خطاهای عملکردی (۹) مورد و خطاهای ثبت (۹) مورد) به دست آمد. لازم به ذکر است که بیشتر خطاهای عملکردی شناخته شده که از نوع ارزیابی و هماهنگی بودند، از نوع تأخیر در انجام کار بودند تا عدم انجام یا انجام آن به صورت اشتباه. سپس در یک جلسه بازش افکار، علل «تریاژ با کیفیت پایین» در اورژانس، به ترتیب فراوانی در ۶ دسته زیر قرار گرفت: «نیروی انسانی» با ۱۳ علت، «بیماران و همراهان» با ۱۲ علت، «لوازم و تجهیزات» با ۱۰ علت، «محیط و تسهیلات» با ۹ علت، «فرآیند و روش کار» و «فرهنگ سازمانی» هر کدام با ۴ علت.

در مرحله سوم، پس از احتساب اعداد اولویت ریسک ۲۹ حالت خط و با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ۸۵٪، به ترتیب ۴ خطای زیر با اعداد اولویت ریسک بالای ۱۵۰ به عنوان خطاهایی با ریسک بالا در فرآیند تریاژ شناسایی شدند:  
 «ورود با تأخیر بیمار/همراه بیمار به اتاق تریاژ» با عدد اولویت ریسک ۲۵۲، «بررسی بسیار کوتاه مدت برای اولویت‌بندی اولیه بیمار» و «ثبت نادرست میزان اکسیژن خون بیمار» هر دو با عدد اولویت ریسک ۲۴۵ و «تأخیر در گرفتن نوار قلب بیمار» با عدد اولویت ریسک ۱۶۰ (جدول ۴).

علاوه بر آن عدد اولویت ریسک خطاهای زیر تنها برای بیماران بحرانی، بالاتر از ۱۵۰ بود: «تأخیر در شروع فرآیند اولویت‌بندی اولیه بیمار»، «بررسی بسیار طولانی جهت اولویت‌بندی اولیه بیمار» با ۱۸۹، «عدم ثبت شرح حال» با ۱۶۹، «ناخوانا بودن شرح حال» و «تأخیر در گرفتن عالیم بالینی بیمار» با

۱۶- بیماران اورژانسی و بیماران فوری، طی فرآیند تریاژ از هم نیز تفکیک می‌شوند. اما از آنجا که توالی فعالیت‌های صورت گرفته بر روی این دو دسته از بیماران در اورژانس مورد مطالعه تفاوت چندانی نداشت، این دو دسته در یک دسته قرار گرفتند. این در حالی است که بیماران اورژانسی از لحاظ نیاز به خدمات فوری اورژانسی نسبت به بیماران فوری از اولویت بالاتر برخوردارند.

### جدول ۳- جدول امتیازدهی به شاخص قابلیت کشف خط (D)

قابلیت کشف	احتمال	امتیاز
غیر قابل شناسایی	< ۱۰٪	۱۰
احتمال بسیار بعيد در شناسایی	۱۰-۲۰٪	۹
احتمال بعيد در شناسایی	۲۰-۳۰٪	۸
احتمال ناچیز در شناسایی	۳۰-۴۰٪	۷
احتمال کم در شناسایی	۴۰-۵۰٪	۶
احتمال ۵۰-۵۰٪ در شناسایی	۵۰-۶۰٪	۵
ممولاً قابل شناسایی	۶۰-۷۰٪	۴
احتمال بالا در شناسایی	۷۰-۸۰٪	۳
احتمال بسیار بالا در شناسایی	۸۰-۹۰٪	۲
حتماً قابل شناسایی	> ۹۰٪	۱

طور قراردادی با لاحظ کردن قابلیت اطمینان ۸۵٪ و با در نظر گرفتن دامنه  $RPN < 1000$  به واسطه مقیاس امتیازدهی ۱ تا ۱۰ در این مطالعه، خطاهای با  $RPN < 150$  به عنوان خطاهایی با ریسک بالا و غیر قابل قبول در فرآیند تریاژ مورد مطالعه، شناسایی شدند.

۴- پیشنهاد و اجرای آن در جهت حذف علل به وجود آورنده حالات خطاهایی که عدد ریسک بالا دارند: در این مرحله اقدامات پیشنهادی با توجه به موارد ذکر شده در ستون «اثرات»، «علل» و «روش‌های کنترلی» (یا کشف)، به منظور حذف یا کاهش شدت اثر خطای بر بیمار، حذف یا کاهش علت به وجود آورنده خطای، و یا افزایش قابلیت کشف وقوع حالت خطای پیش از آن که اتفاق بیفتند، برای حالات خطایی که عدد اولویت ریسک آن‌ها بالای ۱۵۰ بود، ارایه گردید. در واقع خطاهای با  $RPN \leq 150$  قابل قبول بوده وارد این مرحله نمی‌شدند.

همچنین به علت اهمیت اینمنی بیمار، اقدامات اصلاحی برای حالات خطایی که شدت اثر آن‌ها بر بیمار مساوی یا بیشتر از ۸ بود (صرفنظر از این که  $RPN \leq 150$  داشتند)، نیز در این مرحله ارایه گردید.

### یافته‌ها

طبق نمودار جریان فرآیند تریاژ اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) که در مرحله اول به دست آمد، بیماران اورژانسی توسط پرستار حاضر در اتاق تریاژ به سه دسته طبقه‌بندی می‌شدند:

- بیماران بحرانی

جدول ۴- خلاصه‌ای از کاربرگ نهایی FMEA برای ۴ خطای با ریسک بالا در فرآیند تریاژ مورد مطالعه به همراه پیشنهادات

حالت خطا	اثرات	S	علل	O	روش‌های کنترلی	RPN	D	اقدامات پیشنهادی
۱/ ۲ ورود با تأخیر بیمار یا همراه بیمار به اتفاق تریاژ	- تاخیر در لحاظ کردن وضعیت عمومی بیمار تازه - پیدا نکردن اتفاق تریاژ - ناآشنایی با معنا و مفهوم تریاژ(علل فرهنگی)	۱۰ ۷ ۴	(نیوود تخت (برانکارد) اورژانس تهران اورژانس تهران با محل اتفاق تریاژ برای بیماران اورژانس تهران به اتفاق تریاژ توسط نگهبانی یا پرسنل اورژانس اورژانس	۹	- انتقال مستقیم بیماران نیازمند به CPR اجیاء به اتفاق ماموران اورژانس تهران اورژانس تهران	۳۶۰ ۲۵۲ ۱۴۴	۴	اختصاص و استقرار یک یا دو برانکارد نزدیک درب ورودی اورژانس، تأمین ویلچر، برنامه‌ریزی برای بیماران بسترهای اورژانس، تعییر مکان اتفاق تریاژ به مکانی نزدیک به درب ورودی اورژانس، تعییه درب اتفاق تریاژ در خلخ مناسب آن و عرض حداقل ۳ متر، مدیریت مسیرهای ورود و خروج به اتفاق تریاژ، نصب تابلو تریاژ در مکانی در معرض دید، راهنمایی همه مراجعین اورژانس در بدود ورود توسط نگهبانی به اتفاق تریاژ و محل برانکارد
۲/۳ بررسی بسیار کوتاه مدت جهت اولویت بندی اولیه بیمار	- تصمیم گیری غلط در مورد سطح مراقبتی بیمار در مورد بیمار: - بحرانی - اورژانسی و یا فوری - غیر فوری	۹ ۸ ۴	- مراجعه همزمان چند بیماریه اتفاق تریاژ - فشارکار و خستگی پرسنل - اجرای دستورات Fast دارویی بیماران توسط پرسنل تریاژ - تعییر شیفت پرسنل و عجله او در تحويل پست - بی خاصل بودن اولویت بندی به جهت تکمیل شدن ظرفیت یکی از قسمتهای اورژانس نظری، CPR... - مراجعت مکرر بیماران غیر اورژانسی جهت پیگیری درمان قبلی خود	۷	- گرفن شرح حال دوباره توسط اینترنت یا دستیار تخصصی مربوطه در صورت پذیرش سرپایی یا بسترهای اورژانس	۳۱۵ ۲۸۰ ۱۴۰	۵	تعیین یک نفر به عنوان پرستار پشتیبان برای ساعت‌های اوج مراجعه، جاکردن مسیر ورود بیماران مرکز اورژانس تهران به اورژانس یا اتفاق تریاژ از مسیر ورود بیماران سرپایی اورژانس، تعیین پرسنلی با عنوان پرسنل Fast برای بیماران سرپایی اورژانس، استفاده از تلفن یا ابزار دیگری جهت فراغوادن دستیار تخصصی مربوطه، دادن امتیاز بازآموزی به پرسنل تریاژ، حضور یک اینترنت در اتفاق تریاژ، تقویت سیستم پذیرش درمانگاه‌های بیمارستان، جاکردن مسیر ورودی درمانگاه‌ها از ورودی اورژانس، آموزش و تأکید بر گرفتن شرح حال دوباره توسط اینترنت یا دستیار تخصصی مربوطه در صورت پذیرش سرپایی یا بسترهای اورژانس
۳/۴ ثبت نادرست میزان اکسیژن خون بیمار	- استناد بر میزان O2 خون ثبت شده در طول ویزیت اولیه بیمار: - بحرانی - اورژانسی و یا فوری	۷ ۷	- عدم دقت در ثبت میزان اکسیژن خون بیمار در فرم تریاژ - کالبیره نبودن اکسیمتر	۵	موردی ذکر نگردید.	۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۵	۷	آموزش اهمیت بیت اکسیژن خون بیمار در فرم به پرسنل تریاژ، عقد قرارداد با شرکت مربوطه جهت کالبیره نمودن مستمر ماهانه اکسی- مترا
۴/۵ تاخیر در گرفتن نوار قلب بیمار	- تاخیر در کسب اطلاع از نوار قلب بیمار: - بحرانی - اورژانسی و یا فوری	۹ ۷	- عدم حضور کمک بهیار ECG و نبود دستگاه ایستگاه پرسنلی - خرابی دستگاه ECG - تمام شدن کاغذ ECG	۵	- امکان پیچ کردن کمک بهیار از طریق ایستگاه پرسنلی	۱۸۰ ۱۴۰	۴	استقرار دستگاه ECG در کنار اتفاق تریاژ یا نزدیک به آن و حضور کمک بهیار در این اتفاق، ذخیره یک بسته کاغذ نوار قلب در ابزار اورژانس و سفارش بسته جدید به مغض استفاده از بسته ذخیره، تهیه یک تابلو درخواست‌های نوار قلب و نصب آن بر روی دیوار و ثبت درخواست‌ها

روش FMEA گردید.  
علاوه بر طبقه‌بندی خطاها طبق مدل بالا، با طبقه‌بندی دسته علل ذکر شده برای خطاها کلی «تریاژ با کیفیت پایین» طبق مدل زیر نیز مسیر شناسایی اقدامات اصلاحی در این مطالعه، هموار گردید:

- ۱ - بر اساس منشاء بروز خطأ: «بیماران و همراهان» و «نیروی انسانی» به عنوان عوامل انسانی، «لوازم و تجهیزات» و «محیط و تسهیلات» به عنوان عوامل ساخت‌افزاری، و «فرآیند و روش کار» و «فرهنگ سازمانی» به عنوان عوامل نرم‌افزاری طبقه‌بندی گردیدند. در زمان فهرست‌کردن علل و کنترل‌های موجود برای هر یک از خطاها در کاربرگ مربوطه، استفاده از این الگو به شناسایی دقیق‌تر اقدامات پیشنهادی کمک نمود.
- ۲ - بر اساس سهولت شناسایی: می‌توان «نیروی انسانی» و «بیماران و همراهان» را به عنوان علل آشکار، و سایر دسته‌ها را به عنوان علل نهفته طبقه‌بندی کرد. این در حالی است که اکثر افراد در جلسه بارش افکار بیشتر به علل آشکار اشاره کردن و این علل نسبت به علل نهفته در مدت زمان کوتاه‌تری فهرست گردید.

همچنین، می‌توان از دو طبقه‌بندی بالا برای دسته‌بندی خود خطا (علاوه بر علل آن) نیز استفاده نمود.

البته تاکنون طبقه‌بندی جامعی از انواع خطاها بخش بهداشت و درمان از جمله اورژانس ارائه نشده است. Henneman و همکارانش در تحقیقی به ارزیابی قابلیت مدل طبقه‌بندی Eindhoven در طبقه‌بندی خطاها گزارش شده بخش اورژانس ایالت ماساچوست آمریکا از تابستان ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ میلادی پرداختند. طبق نتایج این تحقیق بسیاری از خطاها اورژانس در طبقات این مدل قرار نگرفت و به عنوان موارد طبقه‌بندی نشده ذکر گردید (۱۳). خطاها در این مدل به ۴ دسته در دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌شوند:

- گروه خطاها نهفته<sup>۱۷</sup>: ۱) خطاها فنی (تجهیزات، طراحی، ساختمان، مواد، و عوامل بیرونی) ۲) خطاها سازمانی (انتقال دانش، پروتکل‌ها، رویه‌ها، اولویت‌های مدیریتی، و موارد فرنگی)
- گروه خطاها آشکار<sup>۱۸</sup>: ۳) خطاها انسانی (دانش-محور، قانون-محور، مهارت-محور) ۴) سایر خطاها (مربوط به بیمار و موارد طبقه‌بندی نشده) (۱۴).

طبق نظر Reason، برخلاف خطاها آشکار (بخصوص خطاها انسانی)، که اغلب به سختی پیش‌بینی و اصلاح می‌شوند، می‌توان شرایط نهفته را که زمینه‌ساز بروز خطاها از سوی انسان‌ها هستند، قبل از وقوع رویداد ناگوار شناسایی و اصلاح کرد. درک این مطلب مسیر شناسایی خطاها را به سوی مدیریت ریسک آینده‌نگر به جای گذشتنه‌نگر رهنمون می‌سازد (۲). Watcher خطاها پیش‌بینی را در طبقات خطاها دارویی، خطاها جراحی، خطاها تشخیصی، خطاها انسان-ماشین، خطاها انتقال و اعزام، خطاها ارتباطات و کار تیمی و در آخر عفونتها بیمارستانی قرار داده است (۱). اما این

17- Latent Failures

18- Active Failures

۱۶۲، «ثبت نادرست علایم بالینی بیمار در فرم تریاژ» و «ثبت اطلاعات نادرست در برگه فرم تریاژ» با <sup>۱۶۰</sup>.

در مرحله بعد، علل وقوع خطاها تحلیل و روش‌های کنترل و کاهش ریسک برای هر یک از خطاها بررسی شد. سرانجام، اقدامات اجرایی با توجه به علل و روش‌های کنترلی لیست شده برای ۴ خطا (با عدد اولویت ریسک >۱۵۰) و همچنین خطاها ی باشد که (علی رغم عدد اولویت ریسک ≤۱۵۰) پیشنهاد گردید. همچنین جهت کاهش میزان وقوع حالت خطا «ورود با تأخیر بیمار/همراه بیمار به اتاق تریاژ»

(۱) اتاق تریاژ به مکانی نزدیک به درب اورژانس با امکانات بهتر تغییر مکان داده شد،

(۲) تابلوی تریاژ در محل مناسب نصب گردید؛ و  
(۳) محل استقرار نگهبانان به کنار درب اورژانس تغییر مکان یافت.

بنابراین با کاهش میزان وقوع علت «پیدا نکردن اتاق تریاژ» برای این حالت خطا از امتیاز ۹ به ۴، RPN کلی این خطا از ۲۵۲ به ۱۱۲ کاهش یافت.

## بحث

با توجه به جنس فعالیت‌های فهرست شده تریاژ مورد مطالعه طبق نمادهای نمودار جریان، دور از انتظار نیست که نوع خطاها شناخته شده نیز بر اساس جنس فعالیت‌ها از نوع تصمیم‌گیری، عملکرد و ثبت سند باشد. این در حالی است که گفته Epstein، Riesک‌های عمدۀ تریاژ شامل خطا‌ی تشخیص وجود شرایط اورژانسی، رده‌بندی نادرست وضعیت بیمار، تشخیص نادرست، و خطا در کسب اطلاعات از بیمار است (۶) بنابراین، به نظر می‌رسد که عموماً عده خطاها تریاژ از نوع تصمیم‌گیری هستند. البته می‌توان علت اختلاف کم بین فراوانی خطاها تصمیم‌گیری و خطاها عملکردی در تریاژ مورد مطالعه را ناشی از نوع مدل به کار گرفته شده در این تریاژ دانست. به این ترتیب که پرستار تریاژ قبل از طبقه‌بندی بیمار در مدل جامع یا فرآگیر (برخلاف مدل اول و دوم) به معانیه فیزیکی و آزمایشات محدود بیمار نیز می‌پردازد. بنابراین به نظر می‌رسد که هرچه مدل به کار رفته برای انجام تریاژ پیچیده‌تر باشد، چون سه‌م تصمیم‌گیری فرد تریاژ کننده بیشتر می‌شود، در نتیجه فراوانی خطاها از نوع تصمیم‌گیری و ارزیابی بیمار نیز بیشتر خواهد شد. این در حالی است که به علت اهمیت بسیار زیاد عامل زمان در تریاژ، بیشتر خطاها عملکردی شناخته شده نیز از نوع تاخیر در انجام کار هستند تا عدم انجام یا انجام آن به صورت اشتباه. البته اینطور نیست که یک خطا فقط از نوع تصمیم‌گیری، یا عملکردی باشد، بلکه عموماً به یکی از آن‌ها گرایش بیشتری دارد. بنابراین، می‌توان با بهره‌گیری از این الگو ذهنی موجب سهولت شناسایی خطاها و راه حل‌ها در مراحل بعدی

۱۳۹۳۲ خطای گزارش شده از ۴۹۶ بخش اورژانس در آمریکا (عنی ۷۸ گزارش خطا از هر ۱۰۰,۰۰۰ ویزیت) ۳٪ منجر به آسیب شده بود که متدالوں ترین نوع خطا دوز مقدار نامناسب دارو (۱۸٪) بود. همچنین علل عمدۀ این خطاها به ترتیب عدم رعایت رویه/پروتکل (۱۷٪)، ارتباط ناکافی (۱۱٪)، لزوم همکاری‌های متعدد و گیج‌کننده (۷/۵٪)، شرایط اورژانسی (۴/۱٪)، و افزایش بارکاری (۳/۴٪) گزارش گردید. به اعتقاد ایشان خطاها دارویی بخش اورژانس ممکن است نتیجه شرایط مراقبتی حاد، پرازدحام و سریع الاجرا آن باشد که نیاز به شناسایی مداخلات برای کاهش این ریسک‌ها و ارزشیابی اثربخشی این مداخلات می‌باشد (۱۷).

به نظر می‌رسد که در تریاژ مورد مطالعه نیز عدم وجود پروتکل معین تریاژ و ارتباط ناکافی یا نبود الگوی تعريف شده ارتباطی با بیمار و به ویژه همکاران در قسمت‌های دیگر اورژانس، از علل ریشه‌ای خطاها تریاژ است. Benjamin نیز ارتباطات ناکافی کتبی یا شفاهی را علت بسیاری از خطاها به ویژه خطاها دارویی معرفی می‌کند. او دستیابی به عملیات ایمن را منوط به پایه‌ریزی سیستم‌های FMEA ایمن بیان می‌کند و بکارگیری روش FMEA را برای جلوگیری از خطاها سیستمی و شناسایی شبکه ایمن (دارای ارتباطات اثربخش) در سیستم‌های بهداشتی درمانی پیشنهاد می‌نماید (۱۸). از سوی دیگر، عبارت «فرهنگ ایمنی» برای محیطی بکارمی‌رود که در آن کار تیمی، ارتباطات شفاف، و پذیرش (هم از سوی ارایه‌کنندگان خدمات مراقبت سلامت و هم از سوی بیماران) وجود داشته باشد (۱). در این راستا، Hobgood افزایش ایمنی بیمار را در گرو توانایی ارایه‌کنندگان مراقبت سلامت در شناسایی، فاش کردن (به بیمار) و گزارش دادن صحیح خطاها پژوهشی بیان می‌کند. طی مطالعه آن‌ها به نسبت پرستاران تمایل این که پزشکان اورژانس مورد مطالعه آن‌ها به عنوان خطا داشتنند، تمایل کمتری را در فاش کردن و همچنین گزارش کردن خطاها از خود نشان دادند (۱۹). به بیان دیگر، استقرار مدیریت ریسک اثربخش علاوه بر قابلیت شناسایی خطا، به استقرار فرهنگ گزارش‌دهی خطا بر پایه اعتماد نیز بستگی دارد (۲).

در حال حاضر در بیمارستان‌های ایران نه تنها سامانه‌ای برای گزارش‌دهی خطاها و حوادث، پیش‌بینی نشده و یا به طور جدی اجرا نمی‌شود، بلکه به علت حاکم نبودن نگرش سیستمی به مدیریت خطاها و عدم وجود فرهنگ ایمنی در بیمارستان‌ها به واژه خطا به عنوان یک تابو نگریسته می‌شود. به همین دلیل در اکثر موارد در طول مصاحبه‌های پژوهش به جای واژه «خطا» از واژه «مشکل» استفاده شد. لذا پیشنهاد می‌گردد تا بستر سازی فرهنگ ایمنی در بخش بهداشت و درمان کشور، از بیمارستان‌های آموزشی با آموزش کار تیمی، مشارکت در تصمیم‌گیری، نحوه برقراری ارتباطات بین صنفی و ارتباط با بیمار به همه کارآموzan در رشته‌های مختلف پژوهشی، پرستاری و پیراپزشکی آغاز گردد. زیرا ضرورت ایجاد زمینه لازم برای

تقسیم‌بندی نیز شامل همه خطاها به ویژه خطاها نهفته نمی‌گردد. آنچه که قدم اول در کاهش خطاها بخش بهداشت و درمان شناسایی انواع خطاهاست، لذا به نظر می‌رسد در خصوص طبقه‌بندی خطاها این بخش به ویژه اورژانس به علت تنوع خطاها به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. در این راستا پژوهش‌های کیفی بیش از پژوهش‌های کمی می‌تواند در جهت تهیه یک مدل جامع طبقه‌بندی انواع خطاها و سپس ریشه‌یابی علل آن‌ها راه‌گشا باشد.

در مقایسه با طبقه‌بندی علل خطاها به علل آشکار و نهفته، Andersson و همکارانش در یک پژوهش کیفی، عوامل مؤثر بر پژوهش، عوامل درونی و بیرونی طبقه‌بندی نموده‌اند. طبق نتایج این بیرونی محیط کار نظیر حجم کاری بالا و آمادگی عملیاتی بر کیفیت ارزیابی اولیه بیماران (شامل شرایط بالینی، سابقه بالینی، آزمایشات و معاینات گوناگون) و در نتیجه اولویت‌بندی آنان در تریاژ تاثیر می‌گذارد (۱۵). اما تمرکز Bucknall و Gerdtzs روی عوامل بیرونی مؤثر در تریاژ بود، به این ترتیب که ایشان با بررسی ۱۷۲ پرستار تریاژ استرالیا ارتباط معنی داری بین ویژگی‌های جمعیتی نوع خدمات تریاژ با میزان خودمختاری پرستار و میزان مشارکت او در تصمیم‌گیری تریاژ نشان دادند. با این حال، ایشان آموزش پرستاران اورژانس را در کنار تدوین و ارزشیابی «راهبردهای عملکردی» تریاژ پیشنهاد نمودند (۱۶). این در حالی است که طبق پیشنهادات اجرایی فهرست شده در کاربرگ FMEA برای تریاژ اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، تهیه و تنظیم پروتکل تریاژ، آموزش آن به پرستاران تریاژ، اجرا و سپس بازبینی آن پیشنهاد شده است. با این توضیح که به منظور کاهش احتمال خطاها تشخیصی تریاژ در اولویت‌بندی بیماران، باید پروتکل تنظیم شده تریاژ بیماران اورژانس، مختص این اورژانس و با توجه به نقش کلیدی پرستار تریاژ در مدل به کارگرفته شده، نوع خدمات مورد نیاز و محدودیت‌های موجود در این اورژانس تنظیم گردد. با فرض این که احتمالاً سهم تهیه و تنظیم پروتکل تریاژ استاندارد در کاهش خطاها تصمیم‌گیری و ارزیابی بیمار، در مدلی که پرستار خودمختاری بیشتری در تصمیم‌گیری دارد، در مقایسه با دو مدل اول و دوم تریاژ، بیشتر خواهد بود.

عمولاً به علت دامنه وسیع نوع خطا در سیستم بهداشت و درمان، بسیاری از تحقیقات به صورت موردي خطاها را بررسی می‌کنند. اما از آنجا که شناسایی همه خطاها ممکن الوقوع به منظور مدیریت ریسک‌های تمامی عوامل خطا‌ساز و خطرساز اهمیت دارد، پژوهش حاضر، تمامی خطاها مربوط به فرآیند منتخب را شناسایی و ارزیابی کرده است.

در مقایسه، Pham و همکارانش با مطالعه مقطعی کل خطاها دارویی اورژانس که در سیستم MEDMARX از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی گزارش شده بود، به نتایج زیر دست یافتند: از بین

را نشان دهنده عدم بروز خط، و نارضایتی ایشان را نشان دهنده بروز خط تلقی نمود. بنابراین، امکان بهره‌مندی از نظرات مستقیم بیمار در امتیازدهی به ستون رضایتمندی بیمار در شاخص شدت اثر خط در پژوهش حاضر امکان پذیر نشد که می‌توان آن را از نقاط ضعف بکارگیری روش FMEA در بخش‌های بهداشت و درمان از جمله اورژانس دانست.

سرانجام باید در نظر داشت که توجه و تلاش بیش از حد روی کاهش اعداد RPN، موجب نادیده‌گرفتن تلاش برای کاهش حالات خطایی می‌شود که تاکنون اتفاق نیافتداده‌اند (۱۱)، لذا نباید خطاها یی با RPN پایین را که شدت و یا میزان وقوع و یا قابلیت کشف ۸ یا بالاتر دارند، از قلم انداخت. به عبارت دیگر، در هنگام به کارگیری روش FMEA در بخش بهداشت و درمان توجه به این نکته حیاتی است که نباید تأکید بیش از حد به عدد اولویت ریسک، باعث غفلت از خطاها یی با عدد اولویت ریسک پایین اما شدت بالا، یا میزان وقوع بالا و یا قابلیت کشف پایین به صورت مجزا شود.

## نتیجه گیری

روش تحلیل حالات و اثرات خط (FMEA) یکی از روش‌های کیفی-کمی و آینده‌نگر است که قابلیت بالای خود را به اقتضای شرایط مورد مطالعه نشان داده است. در این پژوهش نیز، شناسایی ۲۹ حالت بالقوه خط در طول تنها ۱۱ فعالیت تریاژ، شناسایی اثرات، علل و کنترل‌های رایج برای هر یک از خطاها، رتبه‌دهی خطاها طبق جداول تنظیم شده مختص شرایط بخش اورژانس مورد مطالعه، اولویت‌بندی خطاها و تعیین خطاها یی با ریسک بالا، ارایه پیشنهادات کاربردی و همچنین قابلیت ارزیابی میزان موقوفیت اقدامات پیشنهادی اجرا شده جهت بهبود فرآیند مورد نظر، همگی حاکی از قابلیت بالای این روش در شناسایی، ارزیابی و کنترل یا پیشگیری از خطاها بدون در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به داده‌های کمی موجود است. به ویژه آن که طبق متداول‌وزی FMEA می‌توان ریسک هر یک از حالات خط را به ۳ طریق کاهش احتمال وقوع علت بروز خط (کاهش شاخص O)، کاهش شدت اثر ناشی از خط (کاهش شاخص D) پیش از وقوع آن، کاهش کشف و شناسایی خط (کاهش شاخص S)، و افزایش احتمال داد و نتیجه مطلوب‌تری به دست آورد. در نتیجه، همان‌طور که طی فرآیند تریاژ در اورژانس، بیماران بر حسب نوع نیازشان به درمان فوری اولویت‌بندی می‌شوند، میزان فوریت نیاز به پیشگیری از خطاها نیز طی FMEA و با توجه به عدد اولویت ریسک مشخص می‌گردد.

سرانجام با توجه به رایج نبودن فرهنگ گزارش‌دهی خطاها در بیمارستان‌های کشور از یک سو، و احتمال مقاومت افراد در برابر استقرار یک سیستم گزارش‌دهی خط به طور اجرایی، گذشته‌نگر، و با نگرش شخصی به فرد خطاکار از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود تا به منظور شناسایی و کاهش همه ریسک‌های بخش اورژانس و سایر بخش‌های

استقرار سیستم گزارش‌دهی خط در این نوع بیمارستان‌ها بیش از سایر مراکز احساس می‌شود. مضاف بر این که با بررسی کارشناسانه گزارش‌های خط می‌توان مفاد آموزشی مورد نیاز کارآموزان را به منظور کاهش میزان وقوع خطها در این بیمارستان‌ها تعیین و لاحظ نمود تا از این طریق فرهنگ اینمی را در سرتاسر سیستم بهداشت و درمان کشور تسری داد. در تأیید این مطلب Shea و Battles با بررسی موردنی علل ریشه‌ای سه خطای گزارش شده از یک بخش اورژانس در انگلیس و دو بیمارستان آموزشی در آمریکا طبق مدل طبقه‌بندی Eindhoven اعلام کردند که کافی نبودن دانش کارآموزان یا آموزش ناکافی آن‌ها علت بالقوه آسیب رساندن به بیماران است. لذا ایشان استقرار سیستم گزارش حوادث را هم به صورت اجرایی و هم اختیاری جهت تعیین مفاد آموزشی کارآموزان در بیمارستان‌های آموزشی پیشنهاد نموده‌اند (۲۰). البته بر اساس مطالعات گذشته‌نگر هم می‌توان مفاد آموزشی مورد نیاز بیمارستان را تعیین نمود. برای مثال، بر اساس مطالعه گذشته‌نگر Lui و همکارانش در بررسی ۲۱۰ پرونده فوتی‌های کمتر از ۲۴ ساعت پذیرش در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی ملی تایوان (به غیر از بیماران سکته قلبی در بیرون از بیمارستان و بیماران سلطانی در مراحل پایانی بیماری) در طول ۳ سال، ۲۵٪ این مرگ و میرها قابل پیشگیری شناخته شد و عامل این مرگ‌ها به ترتیب درصد فراوانی مدیریت درمانی نامناسب، تشخیص اشتباه و تشخیص با تأخیر یا دیره‌گیری بیماری تعیین گردید (۲۱).

طبق روش بکار رفته FMEA، بهره‌مندی از تجربه و نگرش بیماران به عنوان مشتریان فرآیند یا سیستم مورد مطالعه، در این سازی آن اهمیت فراوان دارد. لذا جدول شدت اثر بر بیمار در اورژانس مورد مطالعه طوری طراحی شد تا تجربه بیمار از بروز خط از سه جنبه مورد مطالعه قرار گیرد. در مقایسه Burroughs و همکارانش در راستای توجه به نگرش بیماران نسبت به ۸ نوع خطا پیشکی، با ۷۶۷ بیمار از ۱۲ بخش اورژانس مصاحبه تلفنی کردند و به نتایج زیر دست یافتند: ۳۸٪ بیماران از بروز حداقل یکی از انواع خطاها نگران بودند (به ترتیب میزان نگرانی ایشان ۲۲٪ از تشخیص غلط، ۱۶٪ از خطاها پیشکی، ۱۶٪ از خطاها دارویی، ۱۲٪ از خطاها پرستاری و ۱۰٪ از رویه/آزمایش غلط بود) که نگرانی ایشان با جنس، سن، نژاد، مدت اقامت، حجم اورژانس، روز مراجعه و نوع بیمارستان ارتباط داشت (۲۲). البته میزان نگرانی بیماران از انواع خطاها لزوماً با میزان وقوع هر یک از انواع خطاها مساوی نیست. در واقع نگرش بیماران از احتمال وقوع خط در سیستم بهداشت و درمان را می‌توان به عنوان معیار سنجش میزان تحقق شرایط اینمی و یا استقرار فرهنگ اینمی در این سیستم تلقی نمود. البته توجه به تفاوت‌های بیماران به عنوان مشتریان سیستم بهداشت و درمان در مقایسه با مشتریان سایر سازمان‌ها ضروری می‌نماید. چرا که معمولاً مراجعین بخش بهداشت و درمان از جمله اورژانس با انتخاب خود عنوان مشتری را کسب نمی‌نمایند و اغلب از حقوق درمانی خود آگاهی ندارند. همچنین نمی‌توان رضایت ایشان

مجتمع آموزشی-درمانی حضرت رسول اکرم(ص)، و همچنین از اعضای فعال تیم FMEA جناب آقای دکتر سعید عباسی (استادیار گروه طب اورژانس)، دکتر فرهاد حیدری و دکتر مرضیه فتحی (دستیاران طب اورژانس)، خانم پریسا اسماعیلی (پرستار اورژانس)، خانم هارمیرم سیاه‌تیر و مرجان مستشار نظامی (کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، آقای مسعود مهدی پور (مسئول آزمایشگاه اورژانس) و خانم خدیجه باجلان (منشی بخش) تقدير و تشکر می‌نماییم.

بیمارستان، آموزش به کارگیری از روش تیم‌محور و آینده‌نگر FMEA از همه کارآموزان بخش‌های بیمارستان‌های آموزشی کشور در قالب دروس حین خدمت آغاز شود، تا نگرش سیستمی این روش به ماهیت خطاها، ترس از گزارش‌دهی خطاهای از سوی افراد را جبران بنماید.

### تقدیر و تشکر

از جناب آقای دکتر حسین سعیدی ریاست محترم بخش اورژانس

## References

- 1- Wachter RM. Understanding patient safety. United States of America: Mac Graw-Hill Companies; 2008. 10, 23-4.
- 2- Reason J. Human error: models and management. BMJ. 2000 Mar 18; 320: 768-70.
- 3- Heydari J, Pooriyamehr E, Abdi S. Introduction of risk management system. Tehran: Researches and Technology; 2006. 2 [Persian]
- 4- Kusler-Jensen J, Weinfurter A. FMEA An idea whose time has come. SSM. 2003 Jun; 9(3): 30.
- 5- L Spath P, Hickey P. Home study program: using failure mode and effects analysis to improve patient. Association of Operating Room Nurses (AORN) Journal. 2003 Jul; 78(1): 16
- 6- Epstein AL, Harding GH. Risk management in selected high risk hospital departments In: Kavaler F, Spiegel A. Risk management in health care institutions: a strategic approach. 2nded. United State of America: Jones and Bartlett; 2003. 326,329.
- 7- Brown S M. Managing risk in acute-care specialty units. In: Carroll R. Risk management handbook for health care organizations, 4thed. San Fransisco: American Society for Healthcare Risk Management; 2004; 295.
- 8- Smith IJ. Failure Mode and effects analysis in healthcare: proactive risk reduction. 2nd ed. United States of America: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO); 2005. 1,18-9.
- 9- Rezayi K, Seyed M, Noori B. FMEA Failure Mode and Effects Analysis. 2nd ed. Iran: RWTUV; 2005. 3,11 [Persian]
- 10- Gharachorlou N. Risk Assessment and risk management. East Azarbijan Province Branch: Sciences & Technologies; 2005. 16,49,63,168 [Persian]
- 11- Krouwer JS. An improved failure mode effects analysis for hospitals. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 2004 Jun; 128(6): 663-7
- 12- Jalili M, Fathi M, Eslami B. Principles of emergency department\_translation of selective chapter of the book Emergency department: principles and application. Salluzo R, Mayer T(editors). 1st ed. Tehran: Abnoos; 2009. 37-45 [Persian]
- 13- Henneman EA, Blank FSJ, Gattasso S, Williamson K, Henneman PL. Testing a classification model for emergency department errors. Journal of Advanced Nursing. 2008 Oct 8;55(1): 90-9.
- 14- Sherman H, Loeb J. Project to develop the international patient safety event taxonomy: updated review of the literature 2003-2005. Proceedings of The WHO World Health Organization Alliance for Patient Safety 2005 Sep; Geneva, Switzerland. 7.
- 15- Andersson AK, Omberg M, Svedlund M. Triage in the emergency department – a qualitative study of the factors which nurses consider when making decisions. Nursing in Critical Care. 2006 Apr 20; 11(3): 136-45.
- 16- Gerdzt M, Bucknall T. Australian triage nurses' decision-making and scope of practice. The Australian Journal of Advanced Nursing. 2000 Sep; 18(1): 24-33.
- 17- Pham JC, Story JL, Hicks RW, Shore AD, Morlock LL, Cheung DS, Kelen GD, Pronovost PJ. National study on the frequency, types, causes and consequences of voluntarily reported emergency department medication errors. Journal

- of Emergency Medicine. In press 2008.
- 18- Benjamin DM. Reducing medication errors and increasing patient safety: Case studies in clinical pharmacology. *Journal of Clinical Pharmacology*. 2003 Jul 1; 43(7): 768-83.
- 19- Hobgood C, Weiner B, Tamayo-Sarver JH. Medical error identification, disclosure, and reporting: Do emergency medicine provider groups differ? *Academic Emergency Medicine*. 2006 Apr; 13(4): 443-51.
- 20- Battles JB, Shea CE. A system of analyzing medical errors to improve GME curricula and programs. *Academic Medicine*. 2001; 76(2): 125-133.
- 21- Lu TC, Tsai CL, Lee CC, Ko PCI, Yen ZS, Yuan A, Chen SC, Chen WJ. Preventable deaths in patients admitted from emergency department. *Emergency Medicine Journal*. 2006; 23: 452-5.
- 22- Burroughs TE, Waterman AD, Gallagher TH, Waterman B, Adams D, Jeffe DB and et al. Patient concerns about medical errors in emergency departments. *Academic Emergency Medicine*. 2008 Jan 8; 12(1): 57-64.