

الگوی حساسیت و مقاومت متقاطع آنتی بیوتیک‌ها علیه سودوموناس اثروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی در جنوب ایران

عزیز ژاپونی^{*}، شهره فرشاد^۱، عبدالوهاب البرزی^۲، مهدی کلانی^۳، جلیل نصیری^۴

PhD.۱ میکروبیولوژی سلوی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی شیراز

۲ فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳ MCS ایمنولوژی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی شیراز

۴ BSc. میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی شیراز

* نشانی برای مکاتبه: شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیمارستان نمازی مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی کد پستی ۷۱۹۳۷۱۱۳۵۱

تلفن: ۰۶۲۶۲۲۵ - ۷۱۱ - ۶۲۸۷۰۷۱۱ . فاکس: ۰۷۱ - ۶۲۶۲۲۵ . E-mail: Japonia@hotmail.com

دریافت مقاله: شهریور هشتاد و چهار پذیرش برای چاپ: دی هشتاد و چهار

چکیده

سابقه و هدف: سودوموناس اثروژینوزا نقش مهمی در عفونتهای شدید در بیماران سوختگی ایفا می‌کند. اكتساب سریع مقاومت چند دارویی منجر به مرگ و میر بالا خصوصاً در مراکز نگهداری بیماران سوختگی می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین الگوی حساسیت و مقاومت متقاطع آنتی بیوتیک‌ها علیه سودوموناس اثروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی در جنوب ایران انجام شد.

روش کار: تست MIC جهت آنتی بیوتیک‌های ایمی پنم، مروپنم، سفیپیم، سفتازیدیم، سفوفیرازون، سولباکتوم، تیکاربیسیلین / کلاولانیت، پیپراسیلین / تازوپیکاتام، سیروفلوكساسین، توبیرامیسین و آمیکاسین برای ۷۰ سوش سودوموناس اثروژینوزا که از بیماران سوختگی جدا شده بود انجام شد. الگوی حساسیت و مقاومت به روشن E-test تعیین گردید. علاوه بر E-test سه نوع فعالیت سودوموناس شامل (IBL group MBL- Metallo-β-Lactamase ، ESBL(Extended-Spectrum β-Lactamase ، IBL(group I inducible β-Lactamase) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: به ترتیب ایمی پنم، مروپنم سیروفلوكساسین بالاترین فعالیت ضد باکتریایی را در محیط کشت علیه این باکتری را داشتند ($P < 0.05$) در مقابل تیکاربیسیلین / کلاولانیت کمترین فعالیت ضد باکتریایی را داشت. تقریباً تمام گونه‌های مقاوم (۹۱-۱۰۰%) فعالیت مقاومت متقاطع به سفیپیم را از خود نشان دادند. قسمت اعظم جدا شده هایی که به ایمی پنم (۱۰۰-۸۵%) مقاوم بودند از خود مقاومت متقاطع به بقیه آنتی بیوتیک‌ها نشان دادند. ESBL فقط در سه سوش (۴/۳٪)، IBL در هشت سوش (۱۱/۴٪) بافت شد. MBL در هیچ‌کدام از ایزوله شده‌ها وجود نداشت.

نتیجه گیری: تقریباً تمام سوش‌های مقاوم از خود مقاومت متقاطع به پنی سیلین‌ها و سفالوسیورین‌ها با بودن ممانعت کننده بتالاکتاماز یا بدون آن را نشان دادند. در این مورد تیکاربیسیلین / کلاولانیت در بالاترین سطح این پدیده دیده شد.

وازگان کلیدی: سودوموناس اثروژینوزا، آنتی بیوتیک‌ها، مقاومت متقاطع، سوختگی، ایران

مقدمه

هایی را تشکیل می‌دهد. تولید چنین مواد همراه با سیدروفورهای باند شده به آهن مانند پیوچیلین و پیووردین سبب استخراج آهن و سایر مواد غذایی از محیط موجود در میکروکلنی‌ها می‌شود^(۱-۲). وجود چنین آرایش اگزو آنزیمی و ژلی همراه با آنزیم پنی سیلینازها سطحی سلول سبب می‌شود ریشه کن کردن این ارگانیزم از وسایل و لوازم پزشکی بسیار دشوار شود و زخم‌های سوختگی را به عفونت با این باکتری مستعد سازد^(۳-۴).

سودوموناس اثروژینوزا باکتری پاتوزن فرست طلب گرم منفی است که دارای لیپوپلی ساکارید تازه قطبی و پلی بوده و این عوامل مسئول تب، حرکت و چسبیدن باکتری به غشاء سلولی بیولوژیکی بوده به عنوان عامل بیماری‌زایی این باکتری در مورد بیماران سوختگی دارای نقش مهمی هستند^(۱-۲). به علاوه سودوموناس اثروژینوزا انواع اگزو آنزیم‌هایی را تولید می‌کند که مقدار زیادی از بیماری‌زایی آنرا سبب می‌شود. چسبیدن باکتریها به وسایل و لوازم پزشکی بوسیله پلی و فیبریا تسريع می‌شود و تولید مقدار زیادی اگزو پلی ساکارید می‌کند که به آب باند شده و ژل

27853) به عنوان سوش کنترل در تعیین حساسیت ضد باکتریایی MIC break point استفاده شد و پس از یک انکوپاسیون ۱۸ ساعته، بر اساس BSAC(British Society for Antimicrobial Chemotherapy) تعیین گردید (۱۲).

روش Disk Approximation Method جهت بررسی شیوع فعالیت Mast diagnostics IBL انجام شد. تمام دیسک های آنتی بیوتیکی از Mersegsideside, UK تهیه شدند (۱۳). بر روی پلیت های حاوی آگار ارگانیزم مورد آزمایش streak شدند. دیسک سفتازیدیم ۳۰ میکروگرم به فاصله ۲۰ میلی متری از دیسک ایمی پنم ۱۰ میکروگرمی (از مرکز تا مرکز دیسک دیگر) بر روی پلیت قرار داده شد. سپس پلیت مدت ۱۸ ساعت در C ۳۷ ° سفتازیدیم بروی طرف نزدیکتر به دیسک ایمی پنم به عنوان وجود تفسیر گردید.

روش Double Disk Synergy Method (DDS) (تعیین شد) (۱۴). دیسک سفتاتکسیم و سفتازیدیم هر دو ۳۰ میکروگرمی (Oxoid Ltdi, Basingstoke, Hampshire, UK) به فاصله ۲۵ میلی متری در دو طرف دیسک آموکسی سیلین (۱۰ میکروگرم)/کلاولات (۱۰ میکروگرم) بروی محیط کشت حاوی آگار پس از یک overnight ایکوپاسیون قرار داده شد. افزایش هاله ممانعتی بطرف دیسک حاوی کلاولات به عنوان وجود ESBL تفسیر شد.

روش اصلاح شده Hedges test جهت تعیین فعالیت متالوبلاکاتاماز بکار گرفته شده (۱۵). پلیت حاوی Muller-Hinton Agar با نمونه کشت داده حساس به ایمی پنم از E-coli تقلیح گردید و یک شبانه روز در انکوپاسیون نگهداری گردید. سپس دیسک ایمی پنم (۱۰ میکروگرمی) در مرکز پلیت قرار داده شد سپس نمونه سودوموناس مقاوم به ایمی پنم در تمام سطح پلیت تقلیح گردید و یک شبانه روز دیگر انکوپاسیون گردید. وجود هاله ممانعت بهم ریخته به عنوان فعالیت متالوبلاکاتاماز تفسیر گردید. اطلاعات حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از chi-square test مقایسه شدند. آنالیز تقطیق داده ها بوسیله Cohen's kappa measurement صورت گرفت. سطح معنی دار P < 0.05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

جدول شماره ۱، کمترین غلظت عوامل خذ باکتریایی را نشان می دهد که از ۹۰٪ و ۹۰٪ رشد باکتریهای جدا شده جلوگیری کردند (MIC₅₀) (۹۰٪ MIC). مروپن و ایمی پنم بیشتری فعالیت خذ باکتریایی را در داخل محیط کشت داشتند و پس از اینها سیپروفلوکسالاسین بیشترین فعالیت را داشتند. آنالیز تقطیق داده ها بوسیله E-test (AB Biodisk, Sweden) نشان داد. نمونه های حساس نسبت به سودوموناس آنژوژنیوزا (ATCC American Typing Culture Collection) (۱۱٪) بودند.

بنابراین عفونت های شدیدی که به وسیله سودوموناس آنژوژنیوزا ایجاد می شود یک مشکل عمومی در بیماران سوختگی باقیمانده است و افزایش میزان مرگ و میر به سبب سوختگی به آن نسبت داده می شود. طبق مطالعه انجام شده در ۱۷۶ مرکز مراقبت از بیماران سوختگی در آمریکای شمالی، گونه های سودوموناس خطرناکترین عفونتی بود که در بیماران سوختگی دیده شد. در یک بررسی مشابه طی ۳۵ سال این باکتری عامل عفونت از بیماران سوختگی بود که به مرگ و میر ۷۷٪ آنها انجامید (۶). وضعیت درمان بیماران با عفونت سودوموناس آنژوژنیوزا خصوصاً زمانی که این ارگانیزم بطور ذاتی مقاوم به چند رده آنتی بیوتیکی باشد و بتواند مقاومت به تمام داروهای ضد میکروبی را کسب کند، مسئله ساز است (۷). برای مثال، توسعه مقاومت آنتی بیوتیکی خصوصاً مقاومت به آمینو گلیکو زیده ای که با واسطه plasmid عمل می کند سریعاً باعث انتقال ژن مقاومت به سودوموناس های حساس و سایر باکتریهای گرم منفی گردیده و ارگانیزم را نسبت به درمان مقاوم می کند (۹). از مرکز زخم سوختگی در بلژیک، سوش شایع سودوموناس آنژوژنیوزا با مقاومت چند داروئی گزارش شده است (۱۱). مطالعه حاضر برای تعیین سطح موجود حساسیت و مقاومت متقاطع برای آنتی بیوتیک های ضد سودوموناس که بطور گسترده ای علیه سودوموناس آنژوژنیوزا در مرکز سوختگی ما تجویز می شوند و مشخص نمودن مکانیزم های مقاومت با روشهای فنوتیپی بانجام گرفت.

روش کار

نمونه ها شامل هفتاد مورد ایزو لوه سودوموناس آنژوژنیوزای غیر تکراری و متناوب بودند که از دیمه ۱۳۸۱ تا اردیبهشت ۱۳۸۲ از بیماران بستری در بیمارستان سوختگی قطب الدین شیراز جدا شدند. یک سواب استریل برای نمونه گیری از هر بیمار مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها سریعاً روی

Nutrient Agar (Basingstoke, Oxoid Ltd, UK) کشت داده شد و یک دوره ۱۸ ساعته در حرارت C ۳۷ ° گرمخانه گذاری گردید. سپس هر کلنی مشکوک دوباره کشت داده شد و خالص گردید. نمونه ها بر اساس تست های اکسیداز و تخمیر ISI، رنگ، تولید رنگدانه پیو سیانین و بوی خاص مورد شناسایی قرار گرفتند. سوشها در درجه حرارت C ۷۰ ° - ۷۰ ° در محیط Nutrient broth ۳۰٪ گلیسرول ذخیره گردید.

جدول ۱: مقایسه مقادیر MIC آنتی بیوتیکهای مورد آزمایش نسبت به سودوموناس آنژوژنیوزا

	آمیکاسین	توبرامایسین	سپروفلوک	پیپراسیلین/لائز	سفوپرازون/سالبیک	سافتازیدیم	سپیم	تیکارسیلین/اکلا	مروپن	ایمی پنم	ایمی پنم
MIC ₅₀ µg/ml ^a	>۲۵۶	>۲۵۶	>۲۵۶	>۲۵۶	>۲۵۶	>۲۵۶	۹۶	>۲۵۶	۱	۲	۲
MIC ₉₀ µg/ml ^b	>۳۲	>۳۲	>۳۲	>۳۲	>۳۲	>۳۲	۵۱	۵۱	۲۱	۲۰	>۳۲
نمونه های مقاوم	۵۴	۶۷	۵۱	۵۱	۶۷	۴۸	۱۱	۱	۱	۱	۱
نمونه های نیمه مقاوم	۱۱	-	۹	-	-	۸	۱۰	۱	۱	۱	۱
نمونه های حساس	۵	۲	۱۹	۱۰	۱۰	۲	۱	۲	۴۸	۴۷	۳


Minimum Inhibitory Concentration(MIC) برای ایمی پنم، مروپن، سپیم، سفتازیدیم، سفوپرازون، سولیباکتم، تیکارسیلین/کلاولات، پیپراسیلین، تازوباكتم، سیپروفلوکسالاسین، توبرامایسین و امیکاسین با روش E-test (AB Biodisk, Sweden) انجام شد. نمونه سودوموناس American Typing Culture Collection (ATCC) (۱۱٪) آنژوژنیوزا

: **MP** : مروپنیوم، **IP** : ایمی پنیم، **CI** : سیپروفلوکسازین، **TZ** : سفتازیدم، **PTC** : پیپراسیلین / تازوباتکام، **AK** : آمی کیسن ، **TM** : توبرامایسین، **CPs** : سفپیم، **PM** : سفپرازون / سالباتکوم، **TLC** : تیکارسیلین / کلاووبونیت

جدول ۲ مقاومت متقاطع را در بین آنتی بیوتیک‌ها را نشان می‌دهد. تمام نمونه‌های مقاوم به آمیکاسین به توبرامایسین و سفپیم مقاوم بودند. همچنان بیشتر این نمونه‌ها مقاومت متقاطع به سفتازیدم ($P < 0.05$) و پیپراسیلین / تازوباتکام را از خود نشان دادند. تقریباً تمام نمونه‌های مقاوم مقاومت متقاطع به سفپیم نشان دادند (۰/۹۸-۱۰۰%). بیشتر نمونه‌های مقاوم به ایمی پنیم (۰/۸۵-۱۰۰%) و مروپنیم (۰/۷۶-۱۰۰%) مقاومت متقاطع به بقیه آنتی بیوتیک‌ها داشتند. مروپنیم و ایمی پنیم فعالترین آنتی بیوتیک‌ها در برابر نمونه‌ها مقاوم بودند. در حالیکه تیکارسیلین / کلاولانات (ESBL) فقط در سه نمونه (۰/۴۳) با روش Double Disk Synergy وجود داشت. IBL در هشت نمونه (۰/۱۱۴%) یافت شد. از ۱۱ نمونه‌ای که به سفتازیدم (۰/۱۱۴%) مقاوم بودند، هشت نمونه (۰/۷۳%) فعالیت IBL مثبت داشتند Metallo- β -lactamase در هیچ نمونه‌ای یافت نشد.

الگوی حساسیت سودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های مختلف در شکل ۱ نشان داده شده است. تحلیل داده‌ها حاکی است که در بین فعالیتهای ضد باکتریایی کار باپنیم (آمی پنیم و مروپنیم) تفاوت معنی داری را نشان می‌دهد ($P < 0.05$). در بین گروه ممانعت کننده‌های β - بتالاکتاماز و پنی سیلین (پیپراسیلین / تازوباتکام تیکارسیلین / کلاولانات) (پیپراسیلین ، تازوباتکام فعالیت ضد سودوموناس بالاتری را از خود نشان داد ($P < 0.05$). آمیکاسین در بین گروه آمینوگلیکوزیدی فعالیت موثرتری را از خود بروز می‌داد ($P < 0.05$) و در خانواده سفالوسپورین‌ها سفتازیدم بهتر از همه بود ($P < 0.05$).

شکل ۱: الگوی حساسیت سوبه‌های سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک‌های مختلف.



جدول ۲: مقاومت متقاطع سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک‌های مورد آزمایش

تعداد	تعداد نمونه‌ها و درصد (مقادیر داخل پرانتز) مقاوم به									
	AK	TM	CL	IP	MP	PTC	TLC	TZ	CPs	PM
AK	۵۴	۵۴(۱۰۰)	۴۱(۷۶)	۲۰(۳۷)	۲۰(۳۷)	۴۴(۸۲)	۴۳(۸۰)	۵۰(۹۳)	۵۳(۹۸)	۵۴(۱۰۰)
TM	۶۷	۵۴(۸۱)	۵۰(۷۵)	۲۰(۳۰)	۲۰(۳۰)	۵۰(۷۵)	۴۹(۷۳)	۵۹(۸۸)	۶۶(۹۸)	۶۷(۱۰۰)
CL	۵۱	۴۱(۸۰)	۵۰(۹۸)	۲۰(۳۹)	۲۰(۳۹)	۳۵(۶۸)	۳۳(۶۵)	۴۶(۹۰)	۴۹(۹۶)	۵۰(۱۰۰)
IP	۲۰	۲۰(۱۰۰)	۲۰(۱۰۰)	۲۰(۱۰۰)	۱۷(۸۵)	۲۰(۱۰۰)	۲۰(۱۰۰)	۲۰(۱۰۰)	۲۰(۱۰۰)	۲۰(۱۰۰)
MP	۲۱	۲۰(۹۵)	۲۰(۹۵)	۲۰(۹۵)	۱۷(۸۱)	۲۱(۱۰۰)	۲۱(۱۰۰)	۱۶(۷۶)	۲۱(۱۰۰)	۲۱(۱۰۰)
PTC	۵۱	۴۴(۸۶)	۵۰(۹۸)	۳۵(۶۹)	۲۰(۳۹)	۲۱(۴۱)	۴۵(۸۸)	۴۲(۸۲)	۵۰(۹۸)	۵۱(۱۰۰)
TLC	۵۱	۴۳(۸۴)	۴۹(۹۶)	۳۳(۶۵)	۲۰(۳۹)	۲۱(۴۱)	۴۵(۸۸)	۴۱(۸۰)	۵۰(۹۸)	۵۰(۱۰۰)
TZ	۵۹	۵۰(۸۵)	۵۹(۱۰۰)	۴۶(۷۸)	۱۶(۲۷)	۱۶(۲۷)	۴۲(۷۱)	۴۱(۶۹)	۵۸(۹۸)	۵۹(۱۰۰)
CPs	۶۷	۵۳(۷۹)	۶۶(۹۸)	۴۹(۷۳)	۲۰(۳۰)	۲۱(۳۱)	۵۰(۷۵)	۵۰(۷۵)	۵۸(۸۷)	۶۷(۱۰۰)
PM	۶۸	۵۴(۷۹)	۶۷(۹۸)	۵۰(۷۳)	۲۰(۳۹)	۲۱(۳۱)	۵۱(۷۵)	۵۰(۷۳)	۵۰(۸۶)	۶۷(۹۸)

: آمی کیسن ، TM : توبرامایسین، CI : سیپروفلوکسازین، IP : ایمی پنیم، MP : مروپنیوم، PTc : پیپراسیلین / تازوباتکام، TZ : سفتازیدم، CPs : سفپیم، PM : سفپرازون / سالباتکوم، سفتازیدم : AK

بحث

تحمین زده می‌شود (۰/۱۹%). میزان مقاومت در نمونه‌های ما $84/3\%$ است. این میزان مقاومت می‌تواند توسط عناصر قابل انتقال (پلاسمید یا ترانس پوزون) به سبب تجویز وسیع این دارو در بیماران بسترهای در مرکز سوختگی کسب شده باشد. تجویز گسترده آنتی بیوتیک مخصوصاً در کلینیک‌ها سبب افزایش فشار اختنابی بروی نمونه‌های حساس بوده و سبب افزایش نمونه‌های مقاوم می‌شود (۰/۲۰ و ۰/۲۱). نتایج نشان می‌دهد که کاربپنیم‌ها (مروپنیم و ایمی پنیم) از نظر فعالیت در بین سایر آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام مقام اول را دارند. به طوریکه در ایمی پنیم $28/6\%$ و میزان مقاومت دیده می‌شود و پس از این دو آنتی بیوتیک سیپروفلوکسا سین با $72/9\%$ قرار می‌گیرد.

مقاومت سودوموناس آئروژینوزا به بیشتر داروهای ضد میکروبی بیشتر در نتیجه همراهی بین outer membrane permeability پمپ چند داروئی ، تیپ ۱ β -Lactamase پمپ Inducible Ampc β -lactamase از هشت نمونه (۰/۱۱۴%) وجود داشت. این حقیقت که IBL در ۰/۷۳% نمونه‌هایی که حساس به سفتازیدم بودند این موضع را تداعی می‌کند که مقاومت می‌تواند در طول درمان از راه انتخاب جهت یافته‌های خاموش (depressed mutant) از جمعیت قابل تحریک (inducible) رخ داده باشد. مقاومت می‌تواند از راه اکتساب plasmid encoding β -lactamase رخ داده باشد. محدوده اکتساب مقاومت به سفتازیدم از ۰/۴۰ تا ۰/۱۰

مکانیزم‌های مقاومت به کارپانیم‌ها، MBL است که با واسطه پلاسمید صورت می‌گیرد (۲۳). مطالعه حاضر در هیچ نمونه‌ای فعالیت MBL را نشان نداد. به رغم اینکه مکانیسم تنظیمی MexB-oprM و از دست دادن oprD که با موتاسیون ساده صورت می‌گیرد می‌تواند در هر سوش سودوموناس اثروژینوزا صورت گیرد و بطور گسترده‌ای مرتبط با انتخاب کارپانیم‌های ضد سودوموناسی باشد (۲۴ و ۲۵). در زمان درمان با اینمی پنم، میزان مقاومت از ۱۶/۹٪ تا ۱۷٪ یافته شده است (۲۶ و ۲۷). متناسبانه این میزان در نمونه‌های جدا شده از سوختگی در مرکز ما به ۲۸/۶٪ می‌رسد. بر اساس این نتایج ترکیب کارپانیم‌ها و سیروفلوکسائین می‌تواند داروهای انتخابی برای بیماران سوختگی ما باشد. بهر حال برای تائید این پیشنهاد، ترکیب آنتی‌بیوتیک‌ها بایستی در *In vivo* و *In vitro* مورد آزمایش قرار گیرد. برای مثال ترکیب سفتازیدیم و یا پیراسیلین / تازوبلاتام همراه با کارپانیم و سیروفلوکسائین می‌تواند اثر فراینده را به سبب مکانیزم‌های مختلف از نظر عملکردی را سبب شود. همچنین استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های مانند کارپانیم‌ها و سیروفلوکسائین در ترکیب با یک داروی موضعی آنتی‌سیتیک مثل nanocrystal silver delivery system می‌تواند هم برای اثرات درمان و هم برای کاهش هزینه Nursing مفید باشد (۲۸). نهایتاً نمونه‌های جدا شده ما از یکی از مراکز سوختگی انتخاب شده اند و بنابراین جهت جلوگیری از انتخاب کلونی (clonal selection) نمونه‌هایی از سایر مراکز سوختگی در کشور باید مورد آزمایش قرار گیرند که می‌تواند منجر به دقت در نتیجه گیری شود.

گرچه هنوز گزارشات کمی از فعالیت MBL از سراسر دنیا گزارش شده است در این مطالعه Modified Hodge test جهت غربالگری نمونه‌های تولید کننده Metallo-β-lactamase به کاربرده شد ولی هیچ نمونه‌ای مثبت یافته نشد. مقادیر مشابهی از مقاومت نیز از ترکیه گزارش شده است (۲۲). در دهه اخیر مقادیر مختلفی از ESBL ها فقط در سه مورد سودوموناس اثروژینوزا یافته شده است. ESBL ها فقط در سه مورد (۴/۳٪) از نمونه‌های ما با روش DDS یافته شدند. میزان مشابهی نیز قابل‌گزارش گردیده بود (۲۲). یافتن آزمایشگاهی این مکانیسم‌ها به سبب ترکیب مکانیزم‌های مقاومتی می‌تواند مشکل باشد. بیان کلاس D از ESBL و سیستم Ampc مقاوم به ممانعت کننده‌های بتلاتامازرا نتیجه می‌دهد. اگرچه همراهی این دو سیستم را نمی‌توان تعیین کرد. ۷۳٪ از نمونه‌های ما چند مقاومتی بودند. مقاومت متقاطع بالایی بین نمونه‌های مقاوم فلوکسائین، سفالوسورین‌ها، آمینوگلیکوزیدها و پنی‌سیلین‌ها وجود داشت. مقاومت متقاطع بالایی در بین نمونه‌ها به کلاس های مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها احتمالاً نشانگر این است که مقاومت آنتی‌بیوتیکی به سبب عدم نفوذیتی یا پمپ (efflux) چند دارویی و یا ترکیب چند مکانیسم مقاومتی غیر مرتبط رخ می‌دهد. به علاوه، تفاوت معنی داری در فعالیت ضد سودوموناسی آنتی‌بیوتیک‌ها در هر گروه نشان می‌دهد که در داخل هر کلاس از آنتی‌بیوتیک‌ها احتمالاً مکانیزم‌های مختلف مقاومت دخیل هستند. به ترتیب کارپانیم‌ها (مرپونیم یا اینمی‌پنم) و سیروفلوکسائین فعالیت ضد باکتریالی را در مرکز سوختگی اولین تاسومین آنتی‌بیوتیک موثر نشان می‌دهد که کارپانیم‌ها انتخاب طلایی علیه نمونه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها دیگر هستند. بیشتر

REFERENCES

- 1- Vasil M and Ochsner UA. The response of *Pseudomonas aeruginosa* to iron: genetics. Mol Microbiol 1999; 34, 399-413.
- 2- Montie TC, Drake D, Sellin H, Slater O and Edmonds S. Mortality, virulence and protection with flagella vaccine against *Pseudomonas aeruginosa* infection. Antibiot Chemother 1987; 39, 233-48.
- 3- Pier GB. Peptide, *Pseudomonas aeruginosa*, polysaccharides and lipopolysaccharides-players in predicament of cystic fibrosis patients, Trend Microbiol 2000; 8, 247-50.
- 4- Tredget EE, Shankowsky HA, Joffe AM, et al. Epidemiology of infections with *Pseudomonas aeruginosa* in burn patients: the role of hydrotherapy. Clin Infect Dis 1992; 15, 941-9.
- 5 Shanokowsky HA, Callioux LS and Tredget EE. North American survey of hydrotherapy in modern burn care. J Burn Care Rehabil 1994; 15, 143-6.
- 6- McManus AT, Mason AD Jr, McManus WF and Pruitt BA Jr. Twenty-five year review of *Pseudomonas aeruginosa* bacteremia burn center. Eur J Clin Microbiol 1985; 4, 219-23.
- 7- Taylor GD, Kibsey P, Kirkland T, Burroughs E and Tredget E. Predominance of staphylococcal organism in infections occurring in a burn intensive care unit. Burns 1992; 18, 332-5.

- 8- Douglas MW, Mulholland K, Denyer V and Gottlieb T. Multi-drug resistant *Pseudomonas aeruginosa* outbreak in a burn unit- an infection control study. *Burns* 2001; 2,131-5.
- 9- Nicas TI and Iglewski HB. Isolation and characterization of transposon-induced mutants of *Pseudomonas aeruginosa* deficient in exoenzyme S. *Infect Immun* 1984; 45, 470-4.
- 10- Vasishta R, Saxena M and Chibber S. Contribution of silver Ion resistance to the pathgenicity of *Pseudomonas aeruginosa* with special reference to burn wound sepsis. *Foli Microbiol* 1991; 36, 498- 501.
- 11- Pirnay JP, DeVos D, Cochez C, et al. Molecular epidemiology of *Pseudomonas aeruginosa* colonization in a burn unit: persistence of a multidrug-resistant clone and a silver sulfadiazine-resistant clone. *J Clin Microbiol* 2003 ; 41, 1192-202.
- 12- MacGowan AP and Wise R. Establishing MIC breakpoints and the interpretation of in vitro susceptibility tests .*J Antimicrob Chemother* 2001; 48, 17-28.
- 13- Sanders CC and Sanders WE. β -lactam resistance in gram-negative bacteria: global trends and clinical impact. *Clin Infect Dis* 1992;15, 824-839.
- 14- Livermore DM. β -lactamases in laboratory and clinical resistance. *Clin Microbiol Rev* 1995; 8, 567-584.
- 15- Lee K, Chong Y, Shin HB, Kim YA, Yong D and Yum JH. Modified Hodge and EDTA-disk synergy tests to screen metallo- β -lactamase-producing strains of *Pseudomonas* and *Acinetobacter* species. *Clin Microbiol Infect* 2001; 7, 88-91.
- 16- Hancock REW. Resistance mechanisms in *Pseudomonas aeruginosa* and other nonfermentative gram-negative bacteria. *Clin Infect Dis* 1998;27, S93-S99.
- 17- Livermore DM. Of *Pseudomonas*, porins, pumps and carbapenems. *J Antimicrob Chemother* 2001; 4, 247–250.
- 18 Livermore DM. Multiple mechanisms of antimicrobial resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: Our worst nightmare? *Clin Infect Dis* 2002; 34, 634–640.
- 19- Nordmann P and Guibert M. Extended-spectrum β -lactamases in *Pseudomonas aeruginosa*. *J Antimicrob Chemother* 1998;42, 128-132.
- 20- Carmeli Y, Troillet N, Eliopoulos GM and Samore MH. Emergence of antibiotic-resistant *Pseudomonas aeruginosa*: comparison of risks associated with different antipseudomonal agents. *Antimicrob Agents Chemother* 1999; 43, 1379-1382.
- 21- Srikumar R, Kon T, Gotoh N and Poole K. Expression of *Pseudomonas aeruginosa* multidrug Efflux Pumps MexA-MexB-OprM and MexC-MexD-OprJ in a multidrug-Sensitive *Escherichia coli* Strain. *Antimicrob Agents Chemother* 1998;42,65-71.
- 22- Gencer S, Ak O, Benzonana N, Batirel A and Ozer S. Susceptibility patterns and cross resistances of antibiotics against *Pseudomonas aeruginosa* in a teaching hospital of Turkey. *Ann Clin Microbiol Antimicrob* 2002; 1, 2.
- 23- Nagano R, Adachi Y, Hashizume T and Morishima H. In vitro antibacterial activity and mechanism of action of J-111,225, a novel 1 β -methylcarbapenem, against transferable IMP-1 metallo- β -lactamase producers. *J Antimicrob Chemother* 2000; 45, 271-276.
- 24- Arita K, Daido K, Ohashi N, Nakamura K, Takeshima, Y and Kohara T. Study on antibiotics susceptibility and mechanism of carbapenem-resistance in clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa* . *Jpn J Antibiot* 1999; 52, 491–6.

- 25- Ochs MM, McCusker MP, Bains M and Hancock RE. Negative regulation of the *Pseudomonas aeruginosa* outer membrane porin OprD selective for imipenem and basic amino acids. *Antimicrob Agents Chemother* 1999; 43,1085-90.
- 26- Troillet N, Samore MH and Carmeli Y. Imipenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*: risk factors and antibiotic susceptibility patterns. *Clin Infect Dis* 1997; 25, 1094-8.
- 27- Calandra G, Ricci F, Wang C and Brown K. Cross-resistance and imipenem. *Lancet* 1986;ii , 340-1.
- 28- Innes ME, Umraw N, Fish JS, Gomez M and Cartotto RC. The use of silver coated dressings on donor site wounds: a prospective, controlled matched pair study. *Burns* 2001; 27, 621-27.

Archive of SID