

پاسخ کچلی سر به داروهای ضد قارچی در یک مدل *In vitro*

مسعود امامی^۱، مینا ثابت قدم^{۲*}، پروانه عدیمی^۳

۱. قارچ شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲. کارشناس ارشد میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران

۳. PhD قارچ شناسی، مدیر گروه انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

* نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان پاستور، انستیتو پاستور ایران، بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری- تلفن: ۰۲۰-۶۶۹۵۳۳۱۱-۶۶۹۵۳۳۲۵۸-۰۹۱۲۶۱۵۳۲۵۸
mina59s@yahoo.com

دریافت مقاله: آبان هشتاد و شش پذیرش برای چاپ: بهمن هشتاد و شش

چکیده

سابقه و هدف: کچلی سر (*Tinea capitis*) یکی از انواع درماتوفیتوزیس است که می تواند پوست و موی سر، ابروها و مژه ها را آلوده کند و در صورت عدم درمان مناسب به یک بیماری مزمن تبدیل شود. هدف از این پژوهش تعیین میزان مقاومت داروئی قارچ های ایجاد کننده کچلی سر، بررسی پاسخ داروهای ضد قارچی در یک مدل *invitro* از عفونت کچلی سر و پیشگیری از هزینه های درمانی اضافی بوده است.

روش کار: در این بررسی حساسیت ۸ سویه متعلق به ۵ گونه درماتوفیت نسبت به ۴ داروی ضد قارچی تربینافین، گریزئوفلووین، فلوکونازول و کتوکونازول توسط روش *Broth macrodilution* مورد بررسی قرار گرفت. حساسیت این سویه ها در ابتدا بدون حضور خرده موی کودکان و در مرحله دوم با حضور خرده موی کودکان نسبت به داروهای ضد قارچی مورد بررسی قرار گرفت. **یافته ها:** در مرحله اول تربینافین موثرترین دارو بر علیه اکثر سویه ها بود. داروی فلوکونازول کمترین تأثیر را روی سویه ها داشت. *Trichophyton rubrum* و *Trichophyton mentagerophytes* بیشترین MIC و *Trichophyton schoenlinie* کمترین MIC را نسبت به داروی کتوکونازول نشان دادند. بیشترین و کمترین MIC نسبت به گریزئوفلووین به ترتیب مربوط به *Trichophyton schoenlinie* و *Microsporum gypseum* بود. در مرحله دوم در حضور خرده های موی MIC اکثر سویه ها نسبت به داروهای مورد مطالعه افزایش یافت. آنالیز آماری داده ها تفاوت معنی داری ($P=0/0001$) را بین MIC داروها در مرحله اول و مرحله دوم نشان داد.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر تأثیر بیشتر تربینافین را نسبت به اکثر سویه ها نشان داد، با وجود این به دلایل مختلف از جمله تحمل پذیری بیمار، هزینه، ... گریزئوفلووین به عنوان داروی انتخابی درمان کچلی سر می باشد. در این تحقیق از خرده های موی جهت ایجاد شرایط مشابه *in vivo* استفاده شد و مشاهده گردید که این حالت باعث افزایش معنی دار MIC قارچها و مقاومت بیشتر آنها نسبت به داروها می شود. این امر کمک می کند تا انتخاب دارو با گزینه های درمانی مناسب تر صورت گیرد.

واژگان کلیدی: کچلی سر، درماتوفیتوزیس، درماتوفیت، داروهای ضد قارچی، MIC

مقدمه

عوامل خطر کچلی سر در بزرگسالان شامل مواردی مثل دیابت، کم خونی، نقص سیستم ایمنی، تغییرات هورمونی (مثل یائسگی)، کورتیکواستروئیدها و درجه قرار گرفتن در معرض عوامل بیماری زا می باشد (۳). با توجه به مکان شکل گیری آرتروکنیدی قارچ ها سه فرم بالینی کچلی سر شامل انواع اکتوتریکس، اندوتریکس و فاووس مشاهده می شود (۴). برای درمان کچلی سر از دو روش درمان موضعی و سیستمیک استفاده می شود. اغلب برای درمان کچلی سر روش سیستمیک لازم است. حداقل دوره درمان ها ۶ هفته است اما در مواردی ممکن است درمان تا چند ماه ادامه یابد (۵).

درماتوفیتوزیس یا عفونت های جلدی قارچی در انسان گستره وسیعی از بیماری ها را شامل می شود که پوست و ضامم آن مثل مو و ناخن را در بر می گیرد. کچلی سر (*tinea capitis*) یکی از شایع ترین عفونت های درماتوفیتی در انسان است که پوست و موی سر، ابروها و مژه ها را گرفتار می کند (۱). گونه های *Trichophyton* و *Microsporum* در اتیولوژی کچلی سر نقش دارند. افراد معمولاً در محدوده سنی ۷-۳ سال دچار این بیماری می گردند. کچلی سر در بزرگسالان غیر معمول می باشد. این عفونت در پسرها ۵ برابر بیشتر از دخترهاست، هر چند بعد از بلوغ این حالت برعکس می شود (۲).

دوم در طی ۴ هفته تغییرات هیف های قارچی به صورت میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت (۷ و ۸).

میزان رشد ارگانیزم ها با میزان رشد لوله کنترل سنجیده شد. OD لوله کنترل رشد در طول موج ۵۳۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مشاهده و ثبت شد، لوله ای که کدورت آن نصف کدورت لوله کنترل باشد به عنوان لوله MIC در نظر گرفته شد. این مدت توسط کمیته NCCLS ارائه شده است و روش انجام تست بر اساس پروتکل M38-A می باشد (۷ و ۹).

یافته ها

نتایج قابل تشخیص برای *Microsporum gypseum* ظرف ۲ روز و برای *Trichophyton rubrum* ، *Trichophyton mentagerophytes* و *Microsporum canis* ظرف ۷ تا ۱۰ روز و برای *Trichophyton schoenlinie* ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز انکوباسیون در دمای °C ۳۷-۳۵ قابل مشاهده و بررسی بود.

نتایج حاصل از بررسی تاثیر آنتی بیوتیک های ضد قارچی در حضور و عدم حضور خرده های مو بر روی قارچهای مورد مطالعه نشان داد که در هر دو مرحله تربینافین موثرترین داروی ضد قارچی بر علیه سویه ها می باشد و فلوکونازول کمترین تاثیر را بر روی نمونه ها داشت (جدول ۱ و ۲).

جدول ۱: MIC اولیه قارچ ها نسبت به ۴ داروی ضد قارچی

قارچ	آنتی بیوتیک			
	MIC اولیه			
	کتوکونازول	فلوکونازول	تربینافین	گریزوفلووین
<i>Microsporum gypseum</i>	۱۶	۲۴	۸	۶۴
<i>Microsporum canis</i>	۸	۲۴	۸	۱۶
<i>Trichophyton rubrum 1</i>	۳۲	۴۸	۲	۳۲
<i>Trichophyton rubrum 2</i>	۱۶	۲۴	۴	۱۶
<i>Trichophyton rubrum 3</i>	۳۲	۴۸	۲	۳۲
<i>Trichophyton mentagerophytes1</i>	۳۲	۴	۱	۳۲
<i>Trichophyton mentagerophytes2</i>	۱۶	۴۸	۰/۱۲۵	۸
<i>Trichophyton schoenlinie</i>	۰/۵	۴۸	۴	۰/۵

جدول ۲: MIC ثانویه قارچ ها نسبت به ۴ داروی ضد قارچی

قارچ	آنتی بیوتیک			
	MIC ثانویه			
	کتوکونازول	فلوکونازول	تربینافین	گریزوفلووین
<i>Microsporum gypseum</i>	۳۲	۹۶	۳۲	-
<i>Microsporum canis</i>	۱۶	۹۶	۸	۱۶
<i>Trichophyton rubrum 1</i>	۳۲	۹۶	۲	۳۲
<i>Trichophyton rubrum 2</i>	۱۶	۴۸	۸	۳۲
<i>Trichophyton rubrum 3</i>	۳۲	۹۶	۲	۳۲
<i>Trichophyton mentagerophytes1</i>	۶۴	-	۴	۶۴
<i>Trichophyton mentagerophytes2</i>	۱۶	-	۰/۵	۱۶
<i>Trichophyton schoenlinie</i>	۰/۵	۹۶	۸	۲

معمولا علت اصلی شکست های درمانی عدم تحمل بیمار است. در درمان کچلی سر داروهای مختلف از جمله گریزوفلووین، تربینافین، ایتراکونازول، کتوکونازول و فلوکونازول به کار می رود. اخیرا موارد مقاوم به درمان نیز گزارش شده است (۶). بنابراین ارائه تکنیک جدید نزدیک به مدل *in vitro* جهت آنتی بیوگرام عناصر قارچی ایجاد کننده عفونت کچلی سر در کوتاه کردن مدت درمان می تواند موثر باشد. ارزیابی اثر ضد قارچی داروها با ابداع تست هایی که شرایط بدن میزبان را برای قارچ بازسازی می کنند، مثلا استفاده از خرده های مو در شرایط آزمایشگاهی، به کاربردی بودن نتایج این آزمون در استفاده بالینی آن کمک می کند.

هدف از این پژوهش تعیین میزان مقاومت دارویی قارچ های ایجاد کننده کچلی سر، ارائه روش جدید برای آنتی بیوگرام قارچ های ایجاد کننده این بیماری، بررسی پاسخ داروهای ضد قارچی در یک مدل *in vitro* از عفونت کچلی سر و کاربرد آنتی بیوگرام قارچ ها همانند باکتری ها و پیشگیری از هزینه های درمانی اضافی بوده است.

روش کار

در این مطالعه اثر ضد قارچی ۴ داروی فلوکونازول (پارس دارو)، کتوکونازول (روز دارو)، تربینافین (بهوزان) و گریزوفلووین (دارو پخش) روی عوامل قارچی درماتوفیتی تهیه شده از بخش قارچ شناسی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت.

قارچ های درماتوفیت تهیه شده شامل *Trichophyton rubrum* ، *Trichophyton mentagerophytes* ، *Microsporum gypseum* ، *Microsporum canis* (PDA ، *schoenlinie*) بود. محیط ساپرو دکستروز آگار (s) ، *Potato dextrose agar* (sc) و ساپرو دکستروز آگار به همراه کلرامفنیکل (sc) و RPMI 1640 به همراه بافر MOPS جهت کشت مورد استفاده قرار گرفتند. در این بررسی از کشت های ۷-۱۵ روزه قارچ بر روی محیط PDA استفاده شد.

سوسپانسیون قارچی طبق روش پیشنهادی NCCLS تهیه گردید (۷)، به طوریکه در طول موج ۵۳۰ نانومتر ترانس میتنس ۹۵٪ را نشان بدهد. سوسپانسیون تهیه شده را به مدت ۱۵ ثانیه در شیکر قرار داده تا کاملا مخلوط شوند. سپس در لوله استریل ml ۰/۱ از سوسپانسیون قارچی و ml ۴/۹ از محیط RPMI 1640 اضافه شد.

MIC سویه ها نسبت به داروهای ذکر شده به روش *Broth macrodilution* طبق پروتکل NCCLS در دو مرحله تعیین گردید (۷). در مرحله اول MIC سویه ها بدون حضور خرده های موتعیین شد، در مرحله دوم خرده های مو ابتدا با کلرفرم و اتانول تیمار شده و سپس اتوکلاو گردیدند. سپس mg ۱۰ از این خرده ها به ml ۰/۹ از سوسپانسیون قارچ و RPMI افزوده شده و سپس به مدت ۱۰ روز در دمای °C ۳۷ انکوبه شدند. سپس از سوسپانسیون حاوی خرده های مو جهت تعیین MIC در مرحله دوم استفاده گردید. در این آزمون از سه شاهد برای کنترل حلال، دارو و رشد قارچ استفاده شد. در مرحله اول با گذشت ۴۸ ساعت به بعد می توان نتایج را مورد بررسی قرار داد. در مرحله

بحث

تا اواخر سال ۱۹۸۰ مقاومت بالینی به عوامل ضد قارچی نادر بوده و تنها در بیماران کاندیدیازیس جلدی- مخاطی مزمن مشاهده می شد، اما شیوع عفونت های قارچی که عفونت های مقاوم را هم شامل می شود طی دو دهه گذشته افزایش یافته است، به طوری که در سالهای اخیر مقاومت دارویی به عوامل ضد قارچی به صورت یک مشکل در آمده است (۱۰).

متدولوژی استاندارد NCCLS برای آزمایشات ضد قارچی از سوسپانسیون کنیدیال یا از سوسپانسیون مخلوط کنیدیال و میسلالیال که در محیط غنی شده رشد کرده، استفاده می کند. البته این نکته را باید در نظر داشت که درجه حرارت انکوباسیون، زمان خواندن نتایج و نوع نمونه ها ممکن است نتایج متفاوتی را در آزمایشهای حساسیت ضد قارچی درماتوفیت ها حاصل کنند (۱۱). اندازه مایه تلقیح یکی از مهمترین عوامل در انجام تست های حساسیت ضد قارچی به شمار می رود. در این تحقیق مایه تلقیح ۸ سویه به کار رفته در ترنس میتنس ۰.۹۵٪ تحت شرایط یکسان تنظیم شده و مورد بررسی قرار گرفت. تراکم مایه تلقیح $10^4 \times 5$ تا $10^4 \times 0.5$ بود که با مقدار توصیه شده توسط متد NCCLS برای قارچ های رشته ای مطابقت داشت. در سالهای اخیر بررسی های مختلفی بر روی حساسیت درماتوفیت ها به داروهای ضد قارچی در شرایط *in vitro* انجام شده است که نتایج آنها تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان داده است. این تغییرات احتمالا ناشی از تفاوت های متدولوژیک در بین آزمایشگاه ها می باشد.

MIC های اولیه (مرحله اول) مشاهده شده در این تحقیق در مورد تمام داروهای آزمایش شده یک محدوده ای از تغییرات را بر علیه گونه های درماتوفیت (میکروسپوروم و تراپیکوفایتون) نشان داده است.

یکی از داروهای به کار رفته در این تحقیق تربینافین بود، امروزه این داروی ضد قارچی برای بسیاری از درماتوفیتوزیس ها یک داروی انتخابی است ولی هنوز برای درمان کچلی سر به عنوان یک داروی انتخابی معرفی نشده است (۱۲). در کل تربینافین قوی ترین داروی مورد استفاده بود که *Trichophyton mentagerophytes* بیشترین حساسیت و *Microsporium canis* و *Microsporium gypseum* کمترین حساسیت را به این ضد قارچ نشان دادند. خلاصه ای از مقایسه نتایج



مرحله اول این تحقیق با نتایج سایر محققان در جدول (۳) آمده است. مرحله اول این تحقیق یعنی آنتی بیوگرام قارچ ها در کشور های مختلف صورت گرفته و نتایج قابل بررسی و مقایسه می باشد. مرحله دوم تاکنون در جایی صورت نگرفته، بنابراین نمی توان مقایسه ای انجام داد، در این تحقیق از خرده های مو برای ایجاد شرایط مشابه *in vivo* استفاده شد و با فرض اینکه شرایط به موقعیت و شرایط بالینی کچلی سر شباهت داشته که در این شرایط اثر دارو بر عفونت ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت و همان طور که مشاهده می شود در بعضی موارد نتایج این بررسی با نتایج سایر محققان متفاوت است که این اختلاف موجود در نتایج می تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله :

- ۱- تفاوت گونه ها و زیر گونه های قارچی در مقابل داروهای مورد بررسی
- ۲- مقاومت سویه ها نسبت به ضد قارچها
- ۳- اختلاف در کیفیت دارو که می تواند ناشی از اختلاف در شرکت سازنده دارو باشد و یا سایر مواردی که پرداختن به آن نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

در مرحله اول کمترین MIC مربوط به *Trichophyton mentagerophytes* نسبت به داروی تربینافین ($0.125 \mu\text{g/ml}$) و بیشترین MIC مربوط به *Microsporium gypseum* نسبت به داروی گریزوفلووین بود ($64 \mu\text{g/ml}$).

در مرحله دوم یعنی بعد از اضافه کردن خرده های مو نیز قارچ *Trichophyton mentagerophytes* حساس ترین قارچ نسبت به تربینافین بود، با این تفاوت که در این مرحله MIC آن نسبت به این دارو ($0.5 \mu\text{g/ml}$) بود، که این امر افزایش MIC را در حضور خرده های مو نشان می دهد. در مرحله دوم بیشترین MIC قارچها مربوط به داروی فلوکونازول بود.

در مرحله اول *Microsporium gypseum* و *Microsporium canis* بیشترین MIC را نسبت به تربینافین نشان دادند ($8 \mu\text{g/ml}$). در مرحله دوم MIC *Microsporium gypseum* نسبت به این دارو به $22 \mu\text{g/ml}$ افزایش یافت در حالیکه MIC *Microsporium canis* همان $8 \mu\text{g/ml}$ باقی ماند. بررسی سایر دارو های ضد قارچی نیز در حضور خرده های مو نتایج مشابهی را نشان داد، یعنی MIC اکثر سویه ها افزایش یافت. اختلاف معنی داری بین MIC سویه ها در مرحله اول و مرحله دوم (در حضور خرده های مو) دیده شد ($P < 0.001$). و اضافه کردن خرده های مو باعث افزایش معنی دار MIC قارچها گردید.



نتیجه گیری

متفاوت بودن نتایج، روتین کردن تست های آنتی بیوگرام قارچها را ضروری ساخته تا با پرداختن و مد نظر قرار دادن نتایج، عوارض ناخواسته دارویی را در نزد مصرف کنندگان این داروها به حداقل رساند.

تشکر و قدر دانی

از سرکار خانم وجیهه سادات نیک بابت یاری رساندن در ویرایش مقاله صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.

REFERENCES

- Rippon. J. W. The pathogenic fungi and actinomycetes. In: W. B. Saunders Company, Medical mycology. 2th edition., 1988; chap 8.
- Grase F Kao, MD.,Franklin Flowers,MD.,Michael J Wells, MD. Tinea capitis, Departments of dermatology and pathology, George Washington university Medical school, Department of pathology and laboratory, Emedicine journal 2005 Jun . Available from: <http://www.emedicine.com/DERM/topic420.htm>.
- Jin Yu, Ruoyu Li, Glenn Bulmer. Current topics of tinea capitis in china department of dermatology / Research center of medical mycology, china. Jpn. J. Med. Mycol. 2005, 46; 61 – 66.
- Gupta AK, Hofstoder sL, Adomp, Summer bell RC: tinea capitis: an over view with emphasis on manage mental. Pediatric dermal, 1999 may – Jun, 16 (16): 171 – 89.
- Temple ME, Jeffrey T. Kirchner, D. O. Pharmacotherapy of tinea capitis. J Am Board Fam Pract, 1999 May- June, 12; 236- 241.
- E. M. Higgins, L. C. Fuller and C. H. Smith . Guide lines for the management of tinea capitis. British Journal of Dermatology 2000, 143; 53 – 58.
- Michael A Pfaller , M.D., Chair holder, Vishnu Chaturvedi,Ph.D.,Ana Espinel - Ingroff, PhD- Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of filamentous fungi ; Approved standard –NCCLS document M38-A , USA.2002 ; 22 –No. 16 .
- Perea Sofia., AnneHe W. Fothergill, Deanna A. Sutton and Michael G. Rinaldi. Comparison of in vitro activities of voriconazole and five Established antifungal agents against different species of Dermatophytes using a Broth Macrodilution Method; Journal of clinical Microbiology, 2001 Jan, 19; 385 – 388.
- C. S. Osborne , I. Leitner, B. Farre and N. S. Ryder. Antifungal drug response in an in vitro model of dermatophyte nail infection, infection diseases department, Novartis research institute, Vienna, Austria, medical mycology April 2004, 42: 159 – 163 .
- Mahmoud A. Ghannoum and Louis B. Rice. Antifungal agents: mode of action, mechanism of resistance, and correlation of these mechanisms with bacterial resistance; clinical microbiology reviews, 1999 octuber. 12; 501 – 517.
- B. Fernandes – Torres, A. J. Carrillo, E. Martin, A. Dell. In Vitro activities of 10 anti fungal drugs Against 508 Dermatophyts strains. Anti microbial agents and chemotherapy september 2001, 45; 2524 – 2528,
- Osborne colin S, Be Hina Hofbauer , Bertrand Fuvre, and Neil S. Ryder invitro analysis of the ability of trichophyton rubrum to become Resistance to Terbinafine; antimicrobial agents and chemothropy. November 2003, 47; 3634 – 3636.

13. Alia S, M. Mendoz, E.A.Zambrano, E.Diaz. Dermatophytes growth curve and in vitro susceptibility test; a broth microtitration method .Medical mycology, June 2005, 43 ;319-325.
14. Bradley M.C, Leidich S,Isham N, et al .Antifungal susceptibilitises and genetic relatedness of serial *Trichophyton rubrum* isolates from patients with onychomycosis. Mycoses 1999, 42; 105-110.
15. Granade TC, Hehmann MF, Artis W. Monitoring of filamentous fungal growth by in situ microspectrophotometry, fragmented mycelium absorbance, density, and ¹⁴C incorporation: Alternatives to mycelial dry weight. Appl Environ Microbial, 1985, 49; 101-108.
16. Jessup CJ, Ryder NS, Ghannoum MA . An evaluation of the in vitro activity of terbinafine. Med Mycol 2000, 38; 155-159.
17. Nenoff P, Wolf T, Uwe-Frithjof H. Antifungal susceptibility testing of dermatophytes. 14th congres of societiese international mycological human and animals. 2000 May 8-13: Buenos Aires, Argentina.
18. Rex J, Pfaller M, Galgiani J, et al. Development of interpretative breakpoints for antifungal susceptibility testing; Conceptual framework and analysis of in vitro-in vivo correlation data for fluconazole and three other antifungal drugs and candida infection. Clin Infect Dis, 1997, 24; 235-247.
19. Belkys Fernandez – Torres. Isabel Inza, and Josef Guarro. In vitro activities of the new antifungal drug eberconazole and three other topical agent against 200 strain of dermatophytes . Journal of clinical microbiology, Nov 2003, 41; 5209-5211.
20. C.J.Jessup,J.Warner, N. Isham, I. Hasan, and M.A. Ghannoum. Antifungal susceptibility testing of dermatophytes : Establishing a medium for inducing conidial growth and evaluation of susceptibility of clinical isolates, Journal of Clinical Microbiology, January 2000, 38; 341-344.

Archive of SID