

## آگاهی و نگرش دانش آموzan مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه در رابطه با بیماری ایدز در سال ۱۳۸۷

\*حسین رنجبر<sup>۱</sup>

۱. کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه

\*نشانی برای مکاتبه: خراسان رضوی، تربت حیدریه، بلوار سپهبد قرنی، دانشکده پرستاری و مامایی، تلفن: ۰۵۳۱۲۲۲۸۰۲۳ - نمبر ۰۵۳۱۲۲۹۰۱۹  
همراه: ۰۹۱۵۳۳۲۷۸۳۰ - ho\_ra72@yahoo.com  
دریافت مقاله: فروردین هشتاد هشت  
پذیرش برای چاپ: خرداد هشتاد و هشت

### چکیده

**سابقه و هدف:** بیماری ایدز از جدی ترین مشکلات بهداشتی قرن حاضر محسوب می‌شود. انسانها به دلیل نوپدید بودن این بیماری اطلاعات اندکی در مورد آن دارند. لذا افزایش دانش افراد و جایگزینی رفتارهای بهداشتی بجای رفتارهای غیر بهداشتی در امر پیشگیری از این بیماری موضوع مهمی محسوب می‌گردد. دانش آموzan دبیرستانی از جمله گروه‌های در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. از این رو این پژوهش با هدف تعیین سطح آگاهی و نگرش دانش آموzan مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه در رابطه با این بیماری انجام شد.

**روش کار:** این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموzan مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه تشکیل می‌دادند. حجم نمونه ۱۰۰ نفر بود که به طریق نمونه گیری دو مرحله‌ای (خوش‌آمدی-تصادفی) وارد مطالعه گردیدند. انبار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه بود. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با بکارگیری آزمون‌های من وینتی، کروسکال والیس، کای‌دو و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**یافته‌ها:** از لحاظ میزان آگاهی ۴۷۴ نفر (۵۵درصد) آگاهی در سطح خوب، ۳۱۲ نفر (۳۹درصد) آگاهی در سطح متوسط و ۱۴ نفر (۱۱درصد) هم آگاهی در حد ضعیفی داشتند. در مجموع ۳۷۱ نفر (۴۶٪) دارای نگرش مطلوب و ماقبلي دارای نگرش خشنی و منفی بودند. دخترها میزان آگاهی بیشتری نسبت به پسرها داشتند ( $p < 0.02$ ). دانش آموzan دبیرستانی میانگین رتبه آگاهی بیشتری در مقایسه با دانش آموzan هنرستانی داشتند ( $p < 0.01$ ). همچنین دانش آموzan رشته تحریری میانگین رتبه آگاهی بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها داشتند ( $p < 0.001$ ). بین رتبه آگاهی دانش آموzan و سطح نگرش آنان رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد ( $p < 0.001$ ). در این پژوهش تلویزیون مهتمترین منبع کسب آگاهی قبلي دانش آموzan در مورد بیماری ایدز بود.

**نتیجه گیری:** در مجموع میزان آگاهی و نگرش افراد مطالعه در سطح خوبی بود. با توجه به آن که تلویزیون مهتمترین نقش اطلاع رسانی را در رابطه با این بیماری داشت، توجه به کیفیت برنامه‌های این رسانه و نیز تقویت نقش سایر منابع اطلاع رسانی بویژه مدارس در امر آموزش دانش آموzan ضروری است.

**واژگان کلیدی:** ایدز، دانش آموzan، آگاهی، نگرش

مبتلایان به ایدز در کشور ایران در سال ۱۳۸۳ حدود ۶۵۳۲ نفر بوده است که درصد آنان را مردان تشکیل می‌دادند. این تعداد در سال ۱۳۸۵ به ۹۵ نفر (۹۴ درصد مذکور) رسید. در حال حاضر در کشور ما ۶۶/۷ درصد مبتلایان از طریق مصرف داروهای تزریقی و ۳۰ درصد نیز از راه تماس جنسی به این بیماری مبتلا می‌گردند(۲).

### مقدمه

بیماری عالمگیر ایدز در جنوب صحرای آفریقا و افزایش اپیدمی‌ها در آسیا در حد غیر قابل پیش بینی قبلي احتمالاً اثرات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جهانی به همراه دارد (۱). این بیماری از جدی ترین مشکلات بهداشتی قرن حاضر محسوب می‌شود. در ایران اولین مورد مبتلا به بیماری ایدز در سال ۱۳۶۵ گزارش گردید که متعاقب آن شمار مبتلایان به این بیماری بسرعت افزایش یافت. بر طبق آمارهای رسمی تعداد

باورها ، اعتقادات و نیز تعیین سطح آگاهی و نگرش افراد هر منطقه بویژه نوجوانان و جوانان آن با توجه به زمینه‌های فرهنگی و اقلیمی همان مناطق است. از این رو این پژوهش با هدف تعیین سطح آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه در رابطه با بیماری ایدز صورت گرفته و لذا نتایج این بررسی می‌تواند در تدوین برنامه‌های آتی آموزش و پرورش و نیز سازمان‌های متولی بهداشت و درمان مفید و مؤثر واقع گردد.

## روش کار

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی است که در زمستان ۱۳۸۷ در شهرستان تربت حیدریه انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با فرض این که ۵۰٪ درصد دانش آموزان از آگاهی کافی در مورد بیماری ایدز برخوردار نباشد و حدود اطمینان ۹۵٪ همراه با ۵٪ خطای ۴۰۰ نفر محاسبه شد که البته بمنظور اطمینان بیشتر، تعداد آن به دو برابر فوق افزایش و در نهایت حجم نمونه ۸۰۰ نفر تعیین شد. نمونه گیری بصورت دو مرحله‌ای (خوش‌ای-تصادی) انجام شد. برای این منظور از بین ۳۲ دبیرستان و هنرستان سطح شهرستان در مرحله اول ۸ مرکز بصورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد از هر مرکز بصورت نمونه گیری احتمالی ساده و براساس جدول اعداد تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار گرد اوری داده‌ها پرسشنامه خود ایفاء بود که روابی آن با استفاده از نظر چندین متخصص در زمینه بیماری‌های عفونی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در ضمن در تدوین پرسشنامه از سوالات تحقیقات سایر پژوهشگران نیز استفاده شد<sup>(۱)</sup>. به منظور تعیین پیوستگی درونی سوالات پرسشنامه ابتدا مطالعه بر روی یک نمونه ۳۰ نفری از دانش آموزان یک مدرسه انجام گردید و شاخص آلفای کرونباخ (α=۰.۷۱) محاسبه شد. سوالات پرسشنامه در چند بخش تنظیم شده بود. بخش اول مشخصات فردی<sup>(۶)</sup> شامل سن، جنس، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی، محل سکونت و منبع کسب اطلاعات قبلی در مورد بیماری ایدز بود. بخش دوم سوالات مربوط به سنجش آگاهی به شکل بسته<sup>(۲۶)</sup> (چند گزینه‌ای و یا با پاسخ بلی، نمی دانم و خیر) بود. نمره گذاری سوالات بدین صورت بود که برای پاسخ‌های بلی نمره ۲، نمی دانم ۱ و خیر صفر در نظر گرفته شد که در مجموع محدوده ای ۰-۵۲ را شامل می‌شد و بصورت رتبه‌ای در سه محدوده بود (بیش از ۷۵٪)، متوسط (۷۵٪-۵۰٪) و ضعیف (کمتر از ۵۰٪) طبقه‌بندی گردید.

نگرش دانش آموزان توسط ۱۰ گویه از نوع مقیاس لیکرت از پاسخ «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف» مورد سنجش قرار گرفت که با توجه به جهت گویه، به هر پاسخ نمره ۱-۵ تعلق گرفت، بطوری که نمره نگرش هر فرد دامنه‌ای شامل ۱۰-۵۰ را در بر می‌گرفت و در سه رتبه، نگرش منفی یا نامطلوب (کمتر از ۵۰٪)، خنثی (۵۰-۷۵٪) و مثبت یا مطلوب (بیش از ۷۵٪) طبقه‌بندی گردید.

به منظور مقولیت سیاسی و ملاحظات اخلاقی تحقیق همانگی لازم با سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه، مدیران و معلمین مدارس صورت گرفت. پرسشنامه‌ها بصورت خود ایفاء و به تفکیک در مدارس پسرانه در حضور پژوهشگر و در مدارس دخترانه توسط یک نفر کارشناس خانم که آموزش لازم را توسط پژوهشگر دریافت نموده بود در مدت ۲۰ دقیقه تکمیل گردید. به دانش آموزان اطمینان داده شد که اطلاعات محرمانه خواهد بود و در ضمن شرکت در این بررسی کاملاً داوطلبانه می‌باشد. در پایان داده‌های حاصله جمع اوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۱/۵ و با بکارگیری آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس، کای دو و ضریب همیستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در همه آزمون‌ها سطح معنا داری ۰/۰۵ مد نظر قرار گرفت.

ایدز چهارمین علت اصلی مرگ در سطح بین المللی شناخته شده است بطوری که روزانه در سراسر جهان ۶۸۰۰ نفر مبتلا به ویروس ایدز شده و بیش از ۵۷۰۰ نفر هم به دلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی جان خود را ازدست می‌دهند<sup>(۳)</sup>. این بیماری نه تنها یک مسئله مهم بهداشتی، بلکه یک گرفتاری اقتصادی اجتماعی است ، بطوری که تاکنون برای درمان یک بیمار مبتلا به ایدز در ایالات متحده آمریکا بین ۱۱۰۰۰-۸۰۰۰ دلار هزینه گردیده است. انسانها به دلیل نوپدید بودن بیماری ایدز اطلاعات اندکی در مورد آن دارند. لذا افزایش دانش افراد و جایگزینی رفتارهای بهداشتی بجا رفتارهای غیر بهداشتی و ناسالم در امر پیشگیری از این بیماری موضوع مهمی محسوب می‌گردد<sup>(۴)</sup>.

دانش آموزان دبیرستانی از جمله گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری ایدز هستند زیرا در این سنین روابط اجتماعی آنها افزایش یافته و زمینه بروز رفتارهای پر خطردر آنان فراهم می شود<sup>(۵)</sup>. مطالعات متعددی در رابطه با میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان در مورد بیماری ایدز صورت گرفته است<sup>(۶-۹)</sup>. در مطالعه‌ای که سواست در همین زمینه بر روی دانش آموزان دبیرستانی در کشور ترکیه انجام داد مشخص گردید که سطح آگاهی دانش آموزان در این پژوهش در حد متوسطی بوده است<sup>(۶)</sup>. در پژوهش دیگری که در سال ۲۰۰۰ در نیجریه با بررسی دانش، آگاهی و رفتار دانش آموزان دبیرستانی در رابطه با بیماری ایدز انجام شد، مشخص گردید که سطح آگاهی دانش آموزان در مورد علت، ماهیت و روش‌های انتقال و پیشگیری از بیماری ایدز ناقص بوده است. همچنین در این مطالعه دانش آموزان نگرش مثبتی در مورد بیماری ایدز نداشتند<sup>(۷)</sup>. طاولوسی و همکاران در مطالعه‌ای دانش و نگرش دانش آموزان تهرانی را در رابطه با بیماری ایدز مورد بررسی قرار داده، نشان دادند که تنها تعداد اندکی از دانش آموزان به تمامی سوالات دانش ایدز پاسخ درستی داده. آنها همچنین ابهاماتی در مورد راه‌های انتقال بیماری داشتند. در این پژوهش دانش آموزان نگرش عدم تحمل قابل توجهی نسبت به بیماری ایدز و مبتلایان به آن داشتند<sup>(۸)</sup>. قابلی و همکاران هم در پژوهشی به بررسی نگرش دانش آموزان مؤنث شهر تبریز در مورد بیماری ایدز پرداخته و در مجموع دریافتند که دانش آموزان نگرش منفی نسبت به بیماری ایدز داشته‌اند<sup>(۹)</sup>. در مطالعه دیگری نیز مشخص گردید که اطلاعات دانش آموزان در رابطه با بیماری ایدز در حد متوسط بوده و دانش آموزان و بویژه پسران دارای نگرش منفی نسبت به بیماری ایدز بوده اند. همچنین در این پژوهش بین سطح آگاهی دانش آموزان و نگرش آنان ارتباط معنی دار و مستقیمی مشاهده گردید<sup>(۹)</sup>. مظفرزاده و وحدانی نیا هم دانش بهداشتی در مطالعه قرار داده و درختان دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که واحد های مورد بررسی از دانش نسبتاً خوبی در مورد بیماری ایدز برخوردار بوده و نیز نگرش مثبتی نسبت به این بیماران داشته‌اند<sup>(۳)</sup>. با این حال نتایج بسیاری از مطالعات انجام شده مبین سطح دانش ناکافی و نگرش نامطلوب دانش آموزان در رابطه با بیماری ایدز می‌باشد<sup>(۶-۹)</sup>. که این امر همراه با روند رو به افزایش مبتلایان موجب گردیده است تا بیماری ایدز در کشور ما به یک مشکل بهداشت عمومی تبدیل گردد که این موضوع لزوم برنامه های متعدد آموزشی مرتبط با این بیماری را برای گروه های مختلف افراد شامل دانش آموزان و دانش جویان طلب می نماید<sup>(۲)</sup>. بدیهی است برای تدوین هر برنامه آموزشی اولین اقدام انجام تحقیقات و بررسی های لازم در خصوص

## یافته‌ها

میانگین رتبه آگاهی دانش آموزان بر حسب جنس متفاوت بود و دخترها همبستگی مثبت و معنی داری بین سن دانش آموزان و سطح آگاهی آنان مشاهده شد ( ضریب همبستگی پیرسون،  $p<0.001$  ) $t=0.24$ . همچنین بین سن دانش آموزان و سطح نگرش آنان نسبت به بیماری ایدز و مبتلایان به آن همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد ، بدین معنی که دانش آموزان با سن بالاتر نگرش مطلوب تری نسبت به بیماری ایدز و مبتلایان به آن داشتند( $t=0.05$ ). دانش آموزان دبیرستانی نیز میانگین رتبه آگاهی بیشتری در مقایسه با دانش آموزان هنرستانی داشتند( $p<0.001$ ). همچنین دانش آموزان مدارس عادی میانگین رتبه آگاهی بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس نمونه داشتند( $p<0.001$ ). آزمون کروسوکال والیس میانگین رتبه آگاهی دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی را بیشتر از سایر پایه های تحصیلی نشان داد ( $p<0.001$ ). در بین رشته های مختلف تحصیلی نیز اختلاف در سطح آماری معنی داری وجود داشت ، بطوری که میانگین رتبه آگاهی دانش آموزان رشته تجربی بیش از سایر رشته ها بود ( $p<0.001$ ). مقایسه میانگین رتبه آگاهی دانش آموزان بر حسب مشخصات دموگرافیک آنان در جدول ۲ نشان داده شده است.

در زمینه نگرش دانش آموزان، در مجموع  $46/4\%$  دانش آموزان از نگرش مطلوب،  $50/1\%$  نگرش خنثی و  $3/5\%$  هم نگرش منفی نسبت به بیماری ایدز بروخوردار بودند. بین نگرش دانش آموزان پسر و دختر و نیز محل سکونت آنان تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. براساس نتایج ، دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی نگرش مطلوب تری نسبت به سایر پایه ها داشتند( $p<0.001$ ). بین نگرش دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی هم تفاوت معنی داری وجود داشت ، بنحوی که دانش آموزان دبیرستانی میانگین رتبه بیشتری نسبت به دانش آموزان هنرستانی داشتند( $p<0.001$ ). همبستگی مثبت و معنی داری بین نمره آگاهی دانش آموزان و نگرش آنان مشاهده شد. بطوری که با افزایش سطح آگاهی، دانش آموزان نگرش مطلوب تری نسبت به ایدز و مبتلایان به آن داشتند( $p<0.001$ ). مقایسه میانگین رتبه آگاهی و نگرش دانش آموزان بر حسب متغیرهای دموگرافیک آنها در جدول ۲ نشان داده شده است. در مورد نوع نگرش دانش آموزان به بیماری ایدز و مبتلایان به آن ، حدود  $64/9\%$  دانش آموزان فرد مبتلا به ایدز را بیمار تلقی می نمودند.  $88/2\%$  معتقد بودند که جامعه و خانواده ها باید مبتلایان به ایدز را حمایت و پشتیبانی نمایند. اما در بین آنان نگرش های منفی نیز دیده می شد، بطوری که  $59/4\%$  آنها معتقد بودند که حاضر به معاشرت با فرد مبتلا به ایدز نمی باشند. همچنین  $23/5\%$  آنها از هم صحبتی با مبتلایان به ایدز هراس داشتند.

از مجموع  $800$  دانش آموز مورد بررسی  $499$  نفر ( $62/4$  درصد) مؤنث و  $301$  نفر ( $37/6$  درصد) مذکور بودند. میانگین سنی دانش آموزان  $11/1 \pm 15/9$  سال و دامنه سنی آنها  $14-19$  سال بود. اکثر دانش آموزان ( $83/3$  درصد) در دبیرستان ها و مابقی در هنرستان ها مشغول به تحصیل بودند. از بین دانش آموزان دبیرستانی  $279$  نفر ( $34/9$  درصد) در رشته عمومی(پایه اول متوسطه)،  $161$  نفر ( $20/1$  درصد) در رشته تجربی ،  $125$  نفر ( $12/6$  درصد) در رشته ریاضی و  $101$  نفر ( $14/1$  درصد) هم در رشته انسانی تحصیل می کردند. در بین دانش آموزان هنرستانی  $41$  نفر ( $5/4$  درصد) در رشته نقشه برداری،  $27$  نفر ( $3/4$  درصد) در رشته مدیریت،  $16$  نفر ( $2/2$  درصد) در رشته خیاطی،  $14$  نفر ( $1/8$  درصد) در رشته باغبانی و  $36$  نفر ( $4/5$  درصد) در رشته رایانه مشغول به تحصیل بودند.  $279$  نفر ( $34/9$  درصد) از کل واحد های مورد پژوهش در پایه اول،  $235$  نفر ( $29/4$  درصد) در پایه دوم ،  $222$  نفر ( $27/8$  درصد) در پایه سوم و  $64$  نفر (ادرصد) هم در مقطع پیش دانشگاهی بودند. اکثر دانش آموزان  $566$  نفر ( $70/8$  درصد) ساکن شهر و  $234$  نفر ( $29/3$  درصد) هم ساکن روستا بودند. تلویزیون مهمترین منبع کسب آگاهی قبلی دانش آموزان در این پژوهش بود. آزمون کای دو تفاوت معنی داری بین منابع کسب اطلاعات قبلی دانش آموزان در مورد ایدز بر حسب جنس آنها نشان داد ( $p<0.02$ ). فراوانی منابع کسب اطلاعات قبلی دانش آموزان در رابطه با بیماری ایدز به تفکیک بر حسب جنس آنان در جدول (۱) نشان داده شده است. در این پژوهش تنها  $5$  نفر ( $0/6$ ) از دانش آموزان به تمامی سوالات آگاهی پاسخ درستی داده بودند. اکثر دانش آموزان ( $59/2$  درصد) در رابطه با بیماری ایدز آگاهی خوبی داشتند. البته ابهاماتی نیز برای آنها در این خصوص وجود داشت ، بطوری که  $8/3\%$  دانش آموزان از این که مبتلایان به بیماری ایدز ممکن است مدتیها از ابتلا به بیماری خود نآگاه باشند، اطلاعی نداشتند.  $4/6\%$  دانش آموزان خون و فرآورده های خونی را عامل انتقال بیماری ایدز ندانسته و یا از آن اظهار به اطلاعی کرده اند.  $9/5\%$  دانش آموزان آمیزش جنسی با فرد آلوده و  $14\%$  آنها شیر مادر را در انتقال بیماری مؤثر ندانسته و یا از آن بی اطلاع بوده اند.  $19/9\%$  دانش آموزان نیز پایبندی به اصول اخلاقی و خودداری از بی بند و باری جنسی را در پیشگیری از بیماری ایدز مؤثر ندانسته و یا از آن اطلاعی نداشته اند. همچنین  $8/5\%$  دانش آموزان استفاده از وسایل مشترک (نظیر تیغ و مسواک) را در امر پیشگیری از بیماری ایدز مؤثر ندانسته و یا از آن اظهار به اطلاعی نموده اند. بطور کلی آگاهی اکثر دانش آموزان  $59/2$ ٪ در سطح خوب ،  $0/39$ ٪ در سطح متوسط و  $0/18$ ٪ هم در حد ضعیفی بود.

جدول ۱. فراوانی منابع کسب اطلاعات قبلی دانش آموزان در رابطه با بیماری ایدز بر حسب جنس آنان

منبع اطلاعاتی	تلوزیون	رادیو	روزنامه و مجلات	اینترنت	کارشناسان بهداشتی	اخناء خانواده	دوستان و همسایان	معلمین و مدرسه	پوسترهای بهداشتی	جمع
جنس										
مؤنث	۲۱۲	۴۲/۵	۱۲	۲/۴	۱۹	۳/۸	۶/۲	۳۱	۶/۲	۴۹۹
مذکور	۱۶۸	۵۵/۸	۷	۲/۳	۵	۱/۷	۶/۳	۱۹	۶/۳	۳۰۱
جمع	۳۸۰	۴۷/۵	۱۹	۲/۴	۲۴	۳	۶۶	۵۰	۸/۳	۸۰۰
										Ch-square=۳۴/۵۶
										df = ۸
										p<0.02

جدول ۲- مقایسه میانگین آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان ها و هنرستان های شهرستان تربت حیدریه در مورد بیماری ایدز در سال

تحصيلي ٨٧-٨٨ ير حسب مشخصات دموغرافيک آنها

مشخصات دموگرافیک	میانگین رتبه آگاهی	سطح معنی داری	میانگین رتبه نگرش	سطح معنی داری	جنس
مذکور	۳۷۶/۵۴	*p< ./.۰۲	۴۰۸/۷۲	* p> ./.۰۵	
مؤثث	۴۱۴/۹۵		۳۹۵/۵۴		
شهر	۴۰۲/۲۶	*p > ./.۰۵	۴۰۸/۴۵	* p > ./.۰۵	محل سکونت
روستا	۳۹۶/۲۴		۳۸۱/۲۸		
دبیرستان	۴۲۲/۵	*p < ./.۰۰۱	۴۲۰/۷۶	* p < ./.۰۰۱	قطعه تحصیلی
هنرستان	۳۳۹/۸۸		۳۴۴/۶۵		
عادی	۴۲۲/۵	*p < ./.۰۰۱	۴۲۰/۷۶	* p < ./.۰۰۱	دبیرستان
نمونه دولتی	۳۳۹/۸۸		۳۴۴/۶۵		
اول	۲۹۲/۷	**p < ./.۰۰۱	۳۴۳/۵۱	** p < ./.۰۰۱	پایه تحصیلی
دوم	۴۱۱/۶۲		۳۹۶/۵۵		
سوم	۴۶۸/۰۲		۴۳۳/۰۳		
پیش	۵۹۵/۴۱		۵۵۰/۵۹		
دانشگاهی					
عمومی	۲۹۲/۷	**p < ./.۰۰۱	۳۴۳/۵۱	** p < ./.۰۰۱	رشته تحصیلی
تجربی	۵۴۹/۲۸		۴۹۶/۴۱		
ریاضی	۴۸۷/۸۸		۴۵۵/۱۲		
انسانی	۳۴۴/۸۴		۳۷۰/۴۴		
نقشه برداری	۲۵۰/۱۵۶		۴۰۶/۱۷		
مدیریت	۲۶۷/۰۲		۴۶۱/۵۲		
خیاطی	۴۷۰/۶۳		۲۳۸/۸۱		
با غیانی	۲۶۳/۸۲		۴۵۴/۵۴		
رايانه	۴۸۸/۴		۳۰۶/۱۳		

آمون من - ويتنى آزمون کروسکال والیس

پخت

در این پژوهش میزان آگاهی و نگرش ۸۰۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه در رابطه با بیماری ایدز مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع اکثر دانش آموزان مورد مطالعه از آگاهی خوب (پاسخ درست به بیش از ۷۵٪) و نگرش مثبتی در مورد بیماری ایدز برخوردار بودند. البته ابهامات و سوء تفاهماتی نیز برای آنها در مورد مهمترین راه های انتقال و عدم انتقال بیماری و روش های پیشگیری از آن وجود داشت، بطوری که درصد بسیار زیادی از دانش آموزان نیش حشرات(۶۲٪)، عطسه و سرفه(۸۱٪)، استفاده مشترک از ظروف غذا(۷۵٪)، استفاده از سروپس های بهداشتی و استخراج های شنا(۷۶٪) و دست دادن و روپویس کردن(۷٪) را جزو راه های انتقال بیماری می دانستند و یا از آن اطلاقی ندانستند. این ابهامات و سوء تفاهمات دانش آموزان در خصوص بیماری ایدز در مطالعات سایر پژوهشگران نیز به درجات متفاوتی گزارش گردیده است<sup>(۳)</sup>. همچنین ۴۶٪ دانش آموزان خون و فرآورده های خونی، ۹٪ دانش آموزان آمیزش جنسی با فرد الوده و ۱۴٪ آنها شیر مادر را در انتقال بیماری مؤثر ندانسته و یا از آن بی اطلاع بوده اند. ۱۹٪ دانش آموزان نیز پایبندی به اصول اخلاقی و خودداری از بند و باری جنسی، ۸٪ دانش آموزان استفاده از وسایل مشترک(ناظر تیغ و مسوک) را در پیشگیری از بیماری ایدز مؤثر ندانسته اند. لذا پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهامات موجود آموزش های لازم و کافی در مورد شمه های، انتقال، عدم انتقال، بیماری، به دانش آموزان، داده شود.

در این پژوهش تلویزیون مهمترین منع کسب آگاهی قبلی دانش آموزان در مورد بیماری ایدز بود. این یافته با نتایج تحقیقات سیاری همخوانی دارد (۳، ۴، ۵، ۶، ۷). از این رو تهیه و پخش برنامه های آموزشی از طریق رسانه های گروهی بویژه تلویزیون در مورد بیماری های عفونی و بیماری ایدز در خلال برنامه های مورد علاقه نوجوانان و جوانان در افزایش سطح آگاهی آنان بسیار مؤثر می باشد. همچنین در این مطالعه دخترها سطح آگاهی بیشتری نسبت به پسرها

## تشکر و قدر دانی

پژوهشگر برخود لازم می‌داند از همکاری و مساعدت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه، مدیران و معلمین و دانش آموزان مدارس در امر انجام این پژوهش تشکر و قدر دانی نماید.

## نتیجه گیری

میزان آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه در سطح خوبی بود، گرچه ابهامات و سوء تفاهماتی نیز برای آنها در مورد مهمترین راه‌های انتقال و عدم انتقال بیماری و روش‌های پیشگیری از آن وجود داشت. با توجه به آن که تلویزیون مهمترین نقش اطلاع‌رسانی را در این مورد ایفاء می‌نماید، توجه به کیفیت برنامه‌های این رسانه و مخاطبین آن و نیز تقویت نقش سایر منابع و بویژه مدارس در امر آموزش دانش آموزان ضروری است.

## REFERENCES

1. Velayati AA, Bakayev V, Bahadori M, Tabatabaei S J, Alaei A, Farahbood A, Masjedi MR. Religious and Cultural Traits in HIV/AIDS Epidemics in Sub-Saharan Africa. *Arch Iranian Med* 2007; 10 (4): 486 – 497.
2. Ghabili K, Shoja MM, Kamran P. The Iranian female high school students' attitude towards people with HIV/AIDS: a cross-sectional study. *AIDS Res Ther*. 2008 Jul 22;5:15.
3. مظفرزاده شهلا، وحدانی نیا مریم سادات. دانش بهداشتی در خصوص ایدز در دختران دانش آموز دبیرستانی: یک مطالعه مقطعی، فصلنامه پاییش بهار ۱۳۸۷، سال هفتم؛ شماره ۲ صفحات ۱۷۳ تا ۱۸۰.
4. Mazloomy SS, Shirvani-Anarak M, Dehghani Tafti AA, Tabibnejad N, Sheikhha MH . Knowledge and attitude about HIV/AIDS among pregnant women in Yazd, Iran. *Iranian Journal of Reproductive Medicine* 2007; 4(1):29-33.
5. حاجیان مطلق ناصر، فرشی سوسن، عبدالهی عشرت و دیگران. بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی از بیماری ایدز در شهرستان ساوجبلاغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۳، ۱۱، سال یازدهم؛ شماره ۴۱ (فوق العاده یک) صفحات ۳۹۳ تا ۴۰۰.
6. Savaser S. Knowledge and attitudes of high school students about AIDS: a Turkish perspective. *Public Health Nurs*. 2003 Jan-Feb;20(1):71-9.
7. Nwokocha AR, Nwakoby BA. Knowledge, attitude, and behavior of secondary (high) school students concerning HIV/AIDS in Enugu, Nigeria, in the year 2000. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2002 Apr;15(2):93-6.
8. Tavoosi, A; Zaferani, A; Enzevaei, A; Tajik, P; Ahmadinezhad, Z. Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among Iranian students. *BMC Public Health*. 2004;4:17.
9. Emamhadi M, Hadian M , Jalilvand M . Attitude and awareness about aids in high school students of Tehran. *Journal of medical Council of I.R.I*. 2007 winter; 24(4):350-357.
10. مظلومی محمود آباد سید سعید، عباسی شوازی معصومه. بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای استان یزد در مورد ایدز. فصلنامه طبیب شرق، بهار ۱۳۸۵ ، سال هشتم؛ شماره ۱ صفحات ۵۳ تا ۶۳.
11. مولوی نجومی مرضیه، شجاعی حسن، عامریان محمدعلی. آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران درباره بیماری ایدز در سال ۱۳۸۱. فصلنامه حکیم، پاییز ۱۳۸۲ ، سال ششم؛ شماره ۳ صفحات ۴۱ تا ۴۶.

۱۲. بهجتی اردکانی مصطفی ، آیت الله جمشید. بررسی میزان آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستان های شهر بزد از بیماری ایدز. مجله بیماری های کودکان ایران، زمستان ۱۳۸۴، سال پانزدهم: شماره ۴ صفحات ۳۲۱ تا ۳۲۶.
۱۳. مجیدپور علی، حبیب زاده شهرام، امانی فیروز، همتی فاطمه. نقش وسایل ارتباط جمعی در آگاهی و نگرش دانش آموزان در مورد بیماری ایدز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، بهار ۱۳۸۵ ، سال ششم: شماره ۱ (پیاپی ۱۹) صفحات ۶۷ تا ۷۲.
۱۴. هادی نگین، میرزایی کامران . بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز در مورد بیماری ایدز. طب جنوب، شهریور ۱۳۸۳ ، سال هفتم: شماره ۱ صفحات ۸۸ تا ۹۴.