

سویه‌های انتروکوکوس مقاوم به ونکومایسین در مرغ داری‌های تهران

لیلا اربابی^۱، مجید بودری^۲، جلیل وندیوسفی^۳، فرمیسک رحیمی^۴، فاتح رحیمی^{۵*}

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۲. استادیار ویروس شناسی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
۳. استاد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۴. دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی
۵. دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

* نشانی برای مکاتبه: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ۲، گروه زیست شناسی، Fateh Rahimi@sci.ui.ac.ir
دریافت مقاله: بهمن هشتاد و هشت پذیرش برای چاپ: فروردین هشتاد نه

چکیده

سابقه و هدف: انتروکوک ها فلور نرمال دستگاه گوارش انسان، پرندگان و سایر حیوانات هستند که از مهم ترین عوامل رایج ادریجاد عفونت های بیمارستانی محسوب می شوند. با توجه به انتقال ژنهای مقاومت بین باکتری ها و انسان، مخازن طبیعی میتوانند در انتشار سویه های مقاوم دخالت داشته باشند. این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های انتروکوکوس جداسازی شده از مرغداری های تهران به انجام رسیده است.

روش کار: ۱۲۲ ایزوله انتروکوکوس بر روی محیط *Membrane Filter Enterococcus Selective Agar* واحد ونکومایسین جداسازی و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تا حد گونه شناسایی گردیدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این سویه ها نسبت به ۶ آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و همچنین *MIC* سویه های مقاوم به ونکومایسین به روش *micro-dilution* با استفاده از توصیه های *CLSI* انجام گردید.

یافته ها: ۴۵ و ۵۱ سویه بترتیب *E. faecalis* و *E. gallinarum* بودند. ۳۹ سویه نیز مقاوم به ونکومایسین بود. مقاومت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، تتراسایکلین، جنتامایسین، کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین بترتیب ۳۹، ۲۳، ۱۹، ۱۹ و ۲۰٪ *MIC* بود. از سویه ها نیز برابر یا بیش از ۲۵۶ میکروگرم برمیلی لیتر بود.

نتیجه گیری: به رغم شیوع سویه های *VRE* متعلق به ۳ گونه بود اما *E. faecium* بالاترین میزان مقاومت را داشت و مقاومت بالایی به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها را نشان داد. نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش بسیار مهم نمونه های ماقیان بعنوان مخازن شاخص های مقاومت است، بنابراین باید نسبت به نظارت دقیق بر سیستم بهداشتی و غذایی توجه شایانی مبدول داشت.

واژگان کلیدی: انتروکوک، ماقیان، تهران

از عفونتها توسط *E. casseliflavus* و *E. gallinarum* بوجود می آید (۵). انتروکوک ها، عوامل مکرر در ایجاد عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه می باشند که در این بخش ها به علت مصرف بی رویه سفالوپسیورین ها و سایر آنتی بیوتیک هایی که انتروکوک ها به آنها مقاوم هستند، ظاهر می شوند. از سال ۱۹۷۰ تا کنون انتروکوک ها به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی مطرح شده اند. به دلیل وجود مقاومت ذاتی و همچنین مقاومت اکتسابی ناشی از موتاسیون و یا دریافت اجزا ژنتیکی از طریق انتقال پلاسمید ها یا ترانسپوزون، این باکتری قادر به بقا در محیط بیمارستان است (۶-۷).

مقدمه

حضور دائمی انتروکوک ها در دستگاه گوارش انسان و حیوانات به عنوان فلور نرمال، اهمیت بالینی آنها در ایجاد عفونت، توانایی ایجاد مقاومت به چند آنتی بیوتیک و ظرفیت بالای آنها برای انتقال افقی ژنهای؛ این گروه از باکتری ها به یک گروه مناسب و ایده آل برای تحقیقات اکلولژیک جهت ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک تبدیل نموده است (۱-۴). حداقل ۱۲ گونه از انتروکوکها وجود دارند، *E. faecalis* شایعترین آنها بوده و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از عفونتها انتروکوکی را ایجاد می نماید (۱-۴). در حالیکه *E. faecium* حدود ۱۰-۱۵٪ از عفونتها را بوجود می آورد و ۱-۲٪

۳ منبع مختلف شامل گوشت، مدفوع و سواب رکتال با استفاده از شبشه های درب دار استریل و همچنین محیط ترانسپورت جمع آوری شده و سپس در مجاورت بخ به آزمایشگاه نگین منتقل شدند. در آزمایشگاه نیز تا زمان شروع آزمایشات که کمتر از ۳ ساعت بود در یخچال نگهداری شدند. جهت انجام این مطالعه از محیط اختصاصی انتروکوکوس Membrane Filter Enterococcus Selective Agar (Merck, St. Louis, MO) حاوی ۴, ۸ µg/ml Germany (Millipore Corporation, Bedford, MA, USA) در مورد نمونه های گوشت و مدفوع استفاده شد (۱۵-۱۶ و ۱۳-۱۴).

محیط اختصاصی واحد فیلتر و همچنین محیط های واحد نمونه های سواب رکتال بمدت ۳۶-۴۸ ساعت در ۴۰°C قرار گرفتند. پس از این مدت، کلیه های قرمز رنگ بر روی محیط پدیدار شدند. فیلترها به پلیت های حاوی محیط bile esculin agar (Merck, Germany) منتقل شده و بمدت ۲ ساعت در دمای ۴۵°C قرار گرفتند (۱۴-۱۵ و ۱۳-۱۶). پس از این مرحله، کلیه های سیاه رنگ مشخص گردیدند که جهت انجام آزمون های کاتالاز، (PYR) Pyrrolidonyl aminopeptidase رشد در محیط ۶/۵% NaCl مورد بررسی قرار گرفتند. بنابراین سویه های کاتالاز منفی، بایل اسکولین و PYR مثبت که قابلیت رشد در محیط ۶/۵% NaCl و دمای ۴۵°C را داشتند؛ بعنوان جنس انتروکوکوس انتخاب و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی، حرکت، تخمیر قندهای ال-آرایینوز، لاکتوز، متیل آلفا-دی گلوكوبیرونوزید، مانیتول و ال-سوربوز و همچنین آزمون بررسی وجود یا عدم وجود پیگمان، تا حد گونه شناسایی شدند (۱۴-۱۵ و ۱۳-۱۶). پس از شناسایی اولیه گونه های مختلف، جهت تأیید این گونه ها از آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و برنامه حرارتی، (30 cycles {95°C (4 min), 95°C (4 min), 30 cycles ۹۵°C (4 min)، ۵۲°C (1 min)، ۷۲°C (1 min)، ۷۲°C for 7 min استفاده شد (۱۳). برای استخراج DNA از روش boiling استفاده شد (۱۳). الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های مختلف نسبت به ۶ آنتی بیوتیک و نکومایسین (۳۰ میکروگرم)، جنتامایسین (۱۰ میکروگرم)، تتراسایکلین (۳۰ میکروگرم)، سپیروفولوساسین (۵ میکروگرم)، اریترومایسین (۱۵ میکروگرم) و کلرامفینیکل (۳۰ میکروگرم) به روش دیسک دیفیوژن با استفاده از استانداردهای Clinical Laboratory and Standard Institute (CLSI) MIC های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک و نکومایسین جهت انجام آزمون به روش Micro-dilution بر اساس استانداردهای CLSI انتخاب شدند و MIC آنها تعیین گردید (۱۷).

یافته ها

بر اساس نتایج آزمون های بیوشیمیایی و ژنتیکی مختلف جهت تعیین جنس و گونه ایزوله های مختلف انتروکوکوس، در مجموع از ۱۲۲ ایزوله جداسازی شده ۳ گونه مختلف شناسایی شد. بدین ترتیب که این ایزوله بعنوان ۲۷ E. gallinarum و E. faecalis و ۴۵ ایزوله بعنوان E. faecium شناسایی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که این ۳ گونه از هر دو مرغداری جداسازی شدند و در هر دو مرغداری نیز گونه E. gallinarum غالب بود و پس از آن گونه های E. faecium و E. faecalis در مرتب بعدی قرار داشتند.

آنتی بیوتیک های استفاده شده در غذای دام و طیور (مانند آووپارسین، پاسیتراسین، اسپیراماپسین، تیلوسین، ویرجینیاماپسین، تتراسایکلین و آمپی سیلین) به عنوان فاکتور افزاینده رشد، می تواند یکی از عوامل ظهور VRE در حیوانات اهلی باشد، زیرا سویه های VRE توانایی انتقال از راه مواد غذایی شده آلوه را به انسان دارد. به همین دلیل از سال ۱۹۹۷ مصرف افزاینده های آنتی بیوتیکی بخصوص آووپارسین در اروپا منع شد؛ در نتیجه این ممنوعیت مشخص گردید که VRE در نمونه های مدافوعی از دام ها و همچنین تولیدات دامی کاهش یافته است (۹). به عنوان مثال یک تحقیق جامع در دانمارک مشخص نمود که شیوع E. faecium مقاوم به آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی از نمونه های مدافوعی ماکیان از ۷/۷٪ در سال ۱۹۹۵ به ۰/۵٪ در سال ۲۰۰۰ رسیده است. حتی در مورد نقش حشرات به عنوان ناقلین پاتوژن های انسان و حیوانات نیز تحقیقاتی صورت گرفته است زیرا رشد در مواد در حال فساد و تماس با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک موجود در کود حیوانات و یا سایر مواد ارگانیک در حال فساد، آنها را تبدیل به کاندیدای مناسبی جهت انتشار باکتری های مدافوعی انسان و حیوانات و در نتیجه انتشار عوامل مقاومت به آنتی بیوتیک نموده است (۱۰).

تاکنون و نکومایسین تقریباً تنها داروئی بود که می توانست به طور دائم جهت درمان عفونت های ناشی از انتروکوک های مقاوم به چند دارو به کار برد شود (۱۱ و ۱۲). و نکومایسین یک آنتی بیوتیک گلیکوپپتیدی است که به جای پنی سیلین همراه با آمینو گلیکوزید در درمان عفونت های انتروکوکی تجویز می شود. تیکوپلاتین، داروی گلیکو پپتیدی دیگری است که از نظر ساختمانی شبیه و نکومایسین است. به دلیل فعالیت این آنتی بیوتیک ها در برابر استافیلوک های مقاوم به متی سیلین و سایر باکتری های گرم مثبت، این داروها به طور گسترده ای جهت درمان و پیشگیری بر علیه عفونت های ناشی از این ارگانیسم ها به کار برد می شوند (۱۱ و ۱۲). در بسیاری از مطالعات از انتروکوک ها به عنوان یکی از منابع مهم ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک نام برد شده است ولی در مورد نقش آنها در آلدگی فرآورده های غذایی اطلاعات کمی گردآوری شده است. قبل ذکر است که تا کنون توانسته اند که این باکتری را در شیر، پنیر، گوشت مکیان، غذاهای آماده به طبخ و همچنین غذاهایی که به درستی پخته نشده اند بیانند (۱۰). همچنین طی تحقیقات متعدد انجام شده در اروپا و آمریکای جنوبی، سویه های VRE را در نمونه های خوک، اسب های پرورشی، گاو و گوسفند، مرغ و جوجه مرغ و بوقلمون شناسایی کرده اند (۱۰). کاملاً واضح است که استفاده بی رویه و بدون نظرات آنتی بیوتیک جهت درمان و یا کنترل عفونت در انسان و یا به عنوان فاکتورهای رشد در غذای حیوانات یکی از دلایل شیوع باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک است (۹). همچنین حیواناتی که در صنایع غذایی مطرح هستند به عنوان مخازن طبیعی این گونه مقاومت ها در خور توجه هستند.

این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های انتروکوکوس جداسازی شده از مرغداری های تهران به انجام رسیده است.

روش کار

در این مطالعه در مجموع ۱۲۲ ایزوله مختلف انتروکوکوس در فصل های بهار، تابستان و پاییز و در طی ۴ مرتبه نمونه گیری در سال ۱۳۸۸ از ۲ مرغداری موجود در حومه شهر تهران بدست آمدند. تمامی این نمونه ها از

جدول ۲. مقاومت‌های چند دارویی در میان سویه‌های VRE		
درصد	تعداد	آنٹی بیوتیک
.	.	V,T,G,Cip,E,C
۵/۱	۲	V,T,G,Cip,E
۱۸	۷	V,T,G,E
۲/۶	۱	V,T,Cip,C
۲/۶	۱	V,TG,Cip
۲/۶	۱	V,T,Cip
۵/۱	۲	V,T,E
۵/۱	۲	V,G,E
۲/۶	۱	V,Cip,E
۱۰/۲	۴	V,Cip,C
۲/۶	۱	V,G,C
۵/۱	۲	V,Cip
۵/۱	۲	V,E
۵/۱	۲	V,C
۷/۶	۳	V,G
۲/۶	۱	V,T
۱۸	۷	V

بحث

در این مطالعه مشخص شد که در ایران شیوع گونه‌های VRE در میان ماکیان متعدد تر از نمونه‌های بیمارستانی و فاضلابی است و شامل ۳ گونه E. faecium و E. faecalis و gallinarum می‌باشد. اما بطور کلی و بدون در نظر گرفتن مقاومت نسبت به ونکومایسین نیز شیوع گونه‌های مختلف انترکوکوکی محدود به سه گونه گالیناروم، فکالیس و فیسیوم بود که از این نظر تنوع پایین تری را نسبت به نمونه‌های فاضلابی نشان داد (۴-۱۵-۱۳). همانگونه که انتظار می‌رفت در این مطالعه سویه E. gallinarum گونه غالب بود و بالاترین شیوع را داشت و پس از آن E. faecium در مرتبه دوم قرار داشت. اما در مورد سویه‌های VRE به رغم استفاده از محیط‌های واحد غلاظت‌های مختلف آنتی بیوتیک و ونکومایسین اما گونه E. faecium با این نتایج متفاوت نبود. همچنین برخوردار بود، که شیوع را داشت و از بالاترین مقاومت نسبت به ونکومایسین منطبق بر سایر مطالعاتی است که در ایران و در مورد نمونه‌های محیطی انجام گرفته است (۴-۱۵-۱۳)، که این امر می‌تواند ناشی از قابلیت و توانایی بالایی گونه فیسیوم در کسب مقاومت نسبت به عوامل ضدمیکروبی و همچنین شرایط نامساعد باشد که بواسطه این عوامل این سویه را تبدیل به یکی از قوی ترین پاتوزن‌های فرصلن طلب نموده است (۴-۱۵).

در مقایسه با سایر مطالعاتی که در ایران بر روی نمونه‌های محیطی و بالینی انجام گرفته است، میزان مقاومت به ونکومایسین بسیار بالاتر است. شاید دلیل این امر استفاده از محیط‌هایی واحد غلاظت‌های منغافتوی از ونکومایسین جهت غربالگری سویه‌ها بوده است. اما در هر صورت مقاومت به ونکومایسین٪ ۳۲ بود که در مقایسه با سایر مطالعاتی که در سراسر دنیا انجام گرفته است این میزان منغافتو و متغیر است. در طی یک تحقیق برروی دام و طیور در سال ۲۰۰۵ در اتریش، سویه‌های VRE مشاهده شده در نمونه‌های احشام ۲۰۰۵٪، نمونه خوک ۲۳/۳٪ و نمونه مربوط به جوجه ۷۷/۱٪ است (۹).

همچنین Kuhn در مطالعه خود در سال ۲۰۰۵ بر روی نمونه‌های بالینی، دامی و محیطی در اروپا میزان مقاومت به ونکومایسین را ۸-۱۱٪ گزارش نموده است (۱۸).

تمامی ۱۲۲ سویه انترکوکوکوس جدا شده به روش دیسک دیفیوژن و جهت بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه‌ها نسبت به آنتی بیوتیک‌های نام برده مورد بررسی قرار گرفتند. بالاترین مقاومت نسبت به ونکومایسین (۳۲٪) بوده و پس از آن تتراسایکلین (۲۳٪) و اریترومایسین (۲۰٪) در مراتب بعدی قرار داشتند. همچنین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک‌های سیپروفلوکسازین و جنتامایسین (هر کدام ۱۹٪) نیز برابر بود و کمترین مقاومت نیز نسبت به کلرامفینیکل (۱۵٪) مشاهده گردید.

در جدول ۱ الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های مقاوم به ونکومایسین بر اساس نوع گونه نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌کنید از ۳۹ سویه VRE، E. faecium تقریباً نیمی از سویه‌های مقاوم را به خود اختصاص داده است و پس از آن E. faecalis و E. gallinarum در E. faecium مراتب بعدی قرار داشتند. همچنین می‌توان مشاهده نمود که گونه E. faecium بالاترین تعداد سویه‌های مقاوم را نسبت به بیشتر آنتی بیوتیک‌ها در اختیار دارد اما گونه E. faecalis بالاترین مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک کلرامفینیکل نشان می‌دهد و هیچگدام از سویه‌های E. gallinarum به این آنتی بیوتیک مقاوم نبودند.

در جدول ۲ سویه‌های مختلف VRE از نظر مقاومت‌های چندگانه طبقه بندی شده اند. بر این اساس نشان داده شد که هیچگدام از سویه‌ها نسبت به تمامی ۶ آنتی بیوتیک مقاوم نبودند. اما ۲ سویه نسبت به ۵ آنتی بیوتیک ونکومایسین، تتراسایکلین، جنتامایسین، سیپروفلوکسازین و اریترومایسین مقاوم بودند. همچنین ۹ سویه نیز نسبت به ۴ دسته آنتی بیوتیک مختلف مقاوم بودند. ۱۰ سویه نسبت به ۲ آنتی بیوتیک، ۱۱ سویه نسبت به ۳ آنتی بیوتیک و ۷ سویه نیز تنها نسبت به آنتی بیوتیک ونکومایسین مقاوم بودند و نسبت به سایر آنتی بیوتیک‌ها حساسیت نشان دادند.

پس از انجام آزمون MIC نسبت به آنتی بیوتیک ونکومایسین بر روی ۳۹ سویه VRE مشخص گردید که ۷۰٪ سویه‌ها مقاومت بالایی (MIC \geq 256 $\mu\text{g/ml}$) به ونکومایسین دارند. همچنین در ۲۲٪ از سویه‌ها MIC \geq 32 $\mu\text{g/ml}$ و در ۸٪ از سویه‌های MIC \geq 64 $\mu\text{g/ml}$ بود.

جدول ۱. مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های VRE بر اساس نوع گونه

گونه	آنتی بیوتیک ونکومایسین	تتراسایکلین	جنما	سیپروفلوکساز	اریترو	کلرام	تر
۱	۳	۳	۲	۲	۸	۸	E. gallinarum
۲	۶	۵	۴	۲	۱۲	۱۲	E. faecalis
۳	۹	۵	۱۱	۱۱	۱۹	۱۹	E. faecium

در این مطالعه پایین ترین مقاومت نسبت به کلرامفنیکل مشاهده شد که در حدود ۱۵٪ بود. این میزان هرچند که بالاتر از مقاومت سویه‌های جدا شده از نمونه‌های محیطی و بالینی است اما در مجموع بطور کلی مقاومت به این آنتی بیوتیک پایین است، که این امر شاید بدلیل استفاده پایین از این آنتی بیوتیک بواسطه اثرات سوء آن در شرایط *in vivo* باشد.

بر طبق شواهد موجود از یک طرف اعتقاد بر انتقال افقی VRE از حیوان به انسان وجود دارد (۱-۴)، و از طرفی دیگر انواع گونه‌های انتروکوکی توانایی تکثیر و بقاء در خاک و آب را دارند و این مقاومت در محیط برای مبارزه با آنها بسیار مشکل ساز است؛ بنابراین بایستی که توجه زیادی را به جلوگیری از انتقال و پخش میکرووارگانیسم‌ها در طبیعت معطوف داشت. سلامت عمومی جامعه ممکن است با انتقال VRE بویژه اگر میکروارگانیسم از طریق مدفووعی به آبهای سطحی انتقال یابد، در معرض تهدید قرار گیرد. زیرا این آبهای ممکن است بدون هیچگونه توجهی مورد مصرف قرار گیرند (۴-۱۵).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش بسیار مهم نمونه‌های ماقیان بعنوان مخازن شاخص‌های مقاومت است؛ که با توجه به انتقال شاخص‌های مقاومت به ونکومایسین در میان حیوان، انسان و محیط؛ بنابراین باید نسبت به نظارت دقیق بر سیستم بهداشتی و غذایی توجه شایانی مبذول داشت.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله بر خود لازم می‌دانند که مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را از استاد ارجمند جناب آفای دکتر محمد رضا پورشفیع بواسطه جامعترین و کاملترین تحقیقاتی که در زمینه انتروکوک در ایران انجام داده اند و نتایج ایشان گره گشای بسیاری از مشکلات این تحقیق نمایند.

اعلام را است بوده

REFERENCES

۱. رحیمی فاتح، طالبی ملیحه، سیفی مهناز و پورشفیع محمد رضا. بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی انتروکوکهای جدادشده از فاضلاب شهری تهران با تأکید بر سویه‌های دارای ژن *vanB* و *vanA*. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرم‌سیری ایران. شماره ۴۲، پاییز ۱۳۸۷، صفحات ۳۱-۳۷.
۲. رحیمی فاتح، بوذری مجید، اربابی لیلی، رحیمی فرمیسک، ملکی زهره و وندیوسفی جلیل. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین ژنهای مقاومت *vanA* و *vanB* در میان سویه‌های انتروکوکی جدا شده از مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های شهر تهران. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرم‌سیری ایران. زمستان ۴۳، شماره ۱۳۸۷، صفحات ۷۹-۸۴.
۳. رحیمی فاتح، سیفی مهناز، پورشفیع محمد رضا، سلطان دلال محمد رضا، پورمند محمد رضا. بررسی کلونالیتی سویه‌های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسییوم مقاوم به مقادیر بالای جنتامایسین جدا شده از فاضلابهای شهر تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره ۱۳، پاییز ۱۳۸۷، صفحات ۷۰-۸۲.

علت انتشار سویه‌های مقاوم به ونکومایسین در اروپا و امریکا مربوط به استفاده بی‌رویه گلیکوپپتیدها در مراکز درمانی و به دنبال آن انتخاب این سویه‌های از دستگاه گوارش انسان و کلونیزه کردن دستگاه گوارش افراد و یا فقط انتقال ژن‌های مقاومت به باکتری‌های ساکن دستگاه گوارش، در حین عبور و نیز مصرف ترکیباتی مثل آوپاراسین به عنوان مکمل غذای دام و محرك رشد ماقیان می‌باشد (۱۴ و ۱۸).

مقاومت نسبت به اریترومایسین در این تحقیق ۲۰٪ بود که این میزان در سویه‌های VRE به ۳۸٪ گزارش گردید که به دلیل مصرف بی‌رویه این آنتی بیوتیک در ایران است. اریترومایسین یکی از آنتی بیوتیک‌های مصرفی در دام و طیور نیز هست که در ایجاد مقاومت در انتروکوکوس موثر است (۱۹-۲۱).

مقاومت به سپیروفلوکساسین ۱۹٪ و در سویه‌های VRE ۲۳٪ است. به واسطه موفقیت در درمان عفونت‌های دستگاه ادراری، این آنتی بیوتیک بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همانند سایر آنتی بیوتیک‌ها مقاومت در *E. faecalis* و *E. faecium* رایج تر از *E. faecium* بوده است. در گزارشی از یونان در سال ۲۰۰۰ این مقاومت در *E. faecalis* بوده است. Stobberingh نیز میزان مقاومت را در تمامی سویه‌ها و همچنین سویه‌های مقاوم به ونکومایسین بدست آمده از نمونه‌های بوقلمون را به ترتیب ۱۲٪ و ۱۲٪ گزارش نموده است (۲۲).

به طور کلی میزان مقاومت به جنتامایسین ۲۲٪ و در سویه‌های VRE حدود ۴۶٪ است. سویه غالب مقاوم به جنتامایسین همانطور که پیش بینی می‌شد فسیوم است. Liassine و همکاران در سال ۱۹۹۸ این مقاومت را در حدود ۴٪ گزارش می‌دهند (۲۳). از طرفی Khan و همکاران در سال ۲۰۰۴ در آمریکا میزان مقاومت به جنتامایسین را حدود ۹۶٪ گزارش نموده اند (۲۴).

میزان مقاومت به تتراسیکلین در این تحقیق ۲۳٪ و در سویه‌های مقاوم به ونکومایسین ۳۸٪ مشاهده شد که در کل میزان مقاومت به تتراسیکلین در کل دنیا بسیار متغیر است. در سویس و امریکا بسیار بالاست و در برخی از فرانسه این میزان کمتر است (۲۴ و ۲۱).

۴. سیفی مهناز، رحیمی فاتح، نخست لطفی معصومه، پورشفیع محمد رضا، سلطان دلال محمد مهدی. بررسی تنوع گونه‌ها و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی انتروکوکهای جدا شده از دو تصفیه خانه فاضلاب شهر تهران. مجله زیست‌شناسی ایران. جلد ۲۱، بهار ۱۳۸۷، شماره ۲، صفحات ۲۶۰-۲۵۰.

5. Pootola J, Neu J, and Wright GD. Glycopeptide Antibiotic Resistance. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 2002; 42:381-408.
6. Magi G, Capretti R, Paolletti C, Pietrella M, and ferrante L. Presence of *vanA*-carrying pheromone response plasmid (PBRGI) in a clinical isolate of *Enterococcus faecium*. *Antimicrob Agents Chemother*. 2003; 47:1571-1576.
7. Flores RM, Haley JA, Roos TW. Vancomycin-resistant enterococci: approach to treatment and control. *Cancer Cont J*. 2000;3:N:1.
8. Murray BE. Diversity among Multidrug-Resistant enterococci. *Emerg Infect Dis*. 1998; 4:37-47.
9. Eisner A, Feierl G, Gorkiewicz G, Dieber F, Kessler H, Marth E, and Kofer J. High Prevalence of *vanA*-Type Vancomycin-Resistant Enterococci in Austria Poultry. *Appl Environ Microbiol*. 2005; 72:6407-6409.
10. Macove L, and Zurek L. Ecology of Antibiotic Resistance Genes: Characterization of Enterococci from Houseflies Collected in food Setting. *Appl Environ Microbiol*. 2006; 71:4028-4035.
11. Harwood JV, Brownell M, Perusek W, Whitlock EJ. Vancomycin-Resistant *Enterococcus* spp. Isolated from Wastewater and Chicken Feces in United States. *Appl Environ Microbiol* 2001; 67:4930-4933.
12. Iversen A, Kuhn I, Franklin A, Mollby R. High Prevalence of Vancomycin-Resistant Enterococci in Swedish Sewage. *Appl Environ Microbiol* . 2002; 68:2838-2842.
13. Rahimi F, Talebi M, Saifi M, Pourshafie MR. Distribution of Enterococcal Species and Detection of Vancomycin Resistance Genes by Multiplex PCR in Tehran Sewage. *Iran Biomed J*. 2007; 11:161:167.
14. Talebi M, Rahimi F, Katouli M, Kuhn I, Mollby I, Eshraghi S, Pourshafie MR. Prevalence and Antimicrobial Resistabce of Enterococcal Species in Sewage Treatment Plants in Iran. *Water Air Soil Pollut*. 2007; 185:111-119.
15. Talebi M, Rahimi F, Katouli M, Mollby R. Pourshafie MR. Epidemiological Link Between Wastewater and Human Vancomycin-Resistant *Enterococcus faecium* Isolated. *Cur Microbiol*. 2008; 56:468-4730.
16. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 11th informational supplement . NCCLS. Wayne, Pa. 2001.
17. National committee for clinical Laboratory standard. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. Approved standard. M7-A5. MIC testing. NCCLS. Villanova, Pa.2000.
18. Kuhn I, Iversen I, Finn M, Greko C, Burman LG, Blanch AR, et al. Occurrence and relatedness of Vancomycin-Resistant Enterococci in Animals, Humans, and the Environment in Different European regions. *Appl Environ Microbiol*. 2005; 7:5383-5390.
19. Wood JJA. Vancomycin Resistant Enterococci. *N Eng J Med*. 2000; 342:710-721.
20. Hayes JR, McIntosh AC, Qaiyami S, Jhonson JA, English LL, Carr LE, et al. High-frequency of quinupristin-dalfopristin-resistant *Enterococcus faecium* isolates from poultry production environment. *J Clin Microbiol*. 2001; 39: 2298-2299

21. Novais C, Couque TM, Ferreira H, Sousa JC, Peixe L. Environmental contamination with vancomycin-resistant enterococci from hospital sewage in Portugal. *Appl Environ Microbiol.* 2005; 71:3364-3368.
22. Stobring E, Bogaard A, London N, Driessen C, Top J, Willems R. Enterococci with glycopeptides resistance in turkeys, turkey farmers, turkey slaughters and urban residents in the south of the Netherlands, evidence for transmission of vancomycin from animals to humans *Antimicrob Agents Chemother.* 1999; 43:2215-2221.
23. Liassine N, Frei R, Jan I, Auckenthaler R. Characterization of glycopeptide-resistant enterococci from Swiss hospital. *J Clin Microbiol.* 1998; 36:1853-1858.
24. Khan Sa, Nawaz Ms, Khan AA, Hopper SL, Jones RA, Cerniglia CE. Molecular characterization of multi drug-resistant *Enterococcus* spp. from poultry and dairy farms: detection of virulence and vancomycin resistance gene markers by PCR. *Cell Probes.* 2005; 19:27-34.

Archive of SID