

مقاومت استافیلولوکوس اورئوس به روغن کاج (pine oil) با استفاده از تست آنتی‌بیوگرام و مشاهده باند ژن‌های *mecA* و *sigB* در PCR

جمیله نوروزی^۱، کامیار متواضع^۲، طیبه اعلارحیمی^{۳*}

۱. استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
۲. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
۳. دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

* نشانی برای مکاتبه: تهران، چهار راه کامرانیه، بلوار شهداد اندرزگو، خیابان سلیمانی شمالی، کوی اشکستانپور شمالی، پلاک 32، واحد 4، تلفن 09371662118-22678621، tayebealarahimi@yahoo.com
دریافت مقاله: آبان نود و یک پذیرش برای چاپ: دی نود و یک

چکیده

سابقه و هدف: مصرف روز افزون آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد بیوسایدی و استفاده از ترکیبات گوناگون از جمله روغن کاج در مواد بیوسایدی منجر به پیدایش سویه‌های استافیلولوکوسی مقاوم به روغن کاج (Pine oil) شده است. هدف از این مطالعه تعیین مقاومت استافیلولوکوس اورئوس نسبت به روغن کاج (Pine oil) و اثبات آن به وسیله تست آنتی‌بیوگرام و مشاهده باند ژن‌های *sigB* و *mecA* در PCR بود.

روش کار: حد نمونه استافیلولوکوس اورئوس از منابع کلینیکی جمع آوری شد. حساسیت و مقاومت آنها به ماده بیوسایدی روغن کاج (Pine oil) و دو آنتی‌بیوتیک موثر بر روی دیواره مانند اگزاسیلین و نکومایسین به روشن فنوتیپی بررسی شد. برای اثبات نتایج فنوتیپی بدست آمده، حضور ژنهای مقاومت *sigB* و *mecA* از طریق PCR سنجیده شد.

یافته‌ها: از میان 100 نمونه جمع آوری شده، ۹۰٪ به آنتی‌بیوتیک اگزاسیلین و ۶۰٪ به ماده بیوسایدی روغن کاج (Pine oil) مقاوم بودند و کلیه نمونه‌ها به آنتی‌بیوتیک نکومایسین حساس بودند. ۸۰٪ از استافیلولوکوس اورئوس‌های مقاوم به Pine oil به اگزاسیلین نیز مقاوم بودند.

نتیجه گیری: ژن *mecA* (القاکنده مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های موثر بر روی دیواره مانند اگزاسیلین و مواد بیوسایدی نظیر Pine oil) می‌باشد. رابطه بین مقاومت آنتی‌بیوتیکی و مصرف مواد بیوسایدی که از طریق حضور این ژن اثبات شد نشانه اهمیت توجه به مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد بیوسایدی در مرکز درمانی و خانگی می‌باشد.

واژگان کلیدی: استافیلولوکوس اورئوس، ژن *mecA* و ژن *sigB* روغن کاج (Pine oil)

روغن کاج (Pine oil) نوعی ضد عفونی کننده فنولی است که به عنوان خوش بو کننده و هم چنین عاملی ضد عفونی کننده در ترکیب شوینده‌ها به کار می‌رود (5-8). این روغن بر روی بسیاری از قارچ‌ها مانند کاندیدا آلبیکنتر (candida albicans) و بر روی بسیاری از ویروس‌ها مانند هرپس سیمپلکس تایپ 2 و ویروس آنفلوانزا و بر روی برخی از باکتری‌ها مانند استافیلولوکوس اورئوس، سرآشیا، سالمونلا، شیگلا، استرپتوکوس پاپوزنر اثر کشنده‌گی دارد. هم چنین گزارش‌هایی مبنی براستفاده از روغن کاج در اسپری های پاک کننده و تمیز کننده، بخارشووهای خانگی، شوینده‌های سرامیک‌ها و موزاییک‌ها، کف پوش‌های طبقات و سطلهای زباله و در تمیز و ضد عفونی کردن موسسات و دفاتر و آشیزخانه‌ها و بیمارستان‌ها و مرکز درمانی وجود دارد (9-12).

مقدمه

مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان باکتری‌ها به خصوص استافیلولوکوس اورئوس های از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. مقاومت بالای آنتی‌بیوتیکی در این باکتری‌ها و بسیاری از باکتری‌های دیگر در اکثر موارد منجر به شکست درمان شده و در برخی بیماران به خصوص بیماران بستری در بیمارستان، دارای عاقب خطرناکی می‌باشد. در چند دهه اخیر استافیلولوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین و اگزاسیلین و به تازگی نیز استافیلولوکوس اورئوس های مقاوم به مقدار متوسط نکومایسین از عوامل مهم ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی محسوب می‌شوند (1-4). استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و بیوساید ها به منظور کنترل و پیش گیری از عفونت‌ها موجب کاهش قابل ملاحظه ابتلاء به بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از عفونت‌ها شده است.

روش میکرودیلوشن براث در حضور ماده ۲و۳و۵ - تری فینل تترازولیوم کلراید انجام شد. MIC و MBC ماده بیوسایدی، برروی استافیلکوکوس اورئوس های مورد مطالعه تعیین گردید. جهت تعیین MIC و MBC آنتی بیوتیک ها، سری 13 تایی از لوله‌های حاوی ۱ میلی لیتر محیط کشت مولر هیلتون براث استریل تهیه گردید. رقت های پی دربی دو برابر از آنتی بیوتیک مورد نظر با غلط نهایی محاسبه شده در لوله ها فراهم شد و به لوله های شماره ۱ تا ۱۱، ۰/۱، میلی لیتر سوپسانسیون میکروبی برای ۰/۵ مک فارلندا اضافه شد. لوله های ۱۲ و ۱۳ به ترتیب به عنوان لوله های کنترل عدم رشد و کنترل رشد تعیین شد. لوله ها به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای ۳۷-۳۵ درجه سلسیوس نگهداری شدند.

MBST DNA Extraction
جهت استخراج ژنون باکتریایی از کیت PCR در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر استفاده شد. واکنش PCR در آب میکرولیتر بافر ۱ میکرولیتر (۱۸ میکرولیتر آب، ۲/۵ میکرولیتر بافر ۱ PCR dNTP، ۱ میکرولیتر پرایمر Forward ۱ میکرولیتر پرایمر Reverse ۰/۵ میکرولیتر آنزیم Taq DNA Polymerase (تکام شد در انتها ۰/۵ میکرولیتر آنزیم (جدول ۱). واکنش دناتوراسیون اولیه DNA به مدت ۳۰۰'' (برای هر دو) در دمای ۹۵^oC (mecA) و ۹۴^oC (sigB)، دناتوراسیون ثانیه به مدت ۴۵'' (برای هر دو) با قراردادن در دمای ۹۵^oC (mecA) و ۹۴^oC (sigB)، الحق پرایمرها به DNA هدف در دماهای ۶۷^oC (mecA) و ۵۵^oC (sigB) به مدت ۴۵'' (برای هر دو) و توسعه پرایمرها در دمای ۷۲^oC (برای هر دو) به مدت ۳۰۰' (mecA) و ۶۰' (sigB) در ۳۰ چرخه تکرار و سرانجام ۴۵' (برای هر دو) واکنش در ۷۲^oC (برای هر دو) صورت گرفت.

یافته‌ها

از میان ۱۰۰ باکتری ایزوله شده، ۹۰٪ به اگزاسیلین و ۶۰٪ به ماده بیوسایدی روغن کاج (Pine oil) مقاوم بودند و کلیه باکتری ها به ونکومایسین حساس بودند. ۸۰٪ از استافیلکوکوس اورئوس های مقاوم به Pine oil. به اگزاسیلین نیز مقاوم بودند. MIC سویه های مقاوم به ماده بیوسایدی حاوی روغن کاج ۳/۹-۱/۹۵ میکروگرم در میلی لیتر و در خصوص سویه های حساس ۰/۵-۱ میکروگرم در میلی لیتر بود. همه نمونه های مقاوم فوق دارای MIC کمتر از ۰/۰۶ W/V٪، (یعنی کمتر از رقت توصیه شده توسط کمپانی تولید کننده) بودند. در حضور روغن کاج ۶۰٪ رقت مصروفی بیان شده توسط کمپانی تولید کننده، ۴۰٪ از سویه های استافیلکوکوس اورئوس رشد کردند و ۴۰٪ در غلط های پایین تر قادر به رشد بودند (شکل ۱). فراوانی ژن mecA در نمونه های بررسی ۹۰٪ درصد بود و کلیه نمونه ها فاقد ژن sigB بودند (شکل ۲) و جدول (۲).


در این بین، مساله پیدایش مقاومت متقاطع و متقابل بین ضدعفونی کننده ها و آنتی بیوتیک ها که به طور وسیعی در حال مصرف هستند خود نمایی می‌کند، طبق گزارش ها، کاهش حساسیت استافیلکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک های موثر بر روی دیواره سلولی مانند ونکومایسین و اگزاسیلین با مصرف ضدعفونی کننده های حاوی روغن کاج گزارش شده است (۱۶-۱۳). برخی از مکانیزم های مقاومت برای آنتی بیوتیک ها و مواد بیوسایدی مشترک هستند. بنابراین احتمال دارد که شوینده های حاوی روغن کاج باعث ایجاد جهش و در نهایت مقاومت باکتری ها از جمله استافیلکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک ها شود (۱۷). این مساله از نظر اقتصادی حائز اهمیت است چرا که اخیرا در ایالات متحده هزینه غفونت های ایجاد شده توسط استافیلکوکوس اورئوس های مقاوم به چندین آنتی بیوتیک، بین ۲۴ تا ۳۶ میلیون دلار تخمین زده شده است (۱۸).

در حال حاضر دو ژن sigB و meCA عامل مقاومت استافیلکوکوس اورئوس به روغن کاج و در نهایت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین و اگزاسیلین گزارش شده است (۲، ۲۰، ۱۹، ۳). چندین ژن ایجاد کننده مقاومت به مواد بیوسایدی در استافیلکوک ها شناسایی شده است. این ژن ها کد کننده پمپ های دفعی وابسته به نیتروی محرکه پروتونی هستند (۲۱). وجود سلول های فعال در محصولات بیوسایدی ممکن است در افزایش بروز باکتری های مقاوم به مواد آنتی بیوتیکی دخیل باشد. از آنجایی که غفونت های استافیلکوکی از انواع رایج غفونت ها به خصوص غفونت های بیمارستانی هستند و با توجه به مقاومت چند دارویی این باکتری ها از جمله مقاومت به متی سیلین که تا چندی پیش داروی انتخابی برای درمان غفونت های استافیلکوکی بود و هم چنین ظهور استافیلکوکوس اورئوس های مقاوم به مقدار متوسط ونکومایسین، امروزه غفونت های استافیلکوکی، مشکل عمده ای در امر درمان بیماران می باشد (۲۲، ۲۳). از آنجایی که مکانیزم های مقاومت در آنتی بیوتیک ها و بیوساید ها مشابه گزارش شده است، بنابراین بررسی مکانیزم های مقاومت، امر مهمی در روند بهبود درمان و پیشگیری می باشد. از این رو جهت درک بهتر این مطلب، پژوهش حاضر با هدف اصلی یافتن ژن های meCA (ژن های ایجاد کننده مقاومت به مواد بیوسایدی) در جمعیت استافیلکوکوس اورئوس ها صورت گرفت.


روش کار

در این بررسی، ۱۰۰ استافیلکوکوس اورئوس ، که با رنگ آمیزی گرم، کشت بر روی محیط مانیتول سالت اگار، مشاهده مثبت بودن تست کاتالاز و کوآگولاز مورد تایید قرار گرفت، از نمونه های کلینیکی زخم، خلط و ادرار بیماران مبتلا به سوختگی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری و بیماران بستری در بیمارستان شهدای تجریش تهران با استفاده از سواب استریل جمع آوری شد.

برای بررسی میزان حساسیت به ماده بیوسایدی به روش ماکرودیلوشن براث و میکرودیلوشن براث در هر دو روش، رقت های پی دربی دو برابر از ماده بیوسایدی در محیط کشت مولر هیلتون براث با غلط نهایی ۴٪ از ماده بیوسایدی تهیه شد. سنجش حساسیت سویه های مورد آزمایش به



شکل 1. رشد در حضور ماده بیو سایدی حل شده در محیط کشت



شکل 2. حضور باند ژن *mecA* در وزن (544 bp) در ستون های 2 و 4 و 5 و عدم حضور باند ژن *sigB* در وزن (272 bp) در ستون های 1 و 3 و 8 بر روی ژل الکتروفورز

جدول 1. توالی پرایمرهای استفاده شده

نام پرایمر	توالی پرایمر (5' → 3')
<i>meca F</i>	GTGGAAGTTAGATTGGGATCATAGC
<i>meca R</i>	GTCAACGATTGTGACACGATAGC
<i>sigB F</i>	CCTTGAAACGGAAGTTCAAGC
<i>sigB R</i>	TGACACACCATCATTCTA

جدول 2. توزیع استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس نتیجه آنتی بیوگرام و PCR
باکتری‌های فاقد ژن *SigB* یا *mecA* باکتری‌های واجد ژن *SigB* یا *mecA*
روش دیسک گذاری ماده ضد میکروبی صرفی

ماهیت	حاله ممانعت از رشد بر حسب mm	تعداد		تعداد		تعداد		درصد
		باکتری	درصد باکتری	باکتری	درصد باکتری	باکتری	درصد باکتری	
Pine oil (mecA)	(R)0-5	60	60	48	80	12	20	
	(I) 5-15	30	20	28	93/3	2	6/7	
	(S)>15	10	10	5	50	5	50	
اگزاسیلین (mecA)	(R)≤10	90	90	90	100	0	0	
	(I)11-12	8	8	5	62/5	3	37/5	
	(s)≥13	2	2	0	0	2	100	
ونکومایسین (SigB)	(R) 0-5	0	0	0	0	0	0	
	(I)5-14	0	0	0	0	0	0	
	(S)≥15	100	100	0	0	100	100	

R = مقاوم، I = مقاومت نسبی S = حساس

میتوان استنباط کرد که خوش بختانه در ایران هنوز مقاومت به ونکومایسین مشاهده نشده است.

در مطالعه Sanckak در سال 2005 در ترکیه مقادیر MIC نسبت به ونکومایسین

$\mu\text{g}/\text{ml}$ 0/12-4 گزارش گردید و همه سویه‌ها نسبت به ونکومایسین

حساس بودند(28). در مطالعه Leonard و هم کاران در آمریکا در سال 2007

$\mu\text{g}/\text{ml}$ 0/25-2 گزارش گردید(29) در مطالعه

MIC ونکومایسین دیگری در تبریز در سال 1385 نیز هیچ مورد مقاوم و یا دارای حساسیت متوسط

$\mu\text{g}/\text{ml}$ 1/5 گزارش گردید(30). در مطالعه صفاری و هم کاران در سال 1388 در کاشان،

نسبت به ونکومایسین یافته نشد و MIC ونکومایسین حدود

1/5 گزارش گردید(31). در مطالعه صفاری و هم کاران در سال 1388 در کاشان،

$\mu\text{g}/\text{ml}$ 0/5 گزارش گردیده است(31). نتایج

فوق با نتایج ما یکسان می‌باشد. در بررسی حاضر، 3 نمونه (6%) نیز یافت

شدند که اگرچه حامل ژن meCA بودند ولی به اگزاسیلین (MIC < 2 μg/ml) < میکروگرم

در میلی لیتر) حساس بودند. این چنین سویه‌هایی از استافیلوکوکوس اورئوس که

حامل ژن meCA هستند اما از نظر فنوتیپی به اگزاسیلین حساس می‌باشند در

کل جهان در حال افزایش هستند. به طوری که مطالعات انجام شده در سال 2007

توسط Ikonomidis و در سال 2008 Hososaka از فراوانی 15% و

11/8% این دسته از استافیلوکوکوس اورئوس را حکایت دارند(33,34). نظر بر این

است که چنین سویه‌هایی از استافیلوکوکوس اورئوس تحت عنوان MRSA

حساس به اگزاسیلین (OS-MRSA) نام گذاری شوند. این سویه‌های باکتریایی

ممکن است طی آزمایش‌های معمول سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی در

آزمایشگاه‌ها به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس های حساس به اگزاسیلین

(MRSA) گزارش شوند. اهمیت موضوع از آن جهت است که چنان‌چه این دسته

از استافیلوکوکوس اورئوس های بنا شناسایی نشوند، درمان عفونت‌های ناشی

از آنها با آنتی بیوتیک های بتا لاکتام می‌تواند به ایجاد سویه‌های بسیار مقاوم تر

MRSA که به علت حضور ژن meCA است منجر گردد.

در مطالعه حاضر سویه‌هایی که حامل ژن meCA بودند و در برایر غلظت‌های رو

به افزایش از ماده بیوسایدی قرار گرفتند، توانستند بدنیال مجاورت با ماده

بیوسایدی قدرت تحمل خود را افزایش دهند. نتایج به دست آمده از مطالعات

مشابه توسط Price .Davis

نیز نشان داده است که مجاورت مکرر سویه‌های باکتریایی با غلظت های

باکتریایی با غلظت های پیشتر از حد بهینه از ماده بیوسایدی حاوی روغن کاج می

تواند به افزایش در MIC و در نتیجه افزایش مقاومت سویه‌های باکتریایی به مواد

بیوسایدی منجر گردد(4,1). نتایج مطالعه حاضر با نتایج به دست آمده از

مطالعات این دو محقق هم خوانی داشت.

نتیجه گیری

سویه‌های باکتریایی قادرند میزان تحمل خود را نسبت به عوامل بیوسایدی توسعه دهند و موجب بروز مقاومت متقاطع با آنتی بیوتیک ها شوند. از این رو این بررسی از طریق اثبات حضور ژن meCA در میان استافیلوکوکوس اورئوس هایی که هم نسبت به بیوسایدی ها و هم نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند اهمیت استراتژی های کنترل عفونت موثر و استفاده از مواد بیوسایدی در غلظت توصیه شده را تاکید می‌نماید.

تشکر و قدردانی

از مسئولین محترم آزمایشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

بحث

امروزه به دلیل استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها، مقاومت آنتی بیوتیکی در حال افزایش است. آنچه که باعث تمايز مطالعه حاضر از مطالعات سایر محققان شده است، بررسی حضور ژن های مقاومت نسبت به ماده بیوسایدی روغن کاج (Pine oil) در جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس ها و بدنیال آن بررسی ارتباط سویه های مقاوم به روغن کاج با آنتی بیوتیک های اگزاسیلین و ونکومایسین بوده است. در مطالعه اخیر، کیفیت اثر بیوساید حاوی روغن کاج بر علیه 100 استافیلوکوکوس اورئوس سنجیده شد. سویه هایی از استافیلوکوکوس اورئوس که دارای MIC در محدوده 1/95-3/9 میکروگرم در میلی لیتر بودند، به عنوان سویه های مقاوم با حساسیت کاهش یافته به ماده بیوسایدی و با 0/5-1 MIC میکروگرم در میلی لیتر نیز حساس به روغن کاج گزارش شدند. در سال 2002 Price و هم کاران، تحقیق مشابهی را بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های ایزوله شده از منابع کلینیکی انجام دادند و حساسیت آن ها را نسبت به روغن کاج سنجیدند و سویه هایی با MIC بین 1/95-3/9 میکروگرم در میلی لیتر(48%) مقاوم به روغن کاج گزارش کردند(1). هم چنین Noguchi و هم کاران در سال 1999 استافیلوکوک های ایزوله شده از منابع کلینیکی با محدوده MIC بین 1-3 میکروگرم در میلی لیتر را مقاوم به روغن کاج گزارش کردند(24). نتایج حاصل از مطالعات Noguchi و Price تاحدوی با نتایج به دست آمده از این بررسی هم خوانی دارد.

در مطالعه حاضر، MBC سویه های مقاوم کمتر از 0/06 (W/V) بود. Rutala و هم کاران در سال 2000 . 94 MBC سویه از استافیلوکوکوس اورئوس ها را نسبت به ماده بیوسایدی روغن کاج سنجیدند. بر طبق آزمایشات آنها مشخص شد که تمامی نمونه های مورد مطالعه آنها، MBC کمتر از 0/05 (W/V) نسبت به ماده بیوسایدی داشتند. نتایج به دست آمده از مطالعات Rutala با نتایج به دست آمده از این بررسی تا حدودی هم خوانی دارد(6). تمامی نمونه های مورد مطالعه در این بررسی دارای MBC کمتر از غلظت مصرفی توصیه شده توسط تولید کننده بودند. این بدین معناست که چنان‌چه این بیوساید مطابق با دستورالعمل تولید کننده مصرف گردد، 100% باکتری های می‌باشد کشته شوند.

در بررسی حاضر فراوانی ژن meCA در میان استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین 90% بود. در سال 2008 Vail و هم کارانش، وجود ژن های ایجاد کننده مقاومت (از جمله meCA) به مواد ضد میکروبی نظیر روغن کاج را در میان 120 سویه کلینیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها حاکی از حضور ژنهای sigB و meCA به ترتیب 15% و 85% در استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین بود(19). این نتایج، با فراوانی 90% ژن meCA در استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین که از بررسی حاضر به دست آمده تا حدودی مطابقت دارد. در سال 2003 Cole و هم کاران، میزان رخ داد ژن meCA را در 98 استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین که از بررسی تا حدودی مطابقت داشت(2).

در مطالعه حاضر هیچ یک از نمونه های جمع آوری شده به آنتی بیوتیک ونکومایسین مقاوم نبودند و چه به صورت فنوتیپی و چه به صورت ژنتیکی، سویه ای مقاوم (VRSA) و یا حتی مقاوم به مقدار متوجه ونکومایسین (VISA) مشاهده نشد. در سال 1996 در 195 بیمارستان آموزشی زاین یک برنامه غربال گری برای شناسایی انواع MRSA ، که راه با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین بود، انجام شد. از 970 مورد MRSA 13 مورد (1/3%) مقاوم نسبت به ونکومایسین تشخیص داده شد(25). در مطالعه نادری نسب و هم کاران در سال 1383، از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) چهار مورد و در

بیمارستان حضرت قائم (عج) مشهد یک مورد MIC معادل 12/5 مشاهده شده است(26). در مطالعه Tiwari و هم کاران در سال 2006، شش سویه VISA گزارش گردید(27). نتایج فوق با نتایج ماده خوانی ندارد از این رو

REFERENCES

1. Price CT, Singh VK, Jayaswal RK, Wilkinson BJ, Gustafson JE. Pine oil cleaner-resistant *Staphylococcus aureus*. reduced susceptibility to vancomycin and oxacillin and involvement of sigB. *Appl Environ Microbiol*. 2002; 68:5417-5421
2. Cole EC, Addison RM, Rubino JR, Leese KE, Dulaney PD, Newell MS, Wilkins J, Gaber DJ. Investigation of antibiotic and antibacterial agent cross-resistance in target bacteria from homes of antibacterial product users and nonusers. *J Appl Microbiol*. 2003; 95:664-676.
3. Fridkin S K. Vancomycin-intermediate and -resistant *Staphylococcus aureus*. what the infectious disease specialist needs to know. *Clin. Infect. Dis.* 2001; 32:108–115.
4. Hiramatsu K. Vancomycin-resistant *Staphylococcus aureus*. a new model of antibiotic resistance. *Lancet Infect. Dis.* 2000; 1:147–155.
5. Moken M. C, McMurry L. M, and Levy S. B. Selection of multipleantibiotic-resistant (mar) mutants of *Escherichia coli* by using the disinfectant pine oil: roles of the mar and acrAB loci. *Antimicrob. Agents Chemother.* 1997; 41:2770–2772.
6. Rutala WA, Barbee SL, Aguiar NC, Sobsey MD, Weber DJ. Antimicrobial activity of home disinfectants and natural products against potential human pathogens. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2000; 21:33-38.
7. Akimitsu N, Hamamoto H, Inoue R, Shoji M, Akamine A, Takemori K, Hamasaki N, and Sekimizu K. Increase in resistance or methicillin resistant *Staphylococcus aureus* to beta-lactams caused by mutations conferring resistance to benzalkonium chloride, a disinfectant widely used in hospitals. *Antimicrob. Agents Chemother.* 1999; 43:3042–3043.
8. Kullik I, Giachino P, and Fuchs T. Deletion of the alternative sigma factor -B in *Staphylococcus aureus* reveals its function as a global regulator of virulence genes. *J. Bacteriol.* 1998; 180:4814-4820.
9. Davis AO, O'Leary JO, Muthaiyan A, Langevin MJ, Delgado A, Abalos AT, Fajardo AR, Marek J, et al. Characterization of *Staphylococcus aureus* mutants expressing reduced susceptibility to common house-cleaners. *J Appl Microbiol*. 2005; 98:364–372. [PubMed:15659191]
10. Lamichhane-Khadka R, Riordan J.T, Delgado A, Muthaiyan A, Reynolds T.D, Wilkinson B.J, and Gustafson J.E. Genetic changes that correlate with the pine-oil disinfectant reduced susceptibility mechanism of *Staphylococcus aureus*. *J Appl Microbiol*. 2008; 105(6):1973–1981.
11. Centers for Disease Control (1999) Four pediatric deaths from community-aquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* Minnesota and North DakotaT 1997-1999. *Morbidity and Mortality Weekly Report*. 48:707-710.
12. Manian F.A. Asymptomatic nasal carriage of mupirocin resistant, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) in a pet dog associated with MRSA infection in household contacts, *Clinical Infectious Disease*. 2003; 36:26-28
13. Bischoff M, Entenza J. M, and Giachino P. Influence of a functional sigB operon on the global regulators sar and agr in *Staphylococcus aureus*. *J. Bacteriol.* 2001; 183:5171–5179.

14. Chan P.F, Foster S.J, Ingham E, and Clements M. O. The *Staphylococcus aureus* alternative sigma factor -B controls the environmental stress response but not starvation survival or pathogenicity in a mouse abscess model. *J. Bacteriol.* 1998; 180:6082–6089.
15. Wu S, Lencastre H. de, and Tomasz A. Sigma-B, a putative operon encoding alternate sigma factor of *Staphylococcus aureus* RNA polymerase: molecular cloning and DNA sequencing. *J. Bacteriol.* 1996; 178:6036–6042.
16. Singh VK, Schmidt RK, Jayaswal, Wilkinson. Impact of sigB mutation on *Staphylococcus aureus* oxacillin and vancomycin resistance background and method of assessment. *Int. J. Antimicrob. Agents.* in press.
17. Levy S. B. Antibacterial household products. cause for concern. *Emerg. Infect. Dis.* 2001; 7:512–515.
18. Palumbi S. R. Humans as the world's greatest evolutionary force. *Science.* 2001; 293:1786–1790.
19. Vali L, Davies SE, Lai LL, Dave J, Amyes SG. Frequency of biocide resistance genes, antibiotic resistance and the effect of chlorhexidine exposure on clinical methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates. *J Antimicrob Chemother.* 2008; 61:524-32.
- 20 . Rachid S, Ohlsen K, Wallner U, Hacker J, Hecker M, and Ziebuhr W. Alternative transcription factor -B is involved in regulation of biofilm expression in a *Staphylococcus aureus* mucosal isolate. *J. Bacteriol.* 2000; 182:6824-6826.
21. Riordan JT, O'Leary JO, Gustafson JE. Contributions of sigB and sarA to distinct multiple antimicrobial resistance mechanisms of *Staphylococcus aureus*. *Int J Antimicrob Agents.* 2006; 28:54–61. [PubMed:16777384]
22. Cheung A. L, Chien Y. T, and Bayer A. S. Hyperproduction of alpha-hemolysin in a sigB mutant is associated with elevated SarA expression in *Staphylococcus aureus*. *Infect. Immun.* 1999; 67:1331–1337.
23. McDonnell G, and Russell A. D. Antiseptics and disinfectants: activity, action, and resistance. *Clin. Microbiol. Rev.* 1999; 12:147–179.
24. Noguchi N, Hase M, Kita M, Sasatsu M, Deguchi K, & Kono M. Antiseptic susceptibility and distribution of antiseptic – resistance genes in methicillin – resistant *Staphylococcus aureus*. *FEMS Microbiol Lett.* 1999; 172:247-253.
25. Centers for Disease control and Prevention. Redused susceptibility of *Staphylococcus aureus* to vancomycin-Japan 1996. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 1997; 46:624-626
26. Naderi nasab M, Fateh Manesh P, Shahnavazi B. *Staphylococcus aureus* resistant agent vancomycin, Rahavard danesh. *Ark Medical University Journal.* 2004; 6:51-55
27. Tiwari HK, Sen MR. Emergence of vancomycin resistance *Staphylococcus aureus* (VRSA) from a tertiary care hospital from northern part of India. *BNC Infect Dis.* 2006; 6:156
28. Sancak B., Ercis S, Menemenlioglu D, Colakoglu S, H ascelik G. Methicillin resistant heteroge Staphylococcus aureus hetrogenously resistant to vancomycin in a Turkish university hospital. *J Antimicrob chemother.* 2005; 56:519-523
29. Leonard SN, Cheung CM, Raybak MJ. Activities of ceftobiprole, linzolid, vancomycin, and daptomycin against community-Associated and Hospital-associated methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*. *Antimicrob Agents Chemother.* 2008; 52:2974-2976

30. Ahmadishoar SH, Nahaei MR, Amirmozafari N. Sensivity of Staphylococcus aureus strains isolated from clinical specimens against vancomycin by using E-test in Tabriz. Medical Journal of Tabriz University of Medical Science of Health Services. 2008; 30:17-23
31. Saffari M, Jokar M, Shajari GH, Piroozmand A, Moosavi GR. Minimum inhibitory concentration of vancomycin in Staphylococcus aureus isolates collected from clinical samples. Feyz, Kashan University of Medical Sciences of Health Services. 2010; 14:234:-241
32. Hososaka Y, Hanaki H, Endo H, Suzuki Y, NMagasawa Z, Otsuka Y, Nakae T, Sunakawa K. Characterization of oxacillin – susceptible meca-positive Staphylococcus aureus: a new type of MRSA. J Infect Chemother. 2007; 13:79-86.
33. Ikonomidis A, Michail g, Vadeki A, et al. In vitro and in vivo evaluations of oxacillin efficiency against meca – positive oxacillin susceptible Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 2008; 52:3905-8.