

شیوع و عوامل پیشگویی کننده هیپر گلیسمی ایزوله در جمعیت شهری تهران: مطالعه قند و لیپید تهران

فرهاد حسین پناه^{*}، مهدی رامبد^۱، فریدون عزیزی^۱

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین شیوع و ویژگی های مبتلایان به هیپر گلیسمی ایزوله (IPH) که به صورت گلوکز پلاسمای ناشتا (FPG) کمتر از ۱۲۶ mg/dl و گلوکز پلاسمما پس از تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) بیشتر از ۲۰۰ mg/dl بود.

روش ها: نتایج OGTT مربوط به ۹۷۴۵ فرد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) (۵۵۸۹ زن و ۴۱۵۶ مرد) با سن بیشتر از ۲۰ سال و بدون تشخیص قبلی دیابت، مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل رگرسیون لوگستیک جهت پیش بینی وجود IPH در افراد با FPG <۱۲۶ mg/dl مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها: شیوع کلی هیپر گلیسمی ایزوله بعد از تست تحمل گلوکز (IPH) (۳/۱٪) (n=۳۰۲) بود. در ۲۶٪ (n=۸۰) از افراد دارای IPH، گلوکز خون ناشتا کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر بود. در آنالیز رگرسیون لوگستیک، نسبت های شانس معنی دار از نظر آماری مربوط به این موارد بودند: گلوکز خون ناشتا (\leq FPG ۱۰۰ mg/dl) OR=۹/۵ (۱/۸-۰/۹۵)، فاصله اطمینان ۰/۹۵ معادل ۱۲/۵ (۱/۱-۰/۷)، سن \leq ۴۰ سال OR=۲/۶ (۰/۶-۰/۲)، فاصله اطمینان ۰/۹۵ : ۰/۷ (۰/۸-۰/۳)، فشار خون بالا (OR=۲/۰) فاصله اطمینان ۰/۹۵ : ۰/۶ (۰/۸-۰/۲)، در دسی لیتر OR=۲/۱ (۰/۱-۰/۲)، فاصله اطمینان ۰/۹۵ : ۰/۶ (۰/۶-۰/۰)، در دسی لیتر OR=۱/۹ (۰/۹-۰/۱)، فاصله اطمینان ۰/۹۵ : ۰/۳ (۰/۳-۰/۰).

نتیجه گیری: این آنالیز نشان داد که در افراد شهرونشین تهرانی با FPG <۱۲۶ mg/dl، متغیر هایی نظیر سن بالا، بالا بودن تری گلیسرید خون، فشار خون بالا و دور کمر غیرطبیعی، به طور معنی داری با وجود IPH ارتباط داشتند. بنابراین می توان OGTT را در افراد دارای خصوصیات فوق الذکر توصیه نمود.

واژگان کلیدی: تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT)، تشخیص، هیپر گلیسمی ایزوله بعد از تست تحمل گلوکز

۱- مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، اوین، بیمارستان آیت الله طالقانی، مرکز تحقیقات چاقی؛ پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تلفن: ۰۲۴۰۹۳۰۹؛ نماینده: ۰۲۴۰۲۴۶۳؛ پست الکترونیک: fhospanah@erc.ac.ir

مقدمه

است که چه زمانی باید OGTT برای تشخیص به موقع دیابت درخواست شود؟

هدف این مطالعه، شناسایی افرادی که از تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) برای تشخیص دیابت نوع ۲ سود می‌برند، با استفاده از یک مدل رگرسیون لوژیستیک می‌باشد. ما همچنین از داده‌های به دست آمده برای محاسبه نسبت‌های احتمال (LR) برای متغیرهای مهم بالینی و آزمایشگاهی، بهره بردیم. علاوه بر این هدف اصلی، ما شیوع IPH را تعیین کردیم و ویژگی‌های افراد دارای IPH را مورد ارزیابی قرار دادیم.

روش‌ها

مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) مطالعه‌ای است که به منظور تعیین شیوع بیماری‌های غیر واگیر و عوامل خطر ساز برای آتروسکلروز در میان جمعیت شهری تهران و طراحی اقدامات مبتنی بر اطلاعات جمعیتی جهت کاهش شیوع یا پیشگیری از روند رو به افزایش دیابت قندی و دیس‌لیپیدمی، انجام گرفت [۱۰]. طرح این مطالعه، شامل دو جزء عمده است: مرحله اول، یک مطالعه مقطعی شیوع بیماری‌های قلبی عروقی و عوامل خطر ساز مربوط به آن و مرحله دوم، یک پیگیری آینده‌نگر ۲۰ ساله، نمونه‌گیری تصادفی بصورت خوش‌ای لایه‌لایه ی چند مرحله‌ای^۱ انجام شد و ۱۵۰۵ نفر را سن ۳ سال و بالاتر از منطقه ۱۳ شهری تهران انتخاب شدند. طی نمونه‌گیری، فهرست همه خانوارهای تحت پوشش سه مرکز بهداشت منطقه (واحد های رسمی مسئول برنامه‌های واکسیناسیون و جمع آوری آمارهای مربوط به سلامت در هر منطقه) مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب، یک نمونه گیری تصادفی از خانوارهای تقسیم‌بندی شده بر اساس مراکز بهداشت به منظور دستیابی به توزیعی مشابه جمعیت اصلی، صورت گرفت و از هر خانوار، همه اعضای بالای سه سال برای شرکت در مطالعه در نظر گرفته شدند. منطقه ۱۳ در مرکز تهران واقع شده و توزیع سنی جمعیت آن، نمایانگر کل جمعیت تهران است [۱۰]. این مطالعه توسط کمیته اخلاق تحقیقات پژوهشکی پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

تشخیص دیابت قندی نوع ۲، بر مبنای گلوکز خون ناشتا (FPG) بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر و/یا گلوکز پلاسمایی ۲ ساعت بعد از تست (2h-PG) بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر با استفاده از تست تحمل ۷۵ گرم گلوکز خوراکی صورت می‌گیرد [۱۱ و ۱۲]. ممکن است در بعضی افراد، این معیارها با هم هماهنگ نباشند؛ به عبارت دیگر، ممکن است در فردی، گلوکز خون ناشتا بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر، اما گلوکز پلاسمای دو ساعت بعد از تست کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد یا آن‌که گلوکز خون ناشتا کمتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر اما 2h-PG مساوی یا بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد. در مطالعه «ایپدمیولوژی دیابت، آنالیز گروهی معیارهای تشخیصی در اروپا» (DECODE)، در میان افراد دارای 2h-PG بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، بیش از ۵۰٪ گلوکز خون ناشتا کمتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر و ۳۱٪ گلوکز خون ناشتا کمتر از ۱۱۰ میلی گرم در دسی لیتر داشتند [۳]. در سومین مطالعه ملی بررسی سلامت و تغذیه (NHANES III)، از میان بزرگسالان بین ۴۰ تا ۷۴ سال که قبل از دیابت تشخیص داده شده بودند، ۴۱٪ فقط معیار 2h-PG را داشتند [۴]. بنابراین، استفاده از گلوکز خون ناشتا به تنها یک نمی‌تواند دیابت را در افراد دارای 2h-PG $\geq ۱۲۶ \text{ mg/dl}$ و FPG $< ۱۲۶ \text{ mg/dl}$ هیپرگلیسمی ایزوله بعد از تست تحمل گلوکز (IPH) شناخته می‌شود، تشخیص دهد.

افراد دارای هیپرگلیسمی ایزوله بعد از تست تحمل گلوکز (IPH) در معرض خطر بالاتری از نظر بیماری قلبی عروقی و مرگ و میر هستند [۵-۷]. بدیهی است که OGTT تنها راه شناسایی IPH خواهد بود. با این وجود، هزینه بیشتر در مقایسه با گلوکز خون ناشتا به تنها یک وقت‌گیر بودن روبروست [۸-۹]. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که OGTT در کار بالینی روزمره برای افرادی توصیه شود که شک قوی به IPH در آنها وجود دارد؛ پرسش اصلی این

^۱ Multistage stratified cluster random sampling

اندازه گیری های آزمایشگاهی

آنالیز های بیوشیمیایی نمونه ها با استفاده از آنالیز کننده Vital Scientific, Spankeren, Selectra 2[®] (Netherlands) صورت گرفت. گلوکز پلاسما با استفاده از روش گلوکز اکسیداز(با استفاده از شرکت پارس آزمون، ایران؛ با ضرائب تغییر درون آزمونی ۰/۵٪ برای TC و ۱/۶٪ برای تری گلیسرید ها، به ترتیب). کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-C) بعد از جداسازی رسوب لیپوپروتئین های حاوی Apo-B با استفاده از اسید فسفوتونجیستیک اندازه گیری می شد. سطح کلسترول لیپو پروتئین با دانسیته کم (LDL-C) با استفاده از فرمول فریدوالد [۱۳] با ضرائب تغییر درون آزمونی ۰/۷٪ و ۰/۳٪ به ترتیب، محاسبه شد. وقتی غلظت تری گلیسرید بیش از ۰/۵ میلی مول در لیتر بود، LDL-C محاسبه نشد. دقต آزمون بعد از هر ۲۵ اندازه گیری با استفاده از سرم کترول (cat. no. 1446070; Boehringer Precinorm Precipath Mannheim; Germany) (cat. no. 171778; Boehringer Mannheim; Germany) برای محدوده پاتولوژیک پایش شد.

روش های آماری

همه داده های پیوسته با توزیع نرمال بصورت میانگین \pm انحراف معیار و داده های دارای skewness بصورت میانه، بین چارک های ۰/۷۵٪-۰/۲۵٪ (IQ ۲۵-۷۵) بیان می شوند. داده های مربوط به متغیر های کیفی بصورت درصد بیان می شوند. متغیر های پیوسته و دوبخش شده^۱ به ترتیب با استفاده از آزمون t-student و Chi-Square مورد مقایسه قرار گرفتند. تفاوت های بین بیش از دو گروه با استفاده از آنالیز واریانس با آزمون Tukey post hoc آنالیز شد. یک مدل رگرسیون لوژیستیک چند متغیری به منظور برآورد نسبت شانس(Odds ratio) تعدل شده جهت IPH به عنوان یک متغیر وابسته در میان افراد دارای FPG کمتر forward از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر با روش conditional طراحی شد. سن (کمتر از ۴۰ سال در مقابل بیشتر/مساوی ۴۰ سال)، جنسیت (مرجع؛ مذکر)، فشار

مورد تایید قرار گرفته است. از ۱۵۰۰۵ شرکت کننده مرحله مقطعی TLGS، در این مطالعه داده های مربوط به ۹۷۴۵ فرد ۲۰ ساله و بالاتر که قبل از مبتلا به دیابت قنده نوع ۲ نبودند، مورد استفاده قرار گرفت. در شروع مرحله مقطعی، بعد از توضیح مراحل و اهداف تحقیق و اخذ رضایت از بیماران، جمع آوری داده های دموگرافیک و معاینه آنتروپومتریک توسط پزشکان عمومی آموزش دیده انجام شد. وزن افراد با استفاده از یک دستگاه تووزین 707 (در محدوده ۰/۱ تا ۱۵۰ کیلوگرم) با دقیق تا ۱۰۰ گرم ثبت شد. دستگاه تووزین، به طور منظم بعد از هر ۱۰ اندازه گیری از نظر دقیق تری گیری بررسی شد. قد بدون کفش با استفاده از یک استادیومتر ثواری با دقیق حداقل یک میلی متر اندازه گیری شد. نمایه توده بدنی (BMI) با تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر مجانور قد (به متر) محاسبه شد. دور کمر طبق پروتکل استاندارد به حالت ایستاده اندازه گیری و به نزدیکترین ۰/۵ سانتیمتر گرد شد؛ دور کمر بیشتر یا مساوی ۸۰ سانتی متر در زنان و بیشتر یا مساوی ۹۰ سانتی متر در مردان، غیرطبیعی تلقی گردید [۱۱]. فشار خون سیستولیک (SBP) و فشار خون دیاستولیک (DBP) بعد از یک استراحت ۱۵ دقیقه ای در وضعیت طاقباز، با استفاده از یک فشارسنج جیوه ای استاندارد شده روی بازوی راست تعیین شد. فشار خون بالا به صورت SBP/DBP بیشتر یا مساوی ۱۴۰/۸۵ میلی متر جیوه یا مصرف یک داروی ضد فشار خون تعریف شد. نمونه های خون بین ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح، بعد از یک ناشتای شباهه ۱۲-۱۴ ساعته، طبق پروتکل استاندارد شده TGLS در لوله های vacutainer گرفته شد. پس از آن، بیماران تحت OGTT استاندارد شده [۱۲] با ۷۵ گرم گلوکز قرار گرفتند. همه نمونه ها طی ۳۵-۴۰ دقیقه بعد از گرفته شدن سانتریفیوژ شدند (۲۵۰۰ دور در دقیقه، به مدت ۳۰ دقیقه، و در دمای ۴ درجه سلسیوس). همه آنالیز های بیوشیمیایی در آزمایشگاه تحقیقاتی در همان روز گرفته شدن نمونه خون انجام شد.

^۱ Dichotomized

تشخیص داده شده بودند، ۳۹/۷٪ (۳۰۲ از ۷۶۰) دارای IPH بودند. از ۳۳۷ مردی که جدیداً مبتلا به دیابت نوع ۲ تشخیص داده شده بودند، ۱۲۱ نفر (۳۵/۹٪) دارای IPH بودند و در میان ۴۲۳ زنی که جدیداً مبتلا به دیابت نوع ۲ تشخیص داده شده بودند، ۱۸۱ نفر (۴۲/۸٪) داشتند.
 $P=0.07$.

شکل ۱ نشان دهنده شیوع رو به افزایش IPH و FPG بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر با بیشتر شدن سن است. شیوع IPH در افراد بالاتر از ۷۰ سال در حدود ۸/۸٪ بود؛ به علاوه، IPH بیشتر از ۴۵٪ همه مواردی که جدیداً مبتلا به دیابت نوع ۲ تشخیص داده شده اند را در بر می‌گیرد و این یافته حتی در دهه های چهارم و پنجم زندگی نیز صادق است (شکل ۱). از ۳۰۲ بیمار دارای IPH، ۲۶/۵٪ (۸۰ نفر)، گلوکز خون ناشتا کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر داشتند.

سطح FPG در افراد دارای IPH بالاتر از افراد غیر دیابتیک بود (107 ± 11 در مقابل 90 ± 10 میلی گرم در دسی لیتر، به ترتیب؛ $P < 0.001$) با این حال، هر دو گروه FPG پایین تر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر داشتند؛ همچنین، سطح IPH در ۲h-PG کمتر از افراد دارای FPG بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر بود (237 ± 47 در مقابل 302 ± 105 میلی گرم در دسی لیتر، به ترتیب؛ $P < 0.001$).


جدول ۱ نشان دهنده میانگین \pm انحراف معیار سن، BMI، دور کمر و عوامل خطر شناخته شده قلبی عروقی در کل جمعیت مورد مطالعه و سه زیرگروه از افراد شامل افراد با FPG بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر، افراد دارای IPH و افراد غیر دیابتیک است. سن افراد دارای IPH به طور معنی داری بیشتر از افراد غیر دیابتیک بود. به طور کلی، شیوع عوامل خطر قلبی عروقی در میان افراد دارای IPH در مقایسه با افراد غیر دیابتیک بالاتر بود. به هر حال، پروفایل لیپید در افراد دارای IPH مختصراً بهتر از افراد دارای گلوکز خون ناشتا بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر بود اما همچنان در محدوده غیر طبیعی بود. BMI و دور کمر، هر دو به طور معنی داری در افراد دارای IPH نسبت به افراد غیر دیابتیک بالاتر بود.

خون بالا، تری گلیسیریدها (کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر در مقابل بیشتر/مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر)، دور کمر (مرجع، بهنجار)، چاقی (کمتر از ۳۰ در مقابل بیشتر/مساوی ۳۰ کیلو گرم بر متر مربع)، کلسترول تام (کمتر از ۲۴۰ در مقابل بیشتر/مساوی ۲۴۰ میلی گرم در دسی لیتر)، HDL-C (کمتر از ۴۰ در مقابل بیشتر/مساوی ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر) و گلوکز خون ناشتا (کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر در مقابل بیشتر/مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر) به عنوان متغیرهای مستقل وارد آنالیز شدند. قدرت ارتباط هر متغیر با معیار Odd's ratio فاصله اطمینان ۹۵٪ اندازه گیری شد.

نسبت‌های احتمال (LR) و فاصله های اطمینان (CI) آنها برای تخمین احتمال داشتن IPH بر اساس هر یک از متغیرها و ترکیب آنها در آنالیز نهایی اندازه گیری شد. طبق تعریف [۱۴]، (اختصاصیت-۱) / حساسیت = $(+/-)$ و اختصاصیت / (حساسیت-۱) = $(-/-)$ می‌باشدند همه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS (version 13.0; SPSS Inc. Chicago, Ill, USA) انجام شدند. همه آزمون‌های آماری دوطرفه بودند و تفاوت‌ها با مقادیر P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند.

یافته‌ها

از ۹۷۴۵ فرد شرکت کننده در مطالعه، ۴۲/۶٪ (تعداد ۴۱۵۶ نفر) مرد و ۵۷/۴٪ (۵۵۸۹ نفر) زن بودند. سن جمعیت بین ۲۰ تا ۹۰ سال بود اما شرکت کنندگان اغلب جوان بودند (میانه ۴۰ سال و بین چارک‌های ۷۵-۲۵٪ معادل ۵۳-۳۰ سال). شیوع تعديل نشده گلوکز خون ناشتا بیشتر/مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر و IPH به ترتیب ۴/۷٪ (با فاصله اطمینان ۹۵٪ معادل ۴/۳-۵/۱) و ۳/۱٪ (با فاصله اطمینان ۹۵٪ معادل ۲/۸-۳/۴) نفر) بود. شیوع تعديل شده بر اساس سن به ترتیب ۰/۰۷۴٪ (با فاصله اطمینان ۹۵٪ معادل ۰/۹۱-۰/۵۷٪) و ۰/۰۶۴٪ (با فاصله اطمینان ۹۵٪ معادل ۰/۸۰-۰/۴۸٪) بود. به طور کلی، ۲/۹٪ از مردان (۱۲۱ نفر) و ۳/۲٪ از زنان (۱۸۱ نفر) دارای IPH بودند. از افرادی که جدیداً مبتلا به دیابت نوع ۲



شکل ۱- شیوع هیپرگلیسمی ایزوله بعد از تست تحمل گلوکز(IPH) و گلوکز خون ناشتا بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر در هریک از گروه های سنی

جدول ۱- عوامل خطر قلبی عروقی در کل جمعیت مطالعه و در میان افراد با FPG بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر، هیپرگلیسمی ایزوله (IPH) بعد از تست تحمل گلوکز (OGTT) و افراد غیر دیابتیک

FPG≥126 mg/dl (n=۴۵۸)	IPH (n=۳۰۲)	غیر دیابتی (n=۸۹۸۵)	کل جمعیت (n=۹۷۴۵)	متغیر
** ۵۴±۱۱	* ۵۴±۱۲	۴۱±۱۴	۴۲±۱۴	سن (سال)
۴۷/۲	۴۰/۱	۴۲/۳	۴۲/۶	مرد (%)
** ۵۲/۸	** ۵۹/۹	۵۷/۷	۵۷/۴	زن (%)
* ۲۸۱±۲۲۴	*	۱۶۳±۱۰۷	۱۶۹±۱۱۸	تری گلیسرید (mg/dl)
* ۲۴۱±۰۵۲	۲۶۰+۱۲۳ * ۲۲۹±۴۶	۲۰۷±۴۵	۲۰۸±۴۶	کلسیترول (mg/dl)
* ۱۵۰±۴۰	* ۱۴۲±۳۹	۱۳۳±۳۸	۱۳۲±۳۸	(mg/dl) LDL-C
** ۴۰±۱۰	* ۴۱±۱۲	۴۲±۱۱	۴۲±۱۱	(mg/dl) HDL-C
** ۱۳۵±۲۴	* ۱۳۷±۲۳	۱۱۹±۱۸	۱۲۰±۱۹	فشار خون سیستولیک (mmHg)
** ۸۴±۱۲	* ۸۳±۱۲	۷۷±۱۱	۷۸±۱۱	فشار خون دیاستولیک (mmHg)
** ۱۸/۳	* ۲۲/۵	۷/۳	۷/۲	داروی ضد فشارخون (%)
** ۲۲/۹±۴/۵	*	۲۶/۶±۴/۹	۲۶/۶±۵	نمایه توده بدنی (Kg/m ²)
** ۹۷±۱۱	۲۹/۸+۶/۶ * ۹۷±۱۱	۸۷/۵±۱۲	۸۸±۱۲	دور کمر (cm)

دادهها به صورت انحراف معیار ± میانگین یا درصد (داخل پرانتز) ارائه شده‌اند. * مقادیر P معنی دار بود ($P<0.05$)

** مقادیر P معنی دار نبود ($P>0.05$)

FPG = fasting Plasma Glucose ;HDL-C = High Density Lipoprotein – Cholesterol ;LDL-C = Low Density Lipoprotein – Cholesterol; IPH = Isolated Postchallenge Hyperglycemia;

جدول ۲- رگرسیون لو جیستیک چند متغیری برای پیش بینی هیپر گلیسمی ایزوله بعد از تست تحمل گلوکز (IPH) در میان ۹۲۸۷ فرد با گلوکز خون ناشتا (FPG) کمتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر

متغیر	گلوکز پلاسمای ناشتا* (mg/dl)	هیپر گلیسمی ایزوله (n=۳۰۲)		کل جمعیت (n=۹۲۸۷)	نسبت شانس تعديل شده (حدود اطمینان ۹۵٪)
		نام	نام		
سن (سال) *	<۱۰۰	۸۰ (۲۶/۵) ¶	۷۷۸۳ (۸۳/۸)	۱/۰	۹/۵ (۱۲/۵) الی ۹/۱
	≥۱۰۰	۲۲۲ (۷۳/۵)	۱۵۰۴ (۱۶/۲)	۹/۵ (۱۲/۵) الی ۹/۱	
جنس *	<۴۰	۴۰ (۱۳/۲)	۴۷۶۴ (۵۱/۳)	۱/۰	۲/۶ (۳/۷) الی ۱/۸
	≥۴۰	۲۶۲ (۸۶/۸)	۴۵۲۳ (۴۸/۷)		
فشار خون	مرد	۱۲۱ (۴۰/۱)	۳۹۰۱ (۴۲/۰)	۱/۰	۱/۰۷ (۱/۴) الی ۰/۸۱ (۰/۸)
	زن	۱۸۱ (۵۹/۹)	۵۳۸۶ (۵۸/۰)		
* (mg/dl) تری گلیسرید	طبيعي	۱۳۷ (۴۵/۴)	۷۴۱۱ (۷۹/۸)	۱/۰	۲/۰ (۲/۶) الی ۱/۵
	پرفشاری خون	۱۶۵ (۵۴/۶)	۱۸۷۶ (۲۰/۲)		
دور کمر (cm) *	<۲۰۰	۱۳۱ (۴۳/۴)	۶۹۰۰ (۷۴/۳)	۱/۰	۲/۱ (۲/۷) الی ۱/۶
	≥۲۰۰	۱۷۱ (۵۶/۶)	۲۳۸۷ (۲۵/۷)		
نمایه توده بدنی (kg/m ²) **	طبيعي	۳۸ (۱۲/۶)	۳۷۰۶ (۳۹/۹)	۱/۰	۱/۹ (۲/۸) الی ۱/۳
	غير طبيعي	۱۶۴ (۸۶/۴)	۵۵۸۱ (۶۰/۱)		
کلسترول تام (mg/dl) **	<۳۰	۱۸۳ (۶۰/۶)	۷۲۲۵ (۷۷/۸)	۱/۰	۰/۹۷ (۱/۳) الی ۰/۷۳ (۰/۷)
	≥۳۰	۱۱۹ (۳۹/۴)	۲۰۶۲ (۲۲/۲)		
	دور کمر (cm) HDL-C **	۱۹۱ (۶۳/۲)	۷۲۹۰ (۷۷/۰)	۱/۰	۰/۸ (۱/۱) الی ۰/۶
	<۲۴۰	۱۱۱ (۳۶/۸)	۱۹۹۷ (۲۱/۵)		
	≥۲۴۰				

¶ داده ها به صورت انحراف معیار ± میانگین یا درصد (داخل پرانتز) ارائه شده اند. ¶ پرفشاری خون به صورت فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۴۰ میلیمتر جیوه و/یا فشار خون دیاستولیک مساوی یا بیشتر از ۸۵ میلیمتر جیوه در نظر گرفته شد.

** دور کمر غیر طبیعی به صورت cm ≥۸۰ در زنان و cm ≥۹۰ در مردان در نظر گرفته شد.

HDL-C = High Density Lipoprotein – Cholesterol; IPH = Isolated Postchallenge Hyperglycemia;

* مقادیر P معنی دار نبود (P<0.05)

** مقادیر P معنی دار بود (P>0.05)

جدول ۳- نسبت های احتمال مثبت و منفی (LR) و دیگر خصوصیات آزمون کلوزک خون ناشتاوی بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، سن بیشتر یا مساوی ۴۰ سال، فشار خون بالا^{*}، تری گلیسیرید بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و دور کمر نابهنجار[†] و ترکیب آنها برای شناسایی هیرینگلیسمی اینزوله بعد از تست تحمل کلوزک (IPH)

* پر فشاری خون به صورت فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۴۰ میلیمتر جیوه و یا فشار خون دیاستولیک مساوی یا بیشتر از ۸۵ میلیمتر جیوه در نظر گرفته شد. † دور کمر غیر طبیعی به صورت ≥ 80 cm در زنان و ≥ 90 cm در مردان در نظر گرفته شد.

FPG = Fasting Plasma Glucose

بالاترین LR مثبت برای داشتن IPH مربوط به FPG بیشتر =LR(+) ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر بود [۵/۱۵] یا مساوی ۹۵٪ اطمینان [۴/۷۳-۵/۶۱]. پس از آن فشار خون بالا [۲/۹ =LR(+)]؛ فاصله اطمینان ۹۵٪ [۲/۶-۳/۲]، تری گلیسیرید بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر =LR(+) ۲/۳؛ فاصله اطمینان ۹۵٪ [۲/۱-۲/۶]، سن بیشتر/مساوی ۴۰ سال [۱/۸ =LR(+)]؛ فاصله اطمینان ۹۵٪ [۱/۷-۱/۹] و دور کمر نابهنجار [۱/۵ =LR(+)]؛ فاصله اطمینان ۹۵٪ [۱/۴-۱/۶] در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. LR مثبت برای ترکیب سه متغیر بالینی (سن، فشار خون و دور کمر) ۲/۷ بود (فاصله اطمینان ۹۵٪ [۲/۹۱-۲/۵۸]) در حالی که LR مثبت برای ترکیب دو متغیر بیوشیمیایی (FPG و تی گلیسی بده) ۹/۷ د (فاصله اطمینان ۹۵٪)

مدل رگرسیون لوجیستیک چند متغیری، نشان داد که متغیرهای گلوکز خون ناشتا ($OR=9/5$)؛ با فاصله اطمینان معادل $7/1-12/5$ ، سن ($OR=2/6$)، با فاصله اطمینان معادل $1/8-3/7$ ، تری گلیسیرید ($OR=2/1$)؛ با فاصله اطمینان معادل $1/6-2/7$ ، فشار خون بالا ($OR=2/0$)؛ با فاصله اطمینان $1/8-2/6$ ، دور کمر ($OR=1/9$)؛ با فاصله اطمینان $1/3-2/8$ ؛ پیش‌بینی کننده های معنی دار IPH در افراد دارای گلوکز خون ناشتای کمتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر بودند (جدول ۲). سایر متغیر ها نظیر جنسیت، BMI، کلسترول

جدول ۳ نشان دهنده نسبت های احتمال (LR) مربوط به متغیر های سو شمیاب و بالتبه بای تشخص IPH است.

و بیماری قلبی عروقی را پیش بینی کند. Meigs و همکارانش [۲۱]. ۳۳۷۰ نفر از مطالعه فرامینگهام (Framingham Offspring Study) را که هیچ شواهد بالینی از CVD نداشتند را بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ ارزیابی کردند و به مدت ۴ سال آنها را از نظر میزان 2h-PG برخورد CVD پیگیری کردند. این محققان دریافتند که ۲h-PG افزایش یافته بعد از OGTT خطر نسبی بروز CVD را تا ۴٪، مستقل از عوامل خطر غیر گلیسمیک یا ناشتا بودن یا هیپر گلیسمی متوسط افزایش می‌دهد. مطالعه «اپیدمیولوژی دیابت، آنالیز گروهی معیارهای تشخیصی در اروپا» [۲۲]، نشان داد که آستانه‌های غلظت 2h-PG برای مرگ و میر ناشی از همه علل و مرگ و میر غیر قلبی عروقی به ترتیب ۵/۴ میلی گرم در دسی لیتر و ۵/۱ میلی گرم در دسی لیتر بود در حالی که آستانه ای برای مرگ و میر ناشی از CVD وجود نداشت، به عبارت دیگر، با افزایش غلظت‌های 2h-PG حتی در محدوده غیر دیابتیک، خطر مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی به طور پیوسته افزایش می‌یافتد. نتایج مقطعی ما نشان داد که برخی عوامل خطر ساز شناخته شده برای بیماری‌های قلبی عروقی نظیر سن، تری گلیسریدها، فشار خون، BMI و دور کمر در میان بیماران دارای IPH مشابه افراد دارای دیابت نوع ۲ تشخیص داده نشده بود و در هردو این گروه‌ها بطور معنی‌داری بالاتر از افراد غیر دیابتیک بود. این نتایج با سایر مطالعات مقطعی همخوانی دارند [۲۳ و ۲۴].

شیوع IPH در جمعیت ما ۳/۱٪ بود که در برگیرنده حدود ۴٪ از موارد جدیداً تشخیص داده شده دیابت است. شیوع IPH با سن افزایش می‌یافتد، به طوری که در افراد بالای ۷۰ سال، ۸/۸٪ بود. شیوع IPH در مطالعات زیادی گزارش شده است [۲۵ و ۲۶ و ۲۷]. این شیوع در کوهورت DECODE [۲۸ و ۲۹] اروپایی بین ۱۷ تا ۹۲ سال) مطالعه ۲۵۲۱۹ بود که شامل ۳۱٪ از همه موارد جدید دیابت قنده نوع ۲ بود [۲۵]. این شیوع در افراد ۴۹ ساله و پایین‌تر ۷٪ و در افراد بالای ۷۰ سال ۴/۶٪ بود [۲۷]. در مطالعه سلامت قلبی عروقی [۲۶]، در میان ۴۵۱۵ شرکت کننده بالای ۶۵ سال، شیوع IPH ۸/۴٪ و در میان موارد دیابت

۸/۶۰-۱۱٪. در نهایت، ترکیب همه متغیرهای بالینی و آزمایشگاهی، LR مثبت را تا ۱۲/۹ (فاصله اطمینان ۹۵٪: ۱۱/۰۷-۱۵/۱۳) بالا می‌برد. پایین ترین LR منفی مربوط به ترکیب سه متغیر بالینی، و معادل ۰/۰۶ (فاصله اطمینان ۰/۰۲-۰/۰۴) بود.

بحث

این مطالعه نشان می‌دهد که در جمعیت شهری تهران، میزان شیوع IPH ۳/۱٪ است و در افرادی با کمتر از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر در حضور FPG بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، سن بیشتر یا مساوی ۴۰ سال، فشارخون بالا، تری گلیسرید بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و دور کمر نابهنجار (بیشتر یا مساوی ۸۰ سانتی متر در زنان و بیشتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر در مردان)، شناس داشتن IPH افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در این گروه، FPG بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و تری گلیسرید بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، یک نسبت احتمال مثبت معادل ۹/۷ برای IPH فراهم می‌کند. اضافه کردن برخی متغیرهای بالینی از قبیل سن بیشتر یا مساوی ۴۰ سال، فشار خون بالا و دور کمر نابهنجار، نسبت احتمال مثبت را به ۱۲/۹ افزایش داد.

IPH یک پیش بینی کننده مستقل برای بیماری قلبی-عروقی است. خطر بالا برای CVD، non-CVD و مرگ و میر ناشی از همه علل در بعضی مطالعات طولی (Longitudinal) برای افراد دارای IPH نشان داده شده است [۶-۷]. Shaw و همکارانش در یک مطالعه طولی [۶] که در آن بیش از ۹۰۰۰ نفر به مدت بین ۵-۱۲ سال پیگیری شدند، نشان دادند که افراد دارای IPH خطر مرگ و میر قلبی عروقی ۲/۳٪ در مردان و ۲/۶ در زنان در مقایسه با افراد غیر دیابتیک داشتند. نقش 2h-PG همچنین به عنوان یک عامل خطرساز مستقل در پیش بینی عوارض ماکروواسکولار و مرگ و میر در بسیاری از مطالعات مقطعی مبتنى بر جمعیت و آینده نگر بررسی شده است. اکثر این مطالعات [۱۶-۲۱] نشان داده اند که 2h-PG نسبت به FPG بهتر می‌تواند مرگ و میر ناشی از همه علل

خوراکی را تحمل کنند و این امر باعث می شود تفسیر نتایج تست مشکل شود زیرا تمام گلوکز مصرف نشده است. با درنظر گرفتن اهمیت تشخیص IPH و همچنین معایب OGTT، منطقی به نظر می رسد که OGTT فقط در افرادی که شک بالایی به وجود IPH در آنها می رود، توصیه شود.

ما از دو رویکرد برای تعریف مشخصات افرادی که در معرض شک بالای داشتن IPH هستند استفاده کردیم. ابتدا، ما یک آنالیز رگرسیون لوژیستیک برای پیش بینی IPH انجام دادیم. نتایج نشان داد که افرادی که FPG بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، سن بیشتر یا مساوی ۴۰ سال، تری گلیسیرید بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، فشار خون بالا و دور کمر نابهنجار داشتند، بیشترین احتمال را برای IPH داشتند. هرچند بهترین پیش بینی کننده IPH، گلوکز خون ناشتا بود، مدل لوژیستیک نشان داد که پیش بینی کننده های دیگری نیز وجود دارند. واضحًا دیگر پیش بینی کننده ها (تری گلیسیریدها، فشار خون بالا، دور کمر) قویاً با آنچه در تعریف سندرم متabolیک توسط برنامه آموزش ملی کلسترول، انجمن درمان بزرگسالان (NCEP- ATP III) [۲۹] پیشنهاد شده، همپوشانی دارد. بنابراین، وجود عناصر سندرم متabolیک ممکن است احتمال داشتن IPH را، حتی در حضور سطوح نرمال گلوکز ناشتا، به ویژه با افزایش سن، بیشتر کند. ما تاکنون چنین مدل لوژیستیکی برای پیش بینی IPH پیدا نکرده ایم؛ بنابراین مقایسه شباهت ها و تفاوت ها با یافته های مطالعات دیگر امکان پذیر نیست. در گام دوم، ما نسبت های احتمال مثبت و منفی برای IPH را، به طور جداگانه و همچنین در ترکیب با هم، با استفاده از هریک از فاکتور های معنی دار در مدل رگرسیون لوژیستیک محاسبه کردیم. در بررسی جداگانه، FPG بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر بالاترین نسبت احتمال مثبت را برای IPH داشت [$LR(+)=5/2$]. وقتی تری گلیسیرید بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر به FPG بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر اضافه می شد، $LR(+)$ تا $9/7$ افزایش می یافت؛ به عبارت دیگر، وقتی دو متغیر بیوشیمیایی بالاتر از مقادیر معینی بودند، شانس تشخیص

نوع ۲ که جدیداً غریال شده بودند، 52% بود. شیوع IPH در میان ۲۸۴۴ فرد ۴۰ تا ۷۴ ساله که در سومین مطالعه آماری ملی بررسی سلامت و تغذیه (NHANES III) شرکت داشتند، $3/3\%$ بود که در برگیرنده تقریباً 41% از همه موارد دیابت جدیداً تشخیص داده شده بود [۴]. در این مطالعه، هم شیوع دیابت قندی نوع ۲ تشخیص داده نشده و هم شیوع IPH با افزایش سن افزایش می یافتد. در سنین پایین تر، FPG بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر ظاهرًا بیشتر اختلالات گلوکز را شناسایی می کرد که نشان می دهد افراد جوان به ندرت IPH داشتند [۴]. این مطالعات از نظر طیف سنی شرکت کنندگان با یکدیگر متفاوت بودند. این تفاوت سنی ممکن است بتواند تفاوت شیوع در مطالعات را توضیح دهد. نتایج ما با نتایج مطالعات دیگر [۲۸، ۲۶، ۲۲، ۴] همخوانی دارد، که نشان می دهد IPH در سالمندان شایعتر است. در دیگر مطالعات، درصد IPH به همه موارد دیابت جدیداً تشخیص داده شده با سن افزایش می یافتد [۲۸، ۵]، به عبارت دیگر، شیوع IPH در سنین پایین تر نسبتاً کمتر بود. اما در مطالعه ما، در همه گروه های سنی، حتی در سنین پایین تر از ۵۰ سال، IPH در برگیرنده تقریباً 43% از همه موارد جدیداً تشخیص داده شده دیابت است. به بیان دیگر، اکثریتی از همه افرادی که جدیداً مبتلا به دیابت نوع ۲ تشخیص داده شده اند، در سنین پایین تر IPH داشتند.

اگر IPH شایع و همچنین یک عامل خطر مستقل و معنی دار برای مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی باشد، پس تشخیص به موقع و مقتضی آن فوق العاده ارزشمند است. لازم است بیاد داشته باشیم 26% از افراد دارای IPH در مطالعه ما، گلوکز خون ناشتایی کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر داشتند. از آنجا که FPG به تنهایی نمی تواند IPH را تشخیص دهد، OGTT تنها راه تشخیص این نوع فرعی از دیابت قندی نوع ۲ خواهد بود. از سوی دیگر، موانعی در برابر انجام روتین OGTT در شرایط بالینی وجود دارد؛ جدای از وقت گیر و گرانتر بودن آن نسبت به FPG، قابلیت تکرار پذیری کلی آن رضایت بخش نیست و تغییرات روز به روز آن زیاد است [۹۸]. به علاوه، اقلیتی از بیماران نمی توانند گلوکز

و دیابت حاملگی را در این مطالعه بررسی نکردیم. آگاهی کامل و مشروح از این متغیرها ممکن است قدرت پیش‌بینی کنندگی IPH را افزایش دهد.

با در نظر گرفتن مشکلات همراه با OGTT و نقش IPH در افزایش خطر و مرگ و میر ناشی از CVD، اگر تست تحمل گلوکز خوراکی در جمعیت های پر خطر، که با کمک فاکتورهای بالینی و بیوشیمیایی در دسترس شناسایی می‌شوند انجام گیرد؛ موثرتر خواهد بود. با این وجود پزشک معالج ممکن است چندان مایل به درخواست OGTT نباشد و این امر کاملاً قابل درک است؛ در هر حال بر مبنای این یافته‌ها، منطقی به نظر می‌رسد که حتی اگر گلوکز خون ناشتا در محدوده نرمال باشد، OGTT در افراد مسن تری که دچار فشار خون بالا، دور کمر نابهنجار و هیپرتری گلیسریدمی هستند درخواست شود.

IPH ۹ برابر بیشتر شد. به علاوه، ترکیب همه متغیرها (سه متغیر بالینی و دو متغیر آزمایشگاهی) (LR(+)) را تا ۱۲/۹ افزایش داد. LR منفی برای ترکیب سه متغیر بالینی، ۰/۰۶ بود. به عبارت دیگر، عدم وجود این سه متغیر بالینی، فاکتوری معادل ۱۶/۷ (۱ تقسیم بر ۰/۰۶) به نفع وضعیت غیر دیابتیک به دست می‌دهد.

در مطالعه ما برخی محدودیت‌های بالقوه وجود دارد. اول آنکه ما از یک نمونه خون منفرد برای سطوح گلوکز ناشتا و همچنین گلوکز بعد از انجام تست تحمل گلوکز با هدف طبقه‌بندی افراد استفاده کردیم. این انتقاد را تقریباً می‌توان به همه مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در مورد دیابت نوع ۲ وارد کرد. دومین مشکل مطالعه ما آنست که چون نسبت افراد با سن بالاتر تا حدودی کمتر از سینین پایین بوده است، داده‌های ما ممکن است دقت کمتری در این گروه داشته باشد. سوم آنکه ما نقش سابقه خانوادگی مثبت

ماخذ

1. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: Report of the expert committee and diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care* 1997; 20: 1183-97.
2. World health Organization: *Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications: Report of a WHO Consultation. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus*. Geneva, World Health Org., 1999.
3. The DECODE-study group on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group. Is fasting glucose sufficient to define diabetes? Epidemiological data from 20 European studies. The DECODE-study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis of Diagnostic Criteria in Europe. *Diabetologia* 1999; 42: 647-54.
4. Resnick HE, Harris MI, Brock DB, Harris TB. American Diabetes Association diabetes diagnostic criteria, advancing age, and cardiovascular disease risk profiles: results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Diabetes Care* 2000; 23: 176-80.
5. Barrett-Connor E, Ferrara A: Isolated postchallenge hyperglycemia and the risk of fatal cardiovascular disease in older women and men: the Rancho Bernardo Study. *Diabetes Care* 1998; 21:1236-39.
6. Shaw JE, Hodge AM, de Courten M, Chitson P, Zimmet PZ: Isolated post-challenge hyperglycaemia confirmed as a risk factor for mortality. *Diabetologia* 1999; 42:1050-54.
7. Lowe LP, Liu K, Greenland P, Metzger BE, Dyer AR, Stamler J. Diabetes, asymptomatic hyperglycemia, and 22-year mortality in black and white men. The Chicago Heart Association Detection Project in Industry Study. *Diabetes Care* 1997; 20: 163-9.
8. Feskens EJ, Bowles CH, Kromhout D. Intra- and interindividual variability of glucose tolerance in an elderly population. *J Clin Epidemiol* 1991; 44: 947-53.
9. Ko GT, Chan JC, Woo J, Lau E, Yeung VT, Chow CC, Cockram CS. The reproducibility and usefulness of the oral glucose tolerance test in screening for diabetes and other cardiovascular risk factors. *Ann Clin Biochem* 1998; 35 (Pt 1):62-7.
10. Azizi F, Rahmani M, Emami H, Madjid M. Tehran Lipid and Glucose Study. *CVD Prevention* 2000; 3:242-7.
11. Dobbelsteyn CJ, Joffres MR, MacLean DR, Flowerdew G. A comparative evaluation of waist circumference, waist-to-hip ratio and body mass index as indicators of cardiovascular risk factors. The Canadian Heart Health Surveys. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2001; 25(5):652-61.
12. World Health Organization: Diabetes Mellitus: Report of WHO study group. Geneva, World Health Org. 1985; Tech. Rep. Ser., no 727.

13. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preoperative ultracentrifuge. *Clin Chem* 1972;18:499–502.
14. Sox HC, Blatt MA, Higgins MC, Marton KI. *Medical Decision Making*. MA: Butterworth Publishers; 1988.
15. Smith NL, Barzilay JI, Shaffer D, Savage PJ, Heckbert SR, Kuller LH, Kronmal RA, Resnick HE, Psaty BM: Fasting and 2-hour postchallenge serum glucose measures and risk of incident cardiovascular events in the elderly: the Cardiovascular Health Study. *Arch Intern Med* 2002; 162:209–16.
16. de Vegt F, Dekker JM, Stehouwer CD, Nijpels G, Bouter LM, Heine RJ: Similar 9-year mortality risks and reproducibility for the World Health Organization and American Diabetes Association glucose tolerance categories: the Hoorn Study. *Diabetes Care* 2000; 23:40–44.
17. The DECODE Study Group, European Diabetes Epidemiology Group: Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis Of Diagnostic criteria in Europe: glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. *Lancet* 1999; 354:617–21.
18. Barzilay JI, Spiekerman CF, Wahl PW, Kuller LH, Cushman M, Furberg CD, Dobs A, Polak JF, Savage PJ: Cardiovascular disease in older adults with glucose disorders: comparison of American Diabetes Association criteria for diabetes mellitus with WHO criteria. *Lancet* 1999; 354:622–25.
19. Rodriguez BL, Lau N, Burchfiel CM, Abbott RD, Sharp DS, Yano K, Curb JD: Glucosa intolerance and 23-year risk of coronary heart disease and total mortality: the Honolulu Heart Program. *Diabetes Care* 1999; 22:1262–65.
20. Tominaga M, Eguchi H, Manaka H, Igarashi K, Kato T, Sekikawa A: Impaired glucose tolerance is a risk factor for cardiovascular disease, but not impaired fasting glucose: the Funagata Diabetes Study. *Diabetes Care* 1999; 22:920–24.
21. Meigs JB, Nathan DM, D'Agostino RB Sr, Wilson PW: Fasting and postchallenge glycemia and cardiovascular disease risk: the Framingham Offspring Study. *Diabetes Care* 2002; 25:1845–50.
22. DECODE Study Group, European Diabetes Epidemiology Group. Is the current definition for diabetes relevant to mortality risk from all causes and cardiovascular and noncardiovascular diseases? *Diabetes Care* 2003; 26(3):688–96.
23. Suzuki H, Fukushima M, Usami M, Ikeda M, Tamiguchi A, Nakai Y, Matsuura T, Kuroe A, Yasuda K, Kurose T, Seino Y, Yamada Y. Factors responsible for development from normal glucose tolerance to isolated postchallenge hyperglycemia. *Diabetes Care* 2003; 26(4):1211–5.
24. Li CL, Tsai ST, Chou P. Comparison of metabolic risk profiles between subjects with fasting and 2-hour plasma glucose impairment: The Kinmen Study. *J Clin Epidemiol* 2002; 55(1):19–24.
25. DECODE Study Group on behalf of the European Diabetes Epidemiology Study Group. Will new diagnostic criteria for diabetes mellitus change phenotype of patients with diabetes? Reanalysis of European epidemiological data. *BMJ* 1998; 317:371–75.
26. Wahl PW, Savage PJ, Psaty BM, Orchard TJ, Robbins JA, Tracy RP: Diabetes in older adults: a comparison of 1997 American diabetes association classification of diabetes mellitus with the 1985 world health organization classification. *Lancet* 1998; 352:1012–15.
27. Qiao Q, Tuomilehto J, Borch-Johnsen K. Post-challenge hyperglycemia is associated with premature death and macrovascular complications. *Diabetologia* 2003; 46: S11:M17–M21.
28. Lee ET, Howard BV, Go O, Savage PJ, Fabsitz RR, Robbins DC, Welty TK. Prevalence of undiagnosed diabetes in three American Indian populations. A comparison of the 1997 American Diabetes Association diagnostic criteria and the 1985 World Health Organization diagnostic criteria: the Strong Heart Study. *Diabetes Care* 2000; 23(2):181–6.
29. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. *Circulation* 2002; 106: 3143–421.