

## اپیدمیولوژی دیابت و اختلال گلوکز ناشتا در بالغین استان سمنان

رحیمه اسکندریان<sup>۱</sup>، علی رشیدی پور<sup>۲</sup>، راهب قربانی<sup>۳</sup>، مجتبی ملک<sup>\*۴</sup>

### چکیده

مقدمه: دیابت، یکی از بیماری‌های شایع در سراسر دنیاست. با توجه به مزمن بودن بیماری دیابت و هزینه سنگینی که بر سیستم بهداشت و درمان تحمل می‌کند، این مطالعه جهت بررسی شیوع دیابت و اختلال گلوکز ناشتا در استان سمنان انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی در جامعه شهری و روستایی استان سمنان ۳۷۹۹ نفر از افراد ۳۰-۷۰ ساله انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه و اندازه‌گیری وزن، قد، دور کمر و دور باسن، از کلیه افراد پس از ناشتا ۱۲ ساعته یک نمونه خون جهت اندازه‌گیری قند خون، تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL گرفته شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، ۳۷۹۹ نفر از ساکنین استان سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد مورد بررسی  $45 \pm 10$  سال بود. شیوع دیابت و اختلال گلوکز ناشتا در استان به ترتیب ۹ درصد و  $15/4$  درصد براورد شد. شیوع دیابت در زنان  $9/9$  درصد و در مردان  $7/9$  درصد بود. در بیش از  $47$  درصد از موارد دیابت، بیماران از ابتلا به آن بی اطلاع بودند. شیوع دیابت در شهروندان  $9/7$  درصد و در ساکنین روستا  $7/4$  درصد بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه شیوع نسبتاً بالای دیابت و IFG را در استان سمنان نشان داد. شناسایی و بیماریابی و افزایش آگاهی و آموزش عمومی می‌تواند در پیش‌گیری از بیماری، تشخیص به موقع و کنترل مطلوب آن نقش مؤثر داشته باشد.

واژگان کلیدی: دیابت، اختلال گلوکز ناشتا، اپیدمیولوژی

- ۱ - گروه داخلی، مرکز آموزشی درمانی فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
- ۲ - گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
- ۳ - گروه پژوهشی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
- ۴ - گروه داخلی، مرکز آموزشی درمانی فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

\*نشانی: مرکز آموزشی درمانی فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تلفن: ۰۹۱۲۱۳۱۳۵۳۸، نماابر: ۰۲۳۱-۰۲۲۲۲۴۲، پست الکترونیک: malekmoj@yahoo.com

## مقدمه

مطالعه جهت بررسی شیوع دیابت و اختلال گلوكز ناشتا و برخی عوامل مرتبط در جمعیت ۷۰-۳۰ ساله استان سمنان انجام شد.

## روش‌ها

### نوع مطالعه و روش نمونه‌گیری

این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی در جامعه شهری و روستایی استان سمنان روی ۳۷۹۹ نفر از افراد ۳۰-۷۰ ساله از مهر لغایت بهمن ۱۳۸۴ انجام شد.

نمونه‌گیری به روش چندمرحله‌ای (طبقه‌ای، خوش‌ای، تصادفی ساده) با تقسیم جامعه شهری به شهرهای سمنان، دامغان، شهرود و گرمسار و روستاهای انجام شد. با استفاده از شماره خانوارهای مرکز بهداشتی، ۷۶۰ سرخوشه به روش سیستماتیک انتخاب و در هر سرخوشه به سمت چپ (درصورت مواجهه با آپارتمان به سمت بالا) تا ۵ خانوار واجد شرایط بررسی شدند. به این صورت که در صورت وجود فرد ۳۰-۷۰ ساله در خانوار، یک نفر به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه تحقیق برای وی تکمیل شد و در صورت عدم وجود فرد واجد شرایط، خانوار دیگر با همان قاعده انتخاب شد.

### روش انجام آزمایش‌های بیوشیمایی و اندازه‌گیری اضافه وزن و چاقی

پس از تکمیل پرسشنامه، معرفی نامه‌ای به فرد منتخب داده شد تا به آزمایشگاه مشخص (قبل از در هر شهر با آزمایشگاه معینی برای انجام آزمایش‌های طرح هماهنگی شده بود) مراجعه و آزمایش‌های لازم انجام شود. آزمایش‌ها با ناشتاپی ۱۲ ساعته انجام شد. آزمایش قند خون ناشتا به روش آنزیمی و توسط دستگاه هلنا ساخت شرکت اپندروف آلمان و با استفاده از کیت‌های مرک آلمان انجام گردید. جهت آزمایش تری‌گلیسرید و کلسترول از دستگاه اتوآنالیزر Lysis ساخت کشورسوئیس و با کیت Man و به روش آنزیماتیک endpoint انجام شد. آزمایش LDL کلسترول تام نیز با همان دستگاه اندازه‌گیری شد. میزان LDL در صورت تری‌گلیسرید کمتر از ۴۰۰ mg/dl با

دیابت یکی از بیماری‌های شایع در تمام کشورهای دنیا می‌باشد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که شیوع دیابت طی ۲۵ سال آینده رو به افزایش است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، تعداد مبتلایان به دیابت در سال ۲۰۲۵ در دنیا به ۳۳۳ میلیون نفر خواهد رسید. از طرف دیگر ناحیه آسیای میانه یکی از مرکز رشد اپیدمیک سریع دیابت در جهان می‌باشد [۱-۲]. با توجه به این که مرگ و میر در بیماران دیابتی بیشتر و امید به زندگی در آنها کمتر از افراد غیر دیابتی می‌باشد، این مسئله بصورت مشکل جدی در برابر سیستم بهداشتی کشورها قرار می‌گیرد [۳].

عوارض بیماری دیابت متنوع و گستردگی دارد واقع بیماری دیابت، شایعترین علت نارسایی کلیه، کوری، قطع عضو غیر ترمومایی و نوروپاتی است [۴-۵]. خطر بروز بیماری عروق کرونر، سکته مغزی و بیماری عروق محیطی در بیماران دیابتی بیشتر از افراد غیر دیابتی است [۶].

دیابت در مراحل اولیه، اغلب بدون علامت بوده، ممکن است برای سال‌ها بدون علامت باقی بماند. هیپرگلیسمی در این بیماران به تدریج پیشرفت کرده و موجب تغییرات پاتولوژیک در ارگان‌های متفاوت بدن می‌گردد [۷]. دیابت نوع ۲ به طور معمول ۵-۱۲ سال بعد از شروع هیپرگلیسمی تشخیص داده می‌شود [۸]؛ لذا تشخیص زودرس و اقدامات درمانی لازم می‌تواند از عوارض دیابت تا حد زیادی بکاهد.

با توجه به مزمن بودن بیماری دیابت و هزینه سنگینی که به سیستم بهداشت و درمان وارد می‌سازند؛ آگاهی از شیوع بیماری در جوامع مختلف ضروری بوده و امکان برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه و درمانی را ممکن می‌سازد. در سال‌های اخیر شیوع دیابت در چندین استان ایران مطالعه شده است [۹-۱۳] ولی اطلاعاتی در مورد استان سمنان در دسترس نیست. از طرف دیگر وجود تفاوت‌های قابل ملاحظه در ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تغذیه‌ای مردم استان‌های مختلف می‌تواند در میزان شیوع دیابت موثر باشد. از این رو، این

## یافته‌ها

### یافته‌های دموگرافیک

در این مطالعه ۳۷۹۹ نفر از ساکنین استان سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. ۴۴/۶ درصد از شرکت کنندگان مرد و ۵۵/۴ درصد زن بودند. میانگین ( $\pm$  انحراف معیار) سنی افراد مورد بررسی  $45\pm 10$  سال که در زنان  $45\pm 9$  و در مردان  $46\pm 10$  سال بود. از افراد مورد مطالعه ۷۱/۵ درصد ساکن شهر و  $28/5$  درصد ساکن روستا بودند.

### شیوع دیابت و اختلال گلوکز ناشتا

شیوع دیابت و اختلال گلوکز ناشتا در استان به ترتیب ۹ درصد (با فاصله اطمینان ۹۵ درصد:  $9/9 - 9/1$  درصد) و  $15/4$  در صد بوده است. بیش از  $47$  درصد از موارد دیابت، تازه تشخیص داده شده و بیماران از ابتلا به آن بی اطلاع بودند. شیوع دیابت در شهربنشین‌ها  $9/7$  درصد و در ساکنان روستا  $7/4$  درصد بود. بالاترین شیوع دیابت در شهرستان دامغان ( $10/3$  درصد) مشاهده شد. شیوع دیابت در زنان  $9/9$  درصد و در مردان  $7/9$  درصد بود.  $5$  درصد افراد کمتر از  $46$  سال،  $12/6$  درصد افراد  $46-60$  سال و  $16/7$  درصد افراد بیشتر از  $60$  سال دیابت داشتند. شیوع اختلال گلوکز ناشتا برای گروههای سنی فوق به ترتیب  $13/13$  و  $20/6$  درصد بود (جدول ۱).

### شیوع دیابت و اختلال گلوکز ناشتا در افراد دچار اضافه وزن و چاقی

$6/5$  درصد نمونه‌های با نمایه توده بدنی کمتر از  $25$ ،  $25/5$  درصد افراد دارای اضافه وزن (نمایه توده بدنی بیشتر از  $25$  و کمتر از  $30$ ) و  $11/3$  درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از  $30$ ) مبتلا به دیابت بودند. شیوع اختلال گلوکز ناشتا برای هر یک از گروههای فوق به ترتیب  $12/1$  و  $15/1$  و  $19/9$  درصد بود (جدول ۱).

استفاده از فرمول فریوالد  $LDL=TC-(HDL-TG/5)$  محاسبه گردید و در صورت تری گلیسرید بیشتر از  $400$  mg/dl با کیت Ziest mg/dl به عنوان قند خون بالا، کلسترول تمام بیشتر از  $126$  mg/dl به عنوان کلسترول بالا، تری گلیسرید بیشتر از  $200$  mg/dl معيار تری گلیسرید بالا براساس استاندارد در نظر گرفته شد. هم‌چنین میزان LDL بیشتر از  $150$  mg/dl و HDL کمتر از  $40$  برای مردان و کمتر از  $50$  mg/dl برای زنان به عنوان معيار HDL پایین در نظر گرفته شد [۱۴]. کترل کیفی دستگاه ابتداء، در حین و انتهای انجام گردید. وزن با حداقل پوشش و بدون کفش با استفاده از یک ترازوی دیجیتالی با دقیق  $100$  گرم و قد افراد با استفاده از متر نواری در وضعیت ایستاده و بدون کفش در حالی که کتفها در شرایط عادی قرار داشتند، اندازه‌گیری شد. نمایه توده بدنی (BMI) از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر محدود قدر (متر) محاسبه شد. BMI بزرگتر یا مساوی  $25$  و کمتر از  $30$  به عنوان اضافه وزن و بیشتر یا مساوی  $30$  به عنوان چاقی در نظر گرفته شد. دور کمر در باریک‌ترین ناحیه آن در حالتی ارزیابی شد که فرد در انتهای بازدم طبیعی خود قرار داشت. جهت اندازه‌گیری دور باریک، بر جسته‌ترین قسمت آن مشخص گردید. اندازه‌گیری دور کمر و دور باریک با استفاده از یک متر نواری غیرقابل ارجاع بدون تحمیل هرگونه فشاری به بدن فرد با دقیق  $1$  میلی متر صورت گرفت. نسبت دور کمر به دور باریک (WHR) بزرگتر یا مساوی  $0/9$  در مردان و بزرگتر یا مساوی  $0/8$  در زنان به عنوان چاقی شکمی در نظر گرفته شد [۱۵].

### تجزیه و تحلیل آماری

پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک، در سطح معنی‌داری  $5$  درصد و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش  $11/5$ ، تحلیل داده‌ها انجام گرفت.

جدول ۱- شیوع دیابت در جمعیت ۳۰-۷۰ ساله استان سمنان به تفکیک منطقه سکونت، جنس، سن، نمایه توده بدنی و شهرستان

## محل سکونت (سال ۱۳۸۴)

نرمال <sup>c</sup>	اختلال گلوکز ناشتا <sup>b</sup>	ابلاط به دیابت <sup>a</sup>			شناخته شده	جدید	نمونه	تعداد	متغیر		
		کل	منطقه سکونت								
(۷۵/۵)	۲۰۵۱	(۱۴/۸)	۴۰۲	(۹/۷)	۲۶۲	(۴/۹)	۱۳۳	(۴/۸)	۱۲۹	۲۷۱۵	شهر
(۷۵/۸)	۸۲۲	(۱۶/۸)	۱۸۲	(۷/۴)	۸۰	(۴/۱)	۴۴	(۳/۳)	۳۶	۱۰۸۴	روستا
(۷۴/۷)	۱۵۷۱	(۱۵/۴)	۳۲۵	(۹/۹)	۲۰۸	(۵/۶)	۱۱۸	(۴/۳)	۹۰	۲۱۰۴	جنس
	۱۳۰۲	(۱۵/۳)	۲۵۹	(۷/۹)	۱۳۴	(۳/۵)	۵۹	(۴/۴)	۷۵	۱۶۹۵	مرد
سن(سال)											
(۸۲/۰)	۱۶۳۶	(۱۳/۰)	۲۵۹	(۵/۰)	۹۹	(۲/۱)	۴۲	(۲/۹)	۵۷	۱۹۹۴	$\leq 45$
(۷۰/۱)	۹۹۷	(۱۷/۳)	۲۴۶	(۱۲/۶)	۱۷۹	(۶/۹)	۹۸	(۵/۷)	۸۱	۱۴۲۲	$46-60$
(۶۲/۷)	۲۴۰	(۲۰/۶)	۷۹	(۱۶/۷)	۶۴	(۹/۷)	۳۷	(۷/۰)	۲۷	۳۸۳	$>60$
نمایه توده بدنی (kg/m <sup>2</sup> ) (BMI)											
(۸۱/۴)	۱۰۲۱	(۱۲/۱)	۱۵۲	(۶/۵)	۸۲	(۳/۳)	۴۲	(۳/۲)	۴۰	۱۲۵۵	$<25$
(۷۵/۴)	۱۱۶۴	(۱۵/۱)	۲۳۳	(۹/۵)	۱۴۷	(۴/۹)	۷۶	(۴/۶)	۷۱	۱۵۴۴	$25-29/9$
(۶۸/۸)	۶۸۸	(۱۹/۹)	۱۹۹	(۱۱/۳)	۱۱۳	(۵/۹)	۵۹	(۵/۴)	۵۴	۱۰۰۰	$\geq 30$
شهرستان محل سکونت											
(۷۹/۸)	۶۳۷	(۱۱/۸)	۹۴	(۸/۴)	۶۷	(۵/۵)	۴۴	(۲/۹)	۲۳	۷۹۸	گرمسار
(۷۳/۶)	۶۶۵	(۱۸/۵)	۱۶۷	(۷/۹)	۷۱	(۴/۰)	۳۶	(۳/۹)	۳۵	۹۰۳	سمنان
(۷۴/۳)	۵۹۷	(۱۵/۳)	۱۲۳	(۱۰/۳)	۸۳	(۴/۲)	۳۴	(۶/۱)	۴۹	۸۰۳	دامغان
(۷۵/۲)	۹۷۴	(۱۵/۴)	۲۰۰	(۹/۳)	۱۲۱	(۴/۹)	۶۳	(۴/۵)	۵۸	۱۲۹۵	شهرورد

a: قندخون ناشتا بیشتر یا مساوی ۱۲۶ mg/dl یا مصرف دارو b: قندخون ناشتا ۱۰۰ تا ۱۲۵ mg/dl c: فندخون ناشتا کمتر از ۱۰۰ mg/dl

نوع مطالعه: مقطعی روش آماری: رگرسیون لجستیک حجم نمونه: ۳۷۹۹ فرد بالغ \* مقادیر به صورت تعداد (درصد) بیان شده‌اند.

بالا، کلسترول بالا و سن ارتباط معنی دار با ابتلا به دیابت داشتند. به طوری که افراد با ۱/۴۳ برابر افراد با دورکمر طبیعی، افراد با چاقی شکمی غیرطبیعی ۱/۴۹ برابر افراد با چاقی شکمی طبیعی، افراد با فشارخون بالا ۱/۳۰ برابر افراد با فشارخون طبیعی، افراد با تری گلیسرید بالا ۲/۹۰ برابر افراد با تری گلیسرید طبیعی و افراد با کلسترول بالا ۱/۲۹ برابر افراد با کلسترول طبیعی و افراد بالای ۶۰ سال ۲/۹۷ برابر افراد کمتر از ۴۵ سال در خطر ابتلا به دیابت بودند. هم چنین افراد چاق و دارای اضافه وزن بیشتر از افراد نرمال در معرض خطرابلا به دیابت بودند (جدول ۳).

شیوع و ارتباط عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت و اختلال تحمل گلوکز در افراد مبتلا به دیابت، شیوع تری گلیسرید، کلسترول و پرفشاری خون و HDL پایین به ترتیب ۵۹/۹ ، ۷۴/۹ و ۵۱/۲ و ۳۶/۵ درصد بود. در افراد با اختلال گلوکز ناشتا، شیوع هریک از موارد فوق به ترتیب ۵۵/۷ و ۵۰/۳ و ۳۹/۷ و ۳۰/۲ درصد بود (جدول ۲). با در نظر گرفتن ابتلا به دیابت به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرهای ذکر شده، به عنوان متغیرهای بالقوه مستقل و انجام رگرسیون لجستیک گام به گام، متغیرهای دورکمر غیر نرمال، چاقی شکمی، پرفشاری خون، تری گلیسرید

**جدول ۲- شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت و اختلال گلوكز ناشتا در جمعیت ۳۰-۷۰ ساله استان سمنان (سال ۱۳۸۴)**

كل	وضعیت قندخون						متغیر	
	نرمال		اختلال گلوكز ناشتا		دیابت			
	نرمال	اختلال گلوكز ناشتا	دیابت	(mg/dl) $\geq 150$ TG				
(۴۷/۶) ۱۸۰۷	(۴۲/۷) ۱۲۲۶	(۵۵/۷) ۳۲۵	(۷۴/۹) ۲۵۶	(mg/dl) $\geq 150$ TG				
(۳۰/۷) ۱۱۶۸	(۳۰/۱) ۸۶۴	(۳۰/۷) ۱۷۹	(۳۶/۵) ۱۲۵		<sup>a</sup> پایین HDL			
(۶۷/۷) ۲۵۷۱	(۶۶/۶) ۱۹۱۴	(۷۰/۰) ۴۰۹	(۷۲/۵) ۲۴۸		(mg/dl) LDL $\geq ۱۰۰$			
(۳۵/۷) ۱۳۵۵	(۳۳/۳) ۹۵۹	(۴۰/۶) ۲۳۷	(۴۶/۵) ۱۵۹		(mg/dl) LDL $\geq ۱۳۰$			
(۴۳/۸) ۱۶۶۳	(۴۰/۵) ۱۱۶۴	(۵۰/۳) ۲۹۴	(۵۹/۹) ۲۰۵		(mg/dl) $\geq ۲۰۰$ Chol			
(۳۴/۸) ۱۳۲۲	(۳۱/۸) ۹۱۵	(۳۹/۷) ۲۳۲	(۵۱/۲) ۱۷۵		پرفشاری خون <sup>b</sup>			
(۷۲/۲) ۲۷۴۳	(۶۹/۰) ۱۹۸۳	(۷۹/۳) ۴۶۳	(۸۶/۸) ۲۹۷		چاقی شکمی <sup>c</sup>			
(۴۱/۲) ۱۵۶۴	(۳۷/۲) ۱۰۷۰	(۵۰/۲) ۲۹۳	(۵۸/۸) ۲۰۱		دورکمر غیرطبیعی <sup>d</sup>			

a: کمتر از ۴۰ برای مردان و کمتر از ۵۰ mg/dl برای زنان b: فشارخون سیستولیک بیشتریا مساوی ۱۳۰ یا دیاستولیک بیشتریا مساوی ۸۵ میلیمترجیوه یا مصرف دارو c: نسبت دورکمر به دور باسن بیشتر از ۰/۹ برای مردان و بیشتر از ۰/۸ برای زنان d: دورکمر بیشتر از ۱۰۲ برای مردان و بیشتر از ۸۸ سانتیمتر برای زنان نوع مطالعه: مقطعي روش آماری: استفاده از آمار توصیفی حجم نمونه: ۳۷۹۹ \* مقادیر به صورت تعداد (درصد) بیان شده‌اند.

**جدول ۳- نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت در جمعیت ۳۰-۷۰ ساله استان سمنان**

متغیر	ضریب ثابت	ضریب $\beta$	خطای معیار $\beta$	نسبت شانس (OR <sup>*</sup> )	فاصله اطمینان ۹۵٪ برای OR
	-۴/۵۴	-۰/۲۳	-	-	-
سن(سال)		-	-	-	-
$\leq ۴۵$		-	-	۱	-
۴۶-۶۰		۰/۷۷	۰/۱۴	۲/۱۵	(۱/۶۴, ۲/۸۲)
$> ۶۰$		۱/۰۹	۰/۱۸	۲/۹۷	(۲/۰۷, ۴/۲۵)
<sup>a</sup> دورکمر غیرطبیعی		۰/۳۶	۰/۱۳	۱/۴۳	(۱/۱۱, ۱/۸۳)
<sup>b</sup> چاقی شکمی غیرطبیعی		۰/۴۰	۰/۱۸	۱/۴۹	(۱/۰۵, ۲/۱۱)
<sup>c</sup> هیبر تانسیون		۰/۲۶	۰/۱۲	۱/۳۰	(۱/۰۲, ۱/۶۶)
<sup>d</sup> تری گلیسرید بالا		۱/۰۷	۰/۱۴	۲/۹۰	(۲/۲۲, ۳/۷۸)
<sup>e</sup> کلسترول بالا		۰/۲۶	۰/۱۲	۱/۲۹	(۱/۰۱, ۱/۶۴)

\*OR= Odds Ratio

a: دورکمر بیشتر از ۱۰۲ برای مردان و بیشتر از ۸۸ سانتیمتر برای زنان

b: نسبت دور کمر به دور باسن بیشتر از ۰/۹ برای مردان و بیشتر از ۰/۸ برای زنان

c: فشارخون سیستولیک بیشتریا مساوی ۱۳۰ یا دیاستولیک بیشتریا مساوی ۸۵ میلیمترجیوه یا مصرف دارو

d: تری گلیسرید بیشتر از ۱۵۰ mg/dl e: کلسترول بیشتر یا مساوی ۲۰۰ mg/dl

\* تمام موارد با  $P < 0.05$  معنی داراست. نوع مطالعه: مقطعي روش آماری: رگرسیون لجستیک حجم نمونه: ۳۷۹۹ فرد بالغ

## بحث

رسید و در مورد IFG از ۱۳ درصد به ۲۰/۶ درصد افزایش یافت. رابطه افزایش شیوع دیابت با سن در اکثر مطالعات دیگر نیز نشان داده شده است [۱۲-۱۷] که احتمالاً دلیل آن تغییرات بیولوژیک ناشی از افزایش سن و همچنین تغییر در شیوه زندگی در افراد مسن تر می‌باشد [۲۳] و این موضوع اهمیت توجه به بیماریابی دیابت در سنین بالاتر را مورد تأکید قرار می‌دهد.

در مطالعه ما شیوع دیابت در بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری نداشت که مشابه بسیاری از مطالعات دیگر می‌باشد [۱۲-۱۷، ۲۴-۲۵]. البته شیوع بالاتر دیابت و IGT در زنان نسبت به مردان در بعضی مطالعات ذکر شده است [۹، ۱۷، ۲۶-۲۷، ۱۳] که تفاوت نتایج این مطالعه احتمالاً ناشی از تفاوت در گروه‌های انتخاب شده، میزان فعالیت فیزیکی و تفاوت‌های نژادی می‌باشد.

در مطالعه ما شیوع دیابت در شهر ۹/۷ درصد و در روستاهای استان ۷/۴ درصد بود. شیوع دیابت در روستاهای استان تهران نیز ۷/۶ درصد گزارش شده [۱۳] که مشابه مطالعه ما می‌باشد. در کرمانشاه شیوع دیابت در شهرها ۹/۲ درصد و در روستا ۲/۱٪ گزارش شده است [۹]. در چمیت شهری مصر، شیوع دیابت بین ۱۳/۵ تا ۲۰ درصد و در جوامع روستایی ۴/۹ درصد گزارش شده است [۲۱]. در ترکیه شیوع دیابت و IFG در شهرها بیشتر از روستاهای گزارش شده است [۱۷]. به نظر می‌رسد تفاوت زندگی شهری و روستائی، وضعیت تغذیه‌ای و میزان فعالیت بدنی و استرس‌های محیطی در این زمینه نقش داشته باشند.

### آگاهی از ابتلا به دیابت

در مطالعه ما حدود ۴۷ درصد بیماران دیابتی از دیابت خود اطلاع نداشتند. در مطالعه سنتنچ ۲۴ درصد [۱۰] در بوشهر ۴۳/۱۶ درصد [۱۱] و در کرمانشاه ۴۰/۳ درصد [۹] از افراد دیابتی از دیابت خود مطلع نبودند. بطور کلی میزان دیابت تشخیص داده نشده در اکثر جوامع از ۲۰ تا ۵۰ درصد گزارش شده است [۲۸] که با توجه به میزان بالای عوارض و مرگ و میر در بیماران دیابتی توجه به این موارد ناشناخته از نکات قابل توجه در جوامع مختلف می‌باشد.

شیوع دیابت در مطالعه حاضر در افراد بالای ۳۰ سال در استان سمنان ۹ درصد (با فاصله اطمینان ۹۵ درصد: ۹/۹-۸/۱ درصد) و شیوع IFG برابر ۱۵/۴ درصد بود. در مطالعه‌ای در سنتنچ روح افراد بالای ۱۰ سال شیوع دیابت ۲/۳٪ و شیوع اختلال تحمل گلوکز (IGT) برابر با ۲/۸ درصد برآورد شد [۱۰]. شیوع دیابت در استان اصفهان و مرکزی در افراد بالای ۱۹ سال ۶۳ درصد گزارش شد [۱۲]. به نظر می‌رسد علت پایین بودن میزان دیابت در این مطالعات، گروه مورد مطالعه و تعریف قدیمی‌تر دیابت (FBS $\geq$ ۱۴۰ mg/dL) در مطالعه سنتنچ بوده است. در مطالعه بوشهر نیز شیوع دیابت ۱۲ درصد گزارش شده که با توجه به تعریف قدیمی دیابت در این مطالعه، به نظر می‌رسد شیوع بالای دیابت در آن استان ناشی از تفاوت‌های نژادی، تغذیه‌ای و ژنتیکی باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد [۱۱]. شیوع دیابت در مطالعه کرمانشاه ۶/۸ درصد و شیوع IGT در جامعه روستایی استان تهران به شیوع دیابت و IGT ترتیب ۷/۶ درصد و ۷/۵ درصد گزارش شده است [۱۲]. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که میزان شیوع دیابت در شرایط محیطی متفاوت می‌تواند تا ده برابر تغییر کند [۱۳]. شیوع دیابت در بحرین در مردان بالای ۴۰ سال و زنان بالای ۵۰ سال در گروه‌های نژادی مختلف از ۲۳ درصد تا ۴۸ درصد گزارش شد [۱۶]. در ترکیه شیوع دیابت ۷/۲ درصد و IGT برابر ۶/۷ درصد در افراد بالای ۲۰ سال گزارش شده [۱۷]. در استرالیا شیوع دیابت ۷/۴ درصد و IFG برابر ۸/۱ درصد گزارش شده [۱۸]. شیوع دیابت در عربستان سعودی در افراد بالای ۳۵ سال ۶ درصد [۱۹]، در یونان شیوع دیابت ۷/۸ درصد و IGT برابر ۳/۹ درصد [۲۰] و در مصر در افراد بالای ۲۰ سال ۹/۴ درصد [۲۱] و در پاکستان ۱۳/۵ درصد [۲۲] بوده است. با توجه به شیوع نسبتاً بالای دیابت در استان سمنان نیاز به توجه بیشتر به این معضل بهداشتی درمانی ضروری می‌باشد.

در مطالعه ما، با بالارفتن سن، شیوع دیابت و IFG نیز افزایش یافت به طوری که شیوع دیابت در افراد کمتر از ۴۵ سال از ۵ درصد به ۱۶/۷ درصد در افراد بالای ۶۰ سال

این مطالعه شیوع نسبتاً بالای دیابت و IFG را در استان سمنان نشان داد و با توجه به رابطه معنی‌دار میان دیابت و عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی، شناسایی و بیماری‌ای ای به ویژه در افراد مسن و چاق و افزایش آگاهی و آموزش عمومی می‌تواند در پیش‌گیری از بیماری، تشخیص به موقع و کنترل مطلوب آن نقش مؤثر داشته باشد.

### سپاسگزاری

این طرح با حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) استان سمنان انجام شده است، لذا بدین وسیله نویسنده‌گان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسؤولین محترم آن سازمان اعلام می‌دارند. از کلیه همکارانی که در جمع آوری داده‌ها در شهرستان‌های سمنان، گرمسار، دامغان و شاهرود همکاری نمودند و همچنین از داوران ناشناسی که نقطه نظرات آنان موجب ارتقای کیفیت مقاله گردید، تشکر و قدردانی می‌شود.

در مطالعه حاضر شیوع عوامل خطر قلبی عروقی شامل تری‌گلیسرید بالا، HDL پایین و LDL بالا، کلسترول تام بالا، پرفشاری خون، چاقی شکمی و دور شکم غیرطبیعی در بیماران دیابتی نسبت به افراد سالم به طور معنی‌داری بالاتر بود. ارتباط مستقیم دیابت با برخی عوامل خطر قلبی عروقی در مطالعات دیگر نیز نشان داده شده است [۲۹ و ۲۲]. [۲] اکه شناسایی و کنترل عوامل خطر در این گروه را پر اهمیت می‌کند. ارتباط متغیرها با وجود دیابت نشان می‌دهد که افزایش سن، اندازه دور کمر غیرطبیعی، چاقی شکمی، پرفشاری خون، تری‌گلیسرید بالا و کلسترول بالا با افزایش احتمال دیابت همراه است و جنسیت در افزایش احتمال دیابت نقشی نداشته که این یافته مشابه مطالعه اصفهان [۱۲] می‌باشد. در مطالعات دیگر نیز چاقی به ویژه در ناحیه شکم به عنوان یک عامل خطر دیابت نوع ۲ ذکر شده است [۳۰-۳۳].

### مأخذ

- King H, Aubert RE, Herman WH: Global burden of diabetes, 1995–2025: prevalence, numerical estimates, and projections. *Diabetes Care* 1998; 21:1414–1431.
- Amos AF, McCarty DJ, Zimmet P: The rising global burden of diabetes and its complications: estimates and projections to the year 2010. *Diabet Med* 1997; 14:7S–5S.
- Morgan CL, Currie CJ, Peters JR: Relationship between diabetes and mortality: a population study using record linkage. *Diabetes Care* 2000; 23:1103–1107.
- Reiber GE, Boyko EJ, Smith DG: Lower extremity foot ulcers and amputations in diabetes. In *Diabetes in America*. Washington, D.C., National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1995, p. 349–385 (NIH publ. no. 95-1468).
- Centers for Disease Control and Prevention: Blindness caused by diabetes: Massachusetts, 1987–1994. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 1996; 45:937–941.
- Bierman EL: George Lyman Duff Memorial Lecture: Atherogenesis in diabetes. *Arterioscler Thromb* 1992; 12:647–656.
- The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* 2000; 23:S4–S19.
- Muggeo M: Accelerated complications in type 2 diabetes mellitus: the need for greater awareness and earlier detection. *Diabet Med* 1998; 15(4):S60–S62.
- Mansoori F, Namdari Tabar H, Shahrezaei AR, Rezaei R, Alikhani A, Montazer MJ, Gazer Poor F. Diabetes mellitus in over-thirty-year old individuals in Kermanshah province, 2002. Behbood (*Journal of Kermanshah University of Medical Sciences*) 2002; 8(2): 57-64. (Persian).
- B-Yaazdanpanah K, Mamudi MS. The study of prevalence of diabetes mellitus and its relationship to hypertension and obesity in people above 10 years in the community of Sanandaj city in 1997. *Journal of Kordestan University of Medical Sciences* 1999; 4(14): 27-32. (Persian).
- Osfouri E, Nabipour I, Rayani M, Fakhrzadeh H, Mostaghni AA, Faghihi Zadeh S, et al. Prevalence of diabetes and impaired Glucose tolerance in Bushehr population aged 30-64 Yr. *Teb Jonoob (Journal of Bohshehr University of Medical Sciences)* 1997; 1: 209-216. (Persian).

12. Sadeghi M, Moayedi SN, Rooh Afza HR, Baghaei AM, Asgari S, Aghdak P, Sajadi F. The incidence of diabetes in over 19 years old population of Isfahan and Markazi provinces, 2002. *Journal of Arak University of Medical Sciences*. 2004; 7(3): 12-20. (Persian)
13. Azizi F, Navaei L. Study of the prevalence of diabetes and impaired Glucose tolerance in rural areas of Tehran province. *Hakim* 2001; 4(2): 92-99. (Persian).
14. Micheal M, Bristow• Brain D, Lowes .Management of heart failure. In: Zipes, Libby, Bonow, Braunwald, editors. *Heart Disease*. 7<sup>th</sup>; 2005 p.603-10.
15. Dobbeltstein CJ, Joffres MR, MacLean DR, Flowerdew G.A. Comparative evaluation of waist circumference, waist to hip ratio and body mass index as indicators of cardiovascular risk factors, The Canadian Heart Health Surveys. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2001; 25:652-661.
16. al-Mahroos F, McKeigue PM. High prevalence of diabetes in Bahrainis. Associations with ethnicity and raised plasma cholesterol. *Diabetes Care* 1998; 21(6):936-42.
17. Satman I, Yilmaz T, Sengül A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). *Diabetes Care* 2002; 25(9):1551-6.
18. Dunstan DW, Zimmet PZ, Welborn TA, De Courten MP, Cameron AJ, Sicree RA, et al. The rising prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study. *Diabetes Care* 2002; 25(5):829-34.
19. El Hazmi MA. Diabetes mellitus - present state of the art. *Saudi Med J* 1990; 11:10-7.
20. Melidonis AM, Tournis SM, Kompoti MK, Lentzas IL, Roussou VR, Iraklianou SL, et al. Increased prevalence of diabetes mellitus in a rural Greek population. *Rural Remote Health* 2006; 6(1):534.
21. Herman WH, Ali MA, Aubert RE, Engelgau MM, Kenny SJ, Gunter EW, et al. Diabetes mellitus in Egypt: risk factors and prevalence. *Diabet Med* 1995; 12(12):1126-31.
22. Shera AS, Rafique G, Khwaja IA, Ara J, Baqai S, King H. Pakistan national diabetes survey: prevalence of glucose intolerance and associated factors in Shikarpur, Sindh Province. *Diabet Med* 1995; 12(12):1116-21.
23. Anthony L, Komaroff F, Claster R. Women's health: In: Brunwald U, Fauci F, Kasper R, Hauser N, editors. *Principles of internal medicine*. Vol 1, 16th Ed. New York: McGraw Hill 2004; P. 21.
24. World Health Organization. *Diabetes Mellitus: Report of a WHO Study Group*. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1985. Technical report series No. 727.
25. Asfour MG, Lambourne A, Soliman A, Al-Behlani S, Al-Asfour D, Bold A, et al. High prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in the Sultanate of Oman: results of the 1991 national survey. *Diabet Med* 1995; 12(12):1122-5.
26. Oliveira JE, Milech A, Franco LJ. The prevalence of diabetes in Rio de Janeiro, Brazil. The Cooperative Group for the Study of Diabetes Prevalence in Rio De Janeiro. *Diabetes Care* 1996; 19(6):663-6.
27. Chou P, Liao MJ, Kuo HS, Hsiao KJ, Tsai ST. A population survey on the prevalence of diabetes in Kin-Hu, Kinmen. *Diabetes Care* 1994; 17(9):1055-8.
28. Midthjell K, Bjørndal A, Holmen J, Krüger O, Bjartveit K. Prevalence of known and previously unknown diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in an adult Norwegian population. Indications of increasing diabetes prevalence. The Nord-Trøndelag Diabetes Study. *Scand J Prim Health Care* 1995; 13(3):229-35.
29. Zimmet P. Epidemiology of diabetes mellitus and associated cardiovascular risk factors. *Am J Med* 2005; 118: 35-85.
30. Good pastor BH, Krishnaswami S, Harris TB. Obesity, regional body fat distribution, and the metabolic syndrome in older men and women. *Arch Intern Med* 2005; 165(7): 777-83.
31. Mokdad AM, Serdula MD , Dietz WK. The continuing epidemic of obesity in the United States. *JAMA* 2000; 285: 1650-1651.
32. Lewis CE, Jacobs DR jr, Mcereath H, et al. Weight gain continues in the 1990s: 10 year trends weight and over weight from the cardia study. *Am J Epidemiol* 2000; 151: 1172-1181.
33. Leibson C L, Smith SA, Ransom J E, et al. Temporal trends in BMI among adults with diabetes. *Diabetes care* 2001; 24: 1584-1589.