

شیوع سندرم متابولیک در دانشجویان و رابطه آن با شاخص‌های چاقی

مجید قلی‌پور^{۱*}، آرزو تبریزی^۱، انوشیروان کاظم‌نژاد^۲

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیکی مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی شامل چاقی مرکزی، افزایش قند خون، اختلالات چربی خون و پرفشاری خونی است که خطر رشد بیماری قلبی عروقی و دیابت را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد روش زندگی و فقدان آگاهی کافی دانشجویان نسبت به این عوامل، آنان را بیشتر در معرض این عارضه قرار می‌دهد. با توجه به کمبود تحقیقات در مورد دانشجویان، این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع سندرم متابولیک و رابطه آن با شاخص‌های چاقی و همچنین تعیین شایع‌ترین عامل خطر آن، به تفکیک در دو جنس انجام شد.

روش‌ها: تعداد ۲۲۳ دانشجو (۱۵۰ مرد، ۷۳ زن) در این تحقیق مقطعی شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، آزمایش خون، و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی جمع‌آوری شد. تمام متغیرهای آنتروپومتریکی و خونی پس از اندازه‌گیری با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و پانل درمانی بزرگسالان ۳ تطبیق داده شد.

یافته‌ها: شیوع سندرم متابولیک ۴/۵٪ (۶/۶٪ مردان، ۲/۷٪ زنان) و چاقی مرکزی ۴/۰٪ (۲/۶٪ مردان، ۸/۵٪ زنان) بود. ۰/۹٪ از آزمودنی‌ها کم تحرک بودند. کمبود HDL-C با ۴/۳٪ و پر فشاری خونی با ۲/۷٪ به ترتیب از شایع‌ترین عوامل بودند. از بین شاخص‌های چاقی، محیط کمر بهترین پیشگوی سندرم متابولیکی برای هر دو جنس بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که شیوع سندرم متابولیک و چاقی در بین آزمودنی‌های این تحقیق، نسبت به برخی از همتأیان ایرانی و اروپایی بیشتر بود. با توجه به ارتباط بین معیارهای سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، و سه اصل افزایش فعالیت جسمانی، کنترل وزن و رژیم غذایی، ارائه برنامه‌ای مناسب به منظور پیشگیری و درمان دانشجویان مبتلا، و ارتقاء سلامتی آنان، در اولویت قرار دارد.

واژگان کلیدی: دانشجو، سندرم متابولیک، شاخص‌های چاقی

۱- مرکز تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شریف

۲- گروه آمار حیاتی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

***نشانی:** تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مدیریت تربیت بدنی، تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۶۵۱۵۴، ۰۲۱-۶۶۰۰۵۷۱۰، پست

الکترونیک: gholipour@sharif.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۲

تاریخ درخواست اصلاح: ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۱/۱۹

عروقی، دیابت نوع ۲ و سرطان مرتبط می‌باشد [۹،۱۰]. با توجه به اینکه دانشجویان در معرض خطر افزایش عوامل خطرساز سندروم متابولیکی و بیماری‌های قلبی - عروقی هستند، به علت فقدان آگاهی کافی نسبت به این عوامل [۱۱]، و اینکه درک دقیقی از خطر بیماری‌های قلبی - عروقی خود ندارند و میزان این خطر را کمتر از مقدار واقعی ارزیابی می‌کنند [۱۲،۱۳]، احتمال زیادی وجود دارد که تا زمان بروز مشکلاتی جدی، بیماری آنان تشخیص داده نشود و این در حالی است که شیوع سندروم متابولیک، با افزایش سن، بیشتر هم می‌شود [۱۴].

Keown و همکاران شیوع ۱۰٪ سندروم متابولیکی و وجود حداقل یک معیار در ۴۳٪ از دانشجویان آمریکایی را گزارش کرده‌اند [۷]. همچنین ۶۶٪ از مردان و ۵۰٪ از زنان دانشگاه نیوهامشایر نیز دارای حداقل یک معیار از معیارهای سندروم متابولیکی بودند و این در حالی است که وجود سه عامل از پنج عامل سندروم متابولیکی در هشت درصد از مردان این دانشگاه گزارش شده است [۶]. در ایران نیز Mehrkash و همکاران روند رو به افزایش سندروم متابولیکی در بین نوجوانان ۱۰ الی ۱۹ ساله شهر تهران را در چند سال اخیر گزارش کرده‌اند [۱۵]. در تحقیق Rashidi و همکاران ۳/۲٪ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۶۷ درصد سندروم متابولیکی بودند و این در حالیست که ۴۵/۷٪ از آنان حداقل یک علامت این سندروم را دارا بودند [۱۶]. گزارش دیگری مبنی بر آن است که ۹/۹٪ از زنان و ۱۱٪ از مردان ایرانی دارای سندروم متابولیک می‌باشند به طوری که زیاد بودن اندازه دور کمر و پایین بودن مقادیر HDL-C در زنان، و پرفسار خونی، تری‌گلیسرید زیاد خون، و دارا بودن حداقل یک مورد از معیارهای سندروم متابولیک در مردان شیوع بیشتری داشت [۱۷].

با توجه به تحقیقات اندک انجام شده در خصوص شیوع سندروم متابولیکی در بین دانشجویان ایرانی و نیز نتایج گزارش شده قبلی ما مبنی بر وجود درصد قابل توجهی دانشجوی دارای اضافه وزن و چاق در دانشگاه صنعتی شریف و روش زندگی کم تحرک آنان [۱۸] و با در نظر گرفتن اینکه تشخیص زود هنگام معیارهای سندروم متابولیکی در جوانان می‌تواند به مداخله هدفمند منجر شده

مقدمه

سندروم متابولیکی مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی شامل چاقی مرکزی^۱، مقاومت به انسولین/اختلال در جذب و سوخت و ساز گلوکز، اختلالات چربی خون (تری‌گلیسرید زیاد، HDL-C کم^۲) و پرفشاری خونی است [۱] که به عنوان عوامل خطر شناخته شده‌اند. بروز سندروم متابولیکی، خطر ابتلا افراد به بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت شیرین و غیره را افزایش می‌دهد. براساس تعریف پانل درمانی بزرگسالان ۳ (ATP III)^۳، در صورتی که فردی دارای سه عامل از مجموعه عوامل فوق باشد، به عنوان بیمار مبتلا به سندروم متابولیکی شناخته می‌شود [۲]. از طرف دیگر، بنابر اعلام فدراسیون جهانی دیابت، یک چهارم بزرگسالان جهان دچار سندروم متابولیکی هستند و خطر مرگ و احتمال سکته و حملات قلبی در آنان به ترتیب دو و سه برابر افراد غیر مبتلا است [۳].

میزان شیوع عوامل خطرساز سندروم متابولیکی در کشورهای آسیایی بالا بوده و در حال افزایش است [۴]، و گزارش شده که کشور ایران از این نظر در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد [۵]. طبق ویرایش ۲۰۰۵ پانل درمانی بزرگسالان، میزان شیوع آن در ایران مشابه آمریکا و بین ۲۵ تا ۴۰ درصد است [۱].

اطلاعات آماری جدید در زمینه دانشجویان نیز نشان می‌دهد که این گروه سنی (۱۸ تا ۲۴ ساله) در مسیر بیماری‌های مزمون قرار گرفته‌اند، که با تصورات گذشته مبنی بر اینکه دانشجویان در اوج سلامت هستند، در تناقض است [۶]. دوران دانشجویی معمولاً در مرحله حساس گذار نوجوانی به جوانی آغاز می‌شود که در این مرحله بیشتر آنان رژیم غذایی ناسالمی را در پیش گرفته و فعالیت جسمانی خود را کاهش می‌دهند [۷]، که پیامد و نتیجه آن می‌تواند ازدیاد وزن و چاقی باشد. توجه به ازدیاد وزن و چاقی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می‌تواند احتمال گسترش عوامل خطرساز سندروم متابولیکی را نیز افزایش دهد [۸] و ضمن آنکه خود به عنوان یک بیماری مورد توجه قرار دارد، با بیماری‌هایی مانند قلب-

1. Central obesity

2. Low high-density lipoprotein cholesterol

3. Adult Treatment Panel III

تمام متغیرهای خونی به روش آنژیمی رنگسنجی و با استفاده از کیت‌های مخصوص اندازه‌گیری شد. محدوده طبیعی و مقادیر مرجع معیارهای خطرساز سندروم متابولیکی در جدول ۱ آورده شده است (جدول ۱).

ویژگی‌های آنتروپومتریکی

وزن آزمودنی‌ها به صورت ناشتا، با لباس سبک، بدون کفش و با دقیقه ۰/۱ کیلوگرم و قد در حالت ایستاده با دقیقه ۰/۱ سانتی‌متر اندازه‌گیری شد (ترازوی دیجیتالی Seca، آلمان). نمایه توده بدن (BMI)^۱ از تقسیم کیلوگرم وزن بدن بر محدوده قدرت محاسبه و مقادیر کمتر از ۱۸/۵ به عنوان لاغر، مساوی یا بالاتر از ۲۵ به عنوان اضافه وزن و مساوی یا بالاتر از ۳۰ به عنوان چاق در نظر گرفته شد. به عنوان شاخص چاقی مرکزی، دور کمر در ناحیه بین پائین‌ترین دندانه و سر استخوان خاکره (در سطح ناف) و دور بسن در برجسته‌ترین قسمت بسن اندازه‌گیری شد و سپس نسبت کمر به بسن از تقسیم اندازه دور کمر به بسن محاسبه گردید. ضخامت لایه چربی زیر پوست توسط کالیپر گردید. ضخامت لایه چربی زیر پوست توسط کالیپر Harpenden - CE 1020 (انگلستان) و در سمت راست بدن، در سه نقطه پشت بازو، فوق خاکره و ران برای زنان و سینه، شکم و ران برای مردان اندازه‌گیری شد و میانگین سه بار اندازه‌گیری برای محاسبه چگالی و درصد چربی بدن مورد استفاده قرار گرفت [۱۹]. درصد چربی بین ۲۱ تا ۲۵ برای مردان و بین ۲۶ تا ۳۲ برای زنان به عنوان اضافه وزن و بیشتر از ۲۵ برای مردان و بیشتر از ۳۲ برای زنان به عنوان چاقی در نظر گرفته شد. فشار خون در حالت نشسته و پس از ۵ دقیقه استراحت با استفاده از فشارسنج جیوه‌ای ثبت شد. تمام متغیرهای آنتروپومتریکی و خونی پس از اندازه‌گیری توسط استادی و متخصصین تربیت بدنی دانشگاه و آزمایشگاه مربوطه، با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و ATP III تطبیق داده شد [۲۰].

روش‌های آماری

ارزیابی آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۶ انجام شد. جهت مقایسه اختلافات بین گروهی برای

و از گسترش معیارهای سندروم متابولیکی، بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت جلوگیری کند [۸]، لزوم بررسی و تعیین میزان شیوع سندروم متابولیکی و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آن در بین دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌باشد، مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان شیوع سندروم متابولیکی و رابطه آن با شاخص‌های چاقی در بین دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود. تعیین این که کدام یک از علائم، به تکیک در هر دو جنس شایع‌تر می‌باشد، هدف دوم تحقیق بود. لذا با توجه به موارد فوق، ما فرض کردیم که شیوع معیارهای سندروم متابولیکی در بین دانشجویان این دانشگاه وجود دارد.

روش‌ها

تحقیق حاضر با موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. آزمودنی‌ها از بین دانشجویان ورودی‌های سال‌های مختلف دوره کارشناسی که در کلاس‌های واحد تربیت بدنی ثبت‌نام کرده بودند به روش نمونه‌گیری خوشای-تصادفی انتخاب و توسط مدرسین مربوطه فراخوان شدند. داوطلبین، پس از اطلاع از موضوع و روش تحقیق، فرم رضایت‌نامه آگاهانه شرکت در تحقیق را امضاء کردند. پس از حذف تعداد ۸ آزمودنی به دلیل کامل نشدن اطلاعات، نمونه پایانی شامل ۲۲۳ آزمودنی ۱۵۰ مرد (۶۷٪) و ۷۳ زن (۳۲٪) از کل جامعه ۵۵۱۰ نفری بود. داده‌ها از طریق جمع‌آوری نمونه‌های خون و آزمایشات پاراکلینیکی، در هفته اول و تکمیل اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک در هفته دوم بین ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به دست آمد.

خون‌گیری و اندازه‌گیری پارامترهای خونی

آزمودنی‌ها بعد از ۱۲ ساعت ناشتاً در محل آزمایشگاه حضور یافتند. ابتدا از سیاهرگ جلو بازویی، نمونه‌های خون در حالت نشسته تهیه و پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم، جهت اندازه‌گیری غلظت پلاسمایی گلوکز (Bio system, England)، تری‌گلیسرید، HDL (شرکت پارس آزمون، ایران) سریعاً به آزمایشگاه انتقال داده شدند.

شیوع سندروم متابولیکی در ۵/۴٪ کل آزمودنی‌ها (۲/۷٪ زنان و ۶/۷٪ مردان) شایع بود. ۳۸/۴٪ (۳۴/۱٪) زنان و ۳۲٪ (۴/۷٪) مردان از آزمودنی‌ها هیچ یک از معیارهای سندروم متابولیکی را نداشتند و در مقابل ۴/۷٪ (۴/۷٪) زنان و ۴/۵٪ (۴/۵٪) مردان از آنها دارای یک معیار و ۱۴/۳٪ (۱۱٪) زنان و ۱۶٪ (۱۶٪) مردان دارای دو معیار بودند. آزمون مجذور کا نشان داد که از نظر تعداد معیار در هیچ یک از نقاط اختلاف معنی‌داری بین دو جنس وجود ندارد.

در بین معیارهای سندروم متابولیکی، HDL-C پایین با ۴/۳٪ (۴/۶٪) مردان و ۴/۵٪ (۴/۲٪) زنان) و پرفشار خونی با ۲۷/۴٪ (۳۰٪) مردان و ۲۱/۹٪ (۲۱٪) زنان) به ترتیب جزو شایع‌ترین معیارها بودند و رتبه‌های بعدی به ترتیب گلیسرید با ۱۲/۱٪ (۱۶٪) مردان و ۲/۷٪ (۲٪) زنان)، گلوکز خون با ۵/۴٪ (۵/۳٪) مردان و ۲/۷٪ (۲٪) زنان) و دور کمر با ۴٪ (۴/۵٪) مردان و ۷/۸٪ (۷٪) زنان) اختصاص یافت. آزمون مجذور کا که به تفکیک برای هر یک از این معیارها انجام شد، تنها اختلاف ترتیب گلیسرید بین دو جنس را معنی‌دار نشان داد ($P=0/003$) (شکل ۱).

در پاسخ به سئوال مربوط به کیفیت غذا (براساس مقادیر و درصددهای ارائه شده، ۱۱/۳۶٪ ۵۳ نفر) از مردان و ۶/۴٪ (۱۸ نفر) از زنان و در مجموع ۸/۳۱٪ (۷۱ نفر) غذای روزانه خود را فاقد کیفیت لازم اعلام کردند. هنگامی که آزمودنی‌ها از نظر نمایه توده بدن (лагر، طبیعی، دارای اضافه وزن و چاق) و از نظر دارار بودن تعداد معیارهای متابولیک (بدون عامل، یک، دو، سه عامل یا بیشتر) تفکیک شدند، نتایج آزمون، اختلاف بین گروه‌های فاقد عوامل متابولیک (ستون مربوط به عدد صفر، $P=0/008$) و گروه‌هایی که تنها دارای دو عامل بودند (دو معیار، $P=0/001$) را معنی‌دار نشان داد (شکل ۲).

همان طور که در جدول ۴ آمده است، آزمون رگرسیون لجستیک دوگانه با استفاده از روش پس رونده نشان داد که از بین شاخص‌های چاقی، محیط کمر بهترین پیشگوی سندروم متابولیک در هر دو جنس است. و در صورت حذف محیط کمر، نمایه توده بدن در مردان و نسبت کمر به باسن در زنان، وجود سندروم متابولیک را بهتر از سایر شاخص‌های چاقی پیش‌بینی می‌کنند (جدول ۴).

معیارهای سندروم متابولیک و شاخص‌های آنتروپومتریکی از آزمون تی مستقل و برای تعیین میزان همبستگی بین شاخص‌های چاقی و متغیرهای خونی از روش ضربه همبستگی پیرسون و تعیین میزان همبستگی بین میزان فعالیت جسمانی و معیارهای سندروم متابولیک از ضربه همبستگی اسپیرمن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل میزان شیوع، تعداد و نوع عوامل سندروم متابولیکی در کل آزمودنی‌ها به تفکیک جنس و نمایه توده بدن از آزمون مجذور کا فیشر^۱ استفاده شد. آزمون رگرسیون لجستیک دوچالته با استفاده از روش پس رونده برای تعیین میزان رابطه بین معیارهای سندروم متابولیکی و برخی شاخص‌های چاقی مورد استفاده قرار گرفت. برای سطح معنی‌داری، $P<0/05$ در نظر گرفته شد. نتایج به صورت درصد، میانگین ± انحراف معیار گزارش می‌شود.

یافته‌ها

ویژگی‌های آنتروپومتریکی و معیارهای سندروم متابولیکی در جدول ۲ آورده شده است. براساس استانداردهای ارائه شده در جدول ۱، به غیر از درصد چربی زنان که در مرز خطر قرار داشت، میانگین سایر مقادیر مربوط به هر دو گروه زنان و مردان در محدوده طبیعی قرار داشت. همچنین، به جز مقادیر HDL-C، فشار خون دیاستولیک و درصد چربی، سایر متغیرها به طور معنی‌داری در مردان بالاتر از زنان بود و بین گلوکز دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۲).

جدول ۳ توزیع شاخص‌های آنتروپومتریکی و میزان فعالیت جسمانی آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن نمایه توده بدن، اضافه وزن و چاقی در مردان و لاغری در زنان بیشتر است. اما با در نظر گرفتن شاخص چاقی مرکزی، زنان چاق‌تر از مردان بودند، طوری که براساس نسبت کمر به باسن، زنان ۳ برابر بیشتر از مردان چاق بودند. درصد چربی ۲۵٪/۲۸٪ (۲۶٪) مردان و ۹٪/۲۲٪ (۲۲٪) زنان از آزمودنی‌ها بالاتر از حد طبیعی بود. ۰/۶۰٪ از آزمودنی‌ها از نظر فعالیت جسمانی کم تحرک بودند (جدول ۳).

1. Fisher's exact chi-square (χ^2)

و با C-HDL پایین ($P=0.001$, $r=-0.233$) همبستگی منفی معنی داری داشت.

همچنین همبستگی مثبت و معنی دار بین تری گلیسرید با درصد چربی ($P<0.0001$, $r=0.288$) و نمایه توده بدن ($P<0.002$, $r=0.249$) متردان وجود داشت. بین تری گلیسرید زنان با درصد چربی ($P<0.005$, $r=0.322$), نمایه توده بدن ($P=0.018$, $r=0.275$) و نسبت کمر به باسن ($P=0.002$, $r=0.358$) رابطه معنی داری وجود داشت که بیانگر ارتباط بین این معیار و شاخص های چاقی آزمودنی ها است. هیچ گونه همبستگی معنی داری بین میزان فعالیت جسمانی و معیار های سندروم متابولیک مشاهده نشد.

ضریب همبستگی بین متغیرها

در کل آزمودنی ها، محیط کمر با فشار خون ($P=0.042$, $r=0.136$) و مقادیر تری گلیسرید ($P<0.0005$, $r=0.371$) همبستگی مثبت معنی دار و با C-HDL پایین ($P<0.0005$, $r=-0.302$) همبستگی منفی معنی داری داشت. بین نسبت محیط کمر با باسن و تری گلیسرید ($P<0.0005$, $r=0.284$) و همچنین فشار خون دیاستولیک ($P<0.0005$, $r=0.236$) همبستگی مثبت معنی دار و با HDL-C پایین ($P<0.0005$, $r=-0.298$) همبستگی منفی معنی دار مشاهده شد. از طرف دیگر، نمایه توده بدنی با تری گلیسرید ($P<0.0005$, $r=0.305$) و فشار خون دیاستولیک ($P=0.011$, $r=0.136$) همبستگی مثبت معنی دار

جدول ۱- معیار های پانل درمانی بزرگسالان برای سندروم متabolیک

| معیار های سندروم متabolیک | مقادیر مرجع و محدوده طبیعی* |
|------------------------------------|-----------------------------|
| دور کمر (سانتی متر) | مردان: >102 - زنان: >88 |
| فشار خون سیستولیک (میلی متر جیوه) | ≥ 13 |
| فشار خون دیاستولیک (میلی متر جیوه) | $\geq 8/5$ |
| HDL-C (میلی گرم بر دسی لیتر) | مردان: <40 - زنان: <50 |
| تری گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر) | ≥ 150 |
| گلوکز ناشتا (میلی گرم بر دسی لیتر) | ≥ 100 |

* برگرفته از پانل درمانی بزرگسالان [۲۰]

جدول ۲- میانگین، انحراف معیار، و اختلافات بین گروهی مربوط به ویژگی های آنتروپومتریکی، فشار خون و چربی های خون در هر دو جنس

| متغیر | مردان (میانگین \pm انحراف معیار) | زنان (میانگین \pm انحراف معیار) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| سن | $20/4 \pm 1/72$ | $20/3 \pm 1/71$ |
| قد | $161/7 \pm 0/05^{**}$ | $175/2 \pm 0/06$ |
| وزن | $54/82 \pm 8/33^{**}$ | $68/91 \pm 11/26$ |
| نمایه توده بدن (کیلو گرم بر متر مربع) | $20/94 \pm 2/80^{*}$ | $22/40 \pm 3/38$ |
| دور کمر (سانتی متر) | $75/30 \pm 8/64^{**}$ | $81/70 \pm 9/24$ |
| نسبت دور کمر به باسن | $0/80 \pm 0/06^{**}$ | $0/85 \pm 0/05$ |
| درصد چربی | $22/60 \pm 7/45^{**}$ | $15/51 \pm 7/11$ |
| فشار خون سیستولیک (میلی متر جیوه) | $10/95 \pm 1/26^{**}$ | $11/91 \pm 1/07$ |
| فشار خون دیاستولیک (میلی متر جیوه) | $7/53 \pm 0/97^{*}$ | $7/08 \pm 1/02$ |
| گلوکز (میلی گرم بر دسی لیتر) | $87/89 \pm 7/73$ | $89/25 \pm 7/63$ |
| تری گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر) | $72/63 \pm 27/92^{**}$ | $110/64 \pm 51/78$ |
| HDL-C (میلی گرم بر دسی لیتر) | $53/01 \pm 11/94^{**}$ | $41/13 \pm 7/26$ |

* سطح معنی دار ($P \leq 0.001$). ** سطح معنی دار ($P < 0.0005$).

نتایج با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه به دست آمد

جدول ۳- توزیع فراوانی شاخص‌های آنتروپومتریکی و میزان فعالیت جسمانی


| شاخص | کل آزمودنی‌ها | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | مردان | زنان | مردان | زنان | مردان | زنان | مردان |
| نمايه توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع) | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد |
| <۱۸/۵ | | | | | | | ۱۵/۲۵ |
| ۱۸/۵-۲۴/۹ | | | | | | | ۶۵/۴۷ |
| ۲۵/۰-۲۹/۹ | | | | | | | ۱۸/۳۹ |
| ≥۳۰ | | | | | | | ۰/۹۰ |
| دور کمر (سانتی‌متر) | | | | | | | |
| محدوده طبیعی (مردان ۱۰۲ که زنان ۸۸ که) | | | | | | | ۹۵/۹۶ |
| فراتر از محدوده طبیعی (مردان ۱۰۲ > زنان ۸۸ >) | | | | | | | ۴/۰۴ |
| نسبت دور کمر به باسن | | | | | | | |
| محدوده طبیعی (مردان ۰/۹ < زنان ۰/۸ <) | | | | | | | ۷۵/۳۴ |
| فراتر از محدوده طبیعی (مردان ۰/۹ > زنان ۰/۸ >) | | | | | | | ۲۴/۶۶ |
| درصد چربی | | | | | | | |
| کم (مردان ۸ < زنان ۱۳ <) | | | | | | | ۵/۸۳ |
| طبیعی (مردان ۸-۲۰ زنان ۱۳-۲۵) | | | | | | | ۶۵/۹۲ |
| اضافه وزن (مردان ۲۰-۲۵ > زنان ۲۰-۳۲) | | | | | | | ۱۷/۰۴ |
| چاق (مردان ۲۵ > زنان ۳۲ >) | | | | | | | ۱۱/۲۱ |
| فعالیت جسمانی | | | | | | | |
| کم تحرک | | | | | | | ۶۰/۱ |
| سبک | | | | | | | ۲۴/۶۶ |
| متوسط | | | | | | | ۷/۶۲ |
| سنگین | | | | | | | ۷/۶۲ |


جدول ۴- پیش‌بینی سندروم متابولیک با شاخص‌های چاقی برای

| جنس | متغیر مستقل | نسبت شانس | حد پائینی حد بالایی | | | |
|-----|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----|------------|
| | | | حد پائینی | حد بالایی | | |
| | CI | | ۱/۲ | ۱ | ۱/۱ | * محیط کمر |
| | | | ۱/۴ | ۱ | ۱/۲ | * محیط کمر |

* سطح معنی دار ($P < 0.005$)

نتایج با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه به دست آمد

* اختلاف معنی دار بین دو جنس. $P < 0.05$ شکل ۱- میزان شیوع معیارهای سندروم متابولیکی در دو جنس. اختلاف بین گروهی با استفاده از آزمون χ^2



شکل ۲- اختلافات بین گروهی براساس شاخص توده بدن و دارا بودن تعداد معیار (صفر، یک دو، سه و بیشتر)، با استفاده از آزمون χ^2

[۸،۲۱]. اما در تحقیق Rashidi و همکاران، شیوع یک عامل کمتر (۰٪/۲۸/۶) و شیوع دو عامل تقریباً مشابه نتایج به دست آمده این تحقیق بود [۱۶]. اگرچه بنابر تعاریف و ملاک‌ها، فرد دارای یک یا دو معیار، به عنوان مبتلا به سندروم متابولیک در نظر گرفته نمی‌شود، اما همراه با افزایش سن، احتمال ابتلا وی به سندروم متابولیک و در نتیجه بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت، بیشتر از افراد فاقد این علائم خواهد شد [۸]. به گزارش Azizi و همکاران میزان شیوع سندروم متابولیک در ایران جزو بالاترین موارد گزارش شده در جهان است و در مطالعات قند و لیپید تهران، میزان آن ۱۰٪ برای سنین ۲۰ تا ۲۹ سال گزارش شده است که زنان بیشتر از مردان به آن مبتلا هستند [۵]. بنابراین اگرچه شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان تحقیق حاضر، در مقایسه با همتایان خود در ایران و اروپا بیشتر است ولی میزان آن براساس گزارش Azizi و همکاران، نسبت به شیوع آن در سطح کشور کمتر می‌باشد که تفاوت سن آزمودنی‌ها می‌تواند علت اصلی آن باشد زیرا علایم سندروم متابولیک با افزایش سن، بیشتر می‌شود [۲۴].

بر خلاف نتایج به دست آمده از تحقیقات Fernandez و Morrell و همسو با نتایج Mehrkash، Gonzales، شیوع سندروم متابولیک در مردان این تحقیق بیشتر از زنان بود

بحث

میزان شیوع سندروم متابولیک در کل آزمودنی‌های این تحقیق ۴٪/۰.۵ (مردان ۷٪/۰.۲۷ و زنان ۷٪/۰.۲۷) بود که با افزایش نمایه توده بدن، میزان آن افزایش یافت (صفر درصد برای افراد لاغر و ۴٪ برای آزمودنی‌هایی با وزن طبیعی و ۱۱٪/۰.۳۴ از آزمودنی‌های دارای اضافه وزن و چاق). تنها ۱٪/۰.۳۴ از آزمودنی‌ها هیچ یک از علائم این عارضه را نداشتند، و این در حالی بود که ۴٪/۰.۴۶ از آستان دارای یک معیار و ۳٪/۰.۱۴ دارای دو معیار بودند. مقادیر پایین HDL-C با ۵٪/۰.۴۳ و پرفسار خونی با ۴٪/۰.۲۷ به ترتیب بیشترین میزان شیوع را در بین معیارهای سندروم متابولیک داشتند. از بین شاخص‌های چاقی، محیط کمر و در صورت حذف آن، نمایه توده بدن در مردان و نسبت کمر به باسن در زنان، بهترین پیشگوی سندروم متابولیک در هر دو جنس بود.

در مقایسه با سایر تحقیقات، میزان شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان تحقیق حاضر، از همتایان اروپایی با ۷٪/۰.۳۷ شیوع [۸،۲۱] و ایرانی با ۲٪/۰.۱۶ و همچنین نوجوانان ۱۵ الی ۱۷ سال کشورمان با ۳٪/۰.۳۳ (مهرکش) بیشتر و نسبت به دانشجویان آمریکایی کمتر بود [۷،۲۲،۲۳]. از نظر شیوع تعداد عوامل سندروم متابولیک، درصد آزمودنی‌هایی که دارای یک یا دو عامل بودند، مشابه همتایان آمریکایی [۷،۲۲،۲۳] و نسبت به سایر تحقیقات اروپایی بیشتر بود.

پرفشارخونی پیشنهاد می‌شود که شامل کاهش وزن یا چربی بدن و افزایش فعالیت جسمانی به همراه رژیم غذایی مناسب است [۲۸]. غلظت زیاد تری گلیسیرید خون آزمودنی‌های تحقیق حاضر به عنوان سومین عامل (۱۲/۱٪)، به شکل معنی‌داری در مردان بیشتر از زنان بود (۷/۱۶٪ در مقابل ۷/۲٪). میزان این معیار در دیگر تحقیقات [۵/۱۳٪، ۵/۱۷٪، ۵/۱۳٪، ۵/۱۲٪، ۴۰٪، ۴۰٪، ۴۰٪] بود [۸، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۲۵]. همان طور که مشاهده می‌شود به غیر از تحقیق Mehrkash (۴۰٪) که مقادیر بسیار زیاد و هانگ (۲/۵٪) که مقادیر بسیار کمی از شیوع تری گلیسیرید را گزارش کرده‌اند، سایر یافته‌ها تقریباً در یک محدوده قرار گرفته‌اند و تفاوت زیادی با نتایج به دست آمده از این تحقیق ندارند [۸، ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۲۵]. همبستگی مثبت و معنی‌دار بین غلظت پلاسمایی تری گلیسیرید مردان با درصد چربی، نمایه توده بدن، دور کمر و همچنین غلظت پلاسمایی تری گلیسیرید زنان با درصد چربی، نمایه توده بدن، دور کمر، و نسبت کمر به باسن، می‌تواند بیانگر ارتباط بین تری گلیسیرید و میزان چاقی آزمودنی‌ها باشد. میزان چاقی و وزن بدن تحت تأثیر مقدار غذا مصرفی و انرژی هزینه شده هنگام فعالیت جسمانی قرار دارد [۲۹] و تغییر مقدار هر کدام از این عوامل می‌تواند وزن بدن را کاهش یا افزایش دهد. میانگین شاخص‌های چاقی آزمودنی‌های تحقیق حاضر به ویژه محیط کمر که دارای کمترین میزان شیوع هم بود، در محدوده طبیعی قرار داشتند. از طرفی دیگر بین مقادیر محیط کمر و HDL-C آزمودنی‌ها، همبستگی منفی و معنی‌داری وجود داشت (۰/۰۰۰۵<P). از آنجا که هم فعالیت جسمانی و هم نوع تغذیه بر میزان HDL-C اثرگذار هستند [۲۶] و طبق نتایج به دست آمده از پرسشنامه، بیشتر آزمودنی‌های تحقیق حاضر از نظر جسمانی کم تحرک بودند، لذا موضوع قرار داشتن میانگین وزن بدن آزمودنی‌ها در محدوده طبیعی، علی‌رغم فقدان فعالیت جسمانی کافی را احتمالاً می‌توان تنها با محدودیت رژیم غذایی توجیه نمود. به عبارت دیگر، آزمودنی‌ها برای حفظ وزن خود تنها به محدود نمودن رژیم غذایی خود متكی هستند که براساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه، قادر کیفیت لازم می‌باشد. مقادیر

[۲۳، ۲۱، ۲۱، ۱۵، ۸]. اگرچه این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود ولی براساس نتایج، علت آن ناشی از شیوع بیشتر پرفشارخونی و غلظت زیاد تری گلیسیرید پلاسمایی مردان نسبت به زنان بود. چاق‌تر بودن درصد بیشتر دانشجویان مرد براساس شاخص توده بدن (۱۰٪ بیشتر از زنان دارای اضافه وزن و چاق) می‌تواند دلیل این موضوع باشد.

از بین پنج معیار سندروم متابولیک، مقادیر پایین HDL-C با ۵/۴٪ بیشترین میزان شیوع را دارا بود. میزان شیوع HDL-C پایین در زنان بیشتر از مردان و پرفشارخونی در مردان بیشتر از زنان بود، اگرچه تفاوت‌ها معنی‌دار نبود. در دیگر تحقیقات انجام شده بر جمعیت‌های مشابه [۲۵، ۲۲، ۱۶، ۷۸] نیز مقادیر پایین HDL-C، همسو با نتایج تحقیق حاضر، جزو بیشترین اختلالات متابولیکی گزارش شده است. تنها Dalleck و همکاران درصد شیوع بیشتری را گزارش کردند (۴۳/۵٪ در مقابل ۴۷/۳٪). این در حالی است که مقادیر شیوع گزارش شده در تحقیقات دیگر [۲۰/۱٪، ۹/۲۸٪، ۵/۱۳٪، ۲/۲۶٪] بسیار کمتر از نتایج تحقیق حاضر بود [۲۵، ۲۱، ۱۶، ۷۸]. روش زندگی از جمله کشیدن سیگار، مقدار چربی رژیم غذایی، و به ویژه میزان فعالیت جسمانی از جمله عوامل موثر بر سطوح HDL-C هستند [۲۶]. مطابق با گزارش Leon و همکاران مبنی بر اینکه کم بودن فعالیت جسمانی به طور مستقیم موجب ۵٪ کاهش سطوح HDL-C می‌شود [۲۷]، ۹/۰۰٪ از کل آزمودنی‌های تحقیق حاضر فاقد فعالیت جسمانی کافی بودند و ۸/۳۱٪ از آنها غذای خود را فاقد کیفیت مناسب اعلام کرده‌اند که هر دو می‌توانند از عوامل اصلی پایین بودن سطوح HDL-C دانشجویان باشند.

در برخی از تحقیقات، پرفشارخونی [۲۳، ۲۲، ۱۶] و در برخی دیگر از تحقیقات، غلظت زیاد تری گلیسیرید خون، به عنوان دومین عامل شایع، معرفی شده‌اند [۲۵، ۲۱، ۸]. در تحقیق حاضر، پرفشارخونی با ۴/۲۷٪ شیوع به عنوان دومین معیار، بیشتر از مقادیر گزارش شده در برخی از دیگر تحقیقات [۲۵، ۲۲، ۲۱، ۱۶، ۸] بود. تنها Morrell و همکاران بیشترین میزان شیوع پرفشارخونی را با ۱/۶۲٪ در مردان گزارش کردند [۲۳]. مدیریت شیوه زندگی، نخستین روشی است که برای پیشگیری و درمان

در افراد بزرگسال ایرانی با وزن طبیعی هم وجود دارد [۱۷]. با توجه به آنکه معمولاً افراد جوان، خود را در معرض خطر بیماری‌های مزمن نمی‌دانند [۳۲,۳۳] و به ویژه دانشجویان که درک دقیقی از خطر بیماری‌های قلبی-عروقی خود نداشته و میزان آن را کمتر از مقدار واقعی ارزیابی می‌کنند [۱۲,۱۳]، لذا سلامت آنان به ویژه در آینده، می‌تواند با خطر جدی تری مواجه شود.

آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که محیط کمر بهترین پیشگوی برای سندرم متابولیک بین دو جنس است و پس از آن، نمایه توده بدن در مردان و نسبت کمر به باسن در زنان، پیشگوهای بهتری می‌باشند. با توجه به این نتایج و همچنین اثرات چاقی مرکزی بر تغییرات متابولیکی مانند مقاومت انسولین، اختلالات چربی و پرفشار خونی و همچنین همبستگی زیاد آن با شروع زودرس انسداد شریان [۳۴]، چاقی مرکزی می‌تواند کاربرد بهتری در تشخیص اولیه سندرم متابولیک داشته باشد. از بین دو شاخص محیط کمر و نسبت کمر به باسن نیز محیط کمر همچنان قدرت پیشگویی بیشتری داشت و ممکن است دلیل آن این باشد که با کاهش و یا افزایش وزن، محیط‌های کمر و باسن، هر دو تغییر می‌کنند که در نتیجه تغییرات نسبت بین آنها هم جزئی خواهد بود [۳۵].

آزمون‌های کترل شده نشان داده‌اند که تمرينات ورزشی اثر مثبتی بر معیارهای سندرم متابولیک افراد از جمله وزن بدن، وزن چربی بدن، حساسیت انسولین، نیم رخ چربی و فشار خون دارد. علاوه بر فعالیت ورزشی، رژیم غذایی نیز بر بسیاری از اجزاء سندرم متابولیک موثر است. رژیم غذایی با چربی اشباع کمر و سرشار از میوه و سبزی با شاخص گلیسمی^۱ پایین، می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، و ابتلا به سندرم متابولیک را کاهش دهد. در یک آزمون، مداخله سه ساله در روش زندگی شامل رژیم غذایی و فعالیت جسمانی باشدت متعادل، احتمال وقوع سندرم متابولیک را تا ۴۱٪ در مقایسه با گروه کترل کاهش داده است [۳۱].

به طور خلاصه، شیوع چاقی در دانشجویان این دانشگاه وجود دارد و درصد قابل توجهی از آنان مبتلا به سندرم

کاهش یافته HDL-C، که می‌تواند ناشی از کم تحرکی و تغذیه نامناسب باشد، دلیلی دیگر برای این موضوع است. همان طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، اگرچه میانگین درصد چربی زنان بیشتر از مردان بود ولی میانگین‌های محیط کمر و نسبت کمر به باسن در مردان بیشتر بود که نشان دهنده توزیع بیشتر چربی در ناحیه شکم (چاقی بشکل سیب) در مردان نسبت به زنان است که دلیل عدمه آن به اختلافات هورمونی مربوط می‌شود. هورمون‌های زنانه استروژن و پروژسترون تأثیر مثبتی روی مقدار توزیع چربی زیرپوستی در ناحیه باسن و ران دارند که در نتیجه منجر به چاقی گلابی شکل در زنان می‌شود [۳۰].

همچنین در موارد بدون اختلال (صفر) و دارای دو معیار، بین گروه‌ها اختلاف معنی دار بود، اما در موارد دارای یک معیار و سه معیار به بالا، اختلاف معنی داری وجود نداشت. همان طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، در گروه آزمودنی‌های بدون اختلال، درصد افراد لاغر بسیار بیشتر از افراد چاق و دارای اضافه وزن می‌باشد و با افزایش تعداد معیار، از درصد افراد لاغر کاسته شده و درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق افزایش می‌یابد طوری که در قسمت سه معیار به بالا، اگرچه اختلاف معنی دار نیست ولی قابل توجه است که این بخش، فاقد آزمودنی لاغر می‌باشد. این نتایج هم راستا با تحقیق Barrimah و همکاران، Rashidi و همکاران و Fernandez و همکاران می‌باشد که نشان دادند با افزایش نمایه توده بدن، تعداد عالیم سندرم متابولیک افزایش می‌یابد [۸,۲۴]. گزارش شده است که با هر کیلوگرم کاهش وزن، احتمال ابتلا به سندرم متابولیک ۰.۸ در زنان و مردان چاق کاهش می‌یابد. در واقع برخی تحقیقات علت شیوع فراینده سندرم متابولیک در سال‌های اخیر را نتیجه ایلامی جهانی چاقی می‌دانند [۳۱]. اگرچه این یک واقعیت است ولی همان طور که در شکل مشاهده می‌شود، آزمودنی‌ها با وجود داشتن وزن طبیعی، همچنان دارای سندرم متابولیک می‌باشند. این موضوع تصور غیر واقعی دانشجویان، مبنی بر این که چون دارای نمایه توده بدنی طبیعی می‌باشند، بنابراین سالم و تندرست هستند را مورد سوال قرار می‌دهد [۸]. در همین راستا، نتایج تحقیق Hadaegh و همکاران نشان داد که شیوع سندرم متابولیک

1. Glycemic Index

عروقی و تکرار این تحقیق در طول دوره تحصیلی دانشجویان، به منظور کنترل و تعدیل برنامه و تعیین میزان دستیابی به اهداف مذکور پیشنهاد می‌شود.

سپاسگزاری

از جدیدت، صرف وقت و همکاری صمیمانه کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تشرک و قدردانی می‌شود. ضمناً از معاونت پژوهشی وقت دانشگاه صنعتی شریف جناب آقای دکتر روستا آزاد، به جهت حمایت مالی در انجام این تحقیق، سپاسگزاری می‌گردد.

متابولیک هستند. بنابراین با توجه به ارتباط بین معیارهای سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و غیره و همچنین اهمیت سه اصل، افزایش فعالیت جسمانی، کنترل وزن و رژیم غذایی، در پیشگیری و درمان سندروم متابولیک، اقدام در جهت برنامه‌ریزی صحیح و دقیق به منظور شناسایی، اطلاع رسانی، و ترغیب اینگونه افراد برای شرکت در فعالیت‌های جسمانی، به ویژه فعالیت‌های ورزشی با طراحی مناسب برای همین منظور، و همچنین آموزش تغذیه مناسب، امری بدیهی و ضروری است. ضمن آنکه در فرآیند برنامه‌ریزی، توجه به ارائه کارگاه‌های آموزشی و واحدهای درسی مرتبط، می‌تواند به حصول نتیجه بهتر کمک کند. به علاوه، سنجش آمادگی قلبی-

مأخذ

- Pan WH, Yeh WT, Weng LC. Epidemiology of metabolic syndrome in Asia. *Asia Pac J Clin Nutr* 2008; 17(S1): 37-42.
- Dugdale DC. Metabolic syndrome. U.S. National library of medicine. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0004546>. (Updated: 2 June 2012).
- The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. International Diabetes Federation. http://www.idf.org/webdata/docs/Metabolic_syndrome_definition.pdf. (Updated: 16 March 2013).
- Janus ED. Metabolic syndrome and its relevance to Asia. *International congress series* 1262. 2004; 535–537.
- Azizi F, Hadaegh F, Khalili D, Esteghamati A, Hosseinpahah F, Delavari A, et al. Appropriate definition of metabolic syndrome among Iranian adults: report of the Iranian National Committee of Obesity. *Arch Iran Med* 2010; 13(5): 426-428.
- Morrell J. College students face obesity, High Blood Pressure, Metabolic Syndrome. University of new Hampshire. http://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/07_0614113310.htm (Updated: 16 March 2013).
- Keown TL, Smith CB, Harris MS. Metabolic syndrome among college students. *J Nurse Prac* 2009; 5(10): 754-759.
- Fernandes J, Lofgren IE. Prevalence of metabolic syndrome and individual criteria in college students. *J Am Coll Health* 2011; 59(4): 313-21.
- Snetselaar L, Malville-Shipan K, Ahrens L, Smith K, Chenard C, Stumbo P, et al. Raising Medical Students Awareness of Nutrition and Fitness in Disease Prevention. Nutrition and fitness program at the university of Iowa. *Med Educ* 2004; 9-21.
- Slentz CA, Duscha BD, Johnson JL, Ketchum K, Aiken LB, Samsa GP, et al. Effects of the amount of exercise on body weight, body composition, and measures of central obesity. *Arch Intern Med* 2004; 164: 31-39.
- Schilten J, Dalleck L. Fitness and Fatness: Indicators of Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease Risk Factors in College Students? *J E P online* 2010; 13(4): 29-39.
- Collins KM, Dantico M, and Shearer NB, Mossman KL. Heart disease awareness among college students. *J Community Health* 2004; 29(5): 405-420.
- Green JS, Grant M, Hill KL Brizzolara J, Belmont B. Heart disease risk perception in college men and women. *J Am Coll Health* 2003; 51(5): 207-211.
- Mattsson N, Ronnemaa T, Juonala M, Viikari JS, Raitakari OT. The prevalence of the metabolic syndrome in young adults. The cardiovascular risk in young Finns study. *J Intern Med* 2007; 261: 159–169.
- Mehrakash M, Mohammadian S, Qorbani M, Eshghinia S, Shafa N. Prevalency of metabolic syndrome among adolescents aged 15 to 17 years in Gorgan, Northern Iran. *Journal of Gorgan University of Medical Sciences* 2011; 13 (2): 93-99.
- Rashidi AA, Parastouei K, Aarabi MH, Taghadosi M, Khandan A. Prevalence of metabolic syndrome in students of Kashan University of Medical Sciences in 2008. *Feyz* 2010; 13 (4): 307-312.
- Hadaegh F, Zabetian A, Harati H, Azizi F. Metabolic syndrome in normal-weight iranian adults. *Ann Saudi Med* 2007; 27(1): 18-24.
- Gholipour M, Tabrizi A. Prevalence of cardiovascular disease risk factors among college students in Sharif University of Technology. *Iranian journal of cardiovascular nursing* 2012; 1(2):
- Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. *Br J Nutr* 1978; 40(3): 497-504.

20. Grundy SM, Cleeman JI, Bairey Merz CN, et al. ATP III Calculator. Adult treatment panel (ATP) III analysis. http://www.globalrph.com/atp_calc.htm. (Updated: 16 March 2013).
21. González Deschamps E, Palmeros Exsome C, Villanueva Sánchez J, Torres Flores B, Bastida S, Vaquero MP, et al. Metabolic syndrome prevalence and its association with the body mass index in university students. *Med Clin (Barc)* 2007; 129(20): 766-769.
22. Dalleck LC, Kjelland EM. The prevalence of metabolic syndrome and metabolic syndrome risk factors in college-aged students. *Am J Health Promot* 2012; 27(1): 37-42.
23. Morrell JS, Lofgren IE, Burke JD, Reilly RA. Metabolic syndrome, obesity and related risk factors among college men and women. *J Am Coll Health* 2012; 60(1): 82-9.
24. Barrimah I, Al Muhaimeed AR, Shobaily HA, Midhet F. Prevalence of metabolic syndrome among Qassim University personnel in Saudi Arabia. *Int J Health Sci (Qassim)* 2011; 5(1): 49-50.
25. Huang TT, Kempf AM, Strother ML, Li C, Lee RE, Harris KJ, et al. Overweight and components of the metabolic syndrome in college students. *Diabetes Care* 2004; 27(12): 3000-1.
26. Sorace P, La Fontaine T, Thomas TR. Know the risks: lifestyle management of dyslipidemia. *ACSM's Health Fit j* 2006; 10: 18-25.
27. Leon AS, Sanchez OA. Response of blood lipids to exercise training alone or combined with dietary intervention. *Med Sci Sports Exerc* 2001; 33: 502-515.
28. Myers JN. Metabolic Syndrome: An Important target for exercise intervention. *Am Coll Sport Med* 2006; 16(2): 1-12.
29. Frayn K. Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd Edition. Wiley-Blackwell; 2003.
30. Tarnus E, Bourdon E. Anthropometric evaluations of body composition of undergraduate students at the University of La Réunion. *Adv Physiol Educ* 2006, 30(4):248-53.
31. Hassinen M. Predictors and consequences of the metabolic syndrome. [Doctoral dissertation], Kuopio. University of Kuopio. 2008.
32. Spencer L. Results of a heart disease risk-factor screening among traditional college students. *J Am Coll Health* 2002; 50: 291-296.
33. Mooney LA, Franks AM. Evaluation of community health screening participants' knowledge of cardiovascular risk factors. *Am Pharm Assoc* 2009; 49(4): 529-537.
34. Arthur FK, Adu-Frimpong M, Osei-Yeboah J, Mensah FO, Owusu L. Prediction of metabolic syndrome among postmenopausal Ghanaian women using obesity and atherogenic markers. *Lipids Health Dis* 2012; 10(11):101.
35. Browning LM, Hsieh SD, Ashwell M. A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and diabetes: 0·5 could be a suitable global boundary value. *Nutrition Research Reviews* 2010, 23: 247-269.