

بررسی تغییرات سفالومتریک (دندانی اسکلتی) در دوره دندانی مختلط متعاقب استفاده از دستگاه Face mask

دکتر محمدصادق احمد آخوندی* - دکتر اعظم خورشیدیان**

*- دانشیار گروه آموزشی ارتودننسی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

**- دندانپزشک و کارشناس پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده

زمینه و هدف: از میان روش‌های مختلف درمانی برای بیماران *Cl III*/اسکلتال، پروتکشن ارتوپدیک فک بالا، روش موثری برای کودکان زیر سنین بلوغ معرفی شده است. افزایش عرض فک به طور معمول در بیماران *Cl III* نیاز می‌باشد، ولی گروهی از بیماران مشکل تنگی عرضی فک بالا ندارند، هدف از این مطالعه بررسی تغییرات سفالومتریک، متعاقب درمان (*FM*) بدون افزایش فک بالادر بیماران *Cl III* در دوره دندانی شیری و دائمی می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه که به صورت قبل و بعد و به گونه *Case Series* انجام شده است، ده بیمار *Cl III* که توسط آنالیز *Stainer* و *McNamara* دارای نقص رشدی فک بالا بودند انتخاب شدند و از آنها رادیوگرافی لترال سفالومتری تهیه شد. برای کلیه بیماران، تنها درمان *Face mask* به کار برده شد. در پایان درمان مجدداً از کلیه افراد رادیوگرافی سفالومتری تهیه گردید. شاخصهای سفالومتری اندازه‌گیری و آنالیز انجام شد. تغییرات اندازه و موقعیت فک بالا و پایین و تغییرات بافت نرم و تغییرات دندانی در طول دوره درمانی با استفاده از آزمون *Paired sample t* بررسی شد.

یافته‌ها: افزایش اورجت به میزان $\frac{2}{3}$ میلی‌متر، کاهش $\frac{3}{5}$ درجه زاویه *Pog-Sn* و در نتیجه اصلاح پروفایل بیمار، اصلاح روابط مولرها در جهت ایجاد رابطه *Cl II*، افزایش $\frac{2}{3}$ میلی‌متری فاصله *IS.A* و *I to NA* و در نتیجه پروترود شدن دندان سانترال فک بالا از نتایج درمان بود که به صورت قابل ملاحظه‌ای معنی دار بود ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: نتایج توجیه کننده تاثیر مثبت استفاده از *FM* ماسک بدون کاربرد افزایش عرض فک، در بهبود وضعیت قدامی خلفی فک بالا در بیماران *Cl III* در دوره دندانی مختلط می‌باشد.

کلید واژه‌ها: مال‌اکلوازن *Cl III* - *FM* ماسک - تغییرات فک بالا - دوره دندانی شیری و دائمی - تغییرات سفالومتریک

پذیرش مقاله: ۱۴/۴/۱۳۸۶

اصلاح نهایی: ۲/۲/۱۳۸۶

وصول مقاله: ۱۸/۸/۱۳۸۵

e.mail:ahmadakh@tums.ac.ir

نویسنده مسئول: گروه آموزشی ارتودننسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

بررسیهایی که در ایران انجام گرفته است، میزان شیوع این مال‌اکلوازن را حدود 5.5% تخمین می‌زنند.^(۱) مال‌اکلوازن *Cl III* حقیقی در واقع دیسپلازی اسکلتال است که از عدم کفايت قدامی خلفی و عمودی فک بالا، رشد بیش از حد مندیبل و یا ترکیبی از این دو ناشی می‌شود. درمانهای مختلفی برای *Cl III* پیشنهاد شده است. از جمله *Chin Cap*, دستگاه فانکشنال، *Face mask*, *FM*, جراحی، برای

در مال‌اکلوازن *Cl III* دندانهای مندیبل قدامیتراز دندانهای فک بالا قرار دارند. میزان اورجت کاهش می‌یابد و گاهی اوقات منفی می‌شود. شیوع مال‌اکلوازن *Cl III* در جمعیت پایین می‌باشد، اما هنوز یکی از مشکلترین ناهنجاریها برای درمان محسوب می‌شود. مال‌اکلوازن *Cl III* تقریباً در 5% جمعیت سفیدپوست آمریکایی و با شیوع بیشتر در کشورهای اروپایی و آسیایی حدود 6% دیده می‌شود.^(۲-۳)

شروع کار از تمامی افراد رضایت‌نامه و یک رادیوگرافی لترال سفالومتری استاندارد تهیه شد و به تهیه رادیوگرافی‌ها از یک مرکز رادیولوژی تاکید گردید. مشخصات دستگاه (Helsinki, Planmeca CG2000) و میزان اشعه استاندارد (Finland) (KV-7 MA 64) بوده است. برای درمان این افراد از پلاک متحرک با بایت خلفی و بدون پیچ و فنر و دارای Hook روی کروشه آدامز دندانهای C استفاده شد. پس از تحويل پلاک، FM نوع Delair درمان بیماران استفاده گردید. نیروی وارده از طرف الاستیک‌های بین فکی سنگین، در هر طرف سیصد و شصت گرم بود. مدت زمان استفاده از دستگاه FM بیست ساعت در شبانه‌روز تعیین گردید. بیماران هر یک ماه یک بار ویزیت شدند. درمان در مرحله فعال‌سازی تا ایجاد یک اورجت مثبت ادامه یافت که میانگین آن حدود هفت ماه بود. در انتهای مرحله درمان فعال‌سازی، از FM به مدت حداقل سه ماه به صورت نیمه‌وقت (۱۲ ساعت در شبانه‌روز) به عنوان Retainer، جهت حفظ وضعیت استفاده گردید و سپس FM حذف شد و در ادامه پس از حداقل سه ماه مجدداً از کلیه افراد رادیوگرافی سفالومتری تهیه شد. ۲۸ لندهارک بر روی هر رادیوگرافی قبیل و بعد از درمان اندازه‌گیری شد که از میان آنها: ۱۵ متغیر خطی (برحسب میلی‌متر) و ۱۱ متغیر زاویه‌ای (برحسب درجه) و دو نسبت می‌باشد. لازم به ذکر است متغیر Gf.S، معرف فاصله تصاویر خلفی‌ترین نقطه سر کنده و نقطه S روی پلان FH می‌باشد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز شد. جهت مقایسه بین نتایج قبل و بعد از درمان از آزمون t Paired sample استفاده گردید. لازم به ذکر است که کلیه Tracing‌ها توسط دو نفر که آموزش‌های لازم را دیده بودند، انجام شد و توسط دو متخصص ارتودنسی که نسبت به درمان صورت گرفته بودند، کنترل گردید. Blind.

یافته‌ها

در مقایسه بین نتایج قبل و بعد از درمان گروه مطالعه توسط آزمون t Paired sample، تغییرات رشدی ناشی از درمان مطابق با جداول ۱، ۲ و ۳ این گونه بدست آمد:

کودکانی که مبتلا به کوچکی فک بالا در جهت قدامی خلفی هستند، درمان ترجیحی این است که فک بالا به وضعیتی جلوتر و پایین‌تر حرکت داده شود که در نتیجه با اضافه شدن استخوان به درزهای خلفی، اندازه آن نیز افزایش یابد.^(۴) در مورد سن درمان این ناهنجاری از طریق پروتراسیون ارتودوکی فک بالا، مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است. در حال حاضر بیشترین اعتقاد بر درمان مال‌اکلورژن III ناشی از نقص رشدی فک بالا، در سنین قبل از بلوغ است.^(۶-۵)

یکی از روش‌های درمانی به این منظور دستگاه Face Mask می‌باشد که توسط Delair معرفی شده است.^(۷) در اکثر مطالعات، قبل از اقدام برای پروتراسیون فک بالا و یا همزمان با آن، افزایش عرض فک انجام شده است، استدلال این افراد این است که افزایش، ریمودلینگ درزهای طرفی و خلفی فک بالا را تحریک می‌کند و شانس پاسخ مطلوب قدامی خلفی را افزایش می‌دهد.^{(۱)، (۸-۱۱)} با توجه به اینکه گروهی از بیماران مشکل تنگی عرضی نداشته و نیاز به افزایش پالاتال ندارند و یا اینکه استفاده از آن در سنین پایین امکان‌پذیر نیست، در مطالعات محدودی به این موضوع پرداخته شده است، لذا هدف از این مطالعه، درمان FM بدون کاربرد افزایش سریع عرض فک مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات سفالومتریک دندانی و اسکلتی در گروهی از بیماران Cl III با نقص فک بالا بررسی گردید.

روش بررسی

این مطالعه قبل و بعد به صورت Case series طراحی و اجرا شده است. ده بیمار که از نظر اسکلتال و دنتال Cl III حقیقی و دارای نقص رشدی فک بالا بوده‌اند، براساس مشخصات بالینی و نیز توسط آنالیز McNamara و Stainer و براساس روش نمونه‌گیری در دسترس (آسان) انتخاب شدند و در مطالعه قرار گرفتند. میانگین سن بیماران مورد بررسی ۸/۰±۰/۸ سال می‌باشد. تمامی آنها در محدود سنی دندانی مختلط بودند و مواردی که درمان قبلی برای آنها صورت گرفته بود و یا دچار هر گونه آنومالی کرانیوفاشیال بودند و نیز موارد Cl III کاذب، از مطالعه خارج شدند. در

از بین متغیرهای نشان‌دهنده تغییرات نسج نرم، تغییرات Ls.El, n.Sn.Pog از لحاظ آماری معنی دار بود.

از بین متغیرهای نشان‌دهنده تغییرات دندانی، تغییرات Is to A, I to NA, Fasclle Int.Inc و روابط بین مولرهای فک بالا و پایین، از لحاظ آماری معنی دار بوده است.

از بین متغیرهای نشان‌دهنده رشد افقی، متغیرهای اورجت، Co.Pog و طول Body مندیبل، از لحاظ آماری دارای تغییرات معنی دار بوده‌اند. ($P < 0.05$)

از بین متغیرهای نشان‌دهنده رشد عمودی، تنها تغییرات SN.Go.Gn از لحاظ آماری معنی دار بود.

جدول ۱: ارزیابی متغیرهای عمودی قبل و بعد از درمان

P-value	انحراف معیار	اختلاف میانگین	بعداز درمان	قبل از درمان	متغیرها
۰/۰۱*	۲/۰۲۰۰۴	-۱/۹۵	۳۵/۶۵	۳۳/۷	SN.Go.Gn
۰/۲	۲/۵۸۲۵۳	-۱/۱۵	۲۹/۶۵	۲۸/۵	FMA
۰/۲	۱/۴۹۴۴۳	۰/۷	-۱/۳	-۰/۶	Overbite
۰/۴	۰/۰۲۶۶۰	۰/۰۰۷	۰/۶۱۷۶	۰/۶۲۴۶	JbI

* :Significant

توضیحات: JbI: ایندکس جارابک.

جدول ۲: ارزیابی متغیرهای قدامی خلفی قبل و بعد از درمان

P-value	انحراف معیار	اختلاف میانگین	بعداز درمان	قبل از درمان	متغیرها
۰/۷	۱/۸۴۳۹۱	-۰/۲	۸۱/۴	۸۱/۲	SNA
۰/۲	۱/۳۰۸۰۹	۰/۶	۷۸/۹	۷۹/۵	SNB
۰/۰۶	۱/۱۸۳۲۲	-۰/۸	۲/۵	۱/۷	ANB
۰/۱	۳/۱۷۱۴۹	-۱/۶۵	۸۷/۳	۸۶/۶۵	Co.Ans
*۰/۰۰۹	۳/۰۵۶۸۷	-۳/۲	۱۰۸/۸۵	۱۰۵/۶۵	Co.Pog
۰/۸	۲/۷۷۱۲۸	-۰/۲۵	۵/۱۵	۴/۹	Ao.Bo
*۰/۰۱	۱/۶۱۶۷۵	۱/۶۵	۱/۷	۲/۳۵	Ls.El
*۰/۰۰۱	۱/۵۶۷۰۲	-۲/۳	۱/۸	-۰/۵	Overjet
۰/۱	۲/۱۲۱۹۷	-۱/۱۵	۱۷/۱۵	۱۶	Gf.S
۰/۲	۰/۹۶۶۰۹	-۰/۴	۲۰/۲۵	۱۹/۸۵	S.Ptm
۰/۰۹	۲/۲۹۷۴۴	-۱/۳۴	۵۰/۳۴	۴۹	Ptm.Ans
۰/۰۷	۳/۷۸۵۱۲	-۲/۴۶	۳۷/۴۶	۳۵	S.6
۰/۶	۴/۵۷۲۲۹	۰/۷۳	۳۲/۹۷	۳۳/۷	6.Ans
<۰/۰۰۱*	۱/۰۵۲۳۸۸	-۲/۶	۷۱/۰۵	۶۸/۴۵	Body L
۰/۴	۲/۲۹۷۹۰	۰/۶۵	۳/۶۵	۴/۳	A.Pn
۰/۰۰۶*	۳/۰۹۵۲۵	۳/۵۵	۱۶۰/۶	۱۶۴/۱۵	n.Sn.Pog

* :Significant

توضیحات: Gf.S: فاصله تصاویر خلفیترین نقطه سر کنديل و نقطه Ls.El / FH: فاصله قدامیترین نقطه بوردر لب
کروی پلان / F: فاصله قدامیترین نقطه سر کنديل و نقطه n.Sn.Pog: فوچانی تا Esthetic Line

جدول ۳: ارزیابی متغیرهای دندانی قبل و بعد از درمان

P-value	انحراف معیار	اختلاف میانگین	بعد از درمان	قبل از درمان	متغیرها
.۰/۱	۹/۷۰۸۱۰	-۵/۰۵	۱۰۷/۰۵	۱۰۲	<u>1 to SN</u>
.۰/۰۸	۸/۴۷۲۲۴	-۵/۳۵	۱۱۴/۲۵	۱۰۸/۹	<u>1 to FH</u>
.۰/۱	۸/۴۰۳۷۰	-۴/۷	۳۶	۲۱/۳	<u>1 to NA</u>
.۰/۰۷	۳/۱۰۴۲۱	-۲/۰۵	۹۰/۱۵	۸۸/۱	IMPA
.۰/۰۲*	۹/۸۳۲۰۶	۸/۶۵	۱۲۶/۵۵	۱۳۵/۲	Int.Inc
.۰/۰۰۱*	۱/۵۲۸۴۳	-۲/۳۵	۵/۲۵	۲/۹	<u>1to NA (mm)</u>
.۰/۰۰۲*	۲/۱۲۳۹۴	-۲/۸	۷/۳۵	۴/۵۵	IS.A
.۰/۰۳*	۱/۸۳۲۵۸	۱/۴۵	۰/۵۵	۲	Molar Rel.

*: Significant

توضیحات: IS.A: فاصله لبه انسیزورهای بالا تا عمودی که از A بر پلان اکلوزال رسم می شود / Int.Inc: زاویه بین ثناپایی

بحث

زاویه ANB، ۰/۸ درجه افزایش یافته که معنی دار نبوده است. فرهادیان، Mermigos و Merwin Gallagher افزایش معنی دار این زاویه را در تحقیقات خود گزارش می کنند. (۱۲، ۱۳ و ۱۴)، با توجه به جهت رشد فک پایین و مدت کم درمان مطالعات فوق در مقایسه با مطالعه حاضر و تفاوت میزان رشد انجام شده در این زمانها، این اختلاف قابل توجیه است. همچنین باید عدم انجام تغییرات معنی دار در بعد افقی که نشان دهنده عدم چرخش معنی دار فک پایین در جهت عقربه های ساعت می باشد را در این مطالعه مدنظر داشت. با توجه به افزایش این زاویه، می توان گفت فک بالا حرکت قدامی را متحمل شده است که به بهبودی رابطه ANB CI III کمی کند. اگر چه برخی از محققان افزایش Clockwise را ناشی از حرکت رو به عقب نقطه B و چرخش Long Face مندیبل می دانند که باعث می شود فرد تمایل به شدن پیدا کند، ولی در این مطالعه عدم تغییرات ناشی از حرکت قدامی فک بالا متعاقب اعمال نیروی FM در استفاده تمام وقت از آن در بیماران بود.

طول موثر فک بالا Co.ANS ۱/۶ میلی متر و شاخص Ptm.ANS ۱/۳ میلی متر و شاخص S.Ptm ۰/۴ میلی متر افزایش غیر معنی دار را نشان می دهد. Baccetti نیز به جا به جایی قدامی کمپلکس فک بالا از ناحیه پتريگوئيد متعاقب استفاده از RME اشاره می کند. وی از شاخص

با توجه به اینکه تاثیر کلی مورد انتظار از دستگاه FM تغییرات در آنالیز لندرمارک های نشان دهنده موقعیت افقی فک بالا می باشد، نتایج به صورت بررسی تغییرات افقی و عمودی لندرمارک های سفالومتریک و بررسی وضعیت بافت نرم مورد بحث قرار می گیرد.

در بررسی تغییرات افقی، زاویه SNA، ۰/۰ درجه افزایش یافته که از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. Keles (۳) و Saddia (۱۲) و Gallagher (۱۳) و فرهادیان (۱) طی تحقیقات خود افزایش معنی دار این زاویه را گزارش کرده اند. افزایش این زاویه بیانگر حرکت قدامی فک بالا می باشد که مورد نظر مطالعه حاضر می باشد.

زاویه SNB، ۰/۶ درجه کاهش یافته که معنی دار نبوده است. در بررسیهای Merwin و Mermigos و Gallagher در بروزهای خود کاهش غیر معنی دار این زاویه را گزارش می نمایند. (۱۲، ۱۳ و ۱۴)

با توجه به اینکه نوع اثر دستگاه و این واقعیت که تکیه گاه دستگاه جهت اعمال نیروی کشش پری ماگزیلا فقط چانه بیمار نمی باشد و پیشانی بیمار نیز به عنوان تکیه گاه مورد استفاده قرار می گیرد، لذا می توان انتظار داشت که تغییرات انجام یافته در SNB زیاد نباشد که از لحاظ درمانی مطلوب به نظر می رسد.

شاخص PN to A ۰/۶۵ میلی‌متر کاهش غیرمعنی‌دار نشان می‌دهد که این کاهش بیانگر جا به جایی قدامی کمپلکس نازو‌ماگزیلاری می‌باشد.

تغییرات شاخص Wits ratio نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که ۰/۲۵ میلی‌متر افزایش غیرمعنی‌دار نشان می‌دهد. افزایش این شاخص نشان‌دهنده بیشتر بودن حرکت قدامی مندیبل، نسبت به فک بالا می‌باشد ولی معنی‌دار نبودن آن نشان دهنده مطلوب بودن نتایج درمانی است.

تغییرات اورجت، افزایش ۲/۳ میلی‌متری را به صورت معنی‌دار نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تاثیر مثبت درمان می‌باشد. ضمناً این یافته با نتایج عمدۀ محققان از جمله Benedetti و Saranes، Wisth و Kilicoglu که مبنی بر اصلاح اورجت پس از درمان با FM در بیماران با نقص رشدی ماگزیلا مطابقت دارد.^(۹ و ۱۸-۱۹)

در بررسی تغییرات عمودی نتایج زیر بدست آمد: در بررسی زاویه SN.Go.Gn، افزایش معنی‌دار ۱/۹ درجه ملاحظه گردید. در استفاده از FM با اعمال نیرو به چانه به عنوان تکیه‌گاه، افزایش این زاویه به عنوان عارضه جانبی آن منطقی به نظر می‌رسد. قابل ذکر است که این یافته با نتایج تحقیق Kilicoglu که وی نیز درمان FM را بدون افزایش عرض فک به کار برده است و افزایش معنی‌دار این زاویه را گزارش کرده است همخوانی دارد.^(۲۰)

نسبت ارتفاع خلفی صورت به ارتفاع قدامی صورت (JbI)، ۰/۰۰۷ کاهش داشته که معنی‌دار نبود. Kilicoglu افزایش ارتفاع قدامی صورت (N-Me) را معنی‌دار گزارش می‌کند که می‌تواند بیانگر تغییرات درمانی در مطالعه وی در چرخش Clockwise مندیبل باشد.

زاویه FMA ۱/۱ درجه افزایش یافته که معنی‌دار نبود. فرهادیان افزایش ۰/۹ درجه و Merwin افزایش دو درجه این زاویه را به شکل معنی‌داری گزارش می‌کنند.^(۱۶، ۱)

اگر چه این نتایج نشان‌دهنده افزایش ارتفاع تحتانی صورت و نشانه رشد عمودی صورت و تمایل به Long Face شدن می‌باشد ولی غیرمعنی‌دار بودن آن نشان‌دهنده عدم اعمال عوارض جانبی افزایش بعد عمودی صورت این بیماران پس از درمان می‌باشد.

Ptm.PNS برای بیان این جا به جایی استفاده کرده است (۸)، افزایش این شاخصها نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنی‌دار کاربرد FM در افزایش طول فک بالا و حرکت قدامی آن می‌باشد، البته می‌توان رشد قدامی ANS را در این افزایش موثر دانست، اما افزایش SNA موید رشد افقی فک بالا می‌باشد.

شاخص S.6 ۲/۴ میلی‌متر افزایش و شاخص ANS ۰/۷ میلی‌متر کاهش غیرمعنی‌دار نشان می‌دهند که بیانگر حرکت قدامی دندان مولر اول فک بالا می‌باشد. Negan به ۰/۵ میلی‌متر حرکت قدامی مولر اول اشاره می‌کند که معنی‌دار نبود.^(۱۵)

شاخص Gf.S ۱/۱ میلی‌متر افزایش غیرمعنی‌دار داشته است. این شاخص معرفی کننده موقعیت قدامی خلفی مندیبل می‌باشد که در نتیجه اعمال نیروی تکیه‌گاه ناشی از FM بر چانه می‌باشد. این افزایش در جهت اهداف درمانی است. ضمناً در بررسی مقالات، به تغییرات این شاخص در هیچ مقاله‌ای اشاره نشده است.

طول موثر مندیبل (Co.Pog) ۳/۲ میلی‌متر و طول Body مندیبل ۲/۶ میلی‌متر افزایش معنی‌دار نشان می‌دهند که می‌توان آن را ناشی از حرکت رو به جلوی Pog دانست. نتایج نشان‌دهنده رشد مندیبل می‌باشد.

با توجه به شاخص VTO، میزان رشد طبیعی فک پایین، در طول یک سال در حدود دو میلی‌متر در جهت قدام می‌باشد.^(۱۶) فاصله زمانی بین رادیوگرافی‌ها در این مطالعه از یک سال بیشتر می‌باشد. علی‌رغم توصیه‌های انجام شده، برخی بیماران در کلینیک‌های مختلف رادیوگرافی‌های خود را انجام دارند و با توجه به ملاحظات اخلاقی تکرار رادیوگرافی‌ها ممکن نبود. با در نظر گرفتن اختلاف بزرگنمایی‌ها در دستگاه‌های مختلف رادیوگرافی، افزایش معنی‌دار متغیرهای طولی قابل اعتماد نبوده ولی نتایج در مجموع با مطالعات Mermigos و Mc Namara و Ellis دارد.^(۱۷ و ۱۸)

قدامیت از حد نرمال قرار گرفته است. Kilicoglu در مطالعه خود افزایش زاویه و فاصله \perp NA را ذکر می کند.^(۲۰) زاویه IMPA، افزایش دو درجه‌ای غیرمعنی دار را نشان می داد، در حالی که Merwin کاهش این زاویه را گزارش کرده است.^(۶) با توجه به این ناهماهنگی به نظر می رسد عوارض جانبی نامطلوب کاهش این زاویه در درمان انجام گرفته ایجاد نشده است.

Inter incisal angle کاهش $8/6$ درجه‌ای معنی دار نشان داد. معنی دار شدن این شاخص را می توان با افزایش زاویه دندانهای قدامی بالا و همچنین افزایش IMPA توجیه کرد که با توجه به عدم همسویی تغییرات IMPA با عوارض جانبی درمانی شاید نتیجه مطلوبتر کلینیکی را بتوان از این روش درمانی انتظار داشت که با مطالعات بعدی و افزایش تعداد نمونه ها می بایست مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

رابطه بین مولرهای اول فک بالا و مندیبل که به صورت فاصله بین دیواره مزیالی دو دندان اندازه گیری شده است، کاهش $1/4$ میلی متری معنی داری را نشان داد، بدین معنی که حرکت قدامی فک بالا در جهت ایجاد رابطه I به شکل Benedetti نیز در درمان خود معنی داری موثر بوده است. RME استفاده کرده است، همین نتیجه را گزارش می کند.^(۹)

در بررسی تغییرات بافت نرم، شاخص $n.Sn.Pog/3/5$ درجه و شاخص $LS.EL/1/6$ میلی متر کاهش معنی دار را نشان دادند. Kilicoglu نیز کاهش معنی دار این زاویه و اصلاح پروفایل بیماران را متعاقب استفاده از FM گزارش می نمایند.^(۲۰)

این نتایج نشان دهنده اصلاح پروفایل بیمار و مطلوب در جهت درمان می باشد و حاکی از وجود هماهنگی بین تغییرات اسکلتی و بافت نرم می باشد.

نتیجه گیری

اصلاح ناهنجاری های اسکلتال بیمار بدون ایجاد چرخش Clock wise Counter Clock wise فک بالا و نیز FM اصلاح اورجت ایجاد رابطه I مولرهای از نتایج درمان بدون استفاده از عنصر فعال Expansion بود. پروفایل بیمار

اوربایت $7/0$ میلی متر کاهش غیرمعنی دار نشان می دهد و می تواند به عنوان عدم تاثیر عوارض جانبی غیرمطلوب این روش درمانی تلقی گردد. فرهادیان در بررسی خود، افزایش بعد عمودی صورت را در اثر درمان با FM, RME گزارش کرده است.^(۱) Proffit کاربرد FM را در بیماران Long face با احتیاط ذکر می کند.^(۵) Hegman در تحقیق خود افزایش عمودی صورت را معنی دار ذکر می کند.^(۲۱)

در مجموع با توجه به اینکه در این مطالعه تغییرات شاخصهای بیانگر رشد عمودی معنی دار نبوده و در اکثر مطالعات انجام شده تغییرات آنها معنی دار گزارش گردیده، این یافته را می توان با چرخش خلاف عقربه های ساعت مندیبل ناشی از رشد جبرانی در ارتفاع خلفی و همچنین عدم اعمال عوارض جانبی ایجاد شده ناشی از افزایش عرض فک بالا بر نتایج درمانی توجیه کرد.

در بررسی تغییرات دندانی شاخصهای \perp to SN و \perp to NA و شاخص A که بیانگر فاصله لبه انسیزال سانترال های بالا از خط A perpendicular می باشد مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه تغییرات سه شاخص اول افزایش غیرمعنی دار و شاخص چهارم افزایش معنی دار نشان داد. افزایش این زوایا نشان دهنده پروتروژن دندان سانترال بالا می باشد اما معنی دار نبودن این تغییرات نشان دهنده اعمال نیرو بر بیس فک بالا و ایجاد نتایج مثبت درمانی بدون ایجاد عوارض جانبی موثر دندانی می باشد. در استفاده از این روش درمانی با توجه به عدم کاربرد عامل فعال کننده جهت پروتروژن دندانها و با توجه به نتایج اسکلتی می توان نسبت به پایدار بودن تغییرات مثبت درمانی بدست آمده امیدوار بود و این خود از جنبه های مثبت این روش درمانی تلقی می گردد. لذا این یافته ها نشان می دهد دستگاه FM بدون استفاده از افزایش در حرکت قدامی ماگزیلا موثر باشد و لذا عوارض جانبی آن در حداقل ممکن قرار دارد.

شاخص فاصله \perp to NA $2/3$ میلی متر افزایش معنی دار نشان می دهد. این شاخص اطلاعاتی در رابطه با موقعیت قدامی خلفی ثناخیای فک بالا نسبت به خط NA ارائه می دهد. افزایش آن به این معنی است که دندان سانترال در موقعیت

تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی درمانی تهران به شماره قرارداد ۴۵۹۱ مورخ ۸۴/۷/۹ می باشد. همچنین از آقای دکتر محمد جواد خرازی فرد که مشاوره آماری این مطالعه را بر عهده داشته اند، تشکر و قدردانی می گردد.

پس از درمان اصلاح شد. عوارض جانبی نامطلوب درمان اعم از افزایش بعد عمودی صورت و عوارض دندانی دیده نشد. این نتایج با توجه به طول مدت درمان و اعمال تغییرات رشدی در این بیماران حاصل گردیده است. در مجموع یافته ها توجیه کننده تاثیر مثبت استفاده از FM بدون استفاده از افزایش عرض فک می باشد. جهت به دست آوردن نتایج قطعیتر، بررسی تعداد نمونه های بیشتری، با استفاده از دستگاه رادیوگرافی واحد پیشنهاد می گردد.

REFERENCES

- فرهادیان، نسرین. تحقیقی پیرامون تغییرات سفالومتریک اسکلتی و دندانی متعاقب استفاده از فیس ماسک در کودکان Cl III اسکلتی با نقص ماگزیلا. [پایان نامه]. تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۶.
- احمد آخوندی، محمد صادق. ارتودنسی در دندانپزشکی عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات لوح محفوظ، ۱۳۸۱، ۲۲۴-۲۶۰.
- Keles A, Tokmak EC. Effect of varying the force direction on maxillary orthopedic protraction. Angle Orthod. 2002 Oct;72(5):387-396.
- McDonald KE, Kapust AJ, Turley PK. Cephalometric changes after the correction if class III malocclusion with maxillary expansion face mask therapy. Am J Orthod. 1999 Jul;116(1):13-24.
- Proffit WR, Henry W. Contemporary orthodontics, Third ed. USA: Mosby;2000,508-515.
- Merwin D, Negan P. Timming for effective application of anteriorly directed orthopedic force to the maxilla. Am J Orthod. 1997 Sep;112(3):292-299.
- Delaire J. Maxillary development revisited. Eur J Orthod. 1997 June;19(3):289-311.
- Baccetti T, Franchi L, McNamara JA Jr. Thine-plate spline analysis of treatment effects of rapid maxillary expansion and face mask therapy early class III malocclusion. Eur J Orthod. 1999 June;21:275-281.
- Benedetti T. Changes occurring during and after treatment of class III malocclusion with rapid palatal expansion and face mask. World J Orthod. 2002;3(3):199-210.
- Kircelli BH, Pektas ZO, Uckan S. Orthodontics protraction with skeletal anchorage in a patient with maxillary hypoplasia and hypodontia. Angle Orthod. 2006 Jan;76(1):156-63.
- Baccetti T, Franchi L, MCNamara JA Jr. Treatment and posttreatment craniofacial changes after rapid maxillary expansion and face mask therapy. Am J Orthod. 2000 Oct;118(4):404-13.
- Gallagher W, Miranda F, Buschang PH. Maxillary protraction: Treatment and post treatment effects. Am J Orthod. 1998 June;113(6):612-619.
- Saadia M, Torres E. Sagittal changes after maxillary protraction with expansion in class III patients in the primary, mixed, and late mixed dentition. Am J Orthod. 2000 June;117(6) :669-680.
- Mermigos J, Full CA, Andreasen G. Protraction of the maxillofacial complex. Am J Orthod. 1990 Jul;98(1):47-55.
- Ngan P, Wei SH, Hagg U. Effect of protraction headgear on III malocclusion. Quintessence Int.1992 Mar;23(3): 197-207.
- Ricketts RM. Bioprogressive therapy as an answer to orthodontic needs. Am J Orthod. 1976 Oct;70(4):359-97.

17. Ellis E, McNamara JA. Components of adult class III open bite malocclusion. Am J Orthod. 1984 Oct;86(4):277-90.
18. Sarnas V, Karl. Extraoral traction to the maxillo with Face mask. Cleft Palatal J. 1987 Apr;24(2):95-103.
19. Wisth J, Tritrapunt A, Ryph P. The effect of maxillary protraction on front occlusion and facial morphology. Acta Odontol Scand. 1987 June;45(3):227-237.
20. Kilicoglu H, Kirlic Y. Profile changes in patients whit class III malocclusions after delaile face mask. Am J Orthod. 1998 Apr;113(4):453-462.
21. Hegman N, Ruther AK. The grummons face mask as an early treatment modality within a class III therapy concept. J Orofacial Orthop. 2003 Nov;64(6):450-456.

Archive of SID