

بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و زنیان بر میکرووارگانیسم‌های پوسیدگی زا

- دکتر حمید کرمانشاه^۱- دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانکر^۲- دکتر سکینه آرامی^۳- دکتر اکبر میرصالحیان^۴-
مهندس محمد کمالی نژاد^۵- دکتر مهرداد کریمی^۶- فرشته جبل عاملی^۷
- ۱- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
۳- دانشیار گروه آموزشی میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴- پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۵- دستیار تخصصی طب سنتی دانشکده علوم پزشکی تهران
۶- دستیار تخصصی گروه آموزشی میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: جامعه جهانی به درمانهای سنتی و لزوم استخراج دارو از مواد طبیعی و گیاهان داروئی توجه خاص دارد. به همین جهت هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی دو گیاه مریم گلی (*Carum*) و زنیان (*Salvia officinalis*) که در متون طب سنتی از موارد پرکاربرد در درمان بیماریهای دهان و دندان هستند بر میکرو ارگانیسم‌های پوسیدگی زا می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی از دو گیاه مریم گلی و زنیان به روش ماسراسیون (خیساندن) عصاره هیدروالکلی تهیه شد و پس از استریل کردن عصارها توسط فیلتر مربوطه، اثر آنتی باکتریال عصارها به روش *Broth macrodilution* (رتیق کردن مرتب نمونه‌ها با روش مربوطه) بر روی میکروارگانیسم‌های استرپتوکوک موتان، لاکتوباسیل رامنوز و اکتینیو میسین ویسکوز ارزیابی شد. نتایج توسط آماره *Mann whitney* آنالیز و مقایسه شدند.

یافته‌ها: میزان حداقل غلظت بازدارندگی رشد عصاره مریم گلی و زنیان برای استرپتوکوک موتان به ترتیب $6/25$ و $12/5$ میکرو گرم در میلی لیتر و برای لاکتوباسیل رامنوز به ترتیب $1/05$ و $6/25$ میکرو گرم در میلی لیتر و برای اکتینیو میسین ویسکوز به ترتیب $12/5$ و 25 میکرو گرم در میلی لیتر به دست آمد.

نتیجه‌گیری: هر دو عصاره مریم گلی و زنیان بر هر سه گونه باکتری اثر بازدارندگی رشد داشتند که این اثر برای مریم گلی به طرز معنی‌داری بیشتر از زنیان بود و در محدوده غلظتی مورد بررسی عصاره مریم گلی بر هر سه باکتری و زنیان بر استرپتوکوک موتان و اکتینیو میسین ویسکوز اثر باکتریسیدال داشتند.

کلید واژه‌ها: عصاره گیاهی - مریم گلی - زنیان - میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا - استرپتوکوک موتان - لاکتوباسیل رامنوز - اکتینیو میسین ویسکوز.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۳/۲۶

اصلاح نهایی: ۱۳۹۰/۱/۱۴

وصول مقاله: ۱۳۸۹/۴/۶

نویسنده مسئول: دکتر حمید کرمانشاه، گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
e.mail:kermanshahhamid@yahoo.com

مقدمه

می‌شود. درمان علامتی و ترمیمی بدون توجه به علت زمینه ساز بیماری با شکست مواجه خواهد شد. (۱)، علی‌رغم اینکه

پوسیدگی دندان در اصل یک بیماری عفونی - میکروبی است که موجب حل شدن و تخریب بافت‌های آهکی دندان

مراجع این دانش در درمان بیماریهای دهان و دندان ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین در این مطالعه دو گیاه مریم گلی (Carum copticum) و زنیان (Salvia officinalis) که از جمله گیاهان پرکاربرد در سنون بوده‌اند (۶-۹) انتخاب شدند تا با بررسی اثر ضد میکروبی آنها بر باکتری‌های عامل پوسیدگی دندان راهکاری با کمترین میزان عارضه جهت کنترل پوسیدگی به ویژه در افرادی که دچار خشکی دهان هستند یا به دنبال درمانهایی از جمله رادیوتراپی مبتلا به پوسیدگی‌های وسیع و غیرقابل کنترل شده‌اند، ارائه شود. ضمناً در متون و مقالات اخیر نیز به بررسی اثرات ضد میکروبی این گیاهان پرداخته شده است.

(۱۰ - ۱۵)

مریم گلی گیاه شناخته شده‌تری است که مطالعات ضد میکروبی بیشتری در مورد آن انجام شده و به عنوان کنترل مثبت گیاهی در این پژوهش درنظر گرفته شده است. (۱۲-۱۶)، در مورد دو گیاه مریم گلی و بومادران، در مورد اثر ضد میکروبی آنها بر باکتری‌های پوسیدگی زا مطالعه‌ای انجام نشده است به جز یک مطالعه که اثر ضد میکروبی عصاره مریم گلی را فقط بر استرپتوكوک موتان بررسی کرده است. (۱۶)، با توجه به اینکه این گیاهان بومی ایران هستند و تهیه عصاره از آنها امکان پذیر است، این مطالعه اثر آنتی باکتریال آنها را به طور اختصاصی بر روی باکتری‌هایی که پوسیدگی زایی آنها اثبات شده است یعنی استرپتوكوک موتان، لاکتو باسیل رامنوز و اکتینومیسیس ویسکوز بررسی کرده است

روش بررسی

این مطالعه تجربی طی دو مرحله انجام گردید:

۱- عصاره گیری: به روش Maceration انجام شد. ابتدا اندام هوایی گیاهان به صورت خشک (از بازار گیاهان دارویی Lib ROR AEU-210 تهیه شده) توسط ترازوی دیجیتال (۰.۹۶٪ اتانول و ۵٪ آب) ریخته شد تا سی سی از حلال

پوسیدگی دندان شایعترین بیماری مزمون در جهان است (۱)، معزالک تا کنون هیچ برنامه‌ای برای ریشه کنی این بیماری میکروبی همانند آنچه در برابر آبله و فلچ اطفال صورت پذیرفته انجام نشده است.

از عوارض تداوم این بیماری از دست رفتن دندانها، درد و عیوب زیبائی است. عامل اتیولوژیک اصلی شناخته شده برای پوسیدگی دندان استرپتوكوک های موتان و لاکتوباسیل ها هستند. (۱)، درمان و پیشگیری از پوسیدگی با آنتی بیوتیک ها و استروئیدها توان اکسیداسیون - احیای بzac را تغییر داده فعالیت لیزوزیم را ضعیف و شرایط ایجاد واکنشهای آلرژیک را تسهیل می‌کند و باعث کاهش مقاومت بدن نسبت به عوامل پاتوژنیک می‌شوند. (۲)

از طرفی استقبال گسترده‌ای از طب سنتی و داروهای گیاهی در زمینه های مختلف علوم پزشکی صورت گرفته است که علت آن کاربرد گیاهان به عنوان دارو از قرنهای پیشین می‌باشد. (۳)، بهره گیری از طب سنتی یکی از راههای دستیابی به داروهای جدید می‌باشد در حال حاضر ۱۱۹ دارو با منشا گیاهی وجود دارد که تنها از نوادگونه از بین دویست و پنجاه هزار گونه شناخته شده، به دست آمده است. (۴)، اما جستجوی سیستماتیک بر روی مواد موثره این گیاهان و تمامی بیماریها امری بسیار طولانی، هزینه بر و محال می‌باشد. (۴)، بنابراین تکیه بر آموزه های بومی یکی از استراتژی های مقبول در دنیا در کشف، کاربرد و تحقیق در مورد گیاهان دارویی است. طب سنتی ایران از پایه های قیمتی علم طب و حاوی اطلاعات گرانبهای در به کارگیری گیاهان در درمان می‌باشد، حفظ سلامت دهان و دندان در طب سنتی ایران مطرح بوده و در کتب «معالجات» (درمانی) فصلی به بیماریهای دهان و دندان اختصاص داده شده است. درمان بیماریهای دهان و دندان در سه بخش کلی "تدبیر و تغذیه"، "به کارگیری دارو" و "استفاده از ابزار (اعمال یادوی)" تقسیم بندی می‌شود. ترکیبات داروئی جهت "تدبیر و تغذیه" در متون طب سنتی ایران تحت عنوان "سنون" نام برده شده است. (۵)، لذا با توجه به روشهای درمان دارویی طب سنتی ایران، یافتن منابع نوین دارویی از

(USA, Difco) Thiyoglycollate ویسکوز Medium برای استرپتوكوک موتان (Spain, CONDA) BHI broth (Germany, MRS broth) برای لاکتوباسیل رامنوز (Merck) به رو ش Serial dilution (رقیق سازی $\frac{1}{2}$) انجام شد (که در نهایت پانصد میکرولیتر از محیط کشت و عصاره در هر لوله وجود داشت). پس از تهیه سوسپانسیون باکتری مطابق لوله $0/5$ مک فارلن (MCF) فارلن دیک سوسپانسیون شیمیایی است که میزان کدورت حاصل از آن قابل مقایسه با سوسپانسیون میکروبی می باشد از این طریق تعداد باکتری در هر میلی لیتر از سوسپانسیون قابل تخمین است (18) (CFU $1/5 \times 10^8$) به تعداد (18) (Colony forming unit) در میلی لیتر و رقیق سازی آن توسط محیط کشت به میزان $\frac{1}{100}$ جهت بدست آوردن تعداد (10^6) CFU در میلی لیتر، به هر لوله پانصد میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به دست آمده اضافه شد. که نهایتاً محدوده غلظتی لوله ها $-0/18$ ۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود. پس از آن گرمایشیاری به مدت بیست ساعت در 37 درجه سانتی گراد انجام شد. بعد از وقوع رشد، با بررسی کدورت در لوله ها رشد و یا عدم رشد باکتری ها ارزیابی گردید.

غلظت اولین لوله ای که رشد در آن مشاهده نشد حداقل (MIC: Minimum Inhibitory concentration) غلظت بازدارندگی (Borth macrodilution) رشد باکتری توسط آن عصاره منظور گردید. سپس از لوله هایی که فاقد رشد بودند در محیط کشت جامد آگاردار در پلیت کشت داده شد اولین پلیتی که رشد مشاهده نگردید به عنوان حداقل غلظت کشنده ای (MBC: Minimum Bactericidal concentration) عصاره برای آن باکتری منظور گردید.

کنترل ها به شرح زیر بودند: محیط کشت و عصاره بدون باکتری \leftarrow عدم رشد، محیط کشت و آب مقطر با باکتری \leftarrow رشد، محیط کشت و کلرهگزیدین (شاهد مثبت) با باکتری \leftarrow عدم رشد. ضمناً گرمایشیاری در مورد *Actinomyces viscosus* و

کاملاً پودر را بپوشاند، بعد از پوشاندن سر ارلن ها با ورقه آلومینیومی به مدت 48 ساعت بر روی دستگاه Shaker (Heidolph unimax 2010) (با نود دور در دقیقه قرار گرفتند. بعد از اینکه حلال و گیاه همگن شند محلولها توسط کاغذ صافی (Watmann 0.5 mm USA) صاف شدند. سپس محلولها در دستگاهی به نام (Heidolph WD 2000 rotary evaporator) قرار گرفتند تا حلال از عصاره جدا شود. عصاره خالص به دست آمده در ویال های استریل جهت انجام آزمایش های میکروبی در یخچال نگهداری شدند. (۱۷)

۲- تست تعیین فعالیت بازدارندگی عصاره ها: سویه های استاندارد به صورت لیوفیلیزه Lactobacillus rhamnosus (ATCC: 7469, PTCC: 1637), *Actinomyces viscosus* (ATCC: 15987) *Streptococcus American Type of mutan* (ATCC: 35668) و مرکز پژوهش های علمی صنعتی ایران (PTCC; persian type of culture collection) تهیه شدند. به منظور تهیه باکتری از نمونه های لیوفیلیزه ابتدا نمونه ها در محیط کشت مایع به صورت Overnight (یک شبانه روز در دمای $35 - 30$ درجه سانتی گراد) کشت داده شدند.

بعد از ایجاد کدورت در محیط مایع، نمونه ها بر روی محیط کشت جامد [برای اکتینومیس ویسکوز (Spain, CONDA) BHI agar agar, برای استرپتوكوک موتان Blood sheep 5 % + BHI agar (Spain, CONDA) لакتوباسیل رامنوز (Germany, Merck) به MRS Agar [(*Actinomyces viscosus* از خلوص آنها ایزو لوله شدند. سپس به رو ش Borth macrodilution طبق پروتکل CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute, 2006, M₇-A₄.USA) اثر آنتی باکتریال هر کدام از عصاره ها بر این سه گونه باکتری بررسی گردیدند.

ابتدا از هر کدام از عصاره ها محلول ذخیره (Stock) هشتصد میکروگرم بر میلی لیتر تهیه شد و توسط فیلتر ($0.22 \mu\text{m}$ Millipore filters) استریل شدند. سپس رقیق سازی عصاره ها در 11 لوله حاوی محیط کشت مایع [برای

زائی آن به اثبات رسیده است. (۲۰) این میکروارگانیسم در شروع پوسیدگی نقش اساسی دارد (۲۰) و در کلیه ضایعات پوسیدگی عاج و مینا و در همه سطوح دندانی دیده می‌شود. (۱)، لاكتوباسیل‌ها در پیشرفت پوسیدگی نقش دارند و اکتینومیس ویسکوز علاوه بر دو باکتری ذکر شده در ضایعات پوسیدگی سطح ریشه نقش ایفا می‌کنند. (۲۰-۲۱)، بنابراین از بین بردن پایه باکتریائی پوسیدگی دندان یکی از عوامل کمک به رفع این عفونت فراگیر می‌باشد. در سالهای اخیر باتوجه به گسترش روز افزون مقاومت میکروارگانیسم‌های بیماری زا نسبت به داروهای موجود و نیز اثرات جانبی آنتی‌بیوتیک‌ها جستجوی مواد ضد میکروبی جدید از گیاهان مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش اثرات ضد باکتریائی عصاره‌های هیدروالکی گیاهان بومادران و مریم گلی به روش Broth macrodilution بر سه باکتری اصلی عامل پوسیدگی دندان بررسی گردید. همان گونه که در جدول ۱ آورده شده است هر دو عصاره مورد مطالعه بر سه باکتری مزبور اثر ضد باکتریائی داشته‌اند که اثر مهاری مریم گلی به طرز معنی‌داری بیشتر از زنیان برای هر سه باکتری بوده است. مریم گلی (Saliva officinalis) گیاه شناخته شده تری است که مطالعات ضد میکروبی بیشتری در مورد آن انجام شده است. (۱۳-۱۶) کاربرد آن در بی‌اشتهاایی، التهاب دهان و حلق و افزایش تعریق مورد تأیید مراجع طب گیاهی است. (۱۰)، شواهدی از اثرات ضد باکتریائی، ضد قارچی و ضد ویروسی آن وجود دارد (۱۰-۱۴، ۱۴-۱۵) در مریم گلی تركیبات آلفا و بتاتوژون (Alpha, Beta-Thujone) (۲۰٪-۶۰٪) و یک و هشت سینئول (Cineol ۸٪ و ۱۶٪) و نیز فلاونوئیدهای مانند اپی ژنین (epigenin) موجود است. علاوه بر آن تركیبات لینالول (Linalool)، بورنئول (borneol) و آلفا و بتا کاریوفیلین (α, β -Caryophyllene) نیز در انسان فرار مریم گلی موجود است. (۱۰) در مطالعات قبلی اثر عصاره هیدروالکی برگ مریم گلی بر فعالیت کلژنولیتیک پورفیروموناس ژنژیوالیس نشان داده شده بود (۱۱) و اثر وسیع آنتی باکتریال و ضد قارچ مریم

در جاربی‌هوازی و در مجاورت Streptococcus mutans CO_2 صورت گرفت. این مراحل برای هر دو عصاره و برای هر سه نوع باکتری سه بار تکرار شد. نتایج توسط آماره Mann-whitney ($p < 0.05$) آنالیز و مقایسه گردید.

یافته‌ها

در نتایج Broth macrodilution میزان (MIC; Minimum Concentration) بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر و سطح معنی‌دار بودن آنها ($p < 0.05$) برای هر کدام از عصاره‌ها بر روی هر سه گونه باکتری در جدول ۱ نشان داده شده است. (کوچکتر بودن میزان MIC و MBC به معنی بالاتر بودن اثر آنتی باکتریال است).

در مورد استرپتوکوک موتان میزان MIC و MBC برای مریم گلی به ترتیب ۶/۲۵ و پنجاه میکروگرم بر میلی لیتر است که به طرز معنی‌داری از میزان MIC و MBC برای زنیان که به ترتیب ۱۲/۵ و دویست میکروگرم بر میلی لیتر است، کمتر است. در مورد لاكتوباسیل میزان MIC و MBC برای مریم گلی به ترتیب ۱/۵۶ و ۱۲/۵ میکروگرم بر میلی لیتر است که به طرز معنی‌داری از میزان MIC و MBC برای زنیان که به ترتیب ۶/۲۵ و بیشتر از دویست میکروگرم بر میلی لیتر است، کمتر می‌باشد. در مورد اکتینومیس ویسکوز میزان MIC و MBC برای مریم گلی ۱۲/۵ و ۱۲/۵ میکروگرم بر میلی لیتر است که به طرز معنی‌داری از میزان MIC و MBC برای زنیان که به ترتیب ۲۵ و ۲۵ میکروگرم بر میلی لیتر است، کمتر می‌باشد.

بحث

پوسیدگی دندان بیماری تخریبی نسج سخت دندان است که در عین اینکه اتیولوژی آن چند عاملی است، ثابت شده که یک بیماری وابسته به پلاک میکروبی است. (۱۹)، پوسیدگی در حضور باکتری‌های اسیدوژنیک مثل استرپتوکوک موتان به شدت افزایش می‌یابد. (۱۹)، استرپتوکوک موتان اولین و مهمترین میکروارگانیسم موجود در پلاک است که پوسیدگی

جدول ۱: میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشنندگی (MBC) بر حسب میکروبی میلی لیتر برای عصاره ها و گونه های میکروبی

نتیجه تست آماری	اثر آنتی باکتریال				گونه باکتری
	زنیان	مریم گلی	متغیرها	عصاره میکروبی میلی لیتر	
S*	۶/۲۵	۱/۵۶	MIC		لاکتوباسیل رامنوز
S	>۲۰۰	۱۲/۵	MBC		
S	۱۲/۵	۶/۲۵	MIC		استرپیتوکوک موتان
S	۲۰۰	۵۰	MBC		
S	۲۵	۱۲/۵	MIC		اکتینومیسیس ویسکوز
S	۲۵	۱۲/۵	MBC		

* S: Significant ($P < 0.05$)

می باشد که تیمول و کارواکرول دارد. (۲۲) اثر عصاره هیدروالکلی زنیان بر سه باکتری عامل پوسیدگی دندان احتمالاً برای اولین بار در این مطالعه گزارش شده است. البته اثر اسانس زنیان بر طیفهای مختلف باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و درماتیت ها گزارش شده است (۲۲) که با توجه به اشتراک موادی مانند کارواکرول و گاما سیمن (γ-cymene) در اسانس فرار و عصاره هیدروالکلی می توان این دو ماده را به عنوان عوامل احتمالی بروز اثر ضد باکتریائی بر شمرد. در مطالعه Singh و همکاران (۱۲) اثر ضد باکتریائی Carum copticum (زنیان) بر پاتوژن های دیگر عامل عفونت در بدن انسان ثابت شده است که از این نظر با مطالعه حاضر همخوانی دارد. بنابراین با توجه به اینکه در نتایج این مطالعه عصاره هیدروالکلی گیاهان مریم گلی و زنیان اثر بازدارندگی رشد و کشنندگی بر باکتری های عامل پوسیدگی دندان داشته اند بررسی اثر ضد باکتریائی آنها به صورت حیوانی در پژوهش های آینده پیشنهاد می شود. از طرفی به دلیل اقبال جامعه جهانی به درمان های سنتی و لزوم استخراج دارو از گیاهان و مقاومت میکروبی به داروهای شیمیایی تهیه فرآورده از جمله دهان شویه ضد میکروبی از این گیاهان مفید و ضروری به نظر می رسد.

گلی بر طیف وسیعی از باکتری ها مانند سودوموناس و آسپرژیلوس و کاندیدا گزارش شده بود (۱۱، ۲۲) که یافته های این مطالعه در مورد اثر باکتریسیدال مریم گلی با تحقیقات فوق همخوانی دارد.

در مطالعه صانعی و همکاران (۱۶)، اثر عصاره گیاهانی از جمله مریم گلی بر تعدادی از باکتری های بیماری زای حفره دهان از جمله استافیلوکوک اورئوس، استرپیتوکوک سالیواریس و استرپیتوکوک موتان بررسی شده است، که مریم گلی با غلظتهاي ۴/۸ میلی گرم در میلی لیتر در زمان شست و نود ثانیه بر این میکرووارگانیسم اثر مهار رشد داشته است، که نتایج مطالعه حاضر با آن هماهنگ است. در عین حال در مطالعه حاضر اثر زنیان و مریم گلی بر کلیه میکروارگانیسم های پوسیدگی زا، که هر کدام نقش ویژه ای در ایجاد پوسیدگی دارند، بررسی شده است، که از این لحاظ نسبت به مطالعه صانعی و همکاران جامعیت بیشتری دارد. زنیان (Carum copticum) یا نانخواه میوه نوعی گیاه معطر با بوی عطر تیمول واژ گیاهان مورد استفاده در بیماری های گوارشی در طب سنتی ایران می باشد (۷) دارای ۴-۶٪ اسانس فرار است که در حدود ۴۵-۵۵٪ آن را تیمول تشکیل می دهد ولی در اسانس زنیان، سیمین و آلفاپی نز و دیپانتن نیز یافت می شود و تنها عضو خانواده چتریان

۳- در محدوده غلظتی مورد بررسی، عصاره مریم گلی بر هر سه باکتری و زنیان بر استرپتوکوک موتان و اکتینومیس ویسکوز اثر باکتریسیدال هم داشتند.

نتیجه‌گیری

هر دو عصاره مریم گلی وزنیان بر هر سه گونه باکتری اثر بازدارندگی رشد داشتند.

۲- اثر بازدارندگی مریم گلی به طرز معنی‌داری بیشتر از زنیان بود.

REFERENCES

1. Theondor MR, Harold OH, Ward J, Swift JR. Art and science of operative dentistry. 5th ed. St. Louis, Missouri: Mosby, Elsevier; 2006, Chapter3.
2. Walsb LJ. The current status of low level laser therapy in dentistry. Aust Dent J. 1997 Oct; 42 (5): 302 – 6.
3. Fabrican DS, Farnsworth NR. The value of plants used in traditional medicine for drug discovery. Environ Health Perspect. 2001 March; 109 (Suppl 1): 69 – 75.
4. Farnsworth NR. The role of ethnopharmacology in drug development. Ciba Found Symp. 1990; 154: 2-11.
5. Nazem Jahan Mohammad Azam Khan. Eksire Azam, Dehli: Nami Monshi Nolkshur; 1315, 38-70.
6. Nazem Jahan Mohammad Azam Khan. Gharabdin Azam, Dehli: Nami Monshi Nolkshur; 1315, 80-82, 150-152, 167-171.
7. Aghili Khorasani Mohammad Hossein. Makhzanol Adviye, 1st ed. Tehran: Entesharate Elmi va Farhangi; 1367, 719-772.
8. Zakariyaye Razi Abubakr Mohammad. Alhavi fe Teb, 1st ed. Bambae: Matbae Osmaniye; 1886, 270-273.
9. Akhvini Bokhari Abubakr. Hedayatol Motealemin fe Teb, 1st ed. Mashhad: Entesharate Daneshgahe Ferdosi; 1371, 40-45.
10. La Gow B. PDR for herbal medicine. 3rd ed. USA: Thomson; 2005, 698-700.
11. Kemper FH. ESCOP monographs. 2nd ed. Stuttgart: Theime; 2003, 452-4.
12. Singh G, Kapoor IPS, Pandey SK, SinghWK, Singh RK. Studies on essential oil: Part 10; Antibacterial activity of volatile oils of some spices. Rhyother Res. 2002 Nov;16(7): 680-682.
13. Weckesser S, Engel E, Simon-Haarhaus B, Wittmer A, Pelz K, Schmepp CM. Screening of plant extracts for antimicrobial activity against bacteria and yeast with dermatological relevance. Phytomedicine. 2007 Aug;14(7-8):508-9.
14. Bozin B, Mimica – Dukic N, Samoilik I, Emilija J. Antimicrobial and antioxidant properties of Rosmary and Sage (*Rosmarinus officinalis* L. and *Salvia officinalis* L., Lamiaceae) Essential oils. J Agric Food Chem. 2007 Sep; 55 (19): 7879 – 85.
15. Hayouni A, Chraiaf I, Abedrabba M, Bovix M, Leveau J, Mohammed H, et al. Tunisian salvia officinalis L. and schinus mollel. Essential oil: their chemical compositions and their preservative effects against salmonella inoculated in minced beef meat. Int J Food Microb. 2008 Jul; 125(3): 242 –51.
16. Sanei Ashraf Sadat, Pour Esmaeeli Hamid Reza, Ebadi far Asghar, Madahi Ali, Saboor Bahman, Mojtab Faraz coworker. The effect of anti bacterial activity of seven plant extraction on number of aerobic microorganism of oral cavity. Pajuhande j. 1976 Fall; (6): 22-25.
17. Samsum shariat H. Extraction of effective substance from drug plants. 2nd ed. Esfahan: Manni; 1386, 12-20.
18. Jean F. Mac faddin biochemical tests for identification of medical bacteria. 3rd ed. St. Louis Missouri: Mosby; 2000, 825.

19. Prabu GR, Gnanamani A, sadulla S. Guajaverin a plant flavonoid as potential antiplaque agent against streptococcus mutans. *J Appl Microb.* 2006 Aug; 101 (2): 487–95.
20. Fejerskov O, Kidd E. *Dental Caries: The disease and its clinical management.* 2nd ed. Singapore: Blackwell; 2008, Chapter 10, 16, 17.
21. Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. *Fundamentals of operative dentistry.* 3rd ed. China: Quintessence; 2006, Chapter 1, 4, 12.
22. Ray AB, Sarma BK, Singh UP. Medicinal properties of plants; anti fungal, antibacterial and antiviral activities. 1st ed. India: International Book Distributing Co; 2004, 8, 9, 488.

Archive of SID