

ارزیابی کیفیت گندم‌های نان ایران بر اساس زیرواحدهای گلوٹنین سنگین

Bread wheat quality evaluation based on the high molecular weight glutenin subunits

صدیقه بحرایی *

چکیده

تنوع زیرواحدهای گلوٹنین سنگین (HMW-GS) در مکان‌های ژنی *Glu-1* در ۸۶ لاین و رقم از گندم‌های نان موجود در برنامه‌های بهنژادی گندم کشور با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی گردید. مجموعاً ۱۴ نوع آمل و ۳۱ ترکیب آلی در گندم‌های نان مورد مطالعه تشخیص داده شد. جفت زیرواحد $2^{***}+12$ در ژنوم D که به عنوان زیرواحدهای نادر در توده‌های بومی پاکستان قبلاً گزارش شده است، در ارقام بولانی، سرخ تخم، و کویر که حاصل تلاقی سرخ تخم می‌باشد، و از توده‌های بومی سیستان و بلوچستان هستند، مشاهده گردید. میانگین کلی امتیاز کیفیت گندم‌های نان بر اساس زیرواحدهای گلوٹنین سنگین برابر ۷/۶ از ۱۰ شد که کیفیت نسبتاً خوبی را نشان داد. در این بررسی گندم‌های نان اینیا، مارون، سایسون، زاگرس، پاستور، تجن، N-75-15، C-79-16، N-75-11، C-79-18 با امتیاز کیفیت برابر ده به عنوان بهترین کیفیت و الموت، شهریار، هامون، C-73-20، C-78-2، C-75-5، C-78-18 با امتیاز چهار تا پنج به عنوان پائین‌ترین کیفیت بر اساس زیرواحدهای گلوٹنین سنگین تعیین گردیدند. با توجه به نقش مهم زیرواحدهای گلوٹنین سنگین به عنوان نشانگر ژنتیکی کیفیت آرد و پخت نان، نتایج تحقیق حاضر یک برآورد ژنتیکی از کیفیت گندم‌های نان در ایران در مقایسه با ارقام خارجی به دست داده است.

واژه‌های کلیدی: گندم نان، کیفیت، گلوٹنین سنگین، بیوتیپ آلی، SDS-PAGE.

مقدمه

می‌گذارند شامل ژن‌های کنترل‌کننده زیرواحدهای گلوٹنین سنگین (*Glu-1*)، گلوٹنین سبک (*Glu-3*)، گلیادین‌ها (*Gli-1,2,3*)، کمیت پروتئین‌ها (*Pro1, Pro2*) سختی دانه (*Ha, Pina-D1, Pinb-D1*)، نشاسته شامل پروتئین‌های مومی (*GBSS-Wx-1*) و محتوای آمیلوز و آمیلو پکتین و سایر ژن‌های بیوسنتز نشاسته، لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها، رنگ بذر و آنزیم‌های آلفا و بتا آمیلاز هستند (Morris, 1998).

کیفیت آرد و پخت نان در یک رقم گندم صفتی پیچیده و تحت تأثیر عوامل متعدد محیطی و ژنتیکی است. تعادل بین ترکیبات مختلف مانند نشاسته، پروتئین‌های گلوٹن، لیپیدها، آب و تداخل بین این ترکیبات تعیین‌کننده کیفیت یک رقم هستند (Johansson et al., 1998). ژن‌های کاملاً شناخته شده‌ای که تنوع آلی آن‌ها بر روی محصول نهائی گندم تأثیر

آللی در این مکان‌های ژنی، مسئول اختلافات ارقام مختلف از لحاظ خواص کیفی آرد و پخت نان می‌باشند (Mackie et al., 1996; Shewry et al., 1992).

با ایجاد سیستم ارزیابی کیفیت که بر اساس تعیین امتیاز برای هر یک از آلل‌ها در مکان‌های ژنی یاد شده ایجاد شده است، امکان تعیین ارزش کیفی هر رقم بر اساس ترکیبات آللی این زیرواحدها فراهم شده است (Payne et al., 1987). در این بررسی ۸۶ ژنوتیپ گندم نان موجود در برنامه‌های بهنژادی گندم کشور بر اساس تنوع آللی در مکان‌های ژنی *Glu-1* به عنوان یک شاخص مهم ژنتیکی از لحاظ امتیاز کیفیت بررسی شده و هم‌چنین مقایسه‌ای از کیفیت گندم‌های نان ایران با گندم‌های نان کشورهای مختلف به عمل آمده است.

مواد و روش‌ها

۸۶ گندم نان شامل لاین‌های پیشرفته، امید بخش، ارقام معرفی شده قدیمی و جدید و ارقام خارجی مورد استفاده در برنامه‌های بهنژادی گندم در اقلیم‌های مختلف ایران مورد مطالعه قرار گرفتند (جدول ۱).

گلوٲتین سنگین از نیم بذر بدون جنین هر یک از ارقام و لاین‌ها (از هر رقم چهار سنبله و از هر سنبله سه بذر) استخراج گردیدند. در مواردی که در درون لاین‌ها یا ارقام ناخالصی مشاهده گردید، تعداد بذور تا ۵۰ بذر افزایش داده شد. برای استخراج گلوٲتین‌ها، پس از خارج کردن گلیادین‌ها با دی‌متیل‌فورمامید (Dimethylformamide-DMF)، رسوب باقی‌مانده در یک میلی‌لیتر از بافر 0.125M Tris-HCl pH=6.8 شامل 10% SDS به صورت سوسپانسیون در آمده و پس از سانتریفوژ، گلوٲتین‌ها با استفاده از بافر استخراج (به نسبت حجمی ۵:۱ شامل بافر 0.125M Tris-HCl، 2.75% SDS، pH=6.8، 2% DTT، ۱۰٪ گلیسرول) گاما پیرونین) برای مدت یک ساعت در ۶۰ درجه سانتیگراد بن ماری، استخراج شدند. زیرواحدهای گلوٲتین سنگین با استفاده از روش SDS-PAGE

در بین عوامل مختلف، پروٲتین‌های ذخیرهٔ بذر از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد تفاوت در کیفیت ارقام گندم محسوب می‌گردند (Payne, 1987; Ahmad et al., 1998; Rodrigues-Quijano et al., 2001; Kasarda, 1989). این پروٲتین‌ها نقش اصلی را در ایجاد خواص رئولوژیکی و کیفیت آرد و پخت نان دارند. در واقع پروٲتین‌های ذخیرهٔ بذر مسئول خواص منحصر به فرد چسبندگی و قابلیت ارتجاع (Viscoelasticity) در خمیر آرد گندم هستند (Branlard et al., 2001). پروٲتین‌های ذخیرهٔ بذر خود شامل گروه‌های گلیادین، گلوٲتین سنگین و سبک هستند. در بین گروه‌های مختلف پروٲتین‌های ذخیرهٔ بذر، زیرواحدهای گلوٲتین سنگین در رابطه با کیفیت پخت نان اهمیت بیشتری دارند. اجزای این پروٲتین‌ها تعیین‌کنندهٔ قابلیت ارتجاع و حجم نان بوده و مسئول ۶۰-۴۷ درصد تنوع ژنتیکی ارقام از لحاظ کیفیت پخت نان هستند (Obukhova et al., 2003a; Obukhova et al., 2003b). لذا در برنامه‌های بهنژادی کیفیت گندم، از گلوٲتین سنگین به عنوان یک شاخص کلیدی و ارزشمند استفاده می‌شود.

زیرواحدهای گلوٲتین سنگین توسط ژن‌هایی که در مکان‌های ژنی *Glu-A1*، *Glu-B1* و *Glu-D1*، به ترتیب بر روی کروموزوم‌های 1A، 1B و 1D مستقر هستند، کنترل می‌شوند. هر مکان ژنی *Glu-1* دارای دو ژن با پیوستگی بسیار نزدیک (*Glu-1-1*، *Glu-1-2*) می‌باشد. ژن *Glu-1-1* زیرواحدهای نوع X (۸۸-۸۰ کیلو دالتون) و ژن *Glu-1-2* زیرواحدهای نوع Y (۷۳-۶۷ کیلو دالتون) از گلوٲتین سنگین را کنترل می‌کند. در گندم‌های زراعی مکان ژنی *Glu-A1* فقط زیرواحد X و *Glu-B1* هر دو زیرواحد X و Y یا فقط زیرواحد X و مکان ژنی *Glu-D1* هر دو زیرواحد نوع X و Y را کنترل می‌کند. بنابراین در گندم نان به طور معمول بین سه تا پنج زیرواحد مشاهده می‌شود (Payne, 1987). تنوع

جدول ۱- مشخصات ۸۶ گندم نان مورد بررسی

Table 1. Information on 86 bread wheats analysed

No.	Cultivar/line name	Region ^a	Pedigree/Origin	Year of	
				G.H. ^b	release
1	Ghermezbafighi	-	landrace-Yazd-Iran	-	very old
2	Sefidbafighi	-	landrace-Yazd-Iran	-	very old
3	Bolani	-	Landrace from Sistan and Balochestan-Zabol	S	very old
4	Sardari	4	Landrace-Kordestan-Iran	W	very old
5	Shahpasand	-	Landrace-Saveh-Iran	W	1942
6	Tabasi	3	Landrace-Tabas Iran	S	1951
7	Omid	4	Landrace No.1-29-11085, Saveh - Iran	W	1956
8	Sholeh	2	Landrace-Iraq	S	1957
9	Roshan	3	Landrace-Esfahan-Iran	F	1958
10	Adl-1	3	Shahpasand*Turkey	S	1962
11	Chenab	2	Introducton Cultivar, Pakistan	S	1964
12	Dayhim	3	Diadem*Italiai, Karaj-Iran	S	1968
13	Inia	1	Inia,Mexico	F	1968
14	Besostaya	4	Introducton Cultivar, Russia	W	1969
15	Khazar1	1	(P 416Q F3) *Nr69 LR64, Mexico	S	1973
16	Arvand	2	Rsh(Mt-Ky*My48)-Ahwaz-Iran	F	1972
17	Karaj1	3	(200H*Vfn)Rsh-Karaj-Iran	W	1973
18	Karaj2	3	(Fa*Th- Mt)Omid-Karaj-Iran	W	1973
19	Moghan1	1	(LR-N10B)*An3E-Mexico	S	1973
20	Karaj3	3	(Drc*Mxp/Son64 Tzpp-Y54)Nai60 Iran	W	1976
21	Bayat	2	(C271*Wte-Son64)*CIR	S	1978
22	Naz	1	(II-12300*LR64-8156 Nor67= Jupateco73-Mexico	S	1978
23	Alborz	1	Fn-Md*K117A/Cofn2(Son64-K1.Rend/Cno"S"LR642-Son64 CM-2182 Mexico	F	1978
24	Azadi	3	(4820*1-32 15409)*Mexp-Karaj-Iran	W	1979
25	Kaveh	1	Fta-P1-Mexico	F	1980
26	Bistoon	4	(Boghda=local bread wheatfrom Sari)x (9-36 592*Piave)-Kermanshah and?	W	1980
27	Sabalan	2	(908*FnA12)*1-32-4382	W	1981
28	Golestan	1	Alondra"S"-Mexico	S	1986
29	Ghods	3	Rsh/5/Wt/4/Nor1K 54*2//Fn/3/Ptr/6/Omid//Kal/Bb-Karaj-Iran	F	1989
30	Navid	4	(Kirkpinar 79)63-112/66-2*7C-Turkey-USA	F	1990
31	Falat	1	Kvz^buho"s"//Kal/Bb=Seri82 Cimmyt-Mexico	S	1990
32	Maroon	3	Avd*Pchu((28mt54A*N10-Brv21-1c/Kt54B)Nar59,1093))7c-Karaj-Gachsaran-Iran	S	1991
33	Hirmand	2	Byt/4/Jar//Cfn/Sr70/3/Jup"s"-Zabol-Iran	S	1991
34	Rasol	1	Veery"S"=Kvz/Buho"S"//Kal/Bb-Mexico	S	1992
35	MV-17	2	Introduction Cultivar-Hungary	W	1993
36	Alvand	3	1-27 6275/CF1770-Karaj-Iran	F	1995
37	Alamoot	4	KAVZ/TI71/3/MAYA"s"//Bb//INIA/4/Kj2/5/ANZA/3/Pi/Ndr//Hys-Karaj-Iran	W	1995
38	Mahdavi	3	TI/PCH/5/MT48/3/WT*//Nar59 TOTA63/4/MUS-Karaj-Iran-ICARDA	F	1995
39	Zarin	4	RK-15841-CIMMYT-ICARDA-Turkey	F	1995
40	Darab 2	2	Maya"s"/Nac-CIMMYT-Mexico	S	1995
41	Tajan	1	Bow"s"/NKt"s"(CM67428-GM-LR-5M-3R-LB-Y) CIMMYT-Mexico	S	1995
42	Atrak	1	Kauz"s"-CIMMYT-Mexico	S	1995
43	Niknejad	3	F13471/Crow"s"- ICARDA	S	1995
44	Star	2	Mexico (LFN/SDY//PVN"S")	S	1995
45	Vee/Nac	-	Introduction cultivar-Mexico-CIMMYT	S	-
46	Siosson	-	Introducton Cultivar, France	W	1996

Table1-Continued

ادامه جدول ۱

No.	Cultivar/line name	Region ^a	Pedigree/Origin	G.H. ^b	Year of release
47	Zagros		Tan"s"/Vee"s"/Opata- CIMMYT/ICARDA	S	-
48	Pastour		Fow/Seri//Bow"s"-CIMMYT	S	-
49	Gahar		Ndvg9144/ Kal/Bb/3/Yaco-CIMMYT/ICARDA	S	-
50	Gascogne	4	Introducton Cultivar, France	W	-
51	Gaspard	4	Introducton Cultivar, France	W	-
52	Sorkhtokhm	2	Landrace from Sistan and Balochestan-Zabol, Afghanistan	S	-
53	Kavir	2	Stfñ/ Kal/V534/ Jit716-Zabol-Iran	S	1997
54	Chamran	2	Attila,(CM85836-5Y- OM-OY-3M-OY)CIMMYT-Mexico	S	1997
55	Shiroodi	1	Attila,(CM85836-4Y-OM-OY-8M-OY-OPZ)-CIMMYT-Mexico	S	1997
56	Marvdasht	3	HD2172 Bloudan//Azadi-Zarghan-Iran	S	1999
57	Azar 2	4	Kvz/Tr71/3/Maya"s"/Bb/Inia/4/Sefid	W	1999
58	Pishtaz (M-75-7)	3	Alvand//Aldan"S"/Ias58 40072-48	S	2002
59	Shiraz (M-75 10)	3	Gv/D630//Ald"S"/3Azd-Zarghan	S	2002
60	Dez (S-75-20)	2	Kauze*2/Opata//Kauze CRG-737-1Y-01M- OY-CIMMYT	S	2002
61	Toos (C-73-5)	4	"Spn/Med//Cama/3/Nzr"-USA	F	2002
62	Shahriar (C-73 20)	4	Kvz/Ti71/3/Maya"s"/Bb/Inia/4/Karaj2/5/Anza/3/Pi/Nar//Hys2002	W	2002
63	Hamoon	2	Falat* Roshan-Zabol-Iran	S	2002
64	N-75-11	1	Siren 64609-6Y-3M-2Y-OM	S	-
65	N-75-15	1	Nai60/SH7//SYSWM70053-2Y-1Y-OY-2AP	S	-
66	N-75-16	1	Shanghia7//Hahn"S"*2/PrI"S"CM95119-3Y-OM-OY	S	-
67	N-75-20	1	Bloudan/Bb/7C*2//Y50/ Kal*3/CW84	S	-
68	M-734	3	HD2172 Bloudan//Azad	S	-
69	M-73 19	3	Sannine/ALD"s"/Arvand40 7134	S	-
70	S-75-11	2	Turaco/Chil	S	-
71	C-73 18	4	Tjb916.46/CB306//2*Mhb/3/Buc	W	-
72	C-755	4	OWL85256*30L-*0-*E0h	F	-
73	C-782	4	Omid//H7/4P839/3/Omid/Tdo15..	W	-
74	C-787	4	Bof13367//P101/3/Strampelli	W	-
75	C-78 11	4	OWL8452524-3H-O-HOH-ND/P101//Bb	W	-
76	C-78 14	4	55.174/P101//Maya/3/ Snb	W	-
77	C-78 18	4	Vata	W	-
78	C-794	4	1- 67 122/4/1-32 1317//II-5017/Y50/3/...	W	-
79	C-796	4	1- 60I //EMU"s"/TjB84/3/1-12628	W	-
80	C-79 15	4	362K2.111/6/NKT/5/TOB/CNO67 TOB/8156..	F	-
81	C-79 16	4	KINACI9795/327SWM12289-7M-OM..	W	-
82	C-79 18	4	CHAM4/TAM200/DEL483 (960185..	F	-
83	Shahi cross	4	Shahi/Kvz/5/Shahi/4/Kal/Bb/Cj"s"/Hork"s"	W	-
84	Alborz cross	4	Alborz/4/k62909/4/cno/k58 Tob/3/Wa	S	-
85	Mahooty	2	Landrace from Yazd-Iran	S	-
86	Moroco	-	Introduction cultivar-CIMMYT	S	-

a: Climatic zones in Iran: 1: Caspian sea shore region, 2: Southern region, 3: Moderate region, 4: Cold region.

b: Growth habit: S: Spring, W: Winter, F: Facultative

بر روی ژل ۱۰٪ (C=1.28) بر اساس روش پین و همکاران (Payne et al., 1981) مورد بررسی الکتروفورزی قرار گرفته و جداسازی شدند. جداسازی زیرواحدهای 2* و 2 در ارقام حاوی زیرواحدهای ۱۲+۲ با استفاده از روش SDS-PAGE در حضور اوره (Lafiandra et al., 4M urea-SDS-PAGE (1993) با استفاده از ژل اصلی ۸٪ (C=2.67) انجام گردید.

نامگذاری زیرواحدها و آل‌های کنترل‌کننده آن‌ها در هر مکان ژنی *Glu-1* در ژنوم‌های مختلف طبق روش پین و لاورنس (Payne and Lawrence, 1983) در کلیه ارقام انجام گردید. هم‌چنین از ارقام استاندارد گندم‌های نان و دوروم ارسالی از منابع مختلف (Chinese Spring, Marquis, Sappo, Duramba) در این بررسی استفاده گردید.

جدول ۲ ترکیبات زیرواحدهای گلوٲنین سنگین را در گندم‌های نان مورد بررسی نشان می‌دهد. سی و یک ترکیب مختلف آللی از زیرواحدهای گلوٲنین سنگین در مکان ژنی *Glu-1* در ۸۶ لاین و رقم مورد بررسی مشاهده شد. معمول‌ترین ترکیب از زیرواحدهای گلوٲنین سنگین در بین گندم‌های نان مورد مطالعه به ترتیب 2*، 7+8، 2+12 و بعد از آن ترکیب N/7+8/2+12 بودند که به ترتیب در ۱۷ و ۱۵ رقم مشاهده گردیدند.

امتیاز کیفیت آرد در هر رقم بر اساس روش امتیازبندی پین و همکاران (Payne et al., 1987) برای هر یک از زیرواحدهای گلوٲنین سنگین در ژنوم‌های مختلف تعیین گردید.

نتایج و بحث

زیرواحدهای گلوٲنین سنگین در بعضی از لاین‌ها و ارقام گندم نان مورد بررسی، جداسازی شده توسط روش SDS-PAGE بر روی ژل ۱۰٪ (T=30%, C=1.28) در شکل ۱ نشان داده شده است. در ارقام مورد مطالعه مطابق معمول در گندم‌های زراعی نان بین ۳ تا ۵ زیرواحد در کلیه ژنوم‌ها مشاهده شد. شکل ۲ تفکیک زیرواحدهای 2* را در ارقام و لاین‌های حاوی 2+12 با استفاده از روش SDS-PAGE با ژل ۸٪ (C=2.67) در حضور 4M urea در ژل ۸٪ نشان می‌دهد.

در ۸۶ گندم نان مورد بررسی ۱۴ آل مختلف در مکان‌های ژنی *Glu-A1*، *Glu-B1* و *Glu-D1* مشاهده شد. در مکان ژنی *Glu-A1* سه نوع زیرواحد 2*، 1 و نول تشخیص داده شد که به ترتیب فراوانی‌های معادل

از ۸۶ گندم مورد بررسی، ۷۴ رقم و لاین از نظر زیرواحدهای گلوٲنین سنگین یکنواختی نشان دادند. ۱۲ رقم و لاین (شعله، کرج ۳، ناز، کاوه، بیستون، قدس، رسول، مهدوی، زرین، کویر، توس، C-73-18) هتروژن بوده و بین دو تا سه ترکیب آللی مختلف از مکان ژنی *Glu-1* نشان دادند. ناخالصی در درون ارقام ممکن است به بیوتیپ‌های طبیعی و یا به اشتباه در نمونه‌برداری مربوط باشند. وجود بیوتیپ‌های پروٲینی درون ارقام معرفی شده گندم، امری طبیعی است که در ارقام کشورهای مختلف گزارش شده است (Appleyard et al., 1979; Metakovsky, 1990).

در ارقام سرخ تخم، کویر و بولانی، در ژنوم D یک جفت زیرواحد مشاهده شد که بر اساس شکل و توضیح ارائه شده در گزارش طاهر و لافیاندر (Tahir and Lafiandra, 1994) مشابه جفت زیرواحدهای 2***+12 است که در توده‌های بومی منطقه بلوچستان در پاکستان با فراوانی بسیار پائین (۲۶٪ در صد) گزارش شده است. بر اساس این گزارش

جدول ۲- زیرواحدهای گلوٲین‌های سنگین و امتیاز کیفیت پخت نان در ۸۶ گندم نان مورد بررسی

Table 2. HMW-G subunits and corresponding bread making quality scores of 86 bread wheats analysed

Order	Cultivar name	S.size	Glu-A1	Glu-B1	Glu-D1	Quality Score ²	Total
1	Ghermezbafeghi	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
2	Sefidbafeghi	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
3	Bolani	12	N	7+8	2***+12'	1+3+nd	Nd
4	Sardari	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
5	Shahpasand	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
6	Tabasi	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
7	Omid	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
8	SholehB1	6	N	20	2+12	1+1+2	4
8	Sholeh B2	3	N	7+8	2+12	1+3+2	6
8	Sholeh B3	3	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
9	Roshan	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
10	Adl-1	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
11	Chenab	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
12	Dayhim	12	1	7+8	2+12	3+3+2	8
13	Inia	12	1	7+8	5+10	3+3+4	10
14	Bezostaya	12	2*	7+9	5+10	3+2+4	9
15	Khazar1	12	2*	13+16	2+12	3+3+2	8
16	Arvand	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
17	Karaj1	12	N	7+9	5+10	1+2+4	7
18	Karaj2	12	N	7+8	5+10	1+3+4	8
19	Moghah	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
20	Karaj3 B1	6	2*	20	2+12	3+3+2	8
22	Karaj3 B2	6	2*	7+8	2+12	3+1+2	7
21	Bayat	24	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
22	Naz B1	6	N	7+8	2+12	1+3+2	6
22	Naz B2	6	1	13+16	5+10	3+3+4	10
23	Alborz	12	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
24	Azadi	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
25	Kaveh B1	9	N	7+8	2+12	1+3+2	6
25	Kaveh B2	3	2*	17+18	5+10	3+3+4	10
26	Bistoon B1	9	N	7+8	2+12	1+3+2	6
26	Bistoon B2	3	1	17+18	2+12	3+3+2	8
27	Sabalan	12	N	14+15	5+10	1+2+4	7
28	Golestan	12	N	17+18	5+10	1+3+4	8
29	Ghods B1	29	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
29	Ghods B2	9	N	7+8	5+10	1+3+4	8
29	Ghods B3	12	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
30	Navid	12	2*	7	5+10	3+1+4	8
31	Falat	12	1	7+9	5+10	3+2+4	9
32	Maroon	12	1	7+8	5+10	3+3+4	10
33	Hirmand	12	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
34	Rasol B1	6	N	7+9	5+10	1+2+4	7
34	Rasol B2	3	1	7+8	2+12	3+3+2	8
34	Rasol B3	3	2*	7+9	5+10	3+2+4	9
35	MV-17	12	2*	7+9	2+12	3+2+2	7
36	Alvand	12	1	7+8	2+12	3+3+2	8
37	Alamoot	12	N	7+9	2+12	1+2+2	5
38	Mahdavi	25	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
38	Mahdavi	22	1	17+18	2+12	3+3+2	8
39	Zarin B1	9	1	17+18	2+12	3+3+2	8

Table 2-Continued

ادامه جدول ۲

Order	Cultivar name	S.size	Glu-A1	Glu-B1	Glu-D1	Quality score ²	Total
39	Zarin B2	3	1	7+8	2+12	3+3+2	8
40	Darab2	12	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
41	Tajan	12	2*	13+16	5+10	3+3+4	10
42	Atrak	12	2*	7+9	5+10	3+2+4	9
43	Niknejad	12	2*	7+9	5+10	3+2+4	9
44	Star	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
45	Vee/Nac	12	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
46	Siosson	12	2*	7+8	5+10	3+3+4	10
47	Zagros	12	2*	17+18	5+10	3+3+4	10
48	Pastour	12	1	17+18	5+10	3+3+4	10
49	Gahar	12	2*	7	5+10	3+1+4	8
50	Gascogne	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
51	Gaspard	12	N	6+8	5+10	1+1+4	6
52	Sorkhtokhm	12	N	7+8	2***+12'	1+3+nd	nd
53	KavirB1	9	2*	17+18	2***+12'	3+3+nd	nd
53	KavirB2	3	N	17+18	2***+12'	1+3+nd	nd
54	Chamran	12	2*	7	5+10	3+1+4	8
55	Shiroodi	12	1	7	5+10	3+1+4	8
56	Marvdasht	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
57	Azar 2	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
58	Pishtaz (M-757)	15	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
59	Shiraz (M-7510)	15	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
60	Dez (S-75-20)	12	2*	17+18	2+12	3+3+2	8
61	Toos:C-73-5	9	2*	7	2+12	3+1+2	6
61	Toos (C-73-5)	3	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
62	Shahriar (C-73-20)	12	N	7+9	2+12	1+2+2	5
63	Hamoon (Falat cross)	12	N	7+9	2+12	1+2+2	5
64	N-75-11	12	2*	17+18	5+10	3+3+4	10
65	N-75-15	12	2*	13+16	5+10	3+3+4	10
66	N-75-16	12	N	7+9	5+10	1+2+4	7
67	N-75-20	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
68	M-73-4	15	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
69	M-73-19	15	N	7+8	2+12	1+3+2	6
70	M-75-1	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8
71	C-73-18B1	9	2*	7	5+10	3+1+4	8
71	C-73-18B2	3	N	6+8	2+12	1+1+2	4
72	C-75-5	12	N	7+9	2+12	1+2+2	5
73	C-78-2	12	N	7+9	2+12	1+2+2	5
74	C-78-7	12	2*	7+9	5+10	3+2+4	9
75	C-78-11	12	N	7+8	5+10	1+3+4	8
76	C-78-14	11	1	7+9	5+10	3+2+4	9
77	C-78-18	12	N	20	2+12	1+1+2	4
78	C-79-4	12	2*	7+9	5+10	3+2+4	9
79	C-79-6	12	1	7+8	2+12	3+3+2	8
80	C-79-15	12	1	7+9	5+10	3+2+4	9
81	C-79-16	12	1	7+8	5+10	3+3+4	10
82	C-79-18	12	2*	7+8	5+10	3+3+4	10
83	Shahi (Cross)	12	N	17+18	2+12	1+3+2	8
84	Alborz (cross)	12	1	7+8	2+12	3+3+2	8
85	Mahooty	12	N	7+8	2+12	1+3+2	6
86	Moroco	12	2*	7+8	2+12	3+3+2	8


1: B1, B2, B3: Biotypes 1-3 in heterogeneous cultivars. 2: Quality scores assigned for HMW-G subunits according to Payne et al., 1987, nd: not identified.

حضور جفت زیرواحد ۵+۱۰ انتخاب شده و فراوانی برابر ۹۵٪ در مقابل ۵٪ زیرواحد ۲+۱۲ در آن‌ها گزارش شده است (Bushuk, 1997). هم‌چنین ۸۵٪ گندم‌های امریکا شامل زیرواحدهای ۵+۱۰ هستند. در اوکراین، روسیه و قزاقستان وضعیت متفاوت بوده و فراوانی زیرواحدهای ۵+۱۰ بین ۴۶ تا ۵۵٪ و ۲+۱۲ بین ۴۱ تا ۵۴ درصد گزارش شده است. در کشورهای اخیر حدود ۵۳-۵۰٪ ارقامی که به عنوان کیفیت خوب شناخته شده‌اند، جفت زیرواحد ۲+۱۲ نشان داده‌اند (Rabinovich, 1998). بر اساس نظر بعضی از دانشمندان روسی واریته‌های مناطق خشک بیشتر حاوی زیرواحدهای ۲+۱۲ و مناطق مرطوب اساساً حاوی زیرواحدهای ۵+۱۰ هستند (Rabinovich, 1998). در این رابطه بعضی از محققین وجود قابلیت سازگاری آلل‌های خاص پروتئین‌های ذخیره بذر را با شرایط اکولوژیک و جغرافیائی معینی تأیید نموده‌اند (Ciaffi et al., 1993). چنین ارتباطی می‌تواند به دلایل متعددی از جمله مهاجرت، دریافت ژنتیکی، یا پیوستگی بین مکان‌های ژنی پروتئین‌های ذخیره بذر و مکان‌های ژنی کنترل‌کننده قابلیت سازگاری ایجاد شده باشد. در عین حال هنوز یک دلیل قوی و مستند بر تائید قابلیت سازگاری تنوع آللی پروتئین‌های ذخیره بذر با شرایط محیطی در دست نمی‌باشد (Lafiandra et al., 1993).

در این بررسی جفت زیرواحد ۲+۱۲ فراوانی بالاتری (۶۰/۰۶٪) از جفت زیرواحد ۵+۱۰ (۳۶/۴۵٪) نشان داد. در مکان ژنی *Glu-A1*، زیرواحدهای ۲* و ۱ (با اثر مثبت بر روی کیفیت)، مجموعاً فراوانی برابر ۶۴٪ و زیرواحد نول (با اثر منفی بر روی کیفیت)، فراوانی ۳۶٪ نشان دادند. در مقایسه در گزارشی از یک بررسی روی ۴۰۰ گندم نان از کشورهای مختلف، زیرواحد نول در کانادا، امریکا و پاکستان حضور نداشته و در کشورهای استرالیا، اوکراین، روسیه، قزاقستان فراوانی ۹٪ یا کمتر را نشان داده است (Rabinovich, 1998). در برنامه‌های بهنژادی گندم ایران، زیرواحدهای گلوپتین سنگین


و در این ارقام زیر واحد Dx (2***) تحرکی کندتر از 2 و کمی سریع‌تر از زیرواحد ۱ در ژنوم A دارد. زیرواحد Dy در رقم کویر، سرخ تخم و بولانی در روش SDS-PAGE تحرکی کمی کندتر از زیرواحد Dx10 نشان داد. طاهر و لافیاندرا (۱۹۹۴) با تجزیه این زیرواحد توسط روش RP-HPLC این زیرواحد را با وجود تحرک نزدیک به زیرواحد DY10 در روش SDS-PAGE، واریته‌ای از Dx12 دانسته و آن را DY12 اطلاق کردند. نکته قابل توجه در مورد این جفت زیرواحدهای نادر این است که در بررسی ۶۰ اجتماع از توده‌های بومی ایران ۴۱٪ از اجتماعات همین جفت آللی را نشان دادند (بحرائی و همکاران، ۱۳۷۹). منشاء رقم کویر نیز از سرخ تخم و سرخ تخم و بولانی خود از توده‌های بومی مناطق سیستان و بلوچستان ایران هستند. بنابراین این جفت آللی با وجود کمیاب بودن در دنیا، در ایران از فراوانی بسیار بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی بلوچستان پاکستان و ایران، توده‌های بومی این جفت زیرواحدها در پاکستان نیز از ایران منشاء گرفته باشند. اگرچه این ارقام از لحاظ کیفیت پخت نان سنتی به عنوان ارقام خوب در مناطق سیستان و بلوچستان شناخته شده‌اند. تا کنون یک بررسی دقیق علمی برای تعیین امتیاز کیفیت این جفت زیرواحد و مقایسه آن‌ها با سایر زیرواحدهای ژنوم D انجام نشده است. با توجه به فراوانی این زیرواحدها در ایران و کمیاب بودن آن‌ها در سایر کشورها نیاز به بررسی در این زمینه اهمیت زیادی خواهد داشت.

نقش مهم‌تر زیرواحدهایی که توسط مکان ژنی مستقر بر روی ژنوم D در تعیین کیفیت پخت نان گزارش شده است (Rodrigues-Quijano et al., 2001). بر اساس اعتقاد بسیاری از دانشمندان، پخت خوب نان به میزان زیادی به حضور جفت زیرواحد ۵+۱۰ در مکان ژنی *Glu-D1* بستگی دارد (Bushuk, 1997; Rabinovich, 1998). در کانادا کلیه لاین‌های بهنژادی بر اساس



شکل ۱- جداسازی الکتروفورزی زیرواحدهای گلوٹنین سنگین با روش SDS-PAGE روی ژل ۱۰٪ در بعضی از گندم‌های نان تحت کشت ایران. ۱ و ۵ به ترتیب استانداردهای گندم نان Chinese Spring و Cheynne، ۲- بولانی ۳- کویر ۴- سرخ تخم ۶- گلستان ۷- هیرمند ۸- نوید ۹- گاسپارد ۱۰- تاجن ۱۱- سبلان ۱۲- C-78-18

Fig. 1. 10% SDS PAGE separation of HMW-G subunits in some promising bread wheat lines and cultivars grown in Iran. 1 and 5 standard cultivars of bread wheats, Chinese Spring and Cheynne respectively, 2: Bolani 3- Kavir 4- Sorkntokhm 6- Golestan 7- Hirmand 8- Navid 9- Gaspard 10- Tajan 11- Sabalan 12- C-78-18



شکل ۲- جداسازی زیرواحدهای گلوٹنین سنگین در بعضی گندم‌های مورد بررسی، با روش SDS-PAGE در حضور اوره روی ژل ۸٪ ارقام استاندارد عبارتند از: ۱، ۵ و ۱۳: Cheynne، ۹، Chinese Spring، ۱۲: Marquis. ارقام شامل: ۲- قرمز بافقی، ۳- سرداری، ۴- طبسی، ۶- کویر ۷- سرخ تخم ۸- بولانی ۱۰- C-78-18، ۱۱- C-75-5

Fig. 2. 4 M urea SDS-PAGE separation of HMW-GS of some cultivars analysed. Standard cultivars are: 1, 5, 13: Cheynne, 9: Chinese Spring, 12: Marquis. Cultivars are: 2- Ghermezbafghi, 3- Sardari, 4- Tabasi, 6- Kavir, 7- Shorktokhm, 8- Bolani, 10- C-78-18, 11- C-75-5

(۷/۳۰) و میانگین کلی برابر ۷/۶ از ۱۰، کیفیت نسبتاً خوبی را نشان داد. به دلیل عدم وجود یک روش استاندارد برای پخت نان‌های سنتی در ایران (کاوه، ۱۳۷۲)، کلیه بررسی‌هایی که در زمینه کیفیت آرد و پخت نان در ایران انجام می‌گیرد، صرفاً امکان مقایسه گندم‌های نان ایرانی را با ارقام خارجی و برای پخت نان‌های حجمی ایجاد می‌نماید. در عین حال با توجه به این که امروزه بر اساس تحقیقات وسیع دانشمندان کشورهای مختلف نقش هر یک از اجزاء گلوٹنین سنگین در کیفیت آرد و پخت نان مشخص شده است، انتخاب ارقام گندم نان بر اساس امتیاز زیرواحدهای گلوٹنین سنگین در برنامه‌های بهنژادی کیفیت گندم، راه مناسبی برای افزایش کیفیت گندم‌های نان ایران خواهد بود.

تشکر و قدردانی

خانم نادیا بقائی شرکت فعالی در بخش آزمایشگاهی این تحقیق داشتند. بدینوسیله از زحمات ایشان قدردانی می‌شود.

در سال‌های اخیر به عنوان شاخص کیفیت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین یکی از دلایل مهم فراوانی بالاتر زیرواحدهای نول و ۱۲+۲ در ارقام ایرانی در مقایسه با سایر کشورها، عدم کاربرد این پروتئین‌ها به عنوان معیار انتخاب در برنامه‌های بهنژادی کیفیت گندم می‌باشد.

جدول ۲ ارزش کیفیت ارقام و لاین‌های گندم نان مورد مطالعه را بر اساس روش رتبه‌بندی پین و همکاران (۱۹۸۷) نشان می‌دهد. در این بررسی گندم‌های نان اینیا، مارون، سایسون، زاگرس، پاستور، تجن، N-75-15، C-79-16، N-75-11، C-79-18 با امتیاز کیفیت برابر ده به عنوان بهترین کیفیت و الموت، شهریار، هامون، C-73-20، C-75-5، C-78-2، C-78-18 با امتیاز چهار تا پنج به عنوان پائین‌ترین کیفیت بر اساس زیرواحدهای گلوٹنین سنگین تعیین گردیدند. میانگین امتیاز کیفیت گندم‌های نان زیر کشت ایران بر اساس زیرواحدهای گلوٹنین سنگین، در اقلیم شمال (۸/۵۶)، معتدل (۷/۳۸) جنوب (۷/۳۳) و سرد

References

- بحرایی، ص، ب. پیرایش فر، ر. جوکار و ب. تجاسب. ۱۳۷۹. بررسی رابطه پروتئین‌های ذخیره بذر با کیفیت آرد، و تنوع ژنتیکی در توده‌های بومی گندم‌های نان ایرانی. گزارش نهایی طرح، شماره ۷۵۲۳۸-۱۲-۱۰۷، کد ۷۹/۳۵۸، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. ۱۴۸ص.
- کاوه، ح. ۱۳۷۲. کیفیت محصولات زراعی. مجموعه مقالات کلیدی. اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. کرج. ۱۸-۱۵ شهریور ۱۳۷۲. صفحه ۲۳۴-۲۲۳.
- Ahmad, M., W. B. Griffin and K. H. Sutton. 1998. Quantification of glutenin and gliadin as a measure of bread baking quality by size exclusion and reverse phase HPLC. In: A.E. Slinkard (eds.), Proc. 9th Intl. Wheat Genetics Symp. Vol 4: 124-126.
- Appleyard, D. B., J. McCausland and C. W. Wrigley 1979. Checking the identity and origin of off-types in propagation of pedigreed wheat seed. Seed Science and Technology 7: 459-466.
- Branlard, G., M. Dardevet, R. Saccomano, F. Lagoutte and J. Gourdon. 2001 Genetic diversity of seed storage proteins and bread wheat quality. 2001. In: Wheat in a Global Environment, Z. Bedo and L. Lang (eds.), Kluwer Academic publishers. Printed in the Netherlands. 157-169.

- Bushuk, W. 1997. Wheat breeding for end product use. In: Wheat: Prospects for global improvements. Developments in Plant Breeding. Vol.6. pp 203-211. The Netherland: Kluwer Academic Publishers.
- Ciaffi, M., D. Lafiandra, E. Porceddu and S. Benedetti. 1993. Storage protein variation in wild emmer wheat (*Triticum turgidum* ssp. *dicoccoides*) from Jordan and Turkey. I-Electrophoretic characterization of genotypes. Theor. Appl. Genet. **86**: 474-480.
- Johansson, E., G., Svensson and W. K. Heneen. 1998. Genotype and environmental effects on factors influencing bread-making quality. In: A. E. Slinkard (ed.), Proc. 9th Intl. Wheat Genetics Symp. Vol. 4. pp 175-177.
- Kasarda, D. D. 1989 Wheat is unique In : Pomeranz Y. (ed.), American Association of Cereal Chemists, St Paul. pp 277-302.
- Lafiandra, D., R. D'Ovidio, E. Porceddu, B. Margiotta and G. Colaprico. 1993. New data supporting High M_r glutenin subunit 5 as the determinant of quality differences among the pairs 5+10vs. 2+12. J. of Cereal Science **18**: 197-205.
- Mackie, A. M., E. S. Lagudah, P. J. Sharp and D. Lafiandra. 1996. Molecular and biochemical composition of HMW glutenin subunits from *T. tauschii* and the D genome of hexaploid wheat. J. of Cereal Science **23**: 213-225.
- Metakovsky, E. V. 1990. The value of gliadin biotypes in commercial cultivars of wheat, In: W. Bushuk and R. Kachuk (eds.). Gluten proteins American Association of Cereal Chemists, pp 569-580.
- Morris, C. F. 1998. Genetic determinants of wheat grain quality. In: A.E. Slinkard (ed.), Proc. 9th Intl. Wheat Genetics Symp., Proc. 9th Intl. Vol. 1. pp 245-253.
- Obukhova, L., E. Budashkina, M. Ermakova. 2003a. Cross 21 as a potential donor of high bread-making quality of wheat. The 1st Central Asian Wheat Conference, Almaty, June 10-13, 2003. pp 540.
- Obukhova, L., M. Ermakova and I. Chernyi. 2003b. Study of the relationships between the Glu-1 scores and bread-making quality lines of CV. Irtyshanka-10. The 1st Central Asian Wheat Conference, Almaty, June 10-13, 2003. pp 541.
- Payne, P. I. 1987. Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation on bread-making quality. Ann. Rev. Plant Physiol. **38**: 141-153.
- Payne, P.I. and G. J. Lawrence. 1983. Catalogue of alleles for the complex loci, *Glu-A1*, *Glu-D1* which code for HMW subunits of glutenin hexaploid wheat, Cereal Res. Commun **11**: 29-35.
- Payne, P. I., L. M. Holt and C.N. Law. 1981. Structural and genetic studies on the high molecular weight subunits of wheat glutenin. I- allelic variation in subunits among varieties of wheat (*Triticum aestivum*), Theor. Appl. Genet. **60**: 229-236.

- Payne, P. I., M. A. Nightingale, A. F. Krattiger and L. M., Holt. 1987. The relation between HMW glutenin subunits composition and bread making quality of British grown wheat varieties. *J. Sci. Food Agri.* **40**: 51-65.
- Rabinovich, S. V. 1998. Composition of high molecular weight glutenin subunits connected with good quality in spring wheats and its distribution in different countries of world In: A. E. Slinkard (ed.), Proc. 9th Intl. Wheat Genetics Symp. Proc. 9th Intl. Vol. 4. pp 254-256.
- Rodrigues-Quijano M., M. T. Nieto-Taladriz, M. Gomez and J. M. Carrillo, 2001. Quality influence of some HMW-glutenin subunits X and Y type coded by *Glu-D1* locus In: Z. Bedo (ed.) 6th International Wheat Conference, Abstract of oral and poster presentation, 5-9 June, Budapest, Hungary, Organized by Agricultural Research Institute of Hungarian Academy of Science, Martonvasar. pp 26.
- Shewry, P. R., N. G. Halford and A. S. Tatham. 1992. Critical Review Article: High molecular weight subunits of wheat glutenin. *J. of Cereal Science* **15**: 105-120.
- Tahir, M., D. Lafiandra. 1994. Assessment of genetic variability in hexaploid wheat landraces of Pakistan based on polymorphism for HMW-glutenin subunits, In: Biochemical evaluation of plant genetic resources, Final technical report, Dept. of Agrobiolgy and Agrobiochemistry, University of Tuscia, Viterbo, Italy. pp 33-44.