

مجله علوم زراعی ایران
جلد ششم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۳

مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم (*Triticum aestivum L.*)
در شرایط تنش خشکی

Genetic study of wheat (*Triticum aestivum L.*) root characteristics
under drought stress condition

جعفر احمدی^۱، عباسعلی زالی^۲، بهمن یزدی صمدی^۳، علیرضا طالعی^۴ و محمدرضا قنادها^۵
و صدیقه فابریکی اورنگ^۶

چکیده

احمدی، جعفر. ع. زالی، ب. یزدی صمدی، ع. طالعی، م.ر. قنادها. و. ص. فابریکی اورنگ، ۱۳۸۳. مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم در ارتباط با تحمل به خشکی، علوم زراعی ایران. جلد ۶، شماره ۴، صفحه ۴۳۷-۴۲۶.

برای مطالعه اثر ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) و نحوه عمل ژن‌ها از لحاظ صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط تنش خشکی در ۶ لاین و دو رقم گندم نان یک طرح تلاقي دایآل ۸×۸ یک طرفه در سال ۱۳۸۱ در گلخانه انجام گرفت. مواد گیاهی (والدین و هیبریدهای F_1) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس ساده و دایآل نشان داد که برای هر دو صفت وزن خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به ساقه در هر دو شرایط عمومی و تنش رطوبتی بین ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد و با توجه به نسبت واریانس GCA به SCA، نقش بیشتر اثر افزایشی ژن‌ها در کنترل صفت وزن خشک ریشه مشاهده شد. برای صفت وزن خشک ریشه در هر دو شرایط عمومی و تنش رطوبتی دو والد ۲۰۰۷-۲ و شاهپسند دارای بالاترین اثر ترکیب‌پذیری عمومی بوده و به عنوان بهترین ترکیب‌شونده‌های عمومی شناسائی شدند. از نظر صفت نسبت وزن خشک ریشه به ساقه در هر دو شرایط والد ۵۸۰/۶ دارای بالاترین اثر ترکیب‌پذیری عمومی بود و به عنوان بهترین ترکیب‌شونده عمومی از نظر این صفت شناسایی شد. در شرایط رطوبت معمول اثر ژنی فوق غالیت در تظاهر هر دو صفت و در شرایط تنش رطوبتی اثر ژنی غالیت نسبی برای وزن خشک ریشه و غالیت کامل برای نسبت ریشه به ساقه ملاحظه شد. همچنین در شرایط تنش خشکی برای دو صفت وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه لاین ۵۵۹۳/۲ دارای حد اکثر تعداد ژن‌های غالب و لاین ۵۲۴-۴ دارای حد اکثر ژن‌های مغلوب در کنترل ژنتیکی این صفت بودند.

واژه‌های کلیدی: ریشه گندم، ترکیب‌پذیری، عمل ژن، تحمل، تنش خشکی.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۳/۴/۱۳

۱- استادیار دانشگاه ایلام

۲ و ۳- استاد دانشگاه تهران

۴ و ۵- دانشجوی کارشناسی دانشگاه ایلام

مقدمه

گندم مهمترین محصول کشاورزی جهان است. در مناطق نیمه خشک، بخش قابل توجهی از اراضی کشت گندم به صورت دیم است. در این مناطق میزان بارندگی حدتاً کم و توزیع سالیانه آن نامنظم است و بنابراین تنفس خشکی مهمترین محدودیت در تولید آن است. از این رو اصلاح گندم برای تحمل به خشکی در این مناطق بسیار ضروری است. برای انجام این کار پس از انتخاب روش اصلاحی مطلوب، استفاده از معیارهای گزینشی و صفات مناسب در شناسایی ژنتیپ‌های متحمل یک ضرورت اساسی است.

مطالعات چندانی برای درک ماهیت و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه برای بهبود پس از رفع تنفس شدید، انجام نشده است، آرودیو (Arraudeau, 1989) وجود ریشه‌های سطحی و کم عمق را یکی از راه کارهای بهبود می‌داند، زیرا در شرایط نزول بارندگی پس از تنفس خشکی موقت، این ریشه‌ها موجب جذب سریع آب شده و بهبود گیاه کمک می‌کنند. ضمناً وی معتقد است که فوق حساسیت (Hypersensitivity) برخی از بافت‌های گیاهی سبب می‌شود که به محض این که کمبود آب اتفاق می‌افتد، این بافت‌ها عکس العمل نشان داده و وارد یک مرحله خواب می‌گردند و بلاfacile پس از این که مجدداً آب در دسترس آن‌ها قرار گرفت، فعالیت رشدی خود را از سر می‌گیرند. توپستین و همکاران (Tupitsyn et al., 1986) به این نتیجه رسیدند که ارقام گندم متحمل به خشکی ریشه طویل‌تر و حجم ریشه بیشتری نسبت به دیگر ارقام دارند. بسیاری از گونه‌های گیاهی با افزایش سهم مواد فتوستراتی اختصاص یافته به رشد ریشه و بنابراین افزایش نسبت ریشه به اندام‌های هوایی و بهره‌گیری بیشتر از آب قبل دسترس به کمبود رطوبت پاسخ می‌دهند (کافی و مهدوی، ۱۳۷۹). یک استفاده کارآمدتر از رطوبت خاک، مخصوصاً توسط گیاهان یک ساله، توسط سیستم ریشه این است که از نظر مرغولوژی انعطاف‌پذیر باشد و

فقط هنگامی که به وسیله خشکی تهدید شدند عمیق‌تر شوند. برای مثال هرد (Hurd, 1976) دریافت که مؤثرترین رقم گندم برای شرایط نیمه‌خشک رقمی است که یک توده ریشه بزرگ در افق‌های ۳۰ سانتی‌متری سطح خاک داشته باشد و در صورت نیاز توانایی گسترش ریشه برای ورود به اعمق بیشتر را هم داشته باشد.

اصلاح غیرمستقیم برای مقاومت به خشکی، یک روش عملده است که در گذشته و حال مورد استفاده بوده است. در این روش مواد ژنتیکی مستقیماً به لحاظ مقاومت به خشکی آزمون نمی‌شوند، بلکه این مواد طی سال‌های زیاد و در چندین نقطه ارزیابی می‌گردند، تا در این ارزیابی‌ها در معرض تنفس خشکی و سایر تنفس‌های محیطی قرار گیرند. ژنتیپ‌هایی که در این شرایط خوب عمل (عملکرد بالا) می‌کنند، دارای صفات مطلوبی خواهند بود که آن‌ها را قادر می‌سازد در مراحل مختلف نمو از تنفس خشکی فرار کرده یا آن را تحمل کنند. بسیاری از خصوصیات گیاهی ممکن است باعث بهبود رشد و افزایش عملکرد گیاه زراعی در شرایط تنفس آب شوند که از جمله می‌توان سازگاری فنرولوژیکی، انعطاف‌پذیری نمو، تنظیم اسمزی، زاویه برگ، سیستم ریشه‌ای کارآمد، قدرت رویش اولیه، حفظ سطح برگ، افزایش انعکاس نور از برگ و غیره را نام برد. این صفات طی سال‌ها آزمایش و ارزیابی‌های مزروعه‌ای ژنتیپ‌های مختلف، بخشی از ریخته ژنتیکی نتاج شده‌اند. سایر صفات نظری شاخص برداشت بالا و غیره که در بهبود عملکرد در شرایط دیم و آبیاری مفید هستند، در برنامه‌های بهترادی برای گیاهان دیم شرایط مناطق نیمه‌خشک مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Blum, 1988).

انتخاب والدین مناسب یکی از موارد مهم در اصلاح گیاهان و یکی از رموز اساسی موفقیت بهترادگران است. در این رابطه سوالی که برای این اصلاحگر مطرح است این است که صفت یا صفات مورد نظر تا چه اندازه

از ارقام غیر مقاوم است. این آزمایش مرفولوژیکی در طی مراحل ابتدائی رشد (پنجه زنی) تا مراحل انتهائی رشد زایشی انجام شده است. تفاوت بین واریته‌ها از نظر نسبت ریشه به ساقه (R/S) بسیار معنی دار بود و این روال در مراحل ابتدا و انتهای رشد و نمو ثابت باقی مانده است. یعنی ارقامی که در مرحله پنجه زدن ریشه بیشتری ایجاد نمودند، این نسبت را در مرحله پر شدن دانه‌ها نیز حفظ کرده‌اند.

معدلت (۱۳۶۰)، مقاومت به خشکی ۳۵ رقم از گندم‌های اصلاح شده را طی سه آزمایش مورد تحقیق قرار داد و سه هفته بعد از تاریخ کشت، خصوصیات وزن ریشه (R)، وزن قسمت هوایی (S) و نسبت بین آن‌ها (R/S) را مورد بررسی قرار داد و دریافت که تفاوت وزن هوایی و وزن ریشه برای تمام ارقام معنی دار است و بین صفات مورد نظر و شاخص مقاومت به خشکی رابطه‌ای وجود ندارد. رضایی (۱۳۶۹)، در آزمایش دای آآل ۸×۸ گندم به منظور بررسی تعداد، طول و وزن خشک ریشه در دو مرحله چهار برگی و به سنبله رفتن به نتایج زیر دست یافت. میانگین مربعات SCA و GCA برای اثر صفات معنی دار بود، برای کلیه صفات به جز طول ریشه، واریانس GCA دو برابر SCA بود. بنابراین استنباط گردید که صفات مورد بررسی توسط اثر افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها به همراه ژن‌هایی با غالیت جزئی کنترل می‌گردد و نتیجه گیری نهایی این که اثر افزایشی ژن‌ها و برآوردهای بالای وراثت‌پذیری میان بازده بالای انتخاب برای وزن خشک ریشه در مرحله به سنبله رفتن است. هورد (1976) از تلاقي یک رقم گندم دوروم که دارای ریشه گسترده‌ای بود، با یک رقم دیگر با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری موفق به انتخاب ژنوتیپ پرمحصول و با ریشه گسترده و مقاوم به خشکی گردید.

مواد و روش‌ها

۶ لاین و دو رقم گندم زمستانه (جدول ۱)، به صورت نیمه دای آآل با هم تلاقي داده شدند و ۲۸ هیبرید

نسبت به گرینش پاسخ می‌دادند در بسیاری از موارد برای پیدا کردن جواب، اولین راه توجه به خصوصیات ظاهری والدین است، راه دوم توجه به خصوصیات کمی و کیفی والدین از نظر صفت مورد نظر است. دارا بودن حد بالاتی از یک صفت نشان‌دهنده یک والد مناسب نیست و لزوماً منجر به موفقیت نمی‌شود، زیرا صفات ممکن است وراثت‌پذیری‌های متفاوتی داشته باشند. راه سوم، شناخت نحوه کنترل ژنتیکی صفت و از همه مهم‌تر قدرت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی والدین است که برای بهترادگر مهم بوده و نقش به سزانی در انتخاب والدین مناسب خواهد داشت. همچنین سهم اجزای واریانس ژنتیکی از کل آن نیز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. سینک و ویرمانی (Singh and Virmani, 1973) عکس العمل ریشه‌های گندم مکزیکی و گندم‌های ضعیف را در خاک‌هایی که از نظر رژیم رطوبتی متفاوت بود مطالعه نمودند و نتیجه گرفتند که گندم‌های محلی نسبت به گندم‌های اصلاح شده در مقابل تغییرات رطوبت مقاومت بهتری نشان می‌دهند. که این امر مربوط به گسترش زیاد ریشه و تمرکز آن در اعمق خاک است. دان چوا (Dencheva, 1973) اثر آبیاری و گسترش سیستم ریشه‌ای در سه تلاقي گندم را در آزمایش‌های دیم و آبی بررسی نمود و همبستگی مثبتی رابین رشد و گسترش ریشه و میزان عملکرد به دست آورد. سیمونیس (Simonis, 1952) نشان داد که افزایش نسبت ریشه به ساقه ممکن است منجر به افزایش بیشتر وزن خشک گیاه در شرایط خشک گردد. کیلیام و لمی (به نقل از سرمندیا و کوچکی، ۱۳۷۱) از این روش برای سنجش مقاومت به خشکی استفاده نموده و عقیده دارند که نسبت ریشه به ساقه یکی از راه‌های بسیار مؤثر در سازگاری گیاهان در شرایط خشکی است. سانداهو و لود (Sandahu and Laude, 1985) با مطالعه نسبت وزن ریشه به شاخ و برگ (ساقه) در گندم نان نشان دادند که در واریته‌هایی که نسبت به گرما و خشکی مقاوم‌ند، میزان وزن خشک ریشه به وزن شاخ و برگ (ساقه) بوته بیشتر

تکرار شاهد، آبیاری کامل و مساوی برای تمام گلدانها با پیمانه به اندازه‌ای انجام می‌گرفت که هیچ مقدار آبی از ته گلدان خارج نشود و آب از دست رفته تنها از طریق تبخیر با تعرق باشد. ولی برای گلدان‌های دو تکرار تنش، بسته به درجه حرارت گلخانه آبیاری تنها به اندازه حدود یک سوم مقدار آب مصرفی در هر بار آبیاری دو تکرار معمولی انجام می‌گرفت تا گیاهان از بین نرفته و با تنش آبی موافق شوند. در هر بار آبیاری مقادیر آب مصرفی برای گلدان‌های هر دو محیط ثبت گردید به طوری که در پایان آزمایش مقدار آب مصرفی هر گلدان در محیط شاهد ۵۸۰۰ میلی لیتر و در محیط تنش خشکی دو هزار میلی لیتر بود. سرانجام در مرحله شروع به سنبله رفتن که دوره رویشی به اتمام رسیده بود، کل قسمت‌های هوایی گیاهان هر گلدان از سطح خاک قطع گردید و وزن خشک قسمت هوایی و ریشه هر گلدان اندازه‌گیری شد و در نهایت پس از به دست آوردن داده‌های خام تجزیه و تحلیل‌های آماری لازم انجام گرفت.

حاصل به همراه ۸ والد، ژنوتیپ‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش گلخانه‌ای را فراهم ساختند. آزمایش در سال ۱۳۸۱ در گلخانه طرح غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج انجام گرفت. مواد گیاهی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند. خاکی که در آزمایش گلخانه استفاده شد خاک سبک استریل شده با ترکیب ۵۰٪ شن و ۵۰٪ خاک برگ بود و از گلدان‌های معمولی برای کشت استفاده شد و در هر گلدان تعداد چهار بذر از یک ژنوتیپ کشت گردید. آبیاری معمولی و مساوی گلدان‌ها به منظور سبز کردن، هر دو یا سه روز انجام گرفت و سپس در مرحله ۳-۴ برگی به خاطر مستان گذرانی و بهاره‌سازی گیاهان، گلدان‌ها به مدت دو ماه به بیرون از گلخانه منتقل شدند و پس از اینکه بهاره‌سازی شدند، گلدان‌ها به داخل گلخانه منتقل شدند و تنش خشکی در دو تکرار اعمال گردید. به این صورت که هر دو یا سه روز، بسته به درجه حرارت گلخانه، آبیاری انجام می‌گرفت و برای گلدان‌های دو

جدول ۱- فهرست و خصوصیات ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی

Table 1. Name and characteristics of evaluated genotypes

| ردیف Entry | نام یا شماره ژنوتیپ | شرایط رویش Growing condition | تحمل یا خسارت به خشکی Drought tolerance/ Susceptibility |
|---------------|------------------------|---------------------------------|---|
| | Genotype | | |
| 1 | 5593/2 | Winter, Non-Irr | Zemstaneh-Dym Tolerant تحمل |
| 2 | 5806-6 | Winter, Irri | Zemstaneh-Aby Susceptible حساس |
| 3 | Sardary | Winter, Non-Irr | Zemstaneh-Dym Tolerant تحمل |
| 4 | Shahpasand | Winter, Irri | Zemstaneh-Aby Susceptible حساس |
| 5 | 7107-6 | Winter, Irri | Zemstaneh-Aby Susceptible حساس |
| 6 | 7007-2 | Winter, Irri | Zemstaneh-Aby Susceptible حساس |
| 7 | 6452 | Winter, Non-Irr | Zemstaneh-Dym Tolerant تحمل |
| 8 | 524-4 | Winter, Non-Irr | Zemstaneh-Dym Tolerant تحمل |

نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود برای هر دو صفت وزن خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به ساقه در هر دو شرایط معمول و تنش رطوبتی بین ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌دار وجود دارد و در نتیجه

نتایج و بحث

تجزیه دایآلل به روش گریفینگ

نتایج تجزیه واریانس دایآلل به روش گریفینگ به طور مشترک برای هر دو شرایط آبیاری در جدول (۲)

وزن خشک ریشه آنها نسبت به وزن خشک شاخ و برگ (قسمت هوایی) بیشتر از ارقامی است که مقاوم نیستند، سه والد ۷۰۰۷-۲، شاهپسند و ۵۸۰۶/۶ به عنوان والدینی مناسب برای انتقال صفات ریشه‌ای در برنامه‌های اصلاح و تهیه رگه‌های مقاوم به خشکی توصیه می‌شوند. مقادیر ترکیب‌پذیری خصوصی (Sij) دورگ‌ها در جدول ۴ نشان داده شده است و ملاحظه می‌شود که برای صفت وزن خشک ریشه در شرایط رطوبتی معمولی، دورگ‌های شاهپسند $\times 5593/2$ ، ۷۰۰۷-۲ $\times 5806-6$ $\times 5093/2$ ، ۷۰۰۷-۲ $\times 5806-6$ $\times 524-4$ $\times 6452$ $\times 7107-6$ و در شرایط تنفس، دورگ‌های ۷۰۰۷-۲ $\times 5806-6$ $\times 5093/2$ دارای بالاترین مقادیر Sij بودند و به عنوان دورگ‌های برتر و متحمل به خشکی از نظر صفت ریشه انتخاب می‌شوند. همچنین از نظر صفت نسبت وزن ریشه به ساقه در شرایط رطوبتی معمولی دورگ ۵۸۰۶-۶ \times شاهپسند و در شرایط تنفس دورگ‌های شاهپسند $\times 524-4$ ، شاهپسند $\times 6452$ و $5806-6 \times 4524$ دارای بالاترین مقادیر Sij بودند.

تجزیه دایآلل به روش هیمن

پس از انجام دو آزمون غیریکنواختی واریانس‌ها و کواریانس‌های ردیف‌ها (Wr-Vr) و ضریب رگرسیون b_a به دلیل صادق نبودن فرضیات تجزیه هیمن برای صفت وزن خشک ریشه در هر دو شرایط معمولی و تنفس رطوبتی با حذف دو والد شاهپسند و ۷۰۰۷-۲ فرضیات صدق کرده و تجزیه و تحلیل انجام گرفت. پارامترهای ژنتیکی برای هر دو صفت در جدول ۵ نشان داده شده است و دیده می‌شود که برای صفت وزن خشک ریشه در هر دو شرایط معمولی و تنفس پارامترهای H₁ و H₂ معنی‌دار بودند و تأثیر توأم اثر ژئی افزایشی و غیرافزایشی را در کنترل این صفت نشان می‌دهد. برای صفت نسبت وزن ریشه به ساقه در شرایط تنفس نیز این شرایط صادق بود. پارامتر H₂ برای دو صفت در هر دو شرایط رطوبتی معنی‌دار شده و توزیع نامتقارن ژئی‌های با اثر مثبت و

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی امکان‌پذیر است و ملاحظه می‌شود که واریانس ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) برای هر دو صفت در هر دو شرایط معنی‌دار شد که نقش اثر افزایشی در کنترل هر دو صفت مشهود گشت. همچنین واریانس ترکیب‌پذیری خصوصی (SCA) برای نسبت وزن ریشه به ساقه و وزن خشک ریشه در دو شرایط آبیاری معمول و تنفس معنی‌دار شد که نقش اثر غیرافزایشی ژئی را در کنترل هر دو صفت نشان می‌دهد. اما با توجه به نسبت واریانس $\frac{GCA}{SCA}$ که برای صفت وزن خشک ریشه در هر دو شرایط رطوبتی معنی‌دار گردید، نقش بیشتر اثر افزایشی ژئی در کنترل این صفت دیده می‌شود. نتایج آزمایش‌های سانداهو و لود (Sandahu and Laude, 1985)، معدلت (۱۳۶۰) و رضائی (۱۳۶۹) در تأیید نتایج حاصله از این آزمایش است.

جدول ۳ مقادیر ترکیب‌پذیری عمومی (gi) والدین برای هر دو صفت در شرایط رطوبتی معمولی و تنفس را نشان می‌دهد و ملاحظه می‌شود که برای صفت وزن خشک ریشه در شرایط رطوبتی معمولی دو والد ۷۰۰۷-۲ و شاهپسند دارای بالاترین مقدار gi بوده که همین دو والد در شرایط تنفس رطوبتی نیز دارای بالاترین مقدار gi برای وزن خشک ریشه بوده و به عنوان بهترین ترکیب‌شونده‌های عمومی برای وزن خشک ریشه شناسایی می‌شوند. همچنین از نظر نسبت وزن خشک ریشه به قسمت هوایی (R/S) در هر دو شرایط والد ۵۸۰۶/۶ دارای بالاترین مقدار gi بوده و به عنوان بهترین ترکیب‌شونده عمومی از نظر این صفت شناسایی می‌شود، با توجه به گزارش‌های اکثر محققان مبنی بر اینکه همبستگی مثبت و معنی‌دار بین رشد و گسترش ریشه با میزان عملکرد دانه و مقاومت بیشتر به تنفس خشکی وجود دارد (Dencheva, 1973) و نیز مطابق با گزارش‌های دیگر (Dencheva, 1973) و Sandahu and Lude, 1985 در واریته‌هایی که نسبت به گرما و خشکی مقاومند، میزان

جدول ۲- تجزیه واریانس دای آلل صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط مختلف رطوبتی

Table 2. Analysis of variance and diallel for root dry matter and root to shoot ratio

under different humidity condition

| منبع تغییرات S. O. V. | درجه آزادی d.f | (M.S) میانگین مرتعات | | | |
|--------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | شرایط رطوبتی معمولی Normal condition | | شرایط تنش رطوبتی Stress condition | |
| | | وزن خشک ریشه Root dry matter | ساقه / ریشه Root/ Shoot | وزن خشک ریشه Root dry matter | ساقه / ریشه Root/ Shoot |
| Genotype | 35 | 0.039** | 3.25** | 0.043** | 0.22** |
| GCA | 7 | 0.051** | 1.05* | 0.055** | 0.073** |
| SCA | 28 | 0.012** | 1.76** | 0.013** | 0.024** |
| Error | 35 | 0.0009 | 0.039 | 0.0018 | 0.0008 |
| GCA/ SCA | | 4.25** | 0.6 ^{ns} | 4.23** | 3.05* |

* and ** : Significant at 5 and 1% probability level, respectively.

* و ** : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: Non- significant

ns: غیرمعنی دار

جدول ۳- مقادیر ترکیب پذیری عمومی (gi) والدها برای صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط مختلف رطوبتی

Table 3. General combining ability (gi) of parents for root dry matter and root to shoot ratio under different humidity condition

| والدها Parents | (M. S) میانگین مرتعات | | | |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | شرایط رطوبتی معمولی Normal condition | | شرایط تنش رطوبتی Stress condition | |
| | وزن خشک ریشه Root dry matter | ساقه / ریشه Root/ Shoot | وزن خشک ریشه Root dry matter | ساقه / ریشه Root/ Shoot |
| 5593.2 | -0.013* | -0.46** | -0.097** | 0.095** |
| 5806*6 | -0.099** | 0.46** | -0.13** | 0.29** |
| Sardary | -0.019** | -0.11* | 0.018* | 0.02 ^{ns} |
| Shahpasand | 0.09* | 0.37** | 0.09** | -0.2** |
| 7101-6 | -0.000 ^{ns} | 0.2** | 0.05** | 0.014 ^{ns} |
| 7007-2 | 0.105** | -0.2** | 0.053** | -0.22** |
| 6452 | 0.012* | -0.23** | 0.016 ^{ns} | 0.006 ^{ns} |
| 524-4 | -0.076** | 0.19** | 0.000 ^{ns} | -0.006 ^{ns} |

* and ** : Significant at 5 and 1% probability level, respectively.

* و ** : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: Non- significant

ns: غیرمعنی دار

جدول ۴- مقدار ترکیب پذیری خصوصی (Sij) دورگاهای وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط مختلف رطوبتی

Table 4. Specific combining ability (Sij) of hybrids for root dry matter and root to shoot ratio under different humidity condition

| دورگاهها Hybrids | شرایط رطوبتی معمولی Normal condition | | شرایط تنفس رطوبتی Stress condition | |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | وزن خشک ریشه Root dry matter | ساقه/ریشه Root/ Shoot | وزن خشک ریشه Root dry matter | ساقه/ریشه Root/ Shoot |
| | | | | |
| 1×2 | -0.12** | -0.29** | 0.1** | -0.087ns |
| 1×3 | 0.009ns | 0.25** | 0.023ns | -0.13** |
| 1×4 | 0.14** | 0.7** | -0.24ns | 0.25** |
| 1×5 | 0.1** | 1.16** | 0.06* | -0.02ns |
| 1×6 | 0.13** | 0.59** | -0.001ns | 0.024ns |
| 1×7 | -0.02ns | -0.14ns | 0.02ns | 0.02ns |
| 1×8 | 0.07** | 0.18ns | -0.026ns | 0.033ns |
| 2×3 | 0.11** | 1.27** | -0.06* | -0.33** |
| 2×4 | 0.01ns | 2** | 0.17** | -0.33** |
| 2×5 | -0.024ns | 0.05ns | 0.04ns | -0.016ns |
| 2×6 | 0.04* | 0.65** | -0.09** | -0.12* |
| 2×7 | -0.06** | -0.98** | -0.02ns | 0.03ns |
| 2×8 | 0.05** | -0.04ns | -0.1** | 0.37** |
| 3×4 | -0.012ns | -0.65** | 0.18** | -0.28** |
| 3×5 | 0.02ns | 1.6** | -0.04ns | 0.23** |
| 3×6 | -0.1** | 0.34** | 0.007** | 0.16** |
| 3×7 | 0.07** | 1.3** | -0.08** | 0.16** |
| 3×8 | -0.07** | 0.08ns | 0.1** | 0.33** |
| 4×5 | -0.12** | 0.93** | -0.14** | 0.19** |
| 4×6 | 0.18** | 0.19ns | 0.12** | -0.016ns |
| 4×7 | 0.05** | 0.83** | -0.06* | 0.37** |
| 4×8 | 0.08** | 1.18** | -0.19** | 0.42** |
| 5×6 | -0.26** | 0.63** | -0.15** | 0.24** |
| 5×7 | 0.11** | -0.25* | -0.06* | 0.24** |
| 5×8 | 0.03ns | 0.45** | 0.04ns | -0.3** |
| 6×7 | 0.06** | 0.71** | 0.007ns | 0.25** |
| 6×8 | -0.06** | 0.76** | 0.23** | -0.38** |
| 7×8 | 0.05** | 1.16** | -0.009ns | -0.098ns |

* and ** : Significant at 5 and 1% probability level, respectively.

* و ** : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: Non-significant

ns: غیرمعنی دار

جدول ۵- پارامترهای ژنتیکی صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط مختلف رطوبتی

Table 5. Genetic parameters of root dry matter and root to shoot ratio under different humidity condition


| Genetic P. | پارامترهای ژنتیکی | شرایط رطوبتی معمولی | | شرایط تنش رطوبتی | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------|
| | | Normal condition | | Stress conditions | |
| | | Root dry matter | Root/Shoot | Root dry matter | Root/Shoot |
| MP | میانگین والد | 0.45 | 1.2 | 0.59 | 1.15 |
| MF ₁ | میانگین نتاج | 0.53 | 3.28 | 0.57 | 1.32 |
| MF ₁ - MP | جهت غالبیت | 0.073 | 2.08 | -0.019 | 0.17 |
| V _P | واریانس والدین | 0.0125 | 0.42 | 0.033 | 0.22 |
| V _D | واریانس افزایشی | 0.012* | 0.38 ^{ns} | 0.032* | 0.22* |
| SE (D) | میانگین کوواریانس اثر | 0.0034 | 0.25 | 0.0013 | 0.024 |
| (F) | افزایشی و غیرافزایشی | 0.003 ^{ns} | 0.25 ^{ns} | 0.014* | 0.2* |
| SE (F) | | 0.0083 | 0.6 | 0.0032 | 0.056 |
| H ₁ | واریانس غالبیت | 0.033* | 4.98* | 0.016* | 0.3* |
| SE (H ₁) | | 0.008 | 0.6 | 0.0033 | 0.054 |
| (H ₂) | واریانس غالبیت تصحیح شده | 0.027* | 4.6* | 0.013* | 0.23* |
| SE (H ₂) | | 0.007 | 0.5 | 0.0029 | 0.047 |
| (h ₂) | اثر غالبیت در کلیه مکان‌های ژنی | 0.021* | 17.3* | 0.0012 ^{ns} | 0.11* |
| SE (h ₂) | | 0.0049 | 0.34 | 0.0019 | 0.32 |
| E | واریانس محیطی کل | 0.0004 | 0.038 | 0.0008 | 0.007 |
| SE (E) | | 0.0012 | 0.084 | 0.0005 | 0.008 |
| $\sqrt{H_1/D}$ | | میانگین درجه غالبیت | 1.64 | 3.59 | 0.7 |
| (H ₂ /4H ₁) | | نسبت ژن‌های با اثر مثبت و منفی در والدین | 0.204 | 0.23 | 0.2 |
| $\sqrt{(4DH_1+F)/\sqrt{(4DH_1)-F}}$ | | نسبت فراوانی آلل‌های غالب به مغلوب در والدین | 1.15 | 1.2 | 1.93 |
| h_n^2 | وراثت پذیری خصوصی | 0.52 | 0.17 | 0.73 | 0.4 |
| h_b^2 | وراثت پذیری عمومی | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |

* and ** : Significant at 5 and 1% probability level, respectively.

* و ** : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.


ns: Non- significant

ns: غیرمعنی دار




نمودار ۱ - خط رگرسیون Wr/Vr و منحنی محدود کننده Wr^2 برای وزن خشک ریشه با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون در شرایط تنفس خشکی

Fig. 1. The Wr/Vr regression and wr^2 concave graph for root dry matter with the position of parents along the regression line in drought stress condition




نمودار ۲ - خط رگرسیون Wr/Vr و منحنی محدود کننده Wr^2 برای نسبت وزن ریشه به ساقه با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون در شرایط تنفس خشکی

Fig. 2. The Wr/Vr regression and wr^2 concave graph for root to shoot dry matter ratio with the position of parents along the regression line in drought stress condition



نمودار ۳- خط رگرسیون Wr/Vr و منحنی محدود کننده Wr^2 برای وزن خشک ریشه با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون در شرایط رطوبتی معمولی

Fig. 3. The Wr/Vr regression and wr^2 concave graph for root dry matter with the position of parents along the regression line in normal condition



نمودار ۴- خط رگرسیون Wr/Vr و منحنی محدود کننده Wr^2 برای نسبت وزن ریشه به ساقه با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون در شرایط رطوبتی معمولی

Fig. 4. The Wr/Vr regression and wr^2 concave graph for root to shoot dry matter ratio with the position of parents along the regression line in normal condition

شرایط تنش خشکی برای دو صفت وزن خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به ساقه نشان می‌دهد که لاین ۵۵۹۳/۲ نزدیکترین والد به محل قطع خط رگرسیون و سهمی محدود کننده است و به عبارت دیگر دارای کوچکترین مقادیر V_r و W_r یا حداقل تعداد ژن‌های غالب است. لاین ۴-۵۲۴ دارای بزرگترین مقادیر V_r و W_r یا دورترین مختصات نسبت به مرکز مختصات بوده و نشان می‌دهد که این لاین دارای حداکثر ژن‌های مغلوب در کنترل ژنتیکی این صفت است. محل تلاقی خط رگرسیون با محور W_r نیز محدوده غالبیت نسبی برای وزن خشک ریشه و غالبیت کامل برای نسبت وزن ریشه به ساقه را نشان می‌دهد، که در تأیید نتیجه حاصله از طریق پارامتر $\sqrt{H_1/D}$ است. مطابق با این نتیجه رضائی (۱۳۶۹) نیز اثر افزایشی ژن‌ها به همراه ژن‌هایی با غالبیت ناقص در کنترل وزن خشک ریشه در مرحله به سنبله رفتن را گزارش کرده است. مونیو و ویتنیکتون (Monyo and Whittington, 1970) نیز تنواع مشاهده شده در خصوصیات ریشه گندم را به پلی ژن‌ها و یک ژن اصلی که طول دوره رویشی را کنترل می‌کند ربط داده‌اند.

منفی در والدین را نشان می‌دهد. پارامتر $\sqrt{H_1/D}$ اثر فوق غالبیت برای کنترل هر دو صفت در شرایط رطوبتی معمولی و اثر غالبیت نسبی (برای وزن خشک) و غالبیت کامل (برای نسبت وزن ریشه به ساقه) را در شرایط تنش نشان می‌دهد که با توجه به نمودارهای ۱ تا ۴ این محدوده غالبیت نسبی تا فوق غالبیت برای هر دو صفت به طور واضح دیده می‌شود. با توجه به کمتر بودن پارامتر $H_2/4H_1$ از $0/25$ برای هر دو صفت در هر دو شرایط رطوبتی، عدم تساوی فراوانی ژن‌های با اثر مشبت و منفی و توزیع نامتقارن آن‌ها در والدین دیده می‌شود. همچنین معنی دار بودن پارامتر F برای هر دو صفت در شرایط تنش رطوبتی یانگر توزیع متقارن ژن‌های غالب و مغلوب در والدین برای دو صفت مزبور است. از طرف دیگر به دلیل اینکه پارامتر $\sqrt{(4DH_1+F)/((4DH_1)-F)}$ برای هر دو صفت در دو شرایط بیشتر از یک برآورد شد، لذا بیشتر بودن آلل‌های غالب به مغلوب در بین والدین برای هر دو صفت را نشان می‌دهد. نمودارهای واریانس کوواریانس (Wr-Vr) برای هر دو صفت در نمودارهای ۱ تا ۴ نشان داده شده است. پراکندگی والدتها در طول خط رگرسیون در

References

منابع مورد استفاده

- رضائی، ع. م. ۱۳۶۹. بررسی ژنتیکی خصوصیت ریشه در گندم پائیزه. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۲۱، شماره ۱ و ۲.
ص ۴۰-۲۷.
- سومدنیا، غ. و ع. کوچکی. ۱۳۷۱. جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم. چاپ سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- کافی، م. و ع. مهدوی دامغانی. ۱۳۷۹. مکانیسم‌های مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- معدلت، پ. ۱۳۶۰. بررسی مقاومت به خشکی در ارقام گندم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

Arraudeau, M. A. 1989. Breeding strategies for drought resistance. In Baker, F. W. G. (ed.), Drought resistance in cereals. P: 101-116. C. A. B. International.

Blum, A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRC Press. Boca Raton.

Dencheva, L. 1973. The effect of irrigation on the development of the root system in wheat. Tastenive, dni navk:

10 (10): 3-10.

- Hurd, E. A. 1976.** Plant breeding for drought resistance. In: T. T. Kozlowski (ed.) water deficits and plant growth. P: 317-354. Academic press, New York.
- Monyo, J. H. and W. J. Whittington, 1970.** Genetic analysis of root growth in wheat. *J. of Agr. Sci.* 74: 329-338.
- Sandahu, A. S. and H. H. Laude. 1985.** Effects of drought heat hardiness in winter wheat. *Agron. J.* 50: 78-81.
- Simonis, W. 1952.** Quantitative studies of the entire root systems of weed and crop plants under field conditions. *Ecology*, 18: 6-79.
- Singh, K. and R. S. Virmani. 1973.** Rooting behaviour of Mexican and indigenous wheat under different soil moisture regimes. *Aust. J. Biol. Sci.* 26: 65-76.
- Tupitsyn, N. V., J. G. Waines and A. K. Lyashok. 1986.** Water uptake by the root system of the spring wheats Botanicheskaya 3 and Orenburgskaya 7 in relation to their drought resistance. *Plant Breeding Abs.* 57: 9,815.