

تعیین نرم‌های نظام تلفیقی تشخیص و توصیه (دریس) برای تشخیص وضعیت تغذیه‌ای و مطالعه تعادل عناصر غذایی گندم آبی در استان آذربایجان شرقی

**Determination of Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) norms for diagnosis of nutrient situation and study of nutrients balance for irrigated wheat crop in East Azarbayjan**

ولی فیضی اصل<sup>۱</sup> و احمد بایبوردی<sup>۲</sup>

چکیده

فیضی اصل، و. و. ۱. بایبوردی، ۱۳۸۴. تعیین نرم‌های نظام تلفیقی تشخیص و توصیه (دریس) برای تشخیص وضعیت تغذیه‌ای و مطالعه تعادل عناصر غذایی گندم آبی در استان آذربایجان شرقی. مجله علوم زراعی ایران، جلد هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴. صفحه: ۲۹۸-۳۰۹.

به منظور تعیین نرم‌های نظام تلفیقی تشخیص و توصیه (دریس) در گندم آبی، تعداد ۹۸۲ نمونه برگ پرچم در مرحله گرده‌افشانی از مزارع گندم در استان آذربایجان شرقی شامل شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرنند، میانه، شبستر، سراب، بستان‌آباد، بناب، ملکان، اهر، کلیبر و هریس در طی ۵ سال زراعی (۱۳۷۸-۱۳۸۳) جمع‌آوری شد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، مس و بور در آن‌ها اندازه‌گیری شد. در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی، عملکرد دانه گندم در تمامی مزارع مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت بهینه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، مس و بور با استفاده از روش دریس و خطوط مرزی به ترتیب ۲/۴۶ (درصد)، ۰/۲۳ (درصد)، ۱/۷۴ (درصد)، ۱۳۷/۹ (میلی‌گرم در کیلوگرم)، ۵۹/۴ (میلی‌گرم در کیلوگرم)، ۱۶/۷ (میلی‌گرم در کیلوگرم)، ۱۶/۵ (میلی‌گرم در کیلوگرم) و ۶۳/۰ (میلی‌گرم در کیلوگرم) است. به منظور استفاده از روش دریس در تفسیر نتایج تجزیه اندام‌های هوایی گندم آبی و ایجاد تعادل تغذیه‌ای در این گیاه، نرم‌های دریس برای ۲۴ فرم بیان تعیین شد. در مجموع از ۲۴ نرم دریس توصیه شده در استان آذربایجان شرقی به غیر از فرم‌های بیان بور و با احتمال کمتری مس می‌توان از تمامی نرم‌ها در تشخیص کمبود و دستیابی به تعادل تغذیه‌ای در گندم آبی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: نرم‌های دریس (DRIS)، خطوط مرزی، گندم آبی، تعادل عناصر غذایی، وضعیت تغذیه‌ای.

## مقدمه

یکی از روش‌های ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای گیاه، به ویژه گیاهان زراعی یک ساله، تجزیه گیاه است (Dow and Roberts, 1982). گیاهان عمده عناصر غذایی مورد نیاز خود را از خاک جذب می‌کنند و بر همین اساس می‌توان بین مواد غذایی جذب شده توسط گیاه و مقدار قابل استفاده آن‌ها در خاک ارتباطی منطقی پیدا کرد (Fageria et al., 1991). گاهی از تجزیه گیاه برای تشخیص مشکلات تغذیه‌ای و در پی آن، برطرف کردن کمبود عناصر غذایی در طول فصل رشد گیاهان زراعی استفاده می‌شود (Dow and Roberts, 1982). مقادیر حاصل از تجزیه اندام‌های مختلف گیاه به تنهایی نمی‌تواند مفهوم خاصی را داشته باشد، زیرا که مقادیر به دست آمده، باید ابتدا با پاسخ‌های گیاهی واسنجی (Calibration) شوند. به عبارت دیگر باید مشخص شود که اعداد و ارقام به دست آمده چه مفهومی دارند؟ و آیا گیاه از لحاظ عنصر غذایی مورد نظر دچار کمبود است یا خیر (Sumner, 1979; Sumner, 1981; Smith, 1986)؟ در روش دریس (Diagnosis and Recommendation Integrated System) (DRIS)، تفسیر نتایج آزمون گیاه اعداد و ارقام به دست آمده از تجزیه‌های آزمایشگاهی برای هر عنصر غذایی با نرم (Norm) مربوطه که غلظت عناصر غذایی در نمونه‌های گیاهی با عملکرد بالا است مقایسه می‌شوند (Sumner, 1979; Sumner, 1981). یکی از مزایای مهم روش دریس تفسیر بهتر نتایج در مقایسه با سایر روش‌ها از جمله غلظت بحرانی عناصر غذایی (Critical Nutrient Concentration) و دامنه کفایت (Sufficiency Range Approach) است (Jones, 1981). در واقع نرم‌های دریس برآیند کلیه عوامل مؤثر در رشد گیاه، از جمله نوع خاک، شرایط اقلیمی منطقه و مدیریت مزرعه هستند. نرم‌ها از میانگین نتایج تجزیه برگ‌های تعداد زیادی نمونه تهیه شده در زمان‌ها و مکان‌های مختلف محاسبه می‌شود (Sumner, 1979; Sumner, 1981).

در روش دریس، برخلاف روش‌های تعیین غلظت بحرانی عناصر غذایی و حدود کفایت، علاوه بر بیان کمبود و یا زیاد بودن عناصر غذایی، تعادل نسبی میان عناصر غذایی و همچنین ترتیب نیاز غذایی گیاهان به صورت کمی قابل محاسبه و بیان است (Sumner, 1981; Amundson and Koehler, 1987). اما به منظور افزایش کارایی این روش در تشخیص نیاز غذایی گیاهان، لازم است برای هر محصول در هر منطقه با نظام رطوبتی معین، نرم مشخصی تعیین شود (Walworth et al., 1986). لذا به منظور تعیین نرم‌های دریس برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی و استفاده از این ارقام در تشخیص محدودیت‌های تغذیه‌ای و توصیه‌های کودی در این منطقه، اجرای این پژوهش ضروری به نظر می‌رسید.

## مواد و روش‌ها

به منظور تعیین نرم‌های دریس در گندم آبی، بانک اطلاعاتی نسبتاً گسترده‌ای با جمع‌آوری ۹۸۲ نمونه گیاهی از مزارع آبی مربوط به طرح محوری گندم در استان آذربایجان شرقی از شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرند، میانه، شبستر، سراب، بستان آباد، بناب، ملکان، اهر، کلیبر و هریس در طی ۵ سال زراعی (۱۳۷۸-۱۳۸۳) تشکیل شد. در تمامی مکان‌های اجرای آزمایش، مصرف کودهای فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف (آهن، منگنز، روی، مس و بور) از طریق آزمون خاک و نیتروژن بر اساس فرمول کودی منطقه برای گندم آبی بود. نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده در تمامی مکان‌های اجرای آزمایش در مرحله گرده‌افشانی و مطابق با مرحله ۶۴ کد زایداکس (Zadoks et al., 1974) و از برگ‌های پرچم تهیه گردید. در این نمونه‌ها غلظت عناصر غذایی نیتروژن (کجل تک اتوآنالیزر)، فسفر (کالریمتری)، پتاسیم (نشر شعله‌ای)، آهن (جذب اتمی)، منگنز (جذب اتمی)، روی (جذب اتمی)، مس (جذب اتمی) و بور (کالریمتری آزومتین اچ)

استفاده گردید که هم عملکرد و هم ارزش غلظت عنصر غذایی آن‌ها در مقایسه با گروه قبلی افزایش نشان داد (فیضی اصل و همکاران، ۱۳۸۲). به عبارت دیگر زوج مرتب‌هایی که از هر نظر صعودی بودند برای ترسیم معادله مرزی مورد استفاده قرار گرفتند. برای ترسیم معادله خط مرزی سمت راست هر شکل، برعکس حالت قبلی عمل شد. مناسب‌ترین معادلات مربوط به این خطوط مرزی به کمک برنامه کامپیوتری Curve expert و با لحاظ حداکثر ضریب تشخیص و حداقل خطای معیار تعیین شد (فیضی اصل و ولیزاده، ۱۳۸۳). پس از ترسیم معادلات خطوط مرزی بر روی نقاط پراکنش مربوط به هر عنصر غذایی، حد بهینه (نرم) و دامنه بهینه غلظت عناصر غذایی محاسبه شد. برای محاسبه غلظت بهینه هر عنصر غذایی، محل تلاقی دو خط مرزی بر روی محور Xها با استفاده از روش آزمون و خطا و به کمک برنامه کامپیوتری Qbasic، به عنوان حد بهینه یا نرم مربوط به آن عنصر غذایی در نظر گرفته شد که بیشترین عملکرد دانه نیز در این غلظت به دست می‌آید. برای تعیین حدود بهینه مربوط به هر عنصر غذایی از عملکردهای بیش از ۶ تن در هکتار استفاده شد. به عبارت دیگر خط مستقیمی از عملکرد ۶ تن در هکتار در محور عرض‌ها به موازات محور طول‌ها در هر شکل رسم شد که در دو نقطه خطوط مرزی را قطع کرد و ارزش محور X این دو نقطه به عنوان حدود بهینه برای عنصر غذایی مورد مطالعه در نظر گرفته شد (Sumner, 1977; Walworth et al., 1986).

روش میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا: در این روش به منظور تعیین نرم‌های دریس برای نسبت‌های عناصر غذایی، کل مشاهدات مربوط به عملکرد محصول به دو گروه با عملکرد زیاد و کم به ترتیب با ۴۵۰ و ۵۳۲ مشاهده برای هر گروه، تقسیم شد. حد انتخابی عملکرد محصول برای گروه‌بندی اطلاعات موجود همانند روش قبلی اختیاری بوده و اگر نمونه‌های دارای عملکرد بالا، توزیع نرمال داشته باشند، چندان بحرانی نیست. تعیین

اندازه‌گیری شد (امامی، ۱۳۷۵). در زمان رسیدن محصول با استفاده از روش قادری و همکاران (Ghadiri et al., 1984) با تکرار پرتاب قاب‌هایی (۱۰ تکرار) به ابعاد یک متر مربع در نقاط مختلف مزرعه آزمایشی، عملکرد دانه گندم تعیین شد. با استفاده از داده‌های به دست آمده از تجزیه‌های گیاهی و عملکرد دانه، نرم‌های دریس برای عناصر غذایی مورد مطالعه از طریق روش‌های خطوط مرزی و میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا محاسبه گردید (Webb, 1972; Sumner, 1979; Walworth et al., 1986). در این روش معیار جامعه دارای عملکرد بالا، عملکردهای بیش از ۶۰۰۰ کیلوگرم در هکتار (عملکردی که در عرف مناطق مورد مطالعه به عنوان عملکردهای بالا شناخته می‌شود) در نظر گرفته شد (فیضی اصل و همکاران، ۱۳۸۲).

۱- روش خطوط مرزی: در روش خطوط مرزی، ابتدا رابطه غلظت هر عنصر غذایی (محور X) با عملکرد دانه (محور Y) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Excel به صورت نقاط پراکنش ترسیم شد. سپس نقاط پراکنش موجود در هر شکل، مطابق روش وب (Webb, 1972) و والورس و همکاران (Walworth et al., 1986) توسط دو خط رگرسیونی محصور گردید که یکی از این خطوط در قسمت چپ و دیگری در قسمت راست هر شکل قرار دارد و محل تلاقی این دو خط رگرسیونی نشان دهنده برطرف شدن تمامی محدودیت‌ها در شرایط آزمایش و رسیدن به حداکثر عملکرد است. برای تعیین معادلات خطوط مرزی مربوط به هر عنصر غذایی، ابتدا تمامی داده‌های آن عنصر غذایی با در نظر گرفتن عملکرد دانه، توسط نرم افزار کامپیوتری Excel به صورت صعودی مرتب شده و سپس کل داده‌ها به گروه‌های ۲۰ تایی تقسیم شدند. در هر گروه ۲۰ تایی حداکثر عملکرد به همراه ارزش عنصر غذایی مربوطه به صورت زوج مرتب‌هایی در یک جدول تنظیم شد. در تعیین معادله قسمت چپ هر شکل، از زوج مرتب‌هایی

و ۴۵ (میلی گرم در کیلوگرم) تعیین شد (جدول ۱). از سوی دیگر با استفاده از همین روش، دامنه بهینه غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، مس و بور برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۲/۸-۲/۳ (درصد)، ۰/۲۸-۰/۲۳ (درصد)، ۲/۴-۱/۵ (درصد)، ۱۹۴-۱۲۶ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۹۰/۸-۵۳/۴ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۱۶/۲-۲۱/۶ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۱۱/۷-۲۳/۸ (میلی گرم در کیلوگرم) و ۱۰/۱-۷۹/۸ (میلی گرم در کیلوگرم) تعیین گردید که بر اساس بانک اطلاعاتی موجود، در این دامنه‌ها امکان دسترسی به عملکردهای بیش از ۶ تن در هکتار وجود دارد. این نتایج نشان می‌دهد که در بین عناصر مورد مطالعه، نیتروژن کمترین ضریب تغییرات و بور و سپس مس بیشترین ضریب تغییرات را داشتند. به عبارت دیگر از نرم و حدود بهینه به دست آمده برای نیتروژن با اعتماد بیشتری در مقایسه با بور و مس می‌توان استفاده کرد (جدول ۱). مقایسه نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط فاجریا و همکاران (Fageria *et al.*, 1991)، اسنوبال و رابسون (Snowball and Robson, 1991) و لیتچ و سامنر (Letzch and Sumner, 1984) نشان می‌دهد که نرم‌های به دست آمده برای عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در این پژوهش تا حدودی مشابه با اعداد و ارقام ارائه شده توسط این پژوهشگران است، اما حدود بهینه گزارش شده برای گندم آبی توسط افراد یاد شده تا حدودی بالاتر از حدود بهینه به دست آمده از این پژوهش است. در حالی که حد بهینه فسفر، آهن، منگنز و روی تا حدودی مشابه، نیتروژن و پتاسیم کمتر و مس و بور بیشتر از اعداد و ارقام توصیه شده توسط کمپل و همکاران (Campbell *et al.*, 2000) برای غلات از جمله گندم در مرحله گرده افشانی است.

نتایج به دست آمده از نرم‌های دریس برای نسبت‌های عناصر غذایی از طریق میانگین گیری از جامعه

نرمال بودن داده‌ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری MSTATC با آزمون چولگی و کشیدگی انجام گرفت (Sumner, 1977). همچنین در این روش حد بین جامعه عملکرد زیاد و جامعه عملکرد کم طوری انتخاب شد که تعداد مشاهدات در جامعه عملکرد زیاد کمتر از ۴۵ - ۳۰ درصد کل مشاهدات نباشد (Sumner, 1977; Walworth *et al.*, 1986). سپس با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Excel به صورت فرم‌های مختلف بیان عناصر غذایی (Form of expression) (N×P, P/N, N/P, ...) تبدیل گردید. در مرحله بعد، نسبت واریانس بین دو جامعه (واریانس گروه دارای عملکرد کم به واریانس گروه دارای عملکرد زیاد) محاسبه و فرم بیانی از عناصر که دارای بزرگترین نسبت واریانس بوده و با استفاده از آزمون F معنی دار بود، به عنوان فرم بیان دو عنصر غذایی مورد مطالعه انتخاب شد. با مشخص شدن فرم بیان عناصر، میانگین ( $\bar{X}_H$ )، واریانس ( $S_H^2$ ) و ضریب تغییرات ( $CV_H$ ) جامعه عملکرد بالای مربوط به آن فرم بیان، به عنوان نرم انتخاب و معرفی شد (Letzch and Sumner, 1984). حدود بهینه عناصر غذایی نیز با استفاده از انحراف معیار ( $SD_H$ ) جامعه عملکرد بالا و از طریق رابطه  $\bar{X}_H \pm SD_H$  محاسبه شد. با افزایش تعداد نمونه‌ها در گروه دارای عملکرد بالا دامنه بهینه تعیین شده به عددی ثابت نزدیک‌تر می‌شود (Letzch and Sumner, 1984; Walworth and Sumner, 1987).

### نتایج و بحث

الف- با استفاده از روش میانگین گیری از جامعه دارای عملکرد بالا، غلظت بهینه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، مس و بور برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۲/۵۷ (درصد)، ۰/۲۵ (درصد)، ۱/۹۵ (درصد)، ۱۶۰ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۷۲/۱ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۱۸/۹ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۱۷/۸ (میلی گرم در کیلوگرم)

جدول ۱- آماره‌های مربوط به عناصر غذایی برای جامعه‌های عملکرد بالا در گندم آبی

Table 1. Statistical parameters of nutrients for high yield population in irrigated wheat

عنصر غذایی Nutrient	میانگین Mean	حدود بهینه Sufficiency level	ضریب تغییرات (درصد) Coefficient of variation (%)
N (%)	2.566 ± 0.243	2.323-2.809	9.5
P (%)	0.253 ± 0.027	0.226-0.280	10.6
K (%)	1.949 ± 0.453	1.496-2.402	23.2
Fe (mg/kg)	159.952 ± 33.880	126.072-193.832	21.2
Mn (mg/kg)	72.078 ± 18.679	53.399-90.757	25.9
Zn (mg/kg)	18.909 ± 2.703	16.206-21.612	14.3
Cu (mg/kg)	17.767 ± 6.019	11.748-23.786	33.8
B (mg/kg)	44.950 ± 34.820	10.130-79.770	77.5




پراکنش داده‌های بیشتری نسبت به جامعه عملکرد بالا در مقایسه با سایر نرم‌های دریس ارائه شده در این پژوهش، برخوردار است (جدول ۲). جالب این که فرم‌های بیان بین سه عنصر اصلی N، P و K در این پژوهش همانند پژوهش آمانسون و کوهرل (Amundson and Koehler, 1987) به صورت K/N، N/P و K/P است، اما مقادیر این نرم‌ها بین نرم‌های ارائه شده توسط این پژوهشگران برای گندم آبی در دو منطقه واشینگتن (Washington) و غرب میانی (Midwest) آمریکا است. در مجموع با توجه به ضریب تغییرات به دست آمده برای نرم‌های دریس در این پژوهش (جدول ۲) می‌توان نتیجه گرفت که در تشخیص وضعیت تغذیه‌ای و مطالعه تعادل عناصر غذایی گندم در استان آذربایجان شرقی نرم‌های مربوط به B و با شدت کمتری Cu در مقایسه با نرم‌های سایر عناصر غذایی دقت کمتری دارند.

ب- با استفاده از خطوط مرزی، حد بهینه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۲/۳۴، ۰/۲۱۲ و ۱/۵۳ درصد تعیین شد که در این مقادیر با برطرف کردن تمامی محدودیت‌های موجود، امکان رسیدن به بیشترین عملکرد در محدوده بانک اطلاعاتی وجود دارد (شکل ۱). مقایسه حدهای بهینه به دست آمده از طریق

دارای عملکرد بالا در این پژوهش نشان داد که از بین ۲۸ فرم بیان انتخاب شده بین عناصر غذایی مورد مطالعه، ۴ مورد آن از طریق آزمون F معنی‌دار نبودند، لذا بر همین اساس هیچ یک از فرم‌های بیان مورد بررسی بین عناصر نیتروژن و آهن، منگنز و بور، آهن و بور و همچنین مس و بور از لحاظ آماری مورد قبول نبوده و بین این عناصر فرم بیان مناسب ارائه نشد. اما تمامی فرم‌های بیان معرفی شده در این پژوهش، با استفاده از آزمون F در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار هستند (جدول ۲). در بین فرم‌های بیان معرفی شده، کمترین مقدار نرم با ۰/۰۱۲ مربوط به K/Fe و بیشترین آن با ۶۲۹/۷ مربوط به Fe/P است. در این میان کمترین ضریب تغییرات به میزان ۱۰/۴ درصد مربوط به فرم بیان N/P و بیشترین آن با ۷۶/۹ درصد مربوط به فرم بیان B/Zn است. به عبارت دیگر به منظور ایجاد تعادل تغذیه‌ای در گندم آبی در استان آذربایجان شرقی و رسیدن به عملکردهای بهینه، استفاده از نرم تعیین شده در این پژوهش N/P نمونه در مقایسه با مقدار B/Zn بسیار مناسب‌تر است (Walworth and Sumner, 1987). بیشترین مقدار F مربوط به جامعه عملکرد بالا (نرم‌ها) به میزان ۵/۷ به فرم بیان N/P و کمترین آن به میزان ۱/۱ به فرم بیان B/N اختصاص دارد و این نشانگر آن است که در مورد فرم بیان N/P جامعه دارای عملکرد پائین از

حدود بهینه به دست آمده از طریق خطوط مرزی در این پژوهش برای عناصر نیتروژن و فسفر مشابه و برای پتاسیم کمتر از حدود بهینه ارائه شده در گندم آبی توسط این پژوهشگران است. در حالی که مقادیر فسفر مشابه و نیتروژن و پتاسیم کمتر از حدهای بهینه ارائه شده توسط کمپل و همکاران (Campbell *et al.*, 2000) برای گندم آبی است. با توجه به اینکه در روش خطوط مرزی، چگونگی پراکنش نقاط در تعیین نوک (Pike) هر

خطوط مرزی با روش میانگین گیری از جامعه دارای عملکرد بالا نشان می دهد که برای عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در این پژوهش، حدهای بهینه به دست آمده از طریق خطوط مرزی ۱۰ تا ۲۷ درصد پائین تر از روش میانگین گیری از جامعه دارای عملکرد بالا است (جدول ۱ و شکل ۱). بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط فاجریا و همکاران (Fageria *et al.*, 1991) و اسنوبال و رابسون (Snowball and Robson, 1991)



Side	Equation	Correlation coefficient
A) L	$Y = -574.8 + 4289.5X - 1527.4 X^2$	$R^2 = 0.998^{**}$
R	$Y = 25774.3 - 10765.6X + 1574.3X^2$	$R^2 = 1.000^{**}$
B) L	$Y = 1/(0.0006 - 0.0043X + 0.0095X^2)$	$R^2 = 0.999^{**}$
R	$Y = 10821.6 - 9931.8X$	$R^2 = 0.992^{**}$
C) L	$Y = -2642.8 + 8139.1X - 2198.0X^2$	$R^2 = 0.999^{**}$
R	$Y = 8859.9 - 739348 \exp(-7.14X^{-0.581})$	$R^2 = 1.000^{**}$

شکل ۱- نقاط پراکنش عملکرد دانه گندم آبی در مقابل غلظت عناصر غذایی نیتروژن (A)، فسفر (B) و پتاسیم (C) در برگ پرچم

Fig. 1. Scattered diagrams of irrigated wheat grain yield against N, P and K contents in flag leaf


عناصر منگنز و روی مشابه و آهن، مس و بور بیشتر از حدود بهینه ارائه شده برای گندم آبی توسط این پژوهشگران است. در حالی که مقادیر آهن و منگنز مشابه و روی کمتر و مس و بور بیشتر از حدود بهینه ارائه شده توسط کمپل و همکاران (Campbell et al., 2000) برای گندم آبی است. همان‌طوری که گفته شد در تعیین حد بهینه عناصر غذایی با استفاده از روش خطوط مرزی، چگونگی پراکنش نقاط تعیین کننده نوک هر دیاگرام یا حد بهینه عنصر غذایی است، لذا حد بهینه به دست آمده از این روش دقیق‌تر از روش میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا است (فیضی اصل و همکاران، ۱۳۸۲). نتایج حاصل از خطوط مرزی نشان می‌دهد که حدود بهینه عناصر غذایی کم مصرف آهن، منگنز، روی، مس و بور برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۲۵۰-۱۰۴، ۸۸-۴۲، ۲۸/۵-۱۳/۲، ۱۸/۰-۸/۸ و ۸۹/۵-۷۷/۵ میلی‌گرم در کیلوگرم است که به غیر از آهن دامنه بالای حدود بهینه تمامی عناصر کم مصرف بالاتر و به استثنای بور حد پائین این دامنه نیز کمتر از روش میانگین‌گیری است. به عبارت دیگر در این پژوهش همانند عناصر پر مصرف، برای عناصر کم مصرف نیز با استفاده از روش خطوط مرزی، دامنه تغییر حدود بهینه عناصر غذایی بسیار پهن‌تر از روش میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا است. با توجه به چگونگی پراکنش نقاط و صعودی و نزولی بودن خطوط مرزی مربوط به عناصر Fe، Mn، Zn، Cu و B (شکل ۲) می‌توان نتیجه گرفت که غلظت بهینه به دست آمده برای عناصر Mn و Cu در مقایسه با عناصر Zn، Fe و B به دلیل وضوح پائین نوک (Pike) منحنی از دقت کافی در تشخیص تعادل Mn و Cu در گیاه برخوردار نیستند.

### جمع‌بندی نهایی

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، غلظت بهینه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز،

منحنی در نظر گرفته می‌شود، لذا حد بهینه به دست آمده از این روش دقیق‌تر و واقعی‌تر از روش میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا است (فیضی اصل و همکاران، ۱۳۸۲). نتایج حاصل از خطوط مرزی نشان می‌دهد که حدود بهینه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۳/۲-۲/۰، ۳۳/۰-۰/۱۸ و ۲/۶۴-۱/۴۰ درصد است که حد بالای دامنه بهینه تمامی عناصر یاد شده بالاتر و حد پائین آن‌ها نیز کمتر از روش میانگین‌گیری است. به عبارت دیگر در این پژوهش با استفاده از روش خطوط مرزی، دامنه بهینه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم پهن‌تر از روش میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا است. در مجموع با توجه به چگونگی پراکنش نقاط و صعودی و نزولی بودن خطوط مرزی (شکل ۱) مربوط به عناصر N، P و K می‌توان نتیجه گرفت که غلظت بهینه به دست آمده برای K در مقایسه با N و P به دلیل وضوح کم نوک (Pike) منحنی از دقت کافی در تشخیص تعادل پتاسیم در گیاه برخوردار نیست.

با استفاده از خطوط مرزی، غلظت بهینه عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، مس و بور برای گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۱۱۵/۷، ۶۷/۴، ۱۴/۵، ۱۵/۱ و ۸۰/۹ میلی‌گرم در کیلوگرم تعیین شد (شکل ۲). مقایسه حدود بهینه به دست آمده از طریق میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا با روش خطوط مرزی نشان می‌دهد که برای تمامی عناصر کم مصرف مورد مطالعه در این پژوهش به جز بور، حدود بهینه به دست آمده از طریق خطوط مرزی بسیار پائین‌تر از روش میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا است (جدول ۱ و شکل ۲). بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط فاجریا و همکاران (Fageria et al., 1991) و اسنوبال و رابسون (Snowball and Robson, 1991) حدود بهینه به دست آمده از طریق خطوط مرزی در این پژوهش برای



شکل ۲- نقاط پراکنش عملکرد دانه گندم آبی در مقابل غلظت عناصر غذایی آهن (A)، منگنز (B)، روی (C)، مس (D) و بور (E) در برگ پرچم.  
Fig 2. Scatter diagrams of irrigated wheat grain yield against concentration of Fe, Mn, Zn, Cu and B in flag leaf.



روی، مس و بور در برگ پرچم گندم آبی در استان آذربایجان شرقی به ترتیب ۲/۴۶ (درصد)، ۰/۲۳ (درصد)، ۱/۷۴ (درصد)، ۱۳۷/۹ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۵۹/۴ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۱۶/۷ (میلی گرم در کیلوگرم)، ۱۶/۵ (میلی گرم در کیلوگرم) و ۶۳/۰ (میلی گرم در کیلوگرم) است. از ۲۸ فرم بیان موجود بین عناصر غذایی یاد شده (جز ۴ مورد نیتروژن و آهن، منگنز و بور، آهن و بور و همچنین مس و بور) ۲۴ فرم بیان به عنوان نرم‌های دریس در تشخیص کمبود عناصر و دستیابی به تعادل تغذیه‌ای در گندم آبی در استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

## References

## منابع مورد استفاده

- امامی، ع. ۱۳۷۵. روش‌های تجزیه گیاه (جلد اول). انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه شماره ۹۸۲. صفحه ۱۲۸.
- فیضی اصل، و. و غ. ر. ولیزاده. ۱۳۸۳. آزمون خاک: تفسیر نتایج آزمون خاک با استفاده از روش‌های تصویری و تجزیه واریانس کیت-نلسون. انتشارات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم. نشریه شماره ۸۵۶۱. صفحه ۱۲۲.
- فیضی اصل، و.، خ. علیزاده، ی. انصاری، ب. موسوی و م. احمدپور چنار. ۱۳۸۲. استفاده از روش شاخص تعادل خصوصیات گیاهی در برنامه‌های به نژادی گندم دیم. مجله نهال و بذر. جلد ۱۹، شماره ۲. ص ۱۳۶-۱۲۱.
- Amundson, R. L., and F. E. Koehler. 1987. Utilization of DRIS for diagnosis of nutrient deficiencies in winter wheat. *Agron. J.* 79: 472-476.
- Campbell, C. R., C. O. Plank, and S. J. Donohue. 2000. Reference sufficiency range field crops: small grain (barley, oats, rye, wheat). <http://www.agr.state.nc.uc/agronomi/saesd/s394.htm>.
- Dow, A. I., and S. Roberts. 1982. Proposal: critical nutrient ranges for crop diagnosis. *Agron. J.* 74: 401-403.
- Fageria, N. K., V. C. Baligar, and C. A. Jones. 1991. Growth and mineral nutrition of field crops. Marcel Dekker, Inc.
- Ghadiri, H., P. J. Shea, and G. A. Wicks. 1984. Interception and retention of Atrazin by wheat stubble. *Weed Sci.* 32: 24 - 27.
- Jones, C. A. 1981. Proposed modifications of the diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) for interpreting plant analyses. *Commun. Soil Sci. Plant Anal.* 12(8): 785-794.
- Letzsch, W. S. and M. E. Sumner. 1984. Effect of population size and yield level in selection of diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) norms. *Commun. Soil Sci. Plant Anal.* 15(9): 997-1006.
- Smith, F. W. 1986. Interpretation of plant analysis: concepts and principles. p. 1-12. In: D.J. Reuter, and J. B. Robinson (eds.). *Plant analysis: an interpretation manual*. Inkata Press, Melbourne.
- Snowball, K., and A. D. Robson. 1991. Nutrient deficiencies and toxicities in wheat: a guide for field identification: Mexico, D. F: CIMMYT.
- Sumner, M. E. 1977. Preliminary N, P and K foliar diagnostic norms for soybeans. *Agron. J.* 69: 226-230.
- Sumner, M. E. 1979. Interpretation of foliar analysis for diagnostic purposes. *Agron. J.* 71: 343-348.
- Sumner, M. E. 1981. Diagnosing the sulfur requirements of corn and wheat foliar analysis. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 45: 87-90.

**Walworth, J. L., W. S. Ietzsch, and M.E. Sumner. 1986.** Use of boundary lines in establishing diagnostic norms. Soil Sci. Soc. Am. J. 50: 123-128.

**Webb, R. A. 1972.** Use of the line in the analysis of biological data. J. Hort. Sci. 47: 309 – 319.

**Zadoks, J. C., T. T. Chang, and C. F. Konzak. 1974.** A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Res. 14: 415-421.

Archive of SID

## Determination of Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) norms for diagnosis of nutrient situation and study of nutrients balance for irrigated wheat crop in East Azarbayjan

Feizi Asl<sup>1</sup>, V. and A. Baybordi<sup>2</sup>

### ABSTRACT

In order to determine DRIS norms for irrigated wheat, 982 plant samples were collected from Irrigated wheat pilot project in East Azarbayjan (Tabriz, Maragheh, Marand, Mianeh, Shabestar, Sarab, Bostanabad, Bonab, Malekan, Ahar and Kaleibar). Plant samples were taken from flag leaf at anthesis stage, for 5 years (1999-2004). Following sample preparation, N, P, K, Fe, Mn, Zn, Cu and B concentration were analysed in Lab. At maturity stage, data of grain yield were collected in all relevant fields. The results showed that means of optimal N, P, K, Fe, Mn, Zn, Cu and B concentrations by DRIS and boundary lines were 2.46%, 0.23%, 1.74%, 137.9 mg. kg<sup>-1</sup>, 59.4 mg. kg<sup>-1</sup>, 16.7 mg. kg<sup>-1</sup>, 16.5 mg. kg<sup>-1</sup> and 63.0 mg. kg<sup>-1</sup>, respectively. To use DRIS for irrigated wheat crop, data interpretation and studying of nutrient balance in plant, DRIS norms for 24 expression forms were defined. It can be concluded that expression forms for irrigated wheat crop in East Azarbayjan, except for B and Cu expression forms, can be used for deficiency diagnosis and studying of nutrient balance in plants.

**Key words:** DRIS norms, Boundary lines, Irrigated wheat.

---

Received: September, 2005

1- Faculty member, Dryland Agricultural Research Institute, Maraghe, Iran. (Corresponding author)

2- Faculty member in East Azarbayjan Agricultural Research Center, Tabriz, Iran.