

(Phaseolus vulgaris L.)

**Study of quantitative and qualitative traits and their relationships with grain
yield in white bean (*Phaseolus vulgaris L.*) under optimum and limited irrigation
conditions**

(Phaseolus vulgaris L.)

STI GMP , SSI

SSI

STI GMP

1 / :

()

()

سینگ (Singh, 2002) بیان داشت که در شرایط تنفس خشکی انتخاب و غربال شدید نسل های اولیه اشتباہ است، زیرا ظاهر قدرت رویشی و عملکرد ژنوتیپ ها در محدوده زمانی کوتاه و در شرایط محدودیت شدید محیطی می باشد و این شرایط برای ظاهر کامل پتانسیل عملکرد کافی نیست، بنابراین بهتر است که در نسل های اولیه، برای مقایسه ژنوتیپ های متتحمل به خشکی، اقلیم ها و محیط هایی انتخاب شوند که دارای تنفس خشکی ملایم باشند. ریچاردز (Richards, 1996) بیان کرد که انتخاب در هردو شرایط تنفس و بدون تنفس سبب تجمع آلل های مطلوب و انتخاب ژنوتیپ هایی با عملکرد بالاتر می شود. پتانسیل عملکرد بالا در مناطق مطلوب باعث عملکرد مطلوب در مناطق مساعدتر نیز می شود. تنوع ژنتیکی به دلیل کوچک شدن خطاهای حداقل بوده و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط نیز به دلیل تکرار پذیری بیشتر محیط ها کوچکتر می شود. شاخص های تحمل به خشکی براساس عملکرد یک ژنوتیپ خاص در شرایط آل (Y_p)، عملکرد یک ژنوتیپ خاص در شرایط تنفس (Y_s)، متوسط عملکرد تمام ژنوتیپ ها در شرایط آل (\bar{Y}_p) و متوسط عملکرد تمام ژنوتیپ ها در شرایط تنفس (\bar{Y}_s) محاسبه می شوند و عبارتند از:

شاخص حساسیت به تنفس¹
SSI (Fisher and Maurer, 1978)

$$SSI = \frac{1 - (Y_s / Y_p)}{1 - (\bar{Y}_s / \bar{Y}_p)}$$

شاخص تحمل به تنفس²
TOL (Rosielle and Hamblin, 1981)

$$TOL = Y_p - Y_s$$

شاخص متوسط محصول دهنده³
MP (Rosielle and Hamblin, 1981)

$$MP = \frac{(Y_p + Y_s)}{2}$$

1-Stress Susceptibility Index
3 - Mean Productivity

پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی جوامع بشری حبوبات است. حبوبات نسبت به غلات در تمامی مراحل رشد به میزان آب بیشتری نیاز دارد. در بین حبوبات از نظر سطح زیرکشت جهانی و ارزش اقتصادی، لوییا مقام اول را داراست مجnoon حسینی (Majnoon Hosseini, 1993) از مهمترین حبوبات در ایران است که در سطحی حدود ۱۵ هزار هکتار کشت می گردد و تولید آن بیش از ۱۸ هزار تن می باشد (Anon., 2000). با توجه به محدودیت اراضی مؤثرترین عامل در افزایش تولید لوییا، انجام تحقیقات در زمینه به زراعی و بهنژادی در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد. خشکی یکی از عوامل محدود کننده تولید لوییا می باشد. یارانه ها و همکاران (Yordanov et al., 2003) اظهار داشتند که مکانیزم تحمل به خشکی به استحکام ساختمان گیاهی بستگی دارد. مثلاً در شرایط خشکی بسیار شدید مولکولهای حاوی باندهای هیدروژنی جایگزین مولکولهای آب در گیاه می شوند تا تحمل گیاه را بالا ببرند. عواملی چون نقش روزنه ها، عمل PS_{II}، وجود پروتئین های خاص و Rubisco، لیپیدها و قندها بر روی سازگاری و تحمل گیاه نسبت به شرایط تنفس خشکی اثر گذارند. در شرایط تنفس خشکی روزنه ها بسته شده و پس از مدتی ABA در گیاه تجمع می یابد و پرولین، مانیتول، سوریتول، گلوتالین تیون و α-توکوفول کاهش می یابد و سنتز پروتئین های جدید متوقف می شود. (Acosta, 1999) بیان کرده است که ارقام متتحمل به خشکی باید دارای مقاومت قابل قبول به بیماری ها، حشرات و نماتدها، تحمل به مشکلات خاک، آب و هوا و عدم حساسیت به نوسانات عادی درجه حرارت و طول روز باشند. سینگ و ساینی (Singh and Saini, 1983) روش به نژادی موفق در شرایط تنفس لوییا را روش شجره ای و تلاقی برگشتی بویژه جهت انتقال سریع ژن های محدود کننده عملکرد بیان کردند.

2- Tolerance Index

انتخاب ۱۰٪ برترین ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد بیان کردنده که در میان کلیه صفات میزان توارث وزن صدنه بیشترین مقدار بود. آنها پیشنهاد کردنده که بهتر است انتخاب مقدماتی براساس (GMP) و غربال کردن ژنوتیپ‌های انتخاب شده براساس عملکرد تحت شرایط تنفس (Y_S) باشد. فرانسیسکو و همکاران (Francisco *et al.*, 1997) در بررسی واکنش لاین‌های اهلی و وحشی لوییا (Tepary (*P. acutifolius*)) نسبت به تنفس خشکی بیان داشتند که همبستگی عملکرد دانه با وزن دانه مثبت ($r = 0.78^{***}$) ولی با مقدار پروتئین منفی ($r = -0.75^{***}$) بود و میانگین عملکرد و وزن دانه ارقام وحشی را به ترتیب ۴۰ و ۷۵ درصد کمتر از ارقام اهلی ولی میزان محتوی پروتئین دو گروه را یکسان بیان کرند (۲۷/۶ درصد). در نهایت لوییا (*P. acutifolius*) Tepary در خاکستر برگ‌های ارقام متتحمل به خشکی (Turkan *et al.*, 2005) با مطالعه واکنش پراکسیداسیون و آنتی اکسیداسیون چربی در خاکستر برگ‌های لوییا (*P. acutifolius L.*) و حساس به خشکی لوییا (معمولی (*P. vulgaris L.*)) دریافتند که تیمار پلی اتیلن گلیکول مقدار محتوای نسبی آب^۱ (RWC) گونه *P. vulgaris* را کاهش داد اما در گونه *P. acutifolius* بی تأثیر بود و تجمع اسید آمینه پروولین در *P. acutifolius* در شرایط تنفس خشکی بیش از *P. vulgaris* گزارش کردند. در ایران نیز تولید ارقام متتحمل به خشکی در لوییا از اهداف مهم به نژادی است که باید مورد توجه قرار گیرد (Majnoon Hosseini, 1993). این تحقیق به منظور بررسی صفات کمی و کیفی تعدادی از ژنوتیپ‌های لوییا سفید تحت شرایط آبیاری کامل و محدود و یافتن منابع مقاومت برای استفاده در برنامه‌های به نژادی و تعیین بهترین معیار جهت گزینش در افزایش و

شاخص میانگین هندسی محصول دهی^۱ GMP

(Fernandez, 1992)

$$GMP = \sqrt{(Y_S)(Y_P)}$$

اشنایدر و همکاران (Schneider *et al.*, 1997) با بررسی شاخص برداشت، حساسیت به خشکی، پتانسیل عملکرد و میانگین هندسی برای لوییا در شرایط خشکی در مناطق میشیگان و مکزیک میزان وراثت پذیری عملکرد در شرایط تنفس را بین ۰/۱۹-۰/۵۹ برآورد کردنده و وزن صدنه را صفت با بیشترین وراثت پذیری و شاخص MP را بهترین شاخص تحمل به خشکی معرفی کردند. آدیکو و همکاران (Adiku *et al.*, 2001) با ارائه مدل مناسب اثر تنفس خشکی روی لوییا، ضریب همبستگی وزن خشک مورد انتظار و مقدار مشاهده شده را به ترتیب ۰/۹۷ و ۰/۹۲ گزارش کردند. نیلسون و نلسون (Nielsen and Nelson, 1998) اظهار داشتند که تنفس در مرحله رویشی باعث کاهش عملکرد دانه در اثر کاهش تعداد نیام در بوته و یا تعداد دانه در نیام می‌شود و تنفس در مرحله زایشی بیشترین تأثیر بر گیاه و کمترین عملکرد را دارد. رافی و همکاران (Raffi *et al.*, 2004) با بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط روی تعداد نیام و بذر در بوته در چند محل طی فصل خشک زراعی اظهار کردند که برای این صفات اثر ژنوتیپ، محیط دارای واریانس معنی دار با متقابل ژنوتیپ × محیط دارای واریانس معنی دار با همبستگی بالا ($r = 0.92^{***}$) می‌باشد. گرزسایک و همکاران (Grezeaik *et al.*, 1996) با بررسی توزع ژنتیکی حبوبات طی سه سال، بیان کردند که شاخص SSI در ارقام متتحمل کمتر از ۰/۳۱ و در ارقام حساس بیش از ۰/۴۴ است و بطورکلی ارقام متتحمل در مقایسه با ارقام حساس عملکرد دانه کمتر اما پایداری بیشتری داشتند. اشنایدر و همکاران (Schneider *et al.*, 2004) با بررسی اثر تنفس خشکی روی لاین‌های خالص لوییا در چندین سال و مکان با

محدود سوم شهریور انجام شد که در این تاریخ گیاهان از لحاظ فنولوژی گیاهی در مرحله دانه بندی بودند. در طی دوره رشد عملیات و جین علف های هرز به صورت دستی انجام شد. با شروع جوانه زنی یادداشت برداری و اندازه گیری صفات مرفولوژیکی کمی و کیفی مورد نیاز با حذف اثر حاشیه ای تا مرحله کامل برداشت، بطور مداوم صورت گرفت. اندازه گیری صفات مورد بررسی بر اساس دستورالعمل های مرکز تحقیقات بین المللی منابع ژنتیک گیاهی¹ (IPGRI) و مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق گرمسیری² (CIAT) انجام گرفت.

صفات مورد ارزیابی شامل موارد زیر است: تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد جوانه زنی، تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد گل دهی، تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد نیام دهی، تعداد روز از کاشت تا ۱۰ درصد رسیدن اولین نیام، طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد رسیدگی کامل، ارتفاع بوته از سطح خاک تا انتهای ساقه اصلی، تعداد گره روی ساقه اصلی، تعداد ساقه های فرعی، تعداد نیام در بوته، وزن نیام، تعداد دانه در نیام، تعداد دانه در ۵ بوته، وزن دانه در ۵ بوته، طول نیام با دم، طول دم نیام، طول دانه، عرض دانه، قطر دانه، وزن صد دانه، طول میانگره، قطر میانگره و درصد پروتئین. کلیه اندازه گیری ها براساس میانگین پنج بوته انجام و ارائه شده است. اثر آبیاری محدود بر کلیه صفات اندازه گیری شده از فرمول زیر محاسبه شد.

$$\frac{\text{مقدار صفت در شرایط آبیاری محدود} - \text{مقدار صفت در شرایط آبیاری بهینه}}{\text{درصد تغییرات صفت}} \times 100$$

جدول ۱ - کد ژنوتیپ های مورد استفاده در مطالعه.

Table 1. Code of genotypes used in this study.

ردیف Row	کد لاین Line Code	ردیف Row	کد لاین Line Code	ردیف Row	کد لاین Line Code
11	KS41112	6	KS41106	1	KS41101
12	KS41113	7	KS41107	2	KS41102
13	KS41114	8	KS41108	3	KS41103
14	KS41157	9	KS41109	4	KS41104
15	KS41165	10	KS41111	5	KS41105

بهبود عملکرد ژنوتیپ ها در هردو محیط تنش و بدون تنش بود.

مواد و روش ها

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی ۱۵ ژنوتیپ لویبا سفید و رابطه آنها با عملکرد دانه در شرایط آبیاری بهینه و محدود جهت تشخیص و شناسایی ارقام متحمل به خشکی دو آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط آبیاری بهینه (آبیاری با دور هفت روز) و آبیاری محدود (آبیاری با دور ۱۰ روز) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران با عرض جغرافیایی 57° و 50° عرض شمالی و 48° و 35° طول شرقی از نصف النهار گرینویچ، 1313 متر ارتفاع از سطح دریا میانگین درجه حرارت سالیانه $12/4$ درجه سانتیگراد انجام شد. ارقام مورد بررسی از بانک ژن حبوبات استگاه تحقیقات کشاورزی خمین تهیه شد(جدول ۱). کاشت آزمایش در شرایط آبیاری بهینه در تاریخ سوم خرداد 1383 و آزمایش در شرایط آبیاری محدود در چهارم خرداد 1383 بصورت خشکه کاری و به روش جوی و پشته ای با فاصله خطوط 50 سانتیمتر از هم و فاصله بوته های پنج سانتیمتر انجام شد. بذور هر ژنوتیپ در سه خط دو متری بصورت دستی کشت گردید. اولین آبیاری در تاریخ 11 خرداد و آخرین آن با رعایت دور آبیاری برای ارقام در شرایط آبیاری بهینه 31 مرداد و برای ارقام در شرایط آبیاری

نسبت به این شرایط عکس العمل خاصی نشان ندادند (جدول ۳).

تنوع فنوتیپی صفات در شرایط آبیاری بهینه و آبیاری محدود

سه تا از ۲۵ صفت در شرایط آبیاری محدود تنوع فنوتیپی بسیار بالایی داشتند (جدول ۳). صفات وزن دانه در پنج بوته، طول دم نیام و درصد پروتئین به دلیل تنوع فنوتیپی بالا، بیشترین درصد ضریب تغییرات (C.V.) را داشتند. کمترین ضریب تغییرات به ترتیب مربوط به روز تا ۵۰٪ گل دهی، طول دانه، تعداد گره روی ساقه اصلی، تعداد دانه در بوته و روز تا ۵۰٪ جوانه زنی بود. نتایج حاصله با نظرات میرزاچی ندوشن (Mirzaie Nadooshan, 1997)، رافی و همکاران (Raffi et al., 2004) و ترکان و همکاران (Turkan et al., 2005) مبنی بر وراثت پذیری بالای صفات تعداد دانه در بوته، روز تا ۵۰٪ گل دهی، روز تا ۵۰٪ جوانه زنی و طول دم نیام مطابقت دارد، اما اشنايدر و همکاران (Schneider et al., 2004) وراثت پذیری کم این صفات را گزارش کردند که با نتایج حاصل از این مطالعه مغایرت دارد.

همبستگی ساده صفات

با اندازه گیری وزن دانه ژنوتیپ‌ها در دو محیط آبیاری بهینه (Y_p) و آبیاری محدود (Y_s) و محاسبه شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی، همبستگی بین وزن دانه و شاخص‌های محاسبه شده به دست آمد (جدول ۴). ملاحظه می‌شود که وزن دانه در شرایط آبیاری بهینه و محدود دارای همبستگی مثبت و معنی دار هستند ($r=0.565^{**}$). همچنین با شاخص‌های GMP، SSI، STI که دارای ویژگی تمایز گروه اول از سایر ژنوتیپ‌ها بودند (Fernandez, 1992) و با وزن دانه در شرایط آبیاری بهینه و محدود همبستگی مثبت و بسیار معنی دار داشتند. بنابراین ژنوتیپ‌هایی که میزان بالای از این شاخص‌ها را داشته باشند به عنوان متتحمل ترین ژنوتیپ‌ها تعیین شدند. در رابطه با شاخص‌های دیگر

با استفاده از ضرایب همبستگی ساده بین شاخص‌ها میزان تحمل به خشکی ژنوتیپ‌ها و رتبه بندی آنها بوسیله شاخص‌های تحمل به خشکی برآورد شد (Fernandez, 1992; Rosielli and Hamblin, 1981; Fisher and Maurer, 1978) و برای ارزیابی دقیق تر ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی نمودار بای پلات ترسیم گردید. بای پلات ابزار مفیدی برای تجزیه اطلاعات و ارزیابی نظری ساختار یک ماتریس دو طرفه می‌باشد که برای بررسی روابط بیش از سه متغیر بصورت یکجا کاربرد دارد. پس از حصول اطمینان از یکنواختی داده‌ها برای محاسبات آماری مورد نظر از برنامه نرم افزاری SAS و برای رسمندودار از نرم افزار STATGRAPHICS Plus استفاده شد.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد که برای اکثر صفات در دو محیط تنوع ژنتیکی خوبی وجود دارد (جدول ۲). معنی دار نبودن اثر متقابل محیط×ژنوتیپ بر برخی صفات دلیل بر پایداری صفت در شرایط مختلف آبیاری بود که با نتایج تحقیقات یارادانف و همکاران (Yordanov et al., 2003) موافق دارد.

اثر نش خشکی حاصل از آبیاری محدود

درصد تغییرات ناشی از شرایط آبیاری محدود بر روی کلیه صفات نشان داد (جدول ۲) که بیشترین آسیب ناشی از تنش خشکی بر روی عملکرد دانه (۹۲/۳۷) بود، که استباط می‌شود این آسیب ناشی از کاهش شدید وزن نیام (۳۴/۵۴ گرم)، و تعداد دانه در بوته (۷۰/۳۱) بود. کمترین اثر آبیاری محدود بر روی صفات روز تا رسیدگی کامل (C.V.=۰/۰٪)، طول دوره پرشدن دانه (C.V.=۷/۰٪)، درصد پروتئین (C.V.=۴/۰٪)، رسیدن اولین نیام (C.V.=۶۳/۲٪) و طول میانگره (C.V.=۷/۰٪) بود. کلیه این صفات بجز روز تا رسیدگی کامل نسبت به آبیاری محدود عکس العمل منفی نشان دادند ولی بقیه صفات

جدول ۲ - تجزیه واریانس مرکب برای صفات مختلف در ژنوتیپ های لویا سفید تحت دو محیط آبیاری بهینه و محدود.

Table 2. Combined analysis of variance for different traits in white bean genotypes under optimum and limited irrigation conditions.

Traits	صفات	df	ارتفاع گیاه Plant height	تعداد ساقه فرعی Sub shoot No.	تعداد گره روی ساقه اصلی Nod no. per main shoot	تعداد دانه در نیام Seed/Pod	میانگین مریعات (Mean Square)			روز تا رسیدن نیام Days to germination	روز تا ۵۰٪ جنونه زنی Days to flowering	روز تا رسیدن 50٪ گل دهی Days to poding	روز تا رسیدن اولین نیام Days to first pod	روز تا رسیدن کامل Days to maturity	طول دوره پر شدن دانه Seed filling duration
							% ۵۰	% ۵۰	٪ ۵۰						
Irrigation (I)	آبیاری	1	230.40 ^{ns}	17.60 ^{**}	2.05 ^{ns}	7.25 ^{**}	30.04 ^{**}	19.60 ^{**}	71.11 [*]	86.04 ^{ns}	0.81 ^{ns}	2.50 ^{ns}			
(I/Rep) Error a	آبیاری / تکرار	4	30.49	0.345	2.37	0.85	0.850	0.834	8.75	190.58	89.72	82.66			
Genotypes (G)	ژنوتیپ	14	154.97 ^{**}	3.07 ^{**}	13.23 ^{**}	11.99 ^{**}	0.810 ^{**}	111.98 ^{**}	78.35 ^{**}	2101.49 ^{**}	138.21 ^{**}	49.78 ^{ns}			
I × G	آبیاری × ژنوتیپ	14	27.19 [*]	1.63 ^{**}	1.34 ^{ns}	7.56 ^{**}	0.05 ^{ns}	2.36 ^{ns}	9.99 ^{ns}	522.29 ^{**}	5.39 ^{ns}	10.02 ^{ns}			
Error b	اشتباه	56	13.136	0.453	0.801	0.241	0.297	1.68	11.733	33.145	32.056	29.823			

ادامه جدول ۲-continued

میانگین مریعات (Mean Square)

طول نیام Pod length	طول دم Pod tail length	طول دانه Seed length	عرض دانه Seed width	قطر دانه Seed diameter	قطر میانگره Internode diameter	طول میانگره Internode length	تعداد نیام در بوته Seed no./Plant	تعداد دانه در بوته Pod no./Plant	وزن نیام Pods weight	وزن دانه در بوته Seed weight/plant	وزن صد دانه 100 Seed weight	درصد پروتئین Protein content
36.22 ^{**}	0.15 ^{ns}	4.48 ^{ns}	0.82 ^{ns}	1.89 ^{**}	1.86 ^{ns}	0.01 ^{ns}	4370.14 ^{**}	146.43 [*]	756.69 ^{**}	530.95 ^{**}	261.94 [*]	56.73 ^{**}
0.371 ^{ns}	0.04 ^{ns}	0.84 ^{ns}	0.45 ^{ns}	0.02 ^{ns}	0.372 ^{ns}	0.07 ^{ns}	86.06 ^{ns}	10.02 ^{ns}	18.78 ^{ns}	11.95 ^{ns}	16.88 ^{ns}	778.95 ^{ns}
1.96 ^{**}	0.15 ^{**}	3.29 ^{**}	0.39 ^{**}	0.54 ^{**}	2.63 ^{**}	0.22 ^{**}	196.56 [*]	15.01 ^{**}	13.56 ^{ns}	10.09 ^{ns}	100.50 ^{**}	126.38 ^{**}
0.850 ^{ns}	0.06 ^{ns}	0.81 ^{ns}	0.49 ^{ns}	0.11 ^{ns}	0.28 ^{ns}	0.08 ^{ns}	66.85 ^{ns}	3.25 ^{ns}	8.60 ^{ns}	6.04 ^{ns}	15.32 [*]	89.31 ^{ns}
0.715 ^{ns}	0.060 ^{ns}	0.280 ^{ns}	0.487 ^{ns}	0.134 ^{ns}	0.219 ^{ns}	0.102 ^{ns}	89.15 ^{ns}	3.61 ^{ns}	9.45 ^{ns}	5.90 ^{ns}	7.7 ^{ns}	81.873 ^{ns}

* and ** : Significant at the 5% and 1% of probability levels, respectively.

ns : Non-significant

* و ** : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱/۰۰ و ۰/۰۵.

ns: غیر معنی دار.

جدول ۳- میانگین و درصد ضریب تغیرات برای صفات مختلف لوبیا در شرایط آبیاری بهینه و محدود.

Table 3. Mean and coefficient of variation for different traits in white bean under optimum and limited irrigation conditions.

Traits	صفات	Mean		C.V.	درصد ضریب تغیرات		
		آبیاری بهینه Optimum irrigation	میانگین آبیاری محدود Limited irrigation		دو محیط Two conditions	آبیاری بهینه Optimum irrigation	آبیاری محدود Limited irrigation
Plant height (cm)	طول بوته (سانتی متر)	36.29	33.09	8.82	11.28	9.32	
Sub shoot	تعداد ساقه فرعی	6.33	5.45	13.90	11.12	11.78	
Nod/Main shoot	گره روی ساقه اصلی	12.03	11.73	2.49	8.35	6.55	
Seed/Pod	تعداد دانه در نیام	4.45	4.01	9.89	11.74	11.34	
Days to germination	روز تا %۵۰ جوانه زنی	7.60	6.44	15.13	7.56	7.98	
Days to 50% flowering	روز تا %۵۰ گل دهی	40.46	39.53	2.30	2.36	3.95	
Days to 50% poding	روز تا %۵۰ نیام دهی	46.46	44.69	3.83	2.02	10.63	
Days to first pod maturity	روز تا رسیدن اولین نیام	74.53	76.48	-2.63	6.80	10.07	
Days to maturity	روز تا رسیدگی کامل	87.37	86.77	0.70	2.66	8.83	
Seed filling duration	طول دوره پرشدن دانه (روز)	46.91	47.24	-0.70	4.38	15.76	
Pod length(cm)	طول نیام (سانتی متر)	10.28	8.99	12.55	6.16	11.34	
Pod tail length (cm)	طول دم نیام (سانتی متر)	0.91	0.83	8.71	22.59	32.02	
Seed length (mm)	طول دانه (میلی متر)	11.89	11.44	3.73	4.31	4.75	
Seed width (mm)	عرض دانه (میلی متر)	6.89	6.70	2.76	3.56	14.22	
Seed diameter (mm)	قطر دانه (میلی متر)	5.03	4.72	6.35	5.58	9.11	
Internode diameter (mm)	قطر میانگره (میلی متر)	4.92	4.63	5.89	9.53	10.06	
Internode length (cm)	طول میانگره (سانتی متر)	1.43	1.44	-0.70	26.16	17.43	
Seed no./Plant	تعداد دانه در بوته	44.22	30.21	31.70	6.53	6.91	
Pod no./Plant	تعداد نیام در بوته	11.89	9.34	21.45	18.67	16.24	
Pods weight (gr)	وزن نیام (گرم)	16.79	10.99	34.54	22.93	18.33	
Seed weight (g/5 plants)	وزن دانه(گرم در ۵ بوته)	12.79	7.94	37.92	24.41	39.33	
100 Seed weight (g)	وزن صد دانه (گرم)	29.52	26.11	11.58	10.14	9.36	
Protein content (%)	درصد پروتئین	27.04	27.68	-2.40	32.67	31.80	

جدول ۴- ضرایب همبستگی برای شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی.

Table 4. Correlation coefficients between different drought tolerance indices.

	YP	YS	TOL	SSI	MP	STI	GMP
YP	1	0.565*	0.767**	0.868**	0.573*	0.751**	0.738**
YS		1	-0.414 ^{ns}	0.709**	-0.631*	0.833**	0.845**
TOL			1	0.347 ^{ns}	0.961**	0.155 ^{ns}	0.134 ^{ns}
SSI				1	0.094 ^{ns}	0.978**	0.975**
MP					1	-0.102 ^{ns}	-0.120 ^{ns}
STI						1	0.998**
GMP							1

* and ** : Significant at the 5% and 1% of probability levels, respectively.

و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵.

ns : Non-Significant

ns: غیر معنی دار.

دانه (در پنج بوته) بیشتر در شرایط آبیاری بهینه تعیین شدند.

بر اساس Y_S: بر اساس این صفت ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۵ و ۱۰ به ترتیب بعنوان ژنوتیپ‌های با وزن دانه (در پنج بوته) بیشتر در شرایط آبیاری محدود تعیین شدند.

بر اساس شاخص TOL: بر اساس این شاخص ژنوتیپ‌های شماره ۶، ۵ و ۳ به ترتیب بعنوان ژنوتیپ‌های متحمل به آبیاری محدود تعیین شدند.

بر اساس شاخص SSI: بر اساس این شاخص ژنوتیپ‌های شماره ۶، ۷ و ۹ بعنوان ژنوتیپ‌های حساس و ژنوتیپ‌های شماره ۴، ۱۰ و ۱۱ به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل در شرایط آبیاری محدود تعیین شدند.

بر اساس شاخص MP: بر اساس این شاخص ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۵ و ۳ بعنوان ژنوتیپ‌های برتر در شرایط آبیاری محدود تعیین شدند.

بر اساس شاخص STI: بر اساس این شاخص ژنوتیپ‌های شماره ۵، ۱ و ۳ بعنوان ژنوتیپ‌های متحمل در شرایط آبیاری محدود تعیین شدند.

بر اساس شاخص GMP: بر اساس این شاخص ژنوتیپ‌های شماره ۵، ۱ و ۳ بعنوان ژنوتیپ‌های با وزن دانه بیشتر در شرایط آبیاری محدود تعیین شدند.

گرازسیاک و همکاران (Grezesak et al., 1996)

نظیر TOL و MP دارای همبستگی مثبت و معنی دار با وزن دانه در شرایط آبیاری بهینه بودند و با وزن دانه در شرایط آبیاری محدود همبستگی منفی داشتند (جدول ۴). ژنوتیپ‌های دارای مقادیر کوچک‌تر این شاخص‌ها به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل تعیین شدند. تعیین ژنوتیپ‌های متحمل بر اساس شاخص‌ها

نتایج حاصل از بررسی تحمل به خشکی در شرایط آبیاری محدود ژنوتیپ‌های لوبيا سفید در جدول ۵ ارائه شده است. طبق نظریه فراناندز (Fernandez, 1992) عملکرد ژنوتیپ‌ها در دو محیط تنفس و بدون تنفس خشکی به چهار گروه زیر تقسیم می‌شود: ژنوتیپ‌هایی که عملکرد بالایی در هر دو محیط دارند (گروه A)، ژنوتیپ‌هایی که صرفاً عملکرد خوبی در شرایط بدون تنفس دارند (گروه B)، ژنوتیپ‌هایی که صرفاً عملکرد خوبی در شرایط تنفس دارند (گروه C)، ژنوتیپ‌هایی که تظاهر ضعیفی در هر دو محیط دارند (گروه D). در جدول ۵ مقادیر GMP, Y_S, Y_P و رتبه بندی ارقام بر اساس TOL, STI, SSI, MP و ژنوتیپ‌های ذکر شده ارائه گردیده است. سه ژنوتیپ شاخص‌های تک تک این شاخص‌ها انتخاب شدند. ژنوتیپ‌های مذکور بر اساس هر شاخص بصورت زیر تعیین گردیدند.

بر اساس Y_P: بر اساس این صفت ژنوتیپ‌های شماره ۵، ۳ و ۱ به ترتیب بعنوان ژنوتیپ‌های با وزن

جدول ۵ - برآورد میزان تحمل ژنوتیپ ها به خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی.

Table 5. Estimation of drought tolerance in white bean genotypes using drought tolerance indices.

ژنوتیپ ها Genotypes	Y _P		Y _S		TOL		MP		SSI		STI		GMP	
	مقدار Value	رتبه Rank												
1	14.51	3	10.24	1	4.27	9	12.37	2	0.96	6	1.08	2	12.19	2
2	13.61	6	8.72	4	4.89	7	11.16	4	1.17	8	0.86	4	10.89	4
3	15.05	2	8.33	6	6.72	3	11.69	3	1.45	12	0.91	3	11.19	3
4	9.83	15	7.62	11	2.21	15	8.72	15	0.73	2	0.54	13	12.78	13
5	16.66	1	9.8	2	6.68	2	13.23	1	1.34	10	1.18	1	8.65	1
6	14.45	4	5.06	15	9.39	1	9.75	10	2.12	15	0.53	15	8.55	15
7	12.71	7	6.65	13	6.06	5	9.68	11	1.55	13	0.61	11	9.19	10
8	12.13	10	8.28	7	3.85	10	10.2	6	1.03	7	0.73	6	10.02	6
9	12.33	8	6.01	14	6.32	4	9.17	13	1.67	14	0.54	14	8.61	14
10	11.07	13	8.79	3	2.28	14	9.39	9	0.67	1	0.7	8	9.86	8
11	11.75	11	8.54	5	3.21	12	10.14	7	0.89	3	0.72	7	10.01	7
12	10.35	14	7.32	12	3.3	13	8.83	14	0.95	5	0.55	12	8.7	12
13	12.31	9	7.67	10	4.64	8	9.99	8	1.23	9	0.68	9	9.71	9
14	14.06	5	8.16	8	5.9	6	11.11	5	1.36	11	0.83	5	10.71	5
15	11.17	12	7.95	9	3.22	11	9.56	12	0.94	4	0.64	10	9.42	11

ویژه بزرگتر از یک می باشند و روی هم رفته ۹۹/۸۳ درصد تغییرات کل داده ها را شامل می شوند. مؤلفه GMP, STI, Y_S, Y_P و MP دارد و بیش از ۰/۶۱ درصد تغییرات کل داده ها را شامل می شود، بنابراین این مؤلفه را می توان تحمل به آبیاری محدود تلقی کرد. هر چه مقدار این مؤلفه بیشتر باشد، رقم مطلوب تر است. مؤلفه دوم که بیش از ۳۸ درصد واریانس کل را توجیه می کند، همبستگی منفی با GMP, STI و Y_S دارد ولی با شاخص های SSI, TOL و Y_P همبستگی مثبت دارد و شاخص حساسیت به آبیاری محدود مشاهده شد. هر چه مقدار این مؤلفه کمتر باشد مطلوب تر است. معادله رابطه بین مؤلفه های اول و دوم را می توان با شاخص ها بصورت زیر نشان داد:

$$= \text{مؤلفه اول} = 0.410 YP + 0.353 YS + 0.152 TOL + 0.029 SSI + 0.482 MP + 0.475 STI + 0.474 GMP$$

$$= \text{مؤلفه دوم} = 0.320 YP - 0.414 YS + 0.578 TOL + 0.607 SSI + 0.020 MP - 0.100 STI - 0.112 GMP$$

شکل ۱ شاخص های GMP, STI و MP شاخص های مناسب تر و ژنوتیپ های ۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۴ یا KS41101، KS41102، KS41103، KS41105 و KS41157 نیز ژنوتیپ های متتحمل تر شناخته شدند.

مقدار شاخص SSI در ارقام مقاوم را کمتر از ۰/۳۱ و در ارقام حساس بیش از ۰/۴۴ عنوان کردند، در حالیکه در این تحقیق مقدار شاخص SSI در ارقام مقاوم ۰/۶۷ و در ارقام حساس بیش از ۱/۵ بود. در مورد انتخاب شاخص مناسب، سه شاخص GMP, STI و MP بعنوان شاخص های مناسب انتخاب برای تحمل به خشکی شناخته شدند. اشنایدر و همکاران (Schneider *et al.*, 2004) نیز شاخص مناسب را GMP معرفی کردند.

تعیین ژنوتیپ های مناسب به آبیاری محدود با استفاده از بای پلات


جهت رسم بای پلات از ماتریسی استفاده شد که ردیف های آن ۱۵ ژنوتیپ لوبيا سفید و ستون های آن شاخص های محاسبه شده بود (جدول ۶). همان گونه که مشاهده می شود فقط دو مؤلفه اول دارای مقادیر

با توجه به معادله های بالا مقادیر بالاتر از مؤلفه اول (سازگاری با آبیاری محدود) و مقادیر کمتر از مؤلفه دوم (حساسیت به آبیاری محدود) مدنظر می باشد. بر این اساس ناحیه چهارم در نمودار بای پلات شامل متتحمل ترین ژنوتیپ ها می شود. همچنین با توجه به

جدول ۶- تجزیه به مؤلفه های اصلی برای شاخص های حساسیت به خشکی لوبيا سفید

Table 7. Principle Component Analysis for drought stress indices for white bean genotypes.

مؤلفه Component	مقدار ویژه Eigen value	نسبت واریانس Variance ratio	واریانس تجمعی Cumulative variance
1	4.297	61.392	61.392
2	2.691	38.440	99.832
3	0.008	0.119	99.952
4	0.003	0.039	99.991
5	0.0006	0.009	100
6	4.667	0	100
7	0	0	100



شکل ۱- نمودار دو بعدی برای تعیین شاخص ها و ژنو تیپ های برتر در لوبیای سفید

Figure 1. Biplot for determination of the superior indices and genotypes in white bean.

References

- Adiku, S. G. K., G. Renger, M. Facklam and C. Hecht-Bucholtz. 2001.** Simulation of the dry matter production and seed yield of common beans under varying soil water and salinity conditions. Agricultural Water Management. 47:55-68.
- Anonymous.** 2003. Agriculture Statistics in 2001-2002. Statistics and Information Technology Office. Ministry of Jihad-e-Agriculture. pp. 182.
- Fernandez, G. C. 1992.** Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In proceeding of a Sympo. Taiwan.13-16 Aug.1992. C.G. Kuo (Ed). AVRDC.
- Fisher, R. A., and R. Maurer. 1978.** Drought resistance in spring wheat cultivar. I. grain yield responses. Aust. J. Agric. Res. 29: 897-912.
- Francisco, J., G. Ibrrra-Perez, B. Ehdaie and D. G. Waines. 1997.** Estimation of outcrossing rate in common bean. Crop Sci. 37: 60-65.
- Gabriel, K. R. 1971.** The biplot graphical display of matrices with applications to principal component analysis. Biometrika. 58: 453-467.
- Grezesaik, S., W. Filek, G. Skrudlik and B. Nizoli. 1996.** Screening for drought tolerance: evalution of seed germination and seedling growth for drought resistance in legume plants. J. Agron and Crop Sci. 177: 245-252.
- Ibrahimi, M., M. R. Ghannadha (Bihamta) and F. Khiyalparast.** 2001. Study of the response of some red and white varieties of common bean to limited irrigation. M.Sc. Thesis. The University of Tehran, Iran. pp. 112.
- Majnoon Hosseini, N.** 1994. Food legumes in Iran. pp. 240.

- Manly, B. F. J. (Ed.). 1994.** Multivariate statistical methods. Chpman & Hall. Moghaddam, M., S. A. Mohammadi, M. Aghae Sarbarzeh (Translated into persian). pp. 254.
- Mirzaie Nadooshan, H. 1997.** Study of genetic diversity and geo-morphological in collection of Iranian and foreign beans. M.Sc. Thesis. Tarbiat Moddares University, Iran. pp.112.
- Nielsen, D. C. and N. O. Nelson. 1998.** Black bean sensivity to water stress at various growth stages. Crop Sci. 38: 422-427.
- Raffi, S. A. M., A. Newas and N. Khan. 2004.** Stability analysis for pod and seed production in Dry bean (*Phaseolus vulgaris* L.). Plant Sci. 3(2): 239-242.
- Richards, R. A. 1996.** Defining selection criteria to improve yield under drought. Plant Growth Regulation. 20:157-166
- Rosielle, A. A. and J. Hamblin. 1981.** The cortical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Sci. 21: 943-946
- Schneider, K. A., R. Rosales-Serna, F. Ibarra-Perez, B. Cazares-Enriquez, J. A. Acosta-Gallegos, P. Ramirez-Vallejo, N. Wassimi, and J. D. Kelly. 2004.** Improving common bean performance under drought stress. Crop Sci. 37: 43-50
- Schneider, K. A., R. Rosales-Serna, J. A. Acosta-Gallegos P. Ramirez-Vallejo. 1997.** Improving pulse performance under drought stress. Crop Sci. 44 : 16-32.
- Singh, S. P. 2002.** Comparison of sources and lines selected for drought resistance in common bean. Crop Breeding Genetics and Cytology. Crop Sci. High-Bean research.
- Singh, A. K. and S. S. Saini. 1983.** Heterosis and combining ability studies in French bean. SABRAOJ. 15(1): 17-22.
- Turkan, I., M. Bor, O. Filiz, and H. Koca. 2005.** Differential responses of lipid per oxidation and antioxidants in the leaves of drought-tolerant *P. acutifolius* Gray and drought-sensitive *P. vulgaris* L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress. Plant Sci. 168. 223-231.
- Yordanov, I., V. Velikova, T. Tsonev. 2003.** Plant responses to drought and stress tolerance. Plant Physiol. 3:187-206.

" ... "

Study of quantitative and qualitative traits and their relationships with grain yield in white bean (*Phaseolus vulgaris* L.) under optimum and limited irrigation conditions

Mohammadi, A.,¹ M. R. Bihamta², M. Soluoki³ and H. R. Dorri⁴

ABSTRACT

Mohammadi, A., M. R. Bihamta., M. Soluoki and H. R. Dorri. Study of quantitative and qualitative traits and their relationships with grain yield in white bean (*Phaseolus vulgaris* L.) under optimum and limited irrigation conditions. **Iranian Journal of Crop Sciences.** **10(3): 231-243 (in Persian).**

Drought stress often is a limited factor in world that threatens crop yield. Application of breeding and selection of tolerant genotypes to abiotic stresses are logical approach for determination of tolerant genotypes that have a high performance under drought. In order to study quantitative and qualitative traits and their relationships with grain yield in white bean genotypes under optimum and limited irrigation conditions, 15 white bean genotypes were studied in two experiments using randomized complete block design with three replications in experimental field, Faculty of Agricultural, The University of Tehran in 2004 cropping season. Combined analysis of variance showed high genetic variation for most of the traits. Some traits had high genetic variation under both conditions. Stress Susceptibility Index (SSI), Geometric Mean Productivity (GMP) and Stress Tolerance Index (STI) had positive correlation with yield under optimum and limited irrigated conditions. Thus genotypes with greater GMP, STI and lower SSI were identified as the tolerant genotypes. For further evaluation, biplot was used. Four genotypes including No. 1, 2, 3, 5 and 14 were identified as tolerant genotypes and STI , GMP, MP indices were determined as suitable indicas in screening for drought tolerance.

Keywords: White bean, Quantitative traits, Qualitative traits, Drought tolerance indices, Biplot.

Received: August, 2006.

- 1- M.Sc. Graduate in plant breeding, Zabol University, Zabol, Iran.(Corresponding author)
- 2- Prof., The University of Tehran, Karaj, Iran.
- 3- Faculty member, Zabol University, Zabol, Iran.
- 4- Faculty member, Agriculture and Natural Resources Center of Markazi province, Khomein, Iran.