

## ارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ‌های برنج (*Oryza sativa L.*) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه

Evaluation of molecular diversity in rice (*Oryza sativa L.*) genotypes using microsatellite markers linked with agronomic and grain physico-chemical characteristics

مهرزاد الهقای پور<sup>۱</sup>، عزت‌الله فرشادفر<sup>۲</sup> و بابک ریعی<sup>۳</sup>

### چکیده

اله قلی پور، م. ع. فرشاد فر و ب. ریعی. ۱۳۹۲. ارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ‌های برنج (*Oryza sativa L.*) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه. مجله علوم زراعی ایران. ۱۵(۴): ۳۳۷-۳۵۴.

به منظور ارزیابی تنوع مولکولی و طبقه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج، تعداد ۹۶ ژنوتیپ برنج موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش از ۵۲ جفت آغازگر ریزماهواره پیوسته با ژن‌های کنترل کننده خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه برنج با توزیع نسبتاً یکنواخت روی ۱۲ جفت کروموزوم برنج استفاده شد. در این آزمایش، تعداد آلل‌های چندشکل ۳۶۱ آلل با متوسط ۴/۲۵۰ آلل در هر مکان ژنی بود. نتایج نشان داد که نشانگرهای RM5642 و RM276 کروموزوم شماره ۶ و نشانگرهای RM14 و RM1 روی کروموزوم شماره ۱ بیشتر از ۹ آلل داشتند. بیشترین و کمترین مقدار محتوی چندشکل (PIC) برای نشانگرهای RM5642 و RM207 به ترتیب ۰/۸۵۴ و ۰/۵۱۰ بودند. تجزیه خوشه‌ای بر اساس داده‌های مولکولی با استفاده از روش دورترین همسایه و ضریب تشابه جاکارد منجر به گروه‌بندی ارقام در نه گروه گردید، به‌طوری‌که باعث تفکیک ارقام محلی با دارا بودن خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه مطلوب از ارقام اصلاح شده و سایر ژنوتیپ‌ها گردید. بدین ترتیب تعداد ۹ رقم از ۹ گروه متفاوت شامل ارقام دیلمانی، طارم محلی، لاین ۲۳، RI1843046 (هاشمی × صالح)، RI1843223 (محمدی × صالح)، IR50، لاین حاصل از تلاقی برگشتی بین دو رقم صالح و آجی بوچی، RI184421 (حسن سرائی × سپیدرود) و RI184472 (غريب × سپیدرود) به عنوان والدین تلاقی‌ها برای تهیه جمعیت‌های اصلاحی انتخاب شدند. بررسی ضرایب تشابه محاسبه شده بین ارقام انتخابی برای استفاده در برنامه اصلاحی نشان داد که میزان تشابه ارقام با یکدیگر بسیار پائین بوده و پیش‌بینی می‌شود که در بین نتایج حاصل از این ارقام به عنوان والدین تلاقی‌ها، تنوع لازم برای اصلاح هدفمند خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه برنج وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که استفاده از نشانگرهای مولکولی اختصاصی و همبسته با ژن‌های کنترل کننده خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه به دلیل عدم تاثیرپذیری آنها از عوامل محیطی می‌تواند ابزار مناسبی برای تولید و اصلاح هدفمند ارقام جدید در جمعیت‌های اصلاحی با استفاده از روش انتخاب به کمک نشانگر باشد.

واژه‌های کلیدی: برنج، تنوع مولکولی، تجزیه خوشه‌ای، ضریب تشابه و نشانگر ریزماهواره.

این مقاله مستخرج از رساله دوره دکتری نگارنده اول می‌باشد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۵/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۱۳

۱- دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج. عضو انجمن علوم زراعت اصلاح نباتات ایران (مکاتبه کننده) (پست الکترونیک: alahgholipour@yahoo.com)

۲- استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

۳- استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

## مقدمه

لاینهای والدینی برنج هیرید به کمک نشانگرهای مولکولی ریزماهواره بهتر از مطالعه آنها به وسیله خصوصیات مورفولوژیک است. طبخ کار و همکاران (Tabakhkar *et al.*, 2011) با مطالعه تنوع مولکولی در ژنتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کنترل کننده کیفیت دانه گزارش نمودند که بیشترین تعداد آلل‌های چندشکل در کل جمعیت مربوط به نشانگر RM276 روی کروموزوم ۶ بود. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که تنوع ژنتیکی بالایی بین کلیه ژنتیپ‌های مورد مطالعه و به خصوص بین ژنتیپ‌های بومی برنج از نظر جایگاه‌های ریزماهواره وجود دارد، به‌طوری که می‌توان از تنوع موجود برای اصلاح خصوصیات کیفی دانه به ویژه در لاینهای پرمحصول استفاده نمود.

استفاده از نشانگرهای مولکولی مبتنی بر قسمت‌های کد کننده ژنوم و یا نشانگرهای پیوسته با ژن‌های دخیل در عملکرد و اجزای آن، می‌تواند برآورد دقیقی از روابط ژنتیپ‌ها را به وجود آورد (Bernardo, 2001). بهره برداری از والدین متقابل در دورگ‌گیری و برنامه هیریداسیون باعث افزایش استفاده از هتروزیس شده و همچنین باعث ایجاد طیف وسیعی از تنوع در نسل‌های در حال تفکیک می‌گردد که شانس انتخاب لاینهای مناسب افزایش می‌یابد. گزینش والدین با مطالعه تنوع ژنتیکی به‌طور موفقیت‌آمیزی در گونه‌های مختلف زراعی بر اساس خصوصیات مورفولوژیک (Bar-Hen *et al.*, 1995)، فیزیولوژیک (Suh *et al.*, 1997)، آیزوزايم (Hamrick and Godt, 1997) و پروتئین‌های ذخیره‌ای (Smith *et al.*, 1987) انجام شده است. استفاده از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در برنامه‌های اصلاحی، اساس و پایه ارزیابی روش‌های اصلاح سنتی بوده و استفاده از نشانگرهای مولکولی می‌تواند مکمل روش‌های اصلاح سنتی باشد (Xi *et al.*, 2008). بنابراین مطالعه و شناخت ارقام مختلف برنج و پی بردن به

آگاهی از میزان تنوع در میان ژنتیپ‌های گیاهان زراعی و از جمله برنج، اولین گام در اصلاح برای صفات مهم زراعی است. تنوع ژنتیکی بین ژنتیپ‌های والدینی معمولاً به وسیله تفاوت‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و صفات مهم اقتصادی ارزیابی می‌شود. معایب این شیوه مرسوم، وقت‌گیر بودن، نیاز به تعداد نمونه زیاد و تاثیر عوامل محیطی در خلال اندازه‌گیری می‌باشد (Zheng *et al.*, 2006). توجه به این نکته مهم است که صفات مورفولوژیک اغلب از نظر تعداد محدود بوده و ممکن است ارتباط ژنتیکی حقیقی بین ژنتیپ‌ها را به خوبی نشان ندهند. بر عکس، تفاوت ژنتیکی بر اساس چندشکلی DNA زیاد و مستقل از عوامل محیطی بوده و مقدار نمونه کمی می‌تواند آگاهی‌بخش باشد (Kamoshita *et al.*, 2008). در بین نشانگرهای مولکولی، نشانگر ریزماهواره‌ها به علت چند شکلی بالا، همبارز بودن و عدم تاثیر از شرایط محیطی به عنوان نشانگری مطمئن مورد توجه هستند و به طور گسترده‌ای در شناسایی و طبقه‌بندی ارقام گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Smith *et al.*, 2000).

Das و همکاران (Das *et al.*, 2012) با بررسی تنوع ژنتیکی بین ارقام مختلف برنج با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی ریزماهواره ارقام باسماتی را از ارقام محلی غیر باسماتی تفکیک نمودند. Jain و همکاران (Jain *et al.*, 2004) با مطالعه ۳۰ ژنتیپ برنج با استفاده از شینگ-جان و همکاران (Sheng-jun *et al.*, 2006) با بررسی تنوع ژنتیکی بین ۴۱ لاین والدینی برنج هیرید به کمک نشانگرهای مولکولی ریزماهواره اعلام نمودند که لاینهای والدینی در دو گروه اصلی نگهدارنده و برگ‌داننده باروری قرار دارند و اظهار داشتند که از نقطه نظر اصلاح برنج هیرید، تفکیک و گروه بندی

تصادفی با دو تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. در این آزمایش خصوصیاتی مانند عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار)، وزن صد دانه (گرم)، تعداد خوش در بوته، تعداد دانه پر در خوش، ارتفاع بوته (سانتی متر)، طول برگ پرچم (سانتی متر)، روز تا ۵۰ درصد گلدهی، شکل دانه، میزان آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن، میزان برنج سالم و خرد با نمونه برداری از ۱۰ بوته تصادفی در هر کرت طبق دستورالعمل موسسه تحقیقات بین المللی برنج (IRRI, 1996) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. اسامی، مشخصات و منشاء ارقام و لاینهای برنج مورد استفاده در جدول یک ارائه شده است. برای ارزیابی مولکولی ژنوتیپ‌های برنج مورد مطالعه، از ۵۲ جفت آغازگر ریزماهواره همبسته با QTL‌های خصوصیات زراعی و فیزیکوژیمیابی مرتب با کیفیت دانه با استفاده از نقشه‌های SSR ارائه شده به وسیله چن و همکاران (Chen *et al.*, 1997)، Temnykh *et al.*, 2000 و McCouch *et al.*, 2002) با توزیع نسبتاً یکنواخت روی ۱۲ جفت کروموزوم برنج استفاده گردید (جدول ۲). استخراج DNA از برگ‌های جوان گیاهچه‌های ۲۱ روزه در مرحله چهار برگی با استفاده از روش CTAB انجام شد (Murray and Thompson, 1980). واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با استفاده از دستگاه ترموسایکلر (T-Gradient, Biometra, USA) در حجم ۱۰ میکرولیتر برای هر واکنش شامل دو میکرولیتر DNA ژنومی با غلظت تقریبی ۵ نانو گرم در میکرولیتر، ۰/۵ میکرولیتر از آغازگرهای روبه جلو و روبه عقب با غلظت ۵ میکرومولار، ۱/۲ میکرولیتر مخلوط بازهای آلی (dNTPs) با غلظت یک میلی مولار، ۰/۱۴ میکرولیتر آنزیم تک پلی‌مراز با غلظت ۵ واحد در میکرولیتر، ۰/۴۸ میکرولیتر کلرید منزیم با غلظت ۵۰ میلی مولار و یک میکرولیتر بافر پی سی آر با غلظت ۱۰ برابر (۱۰X) انجام گردید. فرآورده‌های PCR تا انجام الکتروفورز در

خصوصیات بارز آنها می‌تواند کمک موثری در تولید ارقام اصلاح شده جدید پر محصول با دارا بودن کیفیت پخت و دیگر خصوصیات مطلوب مثل مقاومت به بیماری‌های، ورس و زودرسی بنماید. لازم به ذکر است که ارقام اصلاح شده پرمحصول که تاکنون معرفی شده‌اند، علی‌رغم پنجه‌زنی بالا و مقاومت نسبت به بیماری بلاست و عملکرد بالا، بدلیل ضعف خصوصیات کیفی (مخصوصاً کیفیت پخت) در رقابت با ارقام بومی توفیق چندانی نداشته‌اند و از این رو با استقبال کم در بازار مواجه و به قیمت نازلت‌تری خریداری می‌شوند. دلیل این موضوع این بوده است که در اصلاح این ارقام در نسل‌های در حال تفرق فقط به عملکرد دانه و اجزای آن و صفات مرتبط به مقاومت به آفات و بیماری‌ها و ورس توجه شده و گزینش لاینهای بر مبنای خصوصیات کیفی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین دست‌یابی به ارقام نسبتاً پرمحصول که دارای خصوصیات مناسب پخت باشند، در اولویت برنامه‌های تحقیقاتی قرارداده است (Allahgholipour *et al.*, 2012). بدین منظور، این پژوهش با هدف مطالعه و تعیین تنوع و گروه‌بندی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی همبسته با QTL‌های صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت دانه، ارزیابی چند شکلی ژنتیکی، شناسایی گروه‌های والدینی و متعاقب آن انتخاب والدین مناسب جهت تهیه جمعیت‌های اصلاحی برای دست‌یابی به ارقام و لاینهای جدید پرمحصول و کیفی برنج انجام گردید.

## مواد و روش‌ها

در این آزمایش تعداد ۹۴ ژنوتیپ برنج سازگار با شرایط اقلیمی استان گیلان، شامل ۲۳ رقم محلی، ۵۶ رقم و لاینهای اصلاح شده و ۱۵ رقم وارداتی و خارجی موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج کشور که تاکنون با استفاده از نشانگرهای مولکولی ارزیابی نشده‌اند، انتخاب و در قالب طرح بلوک‌های کامل

### جدول ۱- اسامی، منشاء و مشخصات ژنوتیپ‌های برنج مورد بررسی

Table 1. Name, origin of country and pedigree of rice genotypes used in this experiment

No.	شمار	Genotype	ژنوتیپ	Pedigree	شجره	Origin	منشاء
1	Sangejo		سنگ‌جو	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران
2	RI18430-30-1-2-1-1	لاین اصلاحی	Saleh / Hashemi	هاشمی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
3	Mohammadi	محمدی	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
4	Salari	سالاری	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
5	Alikazemi	علی‌کاظمی	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
6	Hassansaraiee	حسن‌سرایی	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
7	Ahlmitaroom	اهمی طارم	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
8	Anbarbo	عبربو	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
9	Daylamani	دیلمانی	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
10	Shahpasand	شاه‌پسند	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
11	Garib	غريب	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
12	Domsefid	دم‌سفید	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
13	Domzard	دم‌زرد	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
14	Gharib sia Rayhani	غريب سياه‌ريحانی	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
15	Tarom Mohali	طارم‌محلی	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
16	Tarom Amiri	طارم‌امیری	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
17	Binam	بینام	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
18	Hassani	حسنی	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
19	Hashemi	هاشمی	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
20	Domsiah	دم‌سیاه	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
21	Abjiboji	آبحی‌بوجی	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
22	RI18430-40-1-1-1-1	لاین اصلاحی	Saleh / Hashemi	هاشمی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
23	Ghashenge	فشنگه	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
24	Champa Boodar	چampa بودار	Local cultivar	رقم محلی	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
25	RI18430-46-1-2-1-1	لاین اصلاحی	Saleh / Hashemi	هاشمی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
26	RI18430-52-1-2-1-2	لاین اصلاحی	Saleh / Hashemi	هاشمی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
27	RI18430-20-1-2-2-1	لاین اصلاحی	Saleh / Hashemi	هاشمی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
28	RI18430-56-1-2-3-1	لاین اصلاحی	Saleh / Hashemi	هاشمی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
29	Ramezanali Tarom	رمضانی‌طارم	Local cultivar	رقم محلی	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
30	RI18431-4-2-3-1-1	لاین اصلاحی	Saleh / Abjiboji	آبحی‌بوجی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
31	RI18431-12-2-3-2-2	لاین اصلاحی	Saleh / Abjiboji	آبحی‌بوجی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
32	RI18431-21-1-3-2-2	لاین اصلاحی	Saleh / Abjiboji	آبحی‌بوجی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
33	Gohar	گوهر	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Basmati, India	باسماتی، هندوستان	
34	RI18431-29-1-2-2-1	لاین اصلاحی	Saleh / Abjiboji	آبحی‌بوجی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
35	Line 23	لاین ۲۳	Introduction	رقم وارداتی	IRRI <sup>8</sup> , Philippines	ایری، فیلیپین	
36	Line 830	۸۳۰	Introduction	رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین	
37	Line 831	۸۳۱	Introduction	رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین	
38	Line 840	۸۴۰	Introduction	رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین	
39	Line 841	۸۴۱	Introduction	رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین	
40	Neda	ندا	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
41	Nemat	نعمت	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
42	Dorfak	درفک	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
43	Kadous	کادوس	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین	
44	Saleh	صالح	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
45	Sepidrood	سپیدروود	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
46	Khazar	خرز	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
47	Shiroodi	شیروودی	Improved cultivar	رقم اصلاح شده	Mazandran, Iran	مازندران، ایران	
48	RI18432-9-1-3-2-1	لاین اصلاحی	Saleh / Mohammadi	محمدی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
49	RI18432-23-1-2-2-1	لاین اصلاحی	Saleh / Mohammadi	محمدی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	
50	RI18432-28-1-3-2-1	لاین اصلاحی	Saleh / Mohammadi	محمدی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران	

\*International Rice Research Institute

ادامه جدول ۱ -

Table 1 continued-

No.	شماره	Genotype	ژنوتیپ	Pedigree	شجره	Origin	منشاء
51	RII8432-67-2-1-3-2	لین اصلاحی	Saleh / mohamadi		محمدی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران
52	RII8432-30-2-2-3-1	لین اصلاحی	Saleh / mohamadi		محمدی / صالح	Guilan,Iran	گیلان، ایران
53	Taychoung	تایچونگ	Introduction		رقم وارداتی	China	چین
54	Fojiminori	فوجی میوری	Introduction		رقم وارداتی	China	چین
55	Usen	یوسن	Introduction		رقم وارداتی	Egypt	مصر
56	IR36	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI*, Philippines	ایری، فیلیپین
57	IR58	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
58	IR28	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
59	IR30	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
60	IR50	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
61	IR60	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
62	Zinet	زنیت	Introduction		رقم وارداتی	Egypt	مصر
63	RII8434-7-1-2-3-1	لین اصلاحی	Saleh / Hassani		حسنی / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
64	RII8434-10-1-2-2-2	لین اصلاحی	Saleh / Hassani		حسنی / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
65	RII8435-7-1-3-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Ahlamitarom		علمی طارم / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
66	RII8435-10-2-2-3-1	لین اصلاحی	Saleh / Ahlamitarom		علمی طارم / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
67	Line44	لین ۴۴	PR27137-CR153		رقم خارجي	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
68	Line45	لین ۴۵	PSBRC44( IR59468-B-B-3-2)		رقم خارجي	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
69	18431 / Abjiboji	لین اصلاحی	Saleh / Abjiboji // Abjiboji		آبجی یوجی / آبجی یوجی / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
70	RII8436-8-1-2-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Hassansaraiee		حسن سرانی / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
71	RII8436-15-1-2-3-2	لین اصلاحی	Saleh / Hassansaraiee		حسن سرانی / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
72	RII8436-11-1-2-2-2	لین اصلاحی	Saleh / Hassansaraiee		حسن سرانی / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
73	RII8437-12-2-1-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Salari		سالاری / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
74	RII8437-42-1-3-3-2	لین اصلاحی	Saleh / Salari		سالاری / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
75	RII8437-6-1-2-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Salari		سالاری / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
76	RII8437-10-1-3-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Salari		سالاری / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
77	RII8439-1-2-3-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Gharib		غرب / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
78	RII8439-9-1-2-2-1	لین اصلاحی	Saleh / Gharib		غرب / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
79	RII8439-20-1-2-3-2	لین اصلاحی	Saleh / Gharib		غرب / صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
80	RII8439-16-1-2-1-1	لین اصلاحی	Saleh / Gharib		غرب صالح	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
81	RII8440-1-1-2-1-2	لین اصلاحی	Sepidrood / Abjiboji		آبجی یوجی / سپیدرود	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
82	IRFAON2010-216	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	Guilan,Iran	گیلان، ایران
83	RII8440-2-1-2-3-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Abjiboji		آبجی یوجی / سپیدرود	Guilan,Iran	گیلان، ایران
84	RII8441-3-1-2-3-2	لین اصلاحی	Sepidrood / Hashemi		هاشمي / سپیدرود	Guilan,Iran	گیلان، ایران
85	IIIRON2010-112	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
86	RII8442-1-1-1-2-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Hassansaraiee		حسن سرانی / سپیدرود	Guilan,Iran	گیلان، ایران
87	RII8442-10-2-1-2-3	لین اصلاحی	Sepidrood / Hassansaraiee		حسن سرانی / سپیدرود	Guilan,Iran	گیلان، ایران
88	RII8442-22-2-1-3-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Hassansaraiee		حسن سرانی / سپیدرود	Guilan,Iran	گیلان، ایران
89	IIIRON2010-410	لین اصلاحی	Introduction		رقم وارداتی	IRRI, Philippines	ایری، فیلیپین
90	RII8443-3-1-2-3-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Mohammadi		محمدی / سپیدرود	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
91	RII8443-10-2-2-3-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Mohammadi		محمدی / سپیدرود	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
92	RII8444-6-2-1-3-2	لین اصلاحی	Sepidrood / Ahlamitarom		علمی طارم / سپیدرود	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
93	RII8445-24-1-1-2-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Hassani		حسنی / سپیدرود	Guilan ,Iran	گیلان، ایران
94	RII8447-2-1-2-1-1	لین اصلاحی	Sepidrood / Gharib		غرب / سپیدرود	Guilan ,Iran	گیلان، ایران

\*International Rice Research Institute

حرارتی بصورت دمای کاهشی طبق روش دان و همکاران (Don *et al.*, 1991) برنامه‌ریزی شد. فرآورده‌های PCR روی ژل پلی اکریل آمید ۱۰ درصد

دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. به منظور حذف نوارهای شبه ریز ماهواره و جلوگیری از اتصال غیر تخصصی آغازگرها، ۱۰ دور اول چرخه

و در مجموع ۳۶۱ آلل را ایجاد نمودند. تعداد آلل موثر، تعداد آلل مشاهده شده و محتوای اطلاعات چندشکل محاسبه و به همراه خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه برای هر نشانگر، در جدول ۲ ارائه شده است. نتایج نشان داد که تعدادی از نشانگرها مثل RM276 پیوسته با عملکرد دانه و RM5642 پیوسته با میزان آمیلوز روی کروموزوم ۶ و نشانگرها RM14 و RM1 همبسته با وزن صد دانه، تعداد خوشه در بوته و عملکرد دانه روی کروموزوم ۱ بیشتر از ۹ آلل مشاهده شده داشتند، در حالی که نشانگرها دیگر مثل RM16، RM1، RM207، RM317 و RM208 واقع در کروموزوم‌های متفاوت و پیوسته با عملکرد دانه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه در بوته و ارتفاع بوته دارای ۳-۴ آلل بودند. شینگ‌جان و همکاران (Sheng-jun *et al.*, 2006) با مطالعه تنوع ژنتیکی در بین ۴۱ لاین والدینی برنج هیرید با استفاده از ۶۶ آغازگر ریزماهواره، تعداد آلل‌های مشاهده شده را در مجموع ۳۰۱ آلل با دامنه بین ۱۳-۲ آلل گزارش نمودند. نتایج مشابهی توسط آکاگی و همکاران (Akagi *et al.*, 1997) مبنی بر چندشکل کمتر و تعداد آلل‌های کمتر برای نشانگرها RM1 و RM3 گزارش گردیده است. میزان اطلاعات چندشکل (PIC) که بیانگر عکس العمل تنوع و فراوانی آللی بین ژنوتیپ‌ها است، از یک مکان ژئی به مکان دیگر متفاوت و برای همه نشانگرها ریزماهواره مورد بررسی در این آزمایش یکسان نبود. در این آزمایش، میزان اطلاعات چند شکل برای مکان‌های ژئی مختلف بین ۰/۵۱۵ تا ۰/۸۵۴ با میانگین ۰/۷۳۱ بود. بیشترین و کمترین میزان اطلاعات چند شکل به ترتیب مربوط به نشانگر RM5642 واقع در کروموزوم ۶ (۰/۸۵۴) و RM207 (۰/۵۱۵) بود. تعدادی از نشانگرها روی کروموزوم ۶ (۰/۵۱۵) بود. تعدادی از نشانگرها RM592 (۰/۸۴۸)، RM240 (۰/۸۴۸) و RM1 (۰/۸۴۵) پیوسته با عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه پر در خوشه، ارتفاع بوته، روز تا

از هم تفکیک و سپس با اتیدیوم برومايد رنگ آمیزی و با دستگاه ژل داک (BioRad, USA) عکس‌برداری شدند. بر اساس الگوهای نواری واضح و روشن حاصل از الکتروفورز، نمره‌دهی در صورت حضور باند (۱) و عدم حضور باند (صفر) انجام شد. ماتریس بدست آمده برای محاسبه ضرایب تشابه مختلف از جمله ضریب تطابق ساده، ضرایب تشابه دایس و جاکارد استفاده شده و تجزیه خوشه‌ای با استفاده از روش‌های مختلف نظیر نزدیک‌ترین همسایه‌ها، دورترین همسایه‌ها و UPGMA انجام شد و برای هر یک از آنها ضریب همبستگی کوفتیک محاسبه و دندروگرام تجزیه خوشه‌ای رسم شد. میزان اطلاعات چند شکلی (Polymorphism Information Content) برای هر نشانگر ریزماهواره در ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از رابطه یک برآورد شد (Arias *et al.*, 2009).  

$$PIC = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n p_i^2 p_j^2 \quad (رابطه ۱)$$
  
 در این رابطه  $p_i$  نشان‌دهنده فراوانی آلل  $i$  ام و  $n$  بیانگر رقم زام است. برای تعیین واقعی گروه‌ها و تائید گروه‌بندی از تجزیه واریانس مولکولی با استفاده از نرم افزار Genalex ver 6.2 استفاده شد. کلیه محاسبه‌های آماری با استفاده از نرم افزارهای NTSYS-pc ver. 2.02 (Rohlf, 1999) برای POPGENE ver. 1.32 (Yeh *et al.*, 1999) شد. با استفاده از نرم افزار SPSS ver 17 میانگین خصوصیات مورفوژیک و فیزیکوشیمیایی دانه ژنوتیپ‌های برنج برای هر گروه حاصل از تجزیه خوشه‌ای محاسبه و با استفاده از آزمون  $t$  با میانگین کل هر گروه مقایسه گردید.

## نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه مولکولی نوارهای الکتروفورز نشان داد که تمامی نشانگرها مولکولی ریزماهواره در ۹۴ ژنوتیپ مورد مطالعه چندشکل بوده

**جدول ۲ - صفات گیاهی مرتبط با نشانگر، تعداد آلل های مشاهده شده، موثر و میزان اطلاعات چندشکلی برای کلیه نشانگرهای ریزماهواره استفاده شده برای ارزیابی تنویر**

**مولکولی ژنتیپ های برنج**

Table 2. SSR markers linked with rice genotypes characteristics, observed and effective number of alleles and polymorphic information content for all primers

ردیف No.	نشانگر SSR marker	شماره کروموزوم No. of Chromosome	تعداد آller مشاهده شده Observed No. alleles (Na)	تعداد آller موثر Effective No. alleles (Ne)	میزان اطلاعات چندشکلی PIC	صفات گیاهی مرتبط با نشانگر Plant Characteristics
1	RM 1	1	11	7.124	0.838	HGW, FGN, GY, FLL, PN
2	RM 3	6	8	6.346	0.824	GT
3	RM 7	3	6	4.128	0.719	AC, HRR
4	RM 11	7	8	4.588	0.752	HGW, FGN, GY, FLL, HRR, PN
5	RM 14	1	11	6.598	0.824	HGW, AC, GY, PH, PN
6	RM 16	3	4	3.830	0.752	PN, PH
7	RM 17	12	8	5.691	0.803	HGW, FGN, PH
8	RM 55	3	4	3.278	0.640	HGW, AC, FGN, GY, HRR, PH, PN
9	RM 103	6	7	4.697	0.754	GT
10	RM 104	1	6	4.708	0.743	HGW, FGN, GY, HRR, PN, PH
11	RM 119	4	6	4.443	0.743	FGN, PH
12	RM 125	7	5	2.779	0.588	HGW, AC, GT, GY,
13	RM 128	1	6	4.945	0.767	HGW, GT, FGN, GY, PH, FLL
14	RM 152	8	6	3.495	0.543	GY, PN
15	RM 164	5	6	5.191	0.780	HGW, FFD, GT, FGN, GY, PN, PH
16	RM 168	3	5	2.604	0.543	HGW, AC, FGN, GY, FLL, PH, PN
17	RM 171	10	6	5.032	0.771	HGW
18	RM 190	6	9	5.070	0.773	AC, GT, HRR, PH, GS
19	RM 202	11	7	5.364	0.791	HGW, GT, FGN, GY, FLL, PN, PH,
20	RM 204	6	6	4.186	0.724	HGW, GT, GY, FGN, GS, FLL, PN, PH
21	RM 205	9	6	3.356	0.652	HGW, PH
22	RM 207	2	4	2.494	0.515	FGN, PH, GY
23	RM 208	2	3	1.689	0.521	HGW, GY, FGN, PH
24	RM 209	11	7	3.221	0.648	HGW, AC, GY, HRR, PN, PH
25	RM 215	9	7	5.436	0.792	HGW, FGN, GY, PN, PH
26	RM 219	9	6	4.455	0.741	GT, AC, GY, PH

(ارتفاع بوته) PN= Plant Height, (وزن صد دانه) GY= Grain Yield, ( عدد دانه پر در خوش) FGN= Filled Grain Number, (وزن صد دانه) HGW=hundred Grain Weight, (دماي زلاتيني شدن) GT= Gelatinization Temperature, (دماي 50 درصد گلدهي) FLL= Flag Leaf Length, (روز تا 50 درصد گلدهي) GS= Grain Shape, (ميزان آميلوز) AC= Amylose Content, (ميزان برجام) HRR= Head Rice Recovery, (ميزان برنج سالم) FPF= Fifty Percent Flowering

ادامه جدول ۲

Table 2 Continued

ردیف No.	نامگر ریزماهواره SSR marker	شماره کروموزوم No. of Chromosome	تعداد آلل مشاهده شده Observed No. alleles (Na)	تعداد آلل موثر Effective No. alleles (Ne)	میزان اطلاعات چندشکلی PIC	صفات گیاهی مرتبط با نامگر Plant Characteristics
27	RM 223	8	7	4.663	0.755	HGW, FGN, GY, FLL, PN, PH
28	RM 239	10	4	2.689	0.556	HGW, AC
29	RM 240	2	9	7.324	0.848	HGW, FFD, FGN, GY, HRR, FLL, PN, PH
30	RM 250	2	6	4.246	0.732	HGW, FFD, FGN, FLL, GY, PN
31	RM 252	4	7	3.421	0.676	HGW, FFD, FGN, GY, PN, PH
32	RM 253	6	8	4.347	0.737	HGW, AC, FGN, GT, GY, FLL
33	RM 255	4	5	3.144	0.633	HGW, FGN, GY, FLL, PH, PN
34	RM 257	9	6	3.725	0.689	HGW, GY, PN, PH
35	RM 258	10	8	6.281	0.822	HGW, PH
36	RM 262	2	7	4.107	0.725	HGW, FFD, FGN, GY, PN, PH
37	RM 276	6	13	9.154	0.791	GY
38	RM 283	1	7	5.409	0.789	HGW, AC, FGN, PN
39	RM 316	9	8	5.335	0.787	GT
40	RM 317	4	4	3.412	0.661	GY, PN, PH
41	RM 340	6	5	3.060	0.623	HGW, GY, FLL, PN, PH, FGN
42	RM 445	7	9	4.998	0.773	HGW
43	RM 475	2	7	3.712	0.701	HGW, FGN, PH, PN, GY
44	RM 484	10	8	5.022	0.775	HGW, GT, PH
45	RM 491	12	6	4.275	0.706	PH
46	RM 549	6	6	4.370	0.734	PL
47	RM 551	4	8	6.281	0.823	HGW
48	RM 592	5	10	7.149	0.845	GY
49	RM 3097	12	9	6.914	0.836	AC
50	RM 5371	6	7	5.828	0.806	AC
51	RM 5642	5	12	8.604	0.854	AC
52	W 2 R	6	7	4.795	0.824	AC

PN= Panicle Number (ارتفاع بوته), PH= Plant Height, GY= Grain Yield (وزن صد ادانه), FGN= Filled Grain Number (تعداد خوش در خوش), HGW=hundred Grain Weight, (تعادل خوش در بوته)


GT= دمای زلایتی شدن، GS= Grain Shape, AC= Amylose Content, FLP= Fifty Percent Flowering (روز تا ۵۰ درصد گلدهی), FLL= Flag Leaf Length, HRR= Head Rice Recovery (وزن برنج سالم) (میزان آمیلوز)، FPF= Fifty Percent Flowering (شکل دانه)، (وزن برگ پرچم)

صفات مورفولوژیک و اطلاعات شجره‌نامه آنها، انتخاب شد که منجر به طبقه‌بندی ۹۴ ژنوتیپ برنج با مقدار تشابه بین ۰/۰۷۵-۱/۰ در ۹ گروه متفاوت گردید (شکل ۱). ضریب همبستگی کوفتیک بین ماتریس تشابه (ماتریس ورودی) حاصل از ضریب جاکارد و ماتریس خروجی حاصل از دندروگرام تجزیه خوش‌های ۰/۹۴ بود. مقدار بالای ضریب همبستگی کوفتیک نشان می‌دهد که تجزیه خوش‌های با استفاده از ضریب تشابه جاکارد بر اساس داده‌های بدست آمده از نشانگرهای ریزماهواره اختصاصی در گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج مورد بررسی بسیار مناسب بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی با در نظر گرفتن گروه‌ها به عنوان تیمار و ژنوتیپ‌های درون هر گروه به عنوان تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی نشان داد که اختلاف بین جمعیت‌ها (گروه‌ها) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بوده و انتخاب گروه‌ها به درستی انجام شده است. به عبارت دیگر تنوع یا واریانس بین گروه‌ها بیشتر از واریانس درون گروه‌ها بود که نشان دهنده متفاوت بودن گروه‌ها از یکدیگر و مشابه بودن افراد درون هر گروه با هم بود (جدول ارائه نشده است). نتایج حاصل از گروه‌بندی نشان داد که گروه اول با دارا بودن ۱۲ رقم با متوسط عملکرد ۳۸۹۰ کیلوگرم در هکتار، وزن صددانه ۲/۵۵ گرم، تعداد دانه پر در خوش‌ه ارقام کم محصول به شمار آمده و به استثنای وزن صد دانه، دارای اختلاف معنی‌داری نسبت به میانگین کل ژنوتیپ‌ها بودند. ارقام موجود در گروه اول با دارا بودن ارتفاع بوته ۱۵۲/۱۲ سانتی‌متر، روز تا ۵۰ درصد گلده‌ی ۹۳/۸۸ روز، طول برگ پرچم ۲۸/۵۷ سانتی‌متر و شکل دانه ۳/۶۹، جزء ژنوتیپ‌های بسیار پابلند با برگ‌های بلند و خمیده، دانه بلند و میانرس محسوب می‌شوند. ارقام تشکیل دهنده این گروه مانند علی کاظمی، حسن سرائی و دیلمانی، آمیلوز متوسط بوده و دارای میزان برنج سالم بیشتر و دانه خرد کمتری

۵۰ درصد گلده‌ی، طول برگ پرچم و تعداد خوش‌ه در بوته از نظر ارزش اطلاعات چند شکل، بعد از نشانگر RM5642 بیشترین مقدار را نشان دادند. مقادیر بالای ارزش اطلاعات چند شکل در این آزمایش حاکی از آن است که نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با QTL‌های عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه، چند شکلی بالای داشته و برای بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج مورد استفاده در این تحقیق در سطح DNA بسیار مناسب می‌باشند. در این آزمایش، تعداد آلل‌های مشاهده شده (Na) در ۹۴ ژنوتیپ مختلف برنج بین ۳-۱۳ با متوسط ۷ آلل و تعداد آلل موثر (Ne) بین ۱/۱۵۴-۹/۱۶۸۹ با متوسط ۴/۷۵۰ آلل موثر بود.

امینی نسب و همکاران (Amininasab et al., 2012) با مطالعه تنوع ژنتیکی در ۲۰ رقم برنج با استفاده از ۱۹ نشانگر ریزماهواره پیوسته با ژن‌های کنترل کننده تحمل به خشکی گزارش نمودند که تمامی نشانگرها چندشکلی بالای را نشان دادند و در مجموع تعداد ۱۴۲ آلل با میانگین ۷/۴۷ آلل در هر جایگاه ژنی را اعلام کردند. محتوای اطلاعات چندشکل بالا، تنوع زیاد و فراوانی آلل‌ها را در بین ارقام نشان می‌دهد، در واقع هر چه میزان اطلاعات چندشکل بالاتر باشد، تعداد آلل‌ها در هر مکان ژنی نیز بیشتر می‌شود. طیخ کار و همکاران (Tabakhkar et al., 2011) با مطالعه چهار گروه از ارقام برنج گزارش نمودند که ارقام وارداتی بالاترین (۰/۴۵) و ارقام آپلندهای پایین ترین (۰/۱۹) میزان محتوای اطلاعات چندشکل را داشتند. آنها همچنین این معیار تنوع در ارقام اصلاح شده ایرانی و محلی را به ترتیب برابر با ۰/۴۲ و ۰/۳۷ اعلام نمودند.

از مقایسه نتایج حاصل از روش‌های مختلف تجزیه خوش‌های و ضرایب تشابه مختلف، در نهایت تجزیه خوش‌های به روش دورترین همسایه‌ها بر مبنای ضریب تشابه جاکارد به دلیل ارائه دندروگرام مناسب (بدون وجود زنجیره‌ای شدن)، همبستگی کوفتیک بالاتر و به خصوص گروه‌بندی مناسب و مطابق با



شکل ۱- گروه بندی ژنوتیپ های برنج بر اساس نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیابی دانه

Fig.1. Grouping of rice genotypes based on SSR markers associated to agronomic and grain physico-chemical traits

در خوش، ارتفاع بوته و طول خوش دارای ۱۰۰ درصد نوار مشابه و یک‌شکل بودند. لاین‌های خالص شامل RI184347 و RI1843410 حاصل تلاقی بین صالح و حسنی، دو لاین خالص RI184357 و RI1843510 حاصل تلاقی بین صالح و اهلمنی طارم به همراه لاین حاصل از تلاقی برگشتی بین رقم اصلاح شده صالح (والد دهنده) و رقم محلی آبجی‌بوچی (والد دوره‌ای) به انضمام چند لاین خالص دیگر، ارقام و لاین‌های گروه چهارم را تشکیل دادند. این ارقام با دارا بودن عملکرد ۵۲۴۰ کیلوگرم در هکتار، وزن صد دانه ۲/۷۰ گرم، تعداد دانه پر و خوش بیشتر، از ارتفاع بوته کمتری برخوردار بودند که می‌توانند در دستیابی به ارقام مقاوم به خواییدگی بوته با ظرفیت کودپذیری بالا مورد استفاده قرار گیرند. میانرس بودن، میزان آمیلوز متوسط و میزان برنج سالم بیشتر و خرد کمتر از دیگر خصوصیات مهم ژنوتیپ‌های این گروه می‌باشد (جدول ۳). از نشانگرهای اختصاصی که در تمایز این گروه نقش داشتند می‌توان به نشانگرهای RM7، RM3 و ۲۰۵ و RM219 اشاره کرد که با QTL‌های کنترل کننده صفات عملکرد دانه، وزن صد دانه، ارتفاع بوته، دمای ژلاتینی شدن، میزان آمیلوز و میزان برنج سالم همبسته بوده و ارقام تشکیل دهنده این گروه از نظر نشانگرهای مذکور از ۹۲/۸-۱۰۰ درصد هم‌شکل بودند و باعث تفکیک این گروه از سایرین شدند. سه لاین خالص شامل RI184446، RI1844524 و RI184472 حاصل تلاقی رقم اصلاح شده سپیدرود با ارقام محلی در گروه پنجم واقع شدند که دارای عملکرد دانه و اجزای عملکرد متوسط و برگ‌های بلندی بوده و میانرس، آمیلوز متوسط و دارای میزان برنج خرد بالائی بودند. ارتفاع بوته مناسب و دانه بلندی این ارقام از صفاتی است که می‌تواند در دستیابی به ارقام پاکوتاه و دانه بلند مورد استفاده قرار گیرد. لاین‌های تشکیل دهنده این گروه برای سه نشانگر R2W، RM55 و RM5371 همبسته با صفت میزان آمیلوز و دو نشانگر

هستند و دارای کیفیت پخت و خوراک خوبی بوده و بعد از پخت نرم باقی می‌مانند (جدول ۳). نشانگر RM1 با ۱۰۰ درصد نوار مشابه و نشانگرهای RM7، RM11، RM16، RM207 و RM208 با ۹۱/۷ درصد نوار مشابه، باعث تمایز این گروه از سایر گروه‌ها گردیدند که با QTL‌های صفات عملکرد و اجزای آن، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، میزان آمیلوز و میزان برنج سالم پیوسته بودند. گروه دوم حاصل از تجزیه خوش‌های شامل ۱۶ ژنوتیپ بود که ارقام حسنی، طارم محلی و RI1843040 حاصل از تلاقی صالح و هاشمی و RI184314 حاصل از تلاقی رقم صالح و آبجی‌بوچی در این گروه قرار گرفتند. کلیه ارقام بومی برنج ایرانی به استثنای دو رقم محمدی و چمپا بودار در دو گروه اول قرار داشتند. ارقام برنج ایرانی با داشتن شجره و زمینه یکسان از نظر ژنتیکی، شbahت زیادی با یکدیگر داشته و به همین دلیل تمامی آنها در گروه‌های نزدیک به هم قرار گرفتند. عملکرد دانه متوسط (۵۰۲۰ کیلوگرم در هکتار)، ارتفاع بوته بلند (۱۳۵/۴۶ سانتی متر)، روز تا ۵۰ درصد گلدهی (۸۷/۸۸ روز) و میزان آمیلوز متوسط (۲۱/۵۲ درصد) از خصوصیات ارقام تشکیل دهنده گروه دوم می‌باشد. ارقام تشکیل دهنده این گروه برای دو نشانگر RM125 و ۲۰۵ درصد نوار مشابه نشانگرهاي RM104، RM128، RM316 و RM340 میزان نوار مشابه مشاهده شده ۹۳/۷ درصد بود که با QTL‌های صفات عملکرد دانه و اجزای آن، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، میزان آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن و میزان برنج سالم پیوسته بودند. در گروه سوم فقط رقم اصلاح شده خزر و ژنوتیپ RI1843223 (محمدی×صالح) با متوسط عملکرد دانه ۴۴۸۰ کیلوگرم در هکتار و ارتفاع بوته ۱۱۹/۰۸ سانتی متر قرار داشت. ژنوتیپ‌های موجود در این گروه از نظر دو نشانگر RM208 و RM549 پیوسته با QTL‌های عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه پر

### جدول ۳ - میانگین خصوصیات مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی دانه در گروههای مختلف حاصل از تجزیه خوشاهی ژنتیپهای برنج بر اساس نشانگرهای ریزماهواره

Table 3. Mean of morphologic and physico-chemical characteristics in different clusters of rice genotypes based on SSR markers

گروهندی Clusters	عملکرد دانه GY	وزن صد دانه HGW	تعداد دانه پر در خوشه FGN	تعداد خوشه در بوته PN	تعداد ۵۰ درصد گلدهی FPF	ارتفاع بوته PH	شکل دانه GS	طول برگ پرچم FLL	میزان آمیلوز AC	دمای ژلاتینی شدن GT	میزان برنج سالم HRR	میزان برنج خرد BR
Cluster 1	3.89**	2.55 <sup>ns</sup>	100.12**	13.47**	93.88 <sup>ns</sup>	152.12**	3.69*	28.57 <sup>ns</sup>	20.59**	4.35*	60.79**	10.85**
Cluster 2	5.02 <sup>ns</sup>	2.68 <sup>ns</sup>	124.92 <sup>ns</sup>	15.37 <sup>ns</sup>	87.88**	135.46*	3.88 <sup>ns</sup>	28.85 <sup>ns</sup>	21.52**	4.93 <sup>ns</sup>	57.38 <sup>ns</sup>	13.26 <sup>ns</sup>
Cluster 3	4.48*	2.72*	117.39 <sup>ns</sup>	15.92 <sup>ns</sup>	96.00 <sup>ns</sup>	119.08 <sup>ns</sup>	3.88 <sup>ns</sup>	22.65**	23.68 <sup>ns</sup>	5.70 <sup>ns</sup>	58.77 <sup>ns</sup>	11.34**
Cluster 4	5.24 <sup>ns</sup>	2.70 <sup>ns</sup>	125.69 <sup>ns</sup>	16.81 <sup>ns</sup>	92.00 <sup>ns</sup>	113.99 <sup>ns</sup>	4.06 <sup>ns</sup>	29.36 <sup>ns</sup>	22.22 <sup>ns</sup>	6.14*	55.94 <sup>ns</sup>	18.67**
Cluster 5	4.55 <sup>ns</sup>	2.74*	115.50 <sup>ns</sup>	16.33 <sup>ns</sup>	96.17 <sup>ns</sup>	120.20 <sup>ns</sup>	4.61**	36.81**	23.87 <sup>ns</sup>	4.47*	56.58 <sup>ns</sup>	17.40*
Cluster 6	5.23 <sup>ns</sup>	2.71*	131.41 <sup>ns</sup>	16.17 <sup>ns</sup>	86.33*	131.53 <sup>ns</sup>	3.76 <sup>ns</sup>	28.32 <sup>ns</sup>	23.33 <sup>ns</sup>	3.91*	59.38*	14.27 <sup>ns</sup>
Cluster 7	6.03*	2.59 <sup>ns</sup>	138.18**	20.46**	98.69*	109.97*	4.50**	25.48 <sup>ns</sup>	23.96 <sup>ns</sup>	5.91 <sup>ns</sup>	55.84 <sup>ns</sup>	13.53 <sup>ns</sup>
Cluster 8	5.66*	2.57 <sup>ns</sup>	137.80**	22.95**	92.25*	100.84**	3.64*	23.06*	26.09**	6.55**	55.64 <sup>ns</sup>	16.56 <sup>ns</sup>
Cluster 9	5.27 <sup>ns</sup>	2.35**	128.13 <sup>ns</sup>	18.45 <sup>ns</sup>	99.50*	114.44 <sup>ns</sup>	4.30 <sup>ns</sup>	25.22 <sup>ns</sup>	23.54 <sup>ns</sup>	5.06 <sup>ns</sup>	54.44**	16.81 <sup>ns</sup>
Mean	5.04	2.62	124.35	17.33	94.41	121.96	4.03	27.59	23.31	5.22	57.20	14.74

ns: Not significant

ns: غیرمعنی دار

\* and \*\*: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

\* و \*\*: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد  
 (ارتفاع بوته)، (تعداد خوشه در بوته)، (FGN= Filled Grain Number، HGW=hundred Grain Weight، PN= Panicle Number، GY= Grain Yield، PH= Plant Height، (تعداد دانه پر در خوشه)، (وزن صد دانه)، ( عملکرد دانه)، FLP= Flag Leaf Length، (شکل دانه)، FPF= Fifty Percent Flowering، GS= Grain Shape، AC= Amylose Content، GT= (دمای ژلاتینی شدن)، HRR= Head Rice Recovery، (میزان برنج خرد)، BR= Broken Rice، Gelatinization Temperature، (میزان برنج سالم))

با عملکرد دانه و اجزای آن، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و روز تا ۵۰ درصد گلدهی پیوسته بوده و ژنوتیپ‌های موجود در این گروه دارای ۹۳/۸ درصد نوار یک شکل برای سه نشانگر مذکور بودند. کلیه ارقام و لاین‌های خارجی با منشاء فیلیپین شامل IR36، IR28، IR58، IR50، IR60 و IR30 به همراه دولاین زنیت و یوسن با منشاء مصر و دو لاین خالص و اصلاح شده RI1843267 و RI1843230 حاصل از تلاقی دو رقم صالح و محمدی در گروه هشتم واقع شدند. عملکرد بالا و پاکوتاهی به همراه میزان آمیلوز و میزان برنج خرد بالا از خصوصیات مثبت و منفی این ژنوتیپ‌ها به شمار می‌آید که می‌تواند در موقع لزوم مورد استفاده اصلاح گران قرار گیرد. ژنوتیپ‌های تشکیل دهنده این گروه از نظر سه نشانگر RM125، RM205 و RM253 کاملاً هم‌شکل بوده (۱۰۰ درصد) و نوارهای مشابهی را نشان دادند. سه لاین وارداتی IRFAON-216، IRON-112 و IRON-421 با منشاء فیلیپین، به انضمام لاین‌های خالص RI184413 (هاشمی×سپیدرود)، RI184421 و RI1844220 حاصل تلاقی بین ارقام RI1844310 و RI184433 سپیدرود و حسن‌سرائی، RI184402 (آجی‌بوجی×سپیدرود) در گروه نهم واقع شدند. متوسط بودن میزان آمیلوز و عملکرد دانه به همراه ارتفاع بوته مناسب و شکل دانه بلند از صفات بارز ارقام این گروه می‌باشد. لاین‌های تشکیل دهنده این گروه برای سه نشانگر RM208، RM262 و RM340 همبسته با QTL‌های کنترل کننده خصوصیات عملکرد دانه و اجزای آن، طول برگ پرچم و ارتفاع بوته، ۱۰۰ درصد هم‌شکل بودند.

طبع کار و همکاران (Tabakhkar *et al.*, 2012) به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و اصلاح شده برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره

RM283 RM240 و پیوسته با QTL‌های کنترل کننده خصوصیات عملکرد دانه و اجزای آن، طول برگ پرچم و ارتفاع بوته، ۱۰۰ درصد هم‌شکل بودند. شش رقم محمدی، چمپابودار، دو لاین خالص RI1843046 و RI1843052 حاصل تلاقی بین دو رقم صالح و هاشمی، لاین ۴۵ (لاین زودرس، دانه متوسط و متتحمل به سرما) و لاین خالص RI1843615 (حسن‌سرائی×صالح) ارقام تشکیل دهنده گروه ششم بودند. این ژنوتیپ‌ها، علیرغم داشتن خصوصیات مشابه ارقام محلی، به دلیل برخورداری از عملکرد دانه و میزان آمیلوز بالا که از مشخصه‌های مهم ارقام این گروه است، در گروهی جدا از طبقه ارقام محلی قرار گرفتند. زودرسی از شاخص ترین خصوصیات ژنوتیپ‌های این گروه است که می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ژنوتیپ‌ها از نظر سه نشانگر R2W و RM168 و RM204 پیوسته با عملکرد دانه و اجزای آن، روز تا ۵۰ درصد گلدهی و میزان آمیلوز دارای ۱۰۰ درصد نوارهای مشابه و هم‌شکل بودند. نکته قابل توجه در این گروه‌بندی این است که تمامی ارقام و لاین‌های معرفی شده در سال‌های اخیر به استثنای رقم خزر در گروه هفتم واقع شده‌اند. داشتن خصوصیات مورفوЛОژیک مشابه، دلیل روشنی برای قرار گرفتن این ژنوتیپ‌ها در یک گروه می‌باشد. عملکرد دانه و اجزای عملکرد بالا، ارتفاع بوته مناسب و میزان آمیلوز بالا، میانرس تا دیررس بودن، شکل بلند دانه و بالا بودن میزان برنج خرد از خصوصیات بارز ارقام تشکیل دهنده این گروه می‌باشد. قرار گرفتن تمامی ارقام معرفی شده در یک گروه نشان می‌دهد که استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره همبسته با QTL‌های خصوصیات مورفوLOژیک و فیزیکوشیمیایی دانه در تفکیک و شناسائی این ارقام نسبت به نشانگرهای مورفوLOژیک که به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی هستند، دارای کارآئی بیشتری می‌باشد که در این بین می‌توان به نشانگرهای RM107، RM255 و RM262 اشاره نمود که

جدول ۴ - میزان ضریب تشابه و درصد چندشکلی بین ژنوتیپ‌های برنج انتخابی به عنوان والدین تلاقی‌ها بر اساس نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات مهم زراعی

Table 4. Similarity coefficient and polymorphism percent among selected rice genotypes as parents based on SSR markers associated with agronomic traits

ژنوتیپ‌های برنج Rice genotypes	طارم محلی Tarom Mohali	(هاشمی × صالح) RI1843046	۲۳ لайн 23	(محمدی × صالح) RI184329	۵۰ لайн IR50	آبجی بوچی / آبجی بوچی × صالح Backcross	(حسن سرانی × سپیدروود) RI184421	(غیری × سپیدروود) RI184472
Daylamni	دیلمانی	0.544 (58.5)	0.244 (76)	0.213 (80.7)	0.283 (74.5)	0.044 (92.2)	0.200 (82)	0.234 (78.8)
Tarom Mohali	طارم محلی		0.159 (81.6)	0.196 (82.4)	0.333 (70)	0.209 (84)	0.296 (73.5)	0.152 (86.3)
RI1843046	(هاشمی × صالح)			0.178 (82)	0.091 (91.8)	0.161 (79.6)	0.233 (77.1)	0.111 (88)
Line 23	۲۳ لайн				0.130 (88.2)	0.264 (74.5)	0.067 (92)	0.191 (78.8)
RI184329	(محمدی × صالح)					0.180 (80)	0.386 (59.2)	0.152 (86.3)
IR50	۵۰ لайн						0.207 (77.6)	0.198 (80.4)
Backcross	آبجی بوچی / آبجی بوچی × صالح						0.267 (70)	0.302 (68.1)
RI184421	(حسن سرانی × سپیدروود)							0.289 (71.4)

The numbers in parenthesis show polymorphism percent

اعداد داخل پرانتز نشان‌دهنده درصد چندشکلی هستند

مثبت و منفی آنها جهت فراهم نمودن تلاقي‌های مکمل به منظور ایجاد تنوع بیشتر صورت می‌گیرد. بررسی ضرایب تشابه محاسبه شده بین ارقام انتخابی برای استفاده در برنامه اصلاحی نشان داد که میزان تشابه ارقام با یکدیگر بسیار پائین بوده و انتظار می‌رود که پس از تلاقي‌های لازم، تفرق لازم از نظر خصوصیات مهم زراعی در جمعیت‌های اصلاحی که لازمه گزینش است، بروز نماید. تنها دو رقم محلی دیلمانی و طارم محلی انتخابی از دو گروه اول و دوم بیشترین شbahت (۰/۵۴۵) را در میان ارقام انتخابی با یکدیگر داشتند و به تبع آن درصد چندشکلی کمتری (۵/۵۸ درصد) را نشان دادند. کمترین میزان شbahت بین دو رقم دیلمانی با لاین IR50 (۰/۰۴۴) بود که درصد چندشکلی بالایی (۲/۹۲ درصد) را نشان دادند (جدول ۴). این دو رقم از نظر اکثر نشانگرها چندشکل بوده و بنابراین انتظار می‌رود که نتاج حاصل از آنها از تنوع بیشتری برخوردار باشند. همچنین برآورد درصد چند شکلی براساس نشانگرها ریزماهواره مورد استفاده نیز حاکی از بالا بودن چند شکلی بین آنها بوده و پیش‌بینی می‌شود که درین نتاج حاصل از این ارقام به عنوان والدین تلاقي‌ها، تنوع لازم برای اصلاح هدفمند خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیائی دانه بروز نماید. از آنجائیکه گروه‌بندی ارقام مورد بررسی بر اساس نشانگرها ریزماهواره اختصاصی و همبسته با ژن‌های کنترل کننده صفات مهم صورت گرفته است، می‌توان از روش انتخاب به کمک نشانگر نسبت به گزینش هدفمند لاین‌های واجد صفت یا صفات مورد نظر به منظور تولید ارقام اصلاحی جدید با عملکرد و کیفیت پخت مناسب و مقاوم به خواهدگی با طول دوره رشد مناسب، بهره‌برداری نمود. به کمک نشانگرها اختصاصی هر گروه، امکان شناسایی ارقام و لاین‌های مشابه هر گروه نیز فراهم می‌گردد که می‌تواند در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

همبسته با ژن‌های کنترل کننده صفات کیفی دانه، تعداد ۴۸ لاین اصلاح شده و بومی برنج را با استفاده از روش UPGMA و ضربی تطابق ساده در چهار گروه طبقه‌بندی نمودند، به‌طوری که ارقام محلی خوش کیفیت در گروهی جداگانه قرار گرفتند. آنها اعلام نمودند که نشانگرها مولکولی پیوسته با ژن‌های کنترل کننده صفات کیفی دانه ابزار مناسبی برای شناسایی و پیش‌بینی کیفیت ارقام برنج به خصوص در نسل‌های در حال تفکیک در برنامه‌های اصلاحی است. در این بررسی نیز قرار گرفتن لاین‌ها و واریته‌های با جد مشترک در گروه‌های مشابه، نیانگر موثر بودن نشانگر مولکولی ریزماهواره همبسته با QTL‌های خصوصیات زراعی و مرتبط با کیفیت پخت دانه در ارزیابی تنوع ژنتیکی برنج بود. بدین ترتیب تعداد ۹ رقم شامل رقم دیلمانی با توجه به عملکرد دانه و اجزای عملکرد پایین، پابلندی، کیفیت پخت مطلوب و میزان برنج سالم بالا از گروه اول، رقم طارم محلی با توجه به زودرسی، پابلندی و کیفیت پخت و میزان برنج سالم بالا از گروه دوم، لاین RI1843223 (محمدی × صالح) با توجه به ارتفاع بوته متوسط، طول برگ، کوتاه و دمای ژلاتینی بالا از گروه سوم، لاین حاصل از تلاقي برگشتی بین دو رقم صالح و آججی‌بوچی با توجه به پاکوتاهی، شکل بلند دانه و عملکرد دانه متوسط از گروه چهارم، لاین RI184472 (غیریب × سپیدرود) با توجه به ارتفاع بوته بالا، شکل دانه بلند و میزان آمیلوز بالا از گروه پنجم، لاین RI1843046 (هاشمی × صالح) با توجه به زودرسی از گروه ششم، لاین ۲۳ با توجه به عملکرد دانه و اجزای عملکرد بالا و ارتفاع بوته مناسب از گروه هفتم، لاین IR50 با توجه به عملکرد دانه بالا، پاکوتاهی و میزان آمیلوز بالا از گروه هشتم و لاین RI184421 (حسن‌سرائی × سپیدرود) با توجه به وزن صد دانه پایین، دیررسی، پاکوتاهی و میزان آمیلوز بالا از گروه نهم، به عنوان والدین تلاقي‌ها انتخاب گردیدند. انتخاب ارقام والدینی بر اساس خصوصیات

## منابع مورد استفاده

### References

- Akagi, H., Y. Yokozeki, A. Inagaki and T. Fujimura.** 1997. Highly polymorphic microsatellites of rice consist of AT repeats, and a classification of closely related cultivars with these microsatellite loci. *Theor. Appl. Genet.* 94: 61–67.
- Allahgholipour, M., A. Moumeni, M. Nahvi, M. Yekta and S. S. Zarbafi.** 2012. Identification of parental combinations for improvement of rice grain quality, yield and yield components in rice. *Cereal Res.* 1 (1): 1-10. (In Persian with English abstract).
- Amininasab, R., M. A. Ebrahimi, A. A. Ebadi and M. Ghodsi.** 2012. Study of genetic variation in Iranian rice (*Oryza sativa* L.) varieties by using molecular markers linked with drought resistance genes. *Crop Biotechnol.* 2 (2): 15-27. (In Persian with English abstract).
- Arias, R. S., L. L. Ballard, B. E. Scheffler.** 2009. UPIC: Perl scripts to determine the number of SSR markers to run. *Bioinformation* 3(8): 352-360.
- Bar-Hen, A., A. Charcosset, M. Bourgoin and J. Guiard.** 1995. Relationship between genetic markers and morphological traits in a maize inbred lines collection. *Euphytica* 84: 145-154.
- Bernardo, R.** 2001. Breeding potential of intera and interheterotic group crosses in maize. *Crop Sci.* 41: 68-71.
- Chen, X., S. Temnykh, Y. Xu, Y. G. Cho and S. R. McCouch.** 1997. Development of a microsatellite framework map providing genome-wide coverage in rice (*Oryza sativa* L.). *Theor. Appl. Genet.* 95: 553-567.
- Das, B., S. Sengupta, M. Ghosh and T. K. Ghose.** 2012. Assessment of diversity among a set of aromatic rice genotypes from India. *Int. J. Biodivers. Conserv.* 4(5): 206-218.
- Don, R. H., P. T. Cox, B. J. Wainwright and J. S. Mattick.** 1991. Touchdown PCR to circumvent spurious priming during gene amplification. *Nucleic Acid Res.* 19: 4008-4009.
- Hamrick, J. L. and M. J. W. Godt.** 1997. Allozyme diversity in cultivated crops. *Crop Sci.* 37: 26-30.
- IRRI,** 1996. Standard Evaluation System for rice. International of Rice Research Institute. Philippines.
- Jain, S., R. K. Jain and S. R. McCouch.** 2004. Genetic analysis of Indian aromatic and quality rice (*Oryza sativa* L.) germplasm using panels of fluorescently-labeled microsatellite Markers. *Theor. Appl. Genet.* 109: 965–977.
- Kamoshita, A and R. C. Babu.** 2008. Phenotypic and genotypic analysis of drought resistance traits for development of rice cultivars adapted to rainfed environments. *Field Crops Res.* 109: 1-23.
- McCouch, S. R., L. Teytelman, Y. Xu, K. B. Lobos, K. Clare, M. Walton, B. Fu, R. Maghirang, Z. Li, Y. Xing, Q. Zhang, I. Kono, M. Yano, R. Fjellstrom, G. DeClerck, D. Schneider, S. Cartinhour, D. Ware and L. Stein.** 2002. Development and mapping of 2240 new SSR markers for rice (*Oryza sativa* L.). *DNA Res.* 9: 199-207.
- Murray, M. G. and W. F. Thompson.** 1980. Rapid isolation of high molecular weight plant. *Nucleic Acids Res.* 8: 4321-4325.

- Rohlf, F. J. 2000.** NTSYS-pc: Numerical taxonomy and multivariate analysis system. Version 2.1. Exeter Publications, New York, USA.
- Sheng-jun, W., L. Zuo-mei and W. Jian-min. 2006.** Genetic diversity among parents of hybrid rice based on cluster analysis of morphological traits and simple sequence repeat markers. *Rice Sci.* 13(3): 155-160.
- Smith, J. S. C., S. Paszkiewicz, O. S. Smith and J. Schaffer. 1987.** Electrophoretic, chromatographic and genetic techniques for identifying associations and measuring genetic diversity among corn hybrids: 187-203. In Proc. 42<sup>nd</sup> Annual Corn and Sorghum Research Conference. Chicago, IL. American Seed Trade Association, Washington, DC, USA.
- Smith, J. S. C., S. Kresovich, M. S. Hopkins, S. Mitchell, R. E. Dean, W. L. Woodman, M. Lee and K. Porter. 2000.** Genetic diversity among elite sorghum inbred lines with simple sequence repeats. *Crop Sci.* 40(1): 226-232.
- Suh, H. S., Y. I. Sato and H. Morishima. 1997.** Genetic characterization of weedy rice (*Oryza sativa* L.) based on morpho-physiology, isozymes and RAPD markers. *Theor. Appl. Genet.* 94: 316-321.
- Tabakhkar, N., B. Rabiei and A. Sabouri. 2011.** Evaluation allele frequency and polymorphism of microsatellite markers linked to gene loci controlling rice grain quality. *Iran. J. Field Crop Sci.* 42 (3): 495-507. (In Persian with English abstract).
- Tabakhkar, N., B. Rabiei and A. Sabouri. 2012.** Genetic diversity of rice cultivars by microsatellite markers tightly linked to cooking and eating quality. *Austr. J. Crop Sci.* 6 (6): 980-985.
- Temnykh, S., W. D. Park, N. Ayres, S. Cartinhour, N. Hauck, L. Lipovich, Y. G. Cho, T. Ishii and S. R. McCouch. 2000.** Mapping and genome organization of microsatellite sequences in rice (*Oryza sativa* L.) *Theor. Appl. Genet.* 100: 697-712.
- Xi, Z. Y., F. H. He, R. Z. Zeng, Z. M. Zhang, X. H. Ding, W. T. Li and G. Q. Zhang. 2008.** Characterization of donor genome contents of backcross progenies detected by SSR markers in rice. *Euphytica* 160: 369-377.
- Yeh, F. C., R. C. Yang and T. J. B. Boyle. 1999.** Microsoft Window-based freeware for population genetic analysis (POPGENE), version 1.31.
- Zheng, B. and L. Yang. 2008.** Mapping QTLs for morphological traits under two water supply conditions at the young seedling stage in rice. *Plant Sci. J.* 175: 767-776.

## Evaluation of molecular diversity in rice (*Oryza sativa L.*) genotypes using microsatellite markers linked with agronomic and grain physico-chemical characteristics

Allahgholipour,<sup>1</sup> M., E. Farshadfar<sup>2</sup> and B. Rabiei<sup>3</sup>

### ABSTRACT

**Allahgholipour, M., E. Farshadfar and B. Rabiei.** 2014. Evaluation of molecular diversity in rice (*Oryza sativa L.*) genotypes using microsatellite markers linked with agronomic and grain physico-chemical characteristics. **Iranian Journal of Crop Sciences.** 15(4): 337-354. (In Persian).

Ninety-four rice genotypes were evaluated for genetic diversity using 52 rice SSR markers linked with some important agronomic and grain quality characteristics which well distributed on 12 chromosomes of rice. The total number of polymorphic alleles was 361 alleles with the average of 4.750 alleles per SSR locus. Results revealed that some markers such as RM276 and RM5642 on chromosome 6 and RM14 and RM1 on chromosome 1 have more than 9 observed alleles. The highest and lowest PIC values were observed for primers RM5642 (0.854) and RM207 (0.515), respectively. Cluster analysis using complete linkage method based on Jaccard similarity coefficient for molecular data showed that all genotypes were classified in nine clusters. Nine cultivars/lines from different cluster including Daylamani, Tarommohali, Line 23, RI1843046 (Saleh×Hashemi), RI1843223 (Saleh×Mohamadi), IR50, Back cross line [(Saleh×Abjiboji) × Abjiboji], RI184421 (Sepidrod×Hassansaraiee) and RI184472 (Sepidrod×Gharib) were selected as parents to be used in rice breeding programs. The similarity coefficient was very low among the selected parental cultivars/lines. Therefore, high diversity in breeding populations is expected by using these selected cultivars/lines as parents of crosses for improvement of important agronomic and physico-chemical characteristics. Marker assisted selection as a powerful technique can be used for development of the new rice cultivars because these parental cultivars/lines were recognized by some SSR markers linked with QTLs for agronomic and grain quality characteristics.

**Key words:** Cluster analysis, Molecular diversity, Rice, Similarity coefficient and SSR markers.

---

**Received: August, 2013      Accepted: December, 2013**

1- Ph.D Student, Razi University, Kermanshah, Iran, and Faculty member of Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran (Corresponding author) (Email: alahgholipour@yahoo.com)

2- Professor, Razi University, Kermanshah, Iran

3- Professor, University of Guilan, Rasht, Iran