

اثر محلول پاشی ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات گیاهی و شاخص‌های فلورسانس کلروفیل گیاهچه‌های برنج در شرایط تنش خشکی

Effect of IAA and Kinetin application on plant characteristics and chlorophyll fluorescence indices in rice seedlings under drought stress condition

مصطفی صالحی‌فر^۱، بابک ربیعی^۲، منصور افشار محمدیان^۳ و جعفر اصغری^۲

چکیده

صالحی‌فر، م.، ب. ربیعی، م. افشار محمدیان و ج. اصغری. ۱۳۹۳. اثر محلول پاشی ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات گیاهی و شاخص‌های فلورسانس کلروفیل گیاهچه‌های برنج در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران. ۱۶(۴): ۲۹۳-۳۰۷.

به منظور ارزیابی اثر هورمون‌های ایندول استیک اسید (IAA) و کاینتین (Kin) بر بهبود تحمل تنش خشکی و شاخص‌های فلورسانس کلروفیل در گیاهچه‌های برنج، یک آزمایش فاکتوریل با سه عامل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۲ در دانشکده علوم کشاورزی گیلان انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از ژنوتیپ‌های برنج غریب، خزر، سپیدرود و آپلندر ۱-۱۳۱-IR83750، تنش خشکی در دو سطح صفر (بدون تنش) و تنش خشکی از مرحله یک تا چهار کدبندی ورگارا و هورمون در سه سطح، صفر (بدون محلول پاشی هورمون)، IAA (10^{-5} مول) و کاینتین (10^{-5} مول) به صورت محلول پاشی برگ. صفات اندازه گیری شده شامل تعداد پنجه، تعداد روز تا لوله شدن برگ، دمای برگ، محتوای آب نسبی برگ، نشت الکتروولیت‌ها، عدد کلروفیل متر و مولفه‌های فلورسانس کلروفیل بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل‌ها اثر معنی‌داری بر همه صفت‌های ارزیابی شده داشتند. رقم سپیدرود در شرایط تنش خشکی دارای بیشترین محتوای آب نسبی برگ (۴۶/۳ درصد) بود. کمترین محتوای آب نسبی برگ نیز متعلق به تیمار غریب در شرایط تنش خشکی (۳۴/۵ درصد) بود. محلول پاشی هورمون IAA هم در شرایط بدون تنش و هم نتش منجر به افزایش محتوای آب نسبی (به ترتیب ۹۲/۴ و ۴۳/۲ درصد) شد. ژنوتیپ آپلندر در شرایط آبیاری کامل دارای بیشترین مقدار عدد کلروفیل متر (۴۷/۰۳) بود. کمترین مقدار آن نیز متعلق به تیمار غریب در تنش خشکی و (۳۰/۶) بود. محلول پاشی IAA و کاینتین منجر به افزایش عدد کلروفیل متر در رقم غریب به ترتیب به میزان ۱۸ و ۱۳/۲ درصد شدند. تنش خشکی منجر به افزایش نشت الکتروولیت‌ها به میزان ۳۲/۱ درصد در تیمار بدون محلول پاشی شد. کمترین میزان نشت الکتروولیت مربوط به رقم سپیدرود در شرایط آبیاری کامل به میزان ۱۶/۳۶ درصد بود. تجزیه ناپارامتریک برای صفات رتبه‌ای نشان داد که ترکیب‌های تیماری مورد استفاده در این آزمایش بر صفات اندازه گیری شده اثر معنی‌داری داشتند. بیشترین مقدار کارآیی کوانتمومی فتوسیستم دو به میزان ۸۱/۰ مربوط به رقم خزر در شرایط آبیاری کامل و محلول پاشی IAA بود. نتایج این آزمایش نشان داد که محلول پاشی IAA و کاینتین منجر به بهبود صفات موردنظری در شرایط تنش خشکی در گیاهچه‌های برنج شد و IAA نقش موثرتری در بهبود تحمل به نتش نسبت به کاینتین داشت. همچنین مشخص شد که ژنوتیپ‌های آپلندر و سپیدرود متتحمل‌تر از ارقام غریب و خزر بودند و در مجموع ژنوتیپ آپلندر با محلول پاشی IAA رشد بهتری در شرایط تنش خشکی داشت.

واژه‌های کلیدی: برنج، شاخص لوله شدن برگ، عدد کلروفیل متر، محتوای آب نسبی و نشت الکتروولیت

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نگارنده اول می‌باشد

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۹/۱۹

۱- دانشجوی دکتری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان. عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (مکاتبه کننده)

(پست الکترونیک: agri20000@yahoo.com)

۲- استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

۳- دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

یک تنظیم کننده در واکنش به تنش کم آبی در گیاه تباکوی ترانسژنیک معرفی شده‌اند (Xu *et al.*, 2010). نتایج تحقیقات نشان داده است که هورمون کایتین عامل مهمی در بیان ژن‌های مرتبط با دفاع در مقابل تنش بوده و بعلاوه به عنوان یک عامل واکنش دهنده در مقابل تنش در گیاه برنج محسوب می‌شود (Rakwal *et al.*, 2003). سایتوکینین در بیان ژن، جلوگیری از فعالیت اکسین، تحریک جریان کلسیم، چرخه سلولی و همچنین به عنوان عامل ضد تنش نقش دارد. نتایج تحقیقات نشان داده است که کاربرد کایتین منجر به افزایش تعداد پنجه در برنج شد (Zahir *et al.*, 2001).

گزارش شده است که تنش خشکی منجر به کاهش مقدار سبزینگی گیاه و عدد کلروفیل متر شد (Mamnoei, 2010 and Seyed Sharifi, 2010). کاهش عدد کلروفیل متر می‌تواند به علت تخرب کلروفیل در اثر محدودیت شدید آبی باشد که به کاهش فتوستتر خالص منجر خواهد شد (Guo *et al.*, 2009). تنش کمبود آب همواره با تنش دمای بالا همراه است که منجر به محدود شدن تولیدات گیاهان زراعی می‌شود. حفاظت یکپارچگی غشا در طی تنش نشانه‌ای از وجود راهکارهای کنترلی در تحمل به پساییدگی می‌باشد. در طی تنش اگر سیتوریز صورت گیرد، تمامیت غشاء از بین می‌رود. در تنش‌های شدید بعضی از قسمت‌های فسفولیپیدهای دولایه غشاء حالت کروی به خود می‌گیرند و پراکسیداسیون چربی‌های غشاء باعث کاهش پایداری غشاء در سلول‌های گیاهی می‌شود. پایداری غشاهای سلولی نقش عمدی‌ای در طی پساییدگی گیاه دارند (Xu *et al.*, 2011) و نشت الکتروولیت‌ها یک شاخص مهم در تخمین میزان پایداری غشاء می‌باشد. در طی تنش نشت الکتروولیت‌ها افزایش می‌یابد که بسته به میزان خسارت در رقم‌های متتحمل در مرحله ترمیم، بازگشت پذیر می‌باشد (Xu *et al.*, 2013). اندازه گیری محتوای آب نسبی در بافت برگ معمولاً برای نشان دادن وضعیت

مقدمه

خشکی عامل اصلی محیطی محدود کننده رشد برنج در مناطق برنجکاری می‌باشد (Farooq *et al.*, 2009). با توجه به گسترش روز افزون تنش‌های محیطی به ویژه خشکی و شوری، ممکن است تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۵۰ درصد از مناطق قابل کشت و کار تحت تاثیر این تنش‌های محیطی قرار گیرند (Wang *et al.*, 2010). هرچند که نیاز به تولید ارقام پرمحصول وجود دارد، ولی باید ظرفیت تحمل به تنش در رقم‌های محلی نیز مورد توجه قرار داده شود (Wu *et al.*, 2011). یکی از راههای شناسایی ارقام مقاوم به تنش خشکی ارزیابی فنتوپی آنها است (Kamoshita *et al.*, 2008).

تحقیقات کمی در مورد تنوع ژنتیک‌های برنج و نحوه تاثیر تنش خشکی در مرحله گیاهچه‌ای در آنها صورت گرفته است. رشد گیاه بعد از رفع تنش در مرحله رویشی ادامه یافته و گیاه ترمیم یا بازیابی می‌شود (Kamoshita *et al.*, 2008). نتایج آزمایش‌های گلستانی نشان داده است که گیاه برنج یک یا چند هفته بعد از تنش در مرحله رویشی ترمیم یافت (Kamoshita *et al.*, 2004).

پیردشتی و همکاران (Pirdashti *et al.*, 2004) گزارش کردند که تنش خشکی در مرحله رویشی باعث کاهش ارتفاع بوته و تعداد پنجه‌ها در برنج شد. تفاوت اصلی رقم‌های برنج در واکنش به تنش خشکی دوره رویشی، مربوط به تعداد پنجه‌ها بود (Kamoshita *et al.*, 2004).

هورمون‌های گیاهی در توانمندسازی گیاه جهت سازگاری با تنش‌های غیر زنده موثر هستند (Santner *et al.*, 2009). اگرچه آبسیزیک اسید (ABA) به عنوان هورمون تنش بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است، اما نقش سایتوکینین‌ها (CK)، و اکسین‌ها در طی تنش‌های محیطی نباید نادیده گرفته شوند. ایندول استیک اسید به عنوان ناقل طیف وسیعی از پیام‌های خارجی و داخلی محسوب می‌شود. تعادل اکسین در گیاه می‌تواند نقش سرنوشت سازی را در پاسخ به تنش‌های غیر زنده ایفا نماید. سایتوکینین‌ها به عنوان

مواد و روش‌ها

این آزمایش به روش فاکتوریل با سه عامل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه نتکرار در بهار سال ۱۳۹۲ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. عامل اول این آزمایش چهار ژنوتیپ برنج که سه رقم ایرانی شامل سپیدرود و خزر به عنوان رقم‌های اصلاح شده و غریب به عنوان یک رقم بومی ایرانی به همراه یک ژنوتیپ آپلندر (IR83750-131-1) که بر مبنای نتایج آزمایش‌های صفاتی چایکار و همکاران (Safaei Chaeikar *et al.*, 2008) و ابرشهر و همکاران (Abarshahr *et al.*, 2011) طوری انتخاب شدند که شامل تنوع کافی از ژنوتیپ‌های حساس (غریب و خزر) و متحمل (سپیدرود) به خشکی باشند. عامل دوم تنش خشکی با دو سطح بدون تنش و تنش خشکی با قطع آبیاری از مرحله اول (رشد گیاهچه) تا پایان مرحله چهار کدبندی ورگارا (Vergara, 1988) (آغاز شخش خوش تا غلاف دهی برگ پرچم) و عامل سوم نیز محلول پاشی هورمون در سه سطح، صفر (بدون هورمون پاشی)، هورمون ایندول استیک اسید (IAA) (Fluka 279023-1187) با غلاظت 5×10^{-5} مول و هورمون کاینتین (Sigma EC No.208-382-2) با غلاظت 5×10^{-5} مول بودند. بذرهای تهیه شده از موسسه تحقیقات برنج کشور، پس از ضدغونه کردن با هیبوکلریت سدیم از منبع واکتس تجاری دو درصد، به مدت ۷۲ ساعت در انکوباتور در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۰ درصد جوانه‌دار شدند. بذور جوانه‌دار شده به جعبه‌های نشاء منتقل و پس از ۲۰ روز نگهداری، گیاهچه‌های جوان در گلدان‌های پلاستیکی به قطر ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر که با خاک مزرعه آزمایشی پر شده بودند، منتقل و سه گیاهچه در هر گلدان کشت شد. خاک آزمایش شامل ۵۶ درصد رس، ۳۴ درصد سیلت و ۱۰ درصد ماسه بوده و هدایت الکتریکی خاک نیز $138/4$ میکروزیمنس بر متر بود. کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب 50 ، 25 و 25

آب در گیاه بکار می‌رود و از این شاخص به‌طور گستردگی در کمی سازی کمبود آب در بافت برگ استفاده می‌شود. تنش خشکی منجر به کاهش محتوای آب نسبی در گیاه می‌شود (Xu *et al.*, 2013; Guo *et al.*, 2009).

فلورسانس کلروفیل یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش تنش‌های محیطی از جمله تنش خشکی در گیاهان زراعی بوده و برای تعیین میزان تحمل به تنش خشکی پیشنهاد شده است. هنگام مواجه شدن گیاهان با تنش‌های محیطی مانند خشکی و یا دمای پایین، بسته شدن روزنه‌ها و کاهش فتوسنتز، منجر به کاهش کارآیی کربوکسیلاسیون، کاهش سرعت باز‌سازی آنزیم رویسکو، کاهش فراهمی دی‌اکسید کربن از روزنه‌ها و یا کاهش انتقال کربوهیدرات‌ها به خارج از سلول مزووفیل شده و در نتیجه باعث کاهش سرعت مصرف NADPH و ATP در چرخه کالوین می‌شود. این موضوع باعث کاهش سرعت انتقال الکترون، کاهش فلوورسانس حداقل (Fm)، کاهش فلوورسانس Maxwell and متغیر (Fv) و کاهش Fv/Fm می‌شود (Johnson, 2000; Baker and Rosenqvist, 2004).

کاهش این نسبت به معنی کاهش کارآیی کواتسومی فتوسیستم دو در گیاه می‌باشد.

با توجه به اهمیت بررسی اثر تنش خشکی در مرحله رشد رویشی رقم‌های بومی برنج و مقایسه آن‌ها با ژنوتیپ‌های خارجی و از طرفی مشکلات ناشی از کمبود آب برای کشت برنج استان گیلان، هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر تنش خشکی روی برخی صفات فیزیولوژیک و مورفو‌لوزیک ژنوتیپ‌های برنج و بررسی اثر محلول‌پاشی هورمون‌های ایندول استیک اسید و کاینتین در بهبود تحمل به تنش خشکی و شاخص‌های فلوورسانس کلروفیل در ژنوتیپ‌های متتحمل و حساس برنج بود.

۷: شکل عمیق، ۵: بطور کامل U شکل، ۷: لبه‌های برگ به هم رسیده یا برگ به شکل مدور (O) شده باشد و ۹: برگ‌ها بطور کامل لوله شده) و بازیابی خشکی بر اساس دستورالعمل SES، پس از اعمال تنفس خشکی ۱۰ روز گیاه آبیاری شد و سپس میزان برگشت گیاه به حالت اول مورد بررسی قرار گرفت: ۱: ۹۰ تا ۱۰۰ درصد، ۳: ۷۰ تا ۸۹ درصد، ۵: ۴۰ تا ۶۹ درصد، ۷: ۲۰ تا ۳۹ درصد و ۹: صفر تا ۱۹ درصد. برای محاسبه میزان نشت الکترولیت‌ها، برگ‌ها به دقت شسته شده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق خشکانده شدند و سپس نمونه‌هایی با ابعاد یک سانتی‌متر مربع تهیه شده و درون لوله‌های آزمایش حاوی ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطّر قرار داده شدند. هدایت الکتریکی محلول (EL1) نمونه‌ها پس از تکان دادن تدریجی به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری هدایت الکتریکی اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها اتوکلاو شده و مجدداً هدایت الکتریکی (EL2) آن‌ها قرائت شد. میزان نشت الکترولیت‌ها با استفاده رابطه زیر محاسبه شد (Molla *et al.*, 2006):

$$EL (\%) = (EL1/EL2) \times 100 \quad (1)$$

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها به روش توکی با استفاده از نرم افزارهای SAS نسخه ۹/۱ و Minitab نسخه ۱۴ انجام شد. برای تجزیه صفات رتبه‌ای از تجزیه ناپارامتری فریدمن استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل‌های ژنوتیپ، تنفس خشکی و هورمون دارای اثر معنی داری بر محتوای آب نسبی بودند. آثار متقابل ژنوتیپ در تنفس و تنفس در هورمون نیز اثر معنی داری بر محتوای آب نسبی داشتند. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در تنفس نشان داد که بیشترین مقدار محتوای آب نسبی در رقم سپیدرود و در شرایط بدون تنفس به میزان ۹۱/۸ درصد مشاهده شد که با سایر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه

میلی‌گرم در کیلو‌گرم، به خاک افزوده شدند. پتانسیل آب خاک نیز با استفاده از منحنی رطوبتی خاک در حدود ۰/۸-۰/۸-۰/۸ مگاپاسکال حفظ شد (Sharma *et al.*, 2005). هورمون‌ها ۱۵ روز بعد از نشاکاری (در یک نوبت) و به میزان ۵۰ میلی لیتر (Ghorbani Javid *et al.*, 2011) روی تمامی گیاه محلول پاشی شدند. هورمون‌های مورد استفاده ۲-ایندول استیک اسید (Fluka 279023-1187) و کایتین (Sigma EC No.208-382-2) بودند. جهت جلوگیری از تجزیه هورمون‌ها در اثر نور خورشید، اعمال تیمارهای هورمونی در هنگام غروب آفتاب انجام شد (Ghorbani Javid *et al.*, 2011). صفات اندازه‌گیری شده در این آزمایش عبارت بودند از: محتوای آب نسبی برگ (RWC)، عدد کلروفیل متر با SPAD 502، Minolta, (Japan)، تعداد روز از اعمال تنفس تا شروع لوله‌ای شدن برگ (Days to leaf rolling)، شاخص لوله شدن برگ (Leaf rolling Index)، نمره خشک شدن برگ (Electrolyte drying score)، نشت الکترولیت‌ها (drying score)، بازیابی خشکی (Leakage Recovery)، تعداد پنجه‌ها و شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و دمای برگ که با استفاده از دستگاه فلورسانس متر مدل Mini-Pam (Walz, Germany) مدت سازگاری به تاریکی گیاه ۳۰ دقیقه بود)، اندازه‌گیری شدند. تعداد پنجه در بوته در ابتدای مرحله چهار کدبندی ورگارا و برای هر تیمار تعداد پنجه‌های پنج بوته شمارش شد. درجه خشک شدن برگ بر اساس دستورالعمل ارزیابی استاندارد برنج (SES) انجام شد که عبارت بود از: صفر: بدون علائم، ۱: فقط نوک برگ‌ها سوخته، ۳: بیش از یک چهارم اکثر برگ‌ها سوخته، ۵: یک پنجم تا یک دوم همه برگ‌ها سوخته، ۷: بیش از دو سوم همه برگ‌ها سوخته و ۹: گیاه بطور کامل مرده باشد، شاخص لوله شدن برگ بر اساس دستورالعمل SES عبارت بود از: صفر: برگ‌ها سالم، ۱: شکل خفیف،

هورمون‌های IAA و کاینتین استفاده شده، کمتر از زمانی بود که از هورمون استفاده نشد. مشخص شده که هورمون‌های IAA و کاینتین (Sakakibara, 2006) در تحمل تنش غیر زنده در گیاه موثر می‌باشند. همچنین مشخص شده که هورمون IAA با تاثیر بر جذب مقدار آب در گیاه سبب افزایش مقدار محتوای آب نسبی در گیاه شد (Normanly, 2010).

نتایج تجزیه واریانس برای عدد کلروفیل متر نشان داد که به جز اثر متقابل سه جانبی ژنوتیپ در تنش در هورمون و دو جانبی تنش در هورمون، سایر آثار اصلی و متقابل دارای اثر معنی‌داری بر میزان سبزینگی برگ بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در تنش نشان داد که بیشترین میزان سبزینگی برگ متعلق به ژنوتیپ آپلندر در شرایط بدون تنش به میزان ۴۷/۱ بود که با رقم خزر در شرایط بدون تنش تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۱). کمترین مقدار عدد کلروفیل متر نیز متعلق به رقم غریب در شرایط تنش خشکی بود. علی‌رغم وجود اختلاف عدد کلروفیل متر میان ژنوتیپ‌های برنج موردن‌آزمایش، تنش خشکی نیز منجر به کاهش عدد کلروفیل متر نسبت به شرایط بدون تنش شد، اما میان سه ژنوتیپ آپلندر، خزر و سپیدرود از نظر عدد کلروفیل متر در شرایط تنش خشکی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد، ولی در رقم غریب در شرایط تنش خشکی، سبزینگی برگ به میزان زیادی کاهش یافت. برخی از محققان نیز گزارش نمودند که تحت تنش خشکی عدد کلروفیل متر کاهش می‌یابد (Mamnoei and Seyed, 2009 ; Sharifi, 2010 ; Guo et al., 2009). تنش خشکی در رقم‌های حساس به تنش نسبت به رقم‌های متتحمل کاهش بیشتری از لحاظ عدد کلروفیل متر در مقایسه با شرایط آبیاری کامل باعث می‌شود (O'Tool, 2004). بوکو و همکاران (Bocco et al., 2012) گزارش نمودند که اگر ژنوتیپی تحت تنش خشکی به‌طور نسبی فعالیت فتوسنتری ثابتی داشته باشد، و به عبارت دیگر سبزینگی برگ خود را حفظ کند، می‌توان فرض نمود

در شرایط بدون تنش اختلاف معنی‌داری نداشت. کمترین مقدار محتوای آب نسبی نیز به میزان ۳۴/۵ درصد متعلق به رقم غریب در شرایط تنش بود که با خزر در شرایط تنش تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۱). رقم سپیدرود در شرایط تنش تا حدود زیادی محتوای آب نسبی برگ بیشتری داشت. اگرچه همانند سایر ارقام در شرایط تنش، محتوای آب نسبی رقم سپیدرود نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافت، اما این رقم با تحمل بیشتر به شرایط تنش ایجاد شده در مقابل پساییدگی تحمل کرده و آب برگ‌های آن به مقدار بیشتری حفظ شد. به طور کلی ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلندر دارای محتوای آب نسبی بیشتری در شرایط تنش نسبت به ارقام غریب و خزر بودند. احتمالاً عدم کنترل باز و بسته شدن روزنه‌ها می‌تواند منجر به اتلاف آب و در نتیجه کاهش محتوای آب نسبی برگ در برنج شود. ارقامی که دارای تحمل بیشتری در مقابل تنش می‌باشند، با کنترل ورود و خروج آب می‌توانند تنش را بهتر تحمل کنند، اما ارقامی که در شرایط تنش روزنه‌های آن‌ها بسته نشود، آب بیشتری را از دست داده و به همین دلیل محتوای آب نسبی برگ آن‌ها کاهش بیشتری می‌یابد. کاهش محتوای آب نسبی برگ در طی تنش باعث کاهش مقدار فتوسنتر و ناپایداری غشاء در برنج می‌شود (Deivanai et al., 2010). مقایسه میانگین اثر متقابل تنش در هورمون نیز نشان داد که محلول‌پاشی هر دو هورمون هم در شرایط تنش و هم در شرایط بدون تنش باعث حفظ آب بیشتری در برگ‌ها حفظ شد، به‌طوری که بیشترین مقدار محتوای آب نسبی در شرایط بدون تنش و با مصرف هر دو هورمون و کمترین مقدار آن در شرایط تنش و بدون استفاده از هورمون مشاهده شد و اگرچه تنش خشکی محتوای آب نسبی را کاهش داد، اما میزان کاهش محتوای آب نسبی در شرایطی که از

جدول ۱- مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در تنش برای صفات گیاهی ژنوتیپ‌های برنج در شرایط تنش خشکی

Table 1. Mean comparison of interaction effect of genotype × stress for plant characteristics of rice

genotypes in drought stress condition

Treatments	تیمارهای آزمایشی	روز تا لوله شدن برگ Days to leaf rolling	نشت الکتروولیت EL (%)	تعداد پنجه No. of tillers	عدد کلروفیل متر SPAD	محتوای آب نسبی RWC (%)
Gharib× non stress	غیریب × بدون تنش	0.0c	17.5c	13.1b	43.1b	90.4a
Gharib× Stress	غیریب × تنش	9.3b	31.2a	6.3c	30.6d	34.5d
Upland×non stress	آپلندر × بدون تنش	0.0c	16.4c	17.1a	47.1a	89.5a
Upland× Stress	آپلندر × تنش	16.5a	27.6b	12.3b	37.1c	43.2c
Khazar× non stress	خرز × بدون تنش	0.0c	16.5c	15.7a	45.4ab	90.7a
Khazar × Stress	خرز × تنش	9.6b	28.3b	7.2c	35.9c	36.7d
Sepidrood× non stress	سپیدرود × بدون تنش	0.0c	16.3c	16.5a	42.9b	91.8a
Sepidrood × Stress	سپیدرود × تنش	16.1a	27.8b	12.7b	38.1c	46.3b

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.

Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly difference at 1% probability level, using Tukey's test

تشخیص خشکی در تمامی ژنوتیپ‌های برنج دمای برگ را افزایش داد، اما محلول پاشی هورمون موجب شد که برگ‌ها در مقابل افزایش دما تحمل بیشتری نشان داده و این موضوع باعث تعدیل دمای برگ شد (جدول ۵). تنش خشکی منجر به بسته شدن روزنه‌ها شده، در نتیجه میزان تعرق گیاه که یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش دما می‌باشد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد که محلول پاشی هورمون‌های رشد باعث باز شدن روزنه‌ها شده و در نتیجه تعرق افزایش یافته و دمای برگ نیز کاهش یافته باشد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه آثار اصلی و متقابل به جز اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ در تنش در هورمون بر تعداد پنجه‌ها اثر معنی‌داری داشتند. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در تنش نشان داد که بیشترین تعداد پنجه در ژنوتیپ آپلندر، سپیدرود و خزر در شرایط بدون تنش تولید شد و کمترین مقدار آن نیز مربوط به رقم غریب در شرایط تنش بود (جدول ۲). در شرایط بدون تنش میان ژنوتیپ‌ها از نظر تعداد پنجه تفاوت وجود داشت، به طوری که ژنوتیپ‌های آپلندر، سپیدرود و خزر به ترتیب با تعداد ۱۷/۱، ۱۶/۵ و ۱۵/۷ عدد پنجه در بوته دارای بیشترین تعداد پنجه بودند و برای رقم غریب این تعداد ۱۳/۱ عدد پنجه در بوته بود.

که برخی از شکل‌های تحمل در فرایند فتوستز تخت تشن خشکی مثل حفظ پتانسیل فشاری در اثر تنظیم اسمزی و یا حفظ پتانسیل آب بالا را دارا می‌باشد. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در هورمون نشان داد که اگرچه استفاده از هر دو هورمون ایندول استیک اسید و کائینتین موجب شد، سبزینگی برگ‌ها در هر چهار ژنوتیپ مورد مطالعه افزایش یابد، اما این افزایش فقط در رقم غریب نسبت به شرایط عدم استفاده از هورمون معنی‌دار بود و در سه ژنوتیپ دیگر تفاوت معنی‌داری بین عدد کلروفیل متر در شرایط بدون استفاده از هورمون و کاربرد هر دو هورمون مشاهده نشد (جدول ۳).

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه آثار اصلی و متقابل بر دمای برگ دارای اثر معنی‌دار بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ در تنش در هورمون نشان داد که بیشترین دمای برگ ۳۶/۲ درجه سانتیگراد (متعلق به رقم غریب و بدون محلول پاشی هورمون در شرایط تنش بود و با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی‌داری بود. چنانکه ملاحظه می‌شود، محلول پاشی هر دو نوع هورمون نیز منجر به کاهش دمای برگ در همه ژنوتیپ‌ها هم در شرایط بدون تنش و هم در شرایط تنش خشکی شد. به عبارت دیگر اعمال

کمترین میزان نشت الکتروولیت‌ها نیز در تمامی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در شرایط آبیاری کامل مشاهده شد (جدول ۱). نتش خشکی احتمالاً به دلیل تخریب غشاء فسفولیپیدی سلول‌ها و یا تغییر میزان سیالیت غشا از طریق افزایش دمای ناشی از بسته شدن روزنه‌ها منجر به افزایش نشت الکتروولیت‌ها در همه ژنوتیپ‌ها شد. این در حالی بود که نتش خشکی در ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلندر میزان نشت الکتروولیت‌ها را در شرایط نتش نسبت به ارقام غریب و خزر کمتر افزایش داد. از طرف دیگر نتش خشکی در ارقام غریب و خزر احتمالاً به دلیل پلاسمولیز یا سیتوریز منجر به تخریب غشاء شده و در نتیجه محتویات سلولی (الکتروولیت‌ها) به بیرون نشست نمودند. به نظر می‌رسد که ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلندر به دلیل تحمل بیشتر در برابر از هم گسیختگی غشاء آسیب کمتری دیده و در نتیجه میزان نشت الکتروولیت‌ها کمتری در آنها مشاهده شد. نتایج بدست آمده با نتایج ژو و همکاران (Xu *et al.*, 2013) مطابقت داشت.

مقایسه میانگین اثر متقابل نتش در هورمون نیز نشان داد که در شرایط بدون نتش تفاوت معنی‌داری میان سطوح هورمون (عدم مصرف هورمون و محلول‌پاشی هر دو نوع هورمون از نظر نشت الکتروولیت‌ها وجود نداشت، اما در شرایط نتش خشکی، استفاده از هورمون موجب کاهش معنی‌دار نشت الکتروولیت شد، به طوریکه نتش خشکی به‌طور معنی‌داری نشت الکتروولیت‌ها را در ژنوتیپ‌های برنج افزایش داد، اما محلول‌پاشی هر دو نوع هورمون تحمل غشاء‌های سلولی این ژنوتیپ‌ها در مقابل پلاسمولیز و سیالیت افزایش داده و منجر به کاهش معنی‌دار نشت الکتروولیت‌ها به خارج سلولی شد. بیشترین میزان نشت الکتروولیت‌ها در شرایط نتش و بدون محلول‌پاشی هورمون مشاهده شد که استفاده از هورمون‌های IAA و کاینتین اثر موجب کاهش نشت الکتروولیت‌ها و تعدیل اثر نتش خشکی شد. هرچند که میزان نشت الکتروولیت‌ها در شرایط بدون نتش در هر

اعمال نتش خشکی موجب کاهش معنی‌دار تعداد پنجه‌ها در تمامی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه شد، اما این کاهش در ژنوتیپ‌های آپلندر و سپیدرود به ترتیب با ۲۸/۱ و ۲۳/۱ درصد، نسبت به رقم‌های غریب و خزر به ترتیب با ۵۱/۹ و ۵۴/۱ درصد، کمتر بود. پیردشتی و همکاران (Pirdashti *et al.*, 2004) و کاموشیتا و همکاران (Kamoshita *et al.*, 2004) نیز گزارش نمودند که نتش خشکی منجر به کاهش تعداد پنجه در ارقام برنج می‌شود. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در هورمون نیز نشان داد که بیشترین تعداد پنجه از رقم سپیدرود و محلول‌پاشی IAA به دست آمد که تفاوت معنی‌داری با تیمارهای سپیدرود در کاینتین، خزر در IAA و آپلندر در هر سه سطح هورمونی نداشت (جدول ۳). هورمون‌های IAA و کاینتین در همه ژنوتیپ‌های برنج مورد آزمایش منجر به افزایش تعداد پنجه شدند و تفاوت معنی‌داری با تیمارهای بدون محلول‌پاشی هورمون داشتند. این دو هورمون به دلیل افزایش شاخصاره از طریق افزایش تعداد پنجه‌ها منجر به افزایش رشد رویشی می‌شوند (Zahir *et al.*, 2001; Normanly, 2010). مقایسه میانگین اثر متقابل نتش در هورمون نیز نشان داد که نتش خشکی در زمانیکه هیچ هورمونی استفاده نشد، منجر به تولید کمترین تعداد پنجه به تعداد ۷/۳ عدد در بوته شد، در حالی که استفاده از هورمون‌های IAA و کاینتین منجر به تعدیل اثر نتش خشکی و افزایش تعداد پنجه در ارقام مورد مطالعه شد (جدول ۲).

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل‌های مورد ارزیابی دارای اثر معنی‌داری بر نشت الکتروولیت‌ها بودند. همچنین آثار متقابل ژنوتیپ در نتش و نتش در هورمون نیز دارای اثر معنی‌دار بر نشت الکتروولیت‌ها بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در نتش نشان داد که بیشترین نشت الکتروولیت‌ها در رقم غریب در شرایط نتش به میزان ۳۱/۲ درصد اتفاق افتاد که با تمامی تیمارهای دیگر تفاوت معنی‌داری داشت.

جدول ۲- مقایسه میانگین صفات گیاهی ژنوتیپ‌های برنج در اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و محلول پاشی IAA و کاینتین

Table 2. Mean comparison of plant characteristics of rice genotypes in interaction effects of drought stress and IAA and Kin application treatment

Treatments	تیمارهای آزمایشی	محتوای آب نسبی (%)	تعداد پنجه tillers	نشت الکترولیت	
				EL (%)	روز تا لوله شدن برگ Days to leaf rolling
Non stress × IAA	بدون تنش × IAA	92.4a	16.4a	16.1c	0.0c
Non stress × Kin	بدون تنش × Kin	90.7a	15.9ab	16.5c	0.0c
Non stress × Non Hormone	بدون تنش × بدون هورمون	88.5b	14.6b	17.6c	0.0c
Stress × IAA	تنش × IAA	43.7c	12.1c	26.6b	14.5a
Stress × Kin	تنش × Kin	42.5c	11.5c	27.6b	14.2a
Stress × Non Hormone	تنش × بدون هورمون	34.3d	7.3d	32.1a	10.5b

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری ندارند

Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly difference at 1% probability level, using Tukey's test

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات گیاهی ژنوتیپ‌های برنج در اثر متقابل تیمارهای ژنوتیپ‌ها و محلول پاشی IAA و کاینتین

Table 3. Mean comparison of plant characteristics of rice genotypes in interaction effects of genotypes and IAA and Kin application treatment

Treatments	تیمارهای آزمایشی	عدد کلروفیل متر SPAD	تعداد پنجه	
			No. of tillers	
Gharib × IAA	غريب × IAA	39.7b-d	12.2d-f	
Ghari × Kin	غريب × Kin	38.1d	11.6ef	
Gharib × Non hormone	غريب × بدون هورمون	32.8e	7.3g	
Upland × IAA	آپلند × IAA	43.2a	15.3ab	
Upland × Kin	آپلند × Kin	42.4ab	15a-c	
Upland × Non hormone	آپلند × بدون هورمون	40.5a-d	13.8a-d	
Khazar × IAA	خزر × IAA	41.9a-c	13.7a-e	
Khazar × Kin	خزر × Kin	41.3a-d	13.2b-e	
Khazar × Non hormone	خزر × بدون هورمون	38.7cd	9.5f	
Sepidrood × IAA	سپیدرود × IAA	41.9a-c	15.8a	
Sepidrood × Kin	سپیدرود × Kin	40.9a-d	14.8a-c	
Sepidrood × non hormone	سپیدرود × بدون هورمون	38.5cd	13.1c-e	

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری ندارند

Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly difference at 1% probability level, using Tukey's test

تحت تنش خشکی، دچار لوله شدن برگ شدند و در مقابل رقم‌های غریب و خزر به ترتیب با ۹/۶ و ۹/۳ داشتند. روز خیلی سریعتر لوله‌ای شدن برگ‌ها را نشان دادند. در شرایط بدون تنش در هر چهار ژنوتیپ مورد مطالعه لوله‌ای شدن برگ‌ها مشاهده نشد (جدول ۱). گیاهانی که به تنش خشکی حساسیت بیشتری دارند، به دلیل از دست دادن آب و به دنبال آن پلاسمویلیز سلول‌ها، دچار لوله شدن برگ‌ها می‌شوند و اولین نشانه تنش خشکی

سه سطح هورمونی، کمترین میزان را داشت (جدول ۲). نتایج تجزیه واریانس برای صفت روز تا لوله شدن برگ نشان داد که به غیر از اثر متقابل ژنوتیپ در هورمون و ژنوتیپ در تنش در هورمون، سایر آثار اصلی و متقابل میان عامل‌ها اثر معنی‌داری بر این صفت داشتند. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در تنش نشان داد که دو ژنوتیپ سپیدرود و آپلند به ترتیب با ۱۶/۵ و ۱۶/۱ روز، دیرتر از رقم‌های خزر و غریب

رتبه بالاتری نسبت به ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلند داشتند و محلول‌پاشی هورمون‌های IAA و کاینتین منجر به کاهش این رتبه در همه ژنوتیپ‌ها شد، در حالیکه تنش خشکی این رتبه را افزایش داد در همین ارتباط نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Yue *et al.*, 2006). به طور کلی بیشترین رتبه مربوط به رقم غریب در شرایط تنش خشکی و بدون محلول‌پاشی هورمون (رتبه ۹) بود. نتایج زین‌العابدین و همکاران (Zinolabedin *et al.*, 2008) نیز نشان داد که تنش خشکی منجر به افزایش رتبه خشک شدن برگ در گیاه برنج شد. بررسی میزان بازیابی بعد از رفع تنش خشکی نشان داد که هورمون‌های محلول‌پاشی شده در این آزمایش منجر به بهبود بازیابی ژنوتیپ‌ها شدند. دو رقم غریب و خزر بازگشت کمتری به حالت اول از خود نشان دادند، ولی در ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلند در زمان ۱۰ روز پس از بازگشت به شرایط عادی، بخش اعظمی از خسارت‌های واردہ ترمیم شد. نتایج این آزمایش نشان داد که ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلند بازیابی خشکی بیشتری نسبت به رقم‌های غریب و خزر داشتند و از این رو احتمالاً می‌توانند به عنوان متحمل به تنش خشکی در نظر گرفته شوند. محلول‌پاشی هورمون‌های IAA و کاینتین نقش مهمی در افزایش تحمل به تنش خشکی در گیاه برنج داشته و منجر به تاخیر اثر تنش خشکی به گیاه و یا تعدیل اثر این تنش شده و در بهبود گیاه و بازگشت آن به شرایط عادی نیز موثر بودند. با توجه به اینکه خشک شدن برگ به دلیل شدت کاهش محتوای آب نسبی برگ می‌شود، این دو هورمون با تاثیر مثبت بر محتوای آب نسبی از خشک شدن برگ جلوگیری کردند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه آثار اصلی و مقابل اثر معنی‌داری بر حداقل فلورسانس در برگ سازگار شده با تاریکی (F0) داشتند. نتایج مقایسه میانگین اثر مقابل سه جانبه نشان داد که بیشترین مقدار F0 متعلق به ترکیب تیماری خزر در شرایط بدون تنش

در گیاه لوله شدن برگ و خشک شدن نوک برگ‌ها می‌باشد که به دلیل کاهش فشار آماس در گیاه به وجود می‌آید (Zinolabedin *et al.*, 2008)، زیرا در گیاهان علفی یکی از عوامل اصلی پایداری فیزیکی گیاهان وجود فشار آماس در سلول‌های گیاه می‌باشد. نتایج مقایسه میانگین برای اثر متقابل تنش در هورمون نیز نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی‌دار تعداد روز تا لوله شدن برگ‌ها شد. به عبارت دیگر، تنش خشکی باعث شد که برگ‌ها در هر چهار ژنوتیپ مورد ارزیابی زودتر لوله‌ای شوند، اما محلول‌پاشی هر دو نوع هورمون منجر به تعدیل اثر تنش خشکی و تاخیر زمان لوله‌ای شدن برگ‌ها شد (جدول ۲). این تاخیر انداختن احتمالاً به دلیل حفظ شرایط طبیعی گیاه با محلول‌پاشی این دو هورمون بود، زیرا این دو هورمون منجر به افزایش محتوای آب نسبی در گیاه از طریق افزایش مقدار جذب آب از ریشه شده و در نتیجه فشار آماس در گیاه به صورت تعادل در آمد و از لوله شدن برگ جلوگیری می‌کند (Normanly, 2010).

نتایج آزمون ناپارامتریک برای صفات رتبه‌ای (نمره خشک شدن برگ)، شاخص لوله شدن برگ و بازیابی خشکی) نشان داد که مقدار کایاسکوثر برای کلیه صفات معنی‌دار بود. به عبارت دیگر میان ترکیب‌های تیماری حاصل از ژنوتیپ در تنش در هورمون اختلاف معنی‌داری وجود داشت.

مقایسه میانگین‌ها برای صفت نمره خشک شدن برگ نشان داد که در تیمارهای بون تنش خشک شدن برگ رخ نداد، ولی در شرایط تنش بسته به حساسیت ژنوتیپ به تنش خشکی، نمره برگ خشک شده افزایش یافت (جدول ۴). رقم‌های خزر و غریب نمره خشک شدن برگ بیشتری نسبت به ژنوتیپ‌های سپیدرود و آپلند داشتند. بیشترین نمره مربوط به رقم غریب در شرایط تنش خشکی بدون محلول‌پاشی هورمون (رتبه ۷) بود (جدول ۴). میانگین حاصل از سه تکرار برای شاخص لوله شدن برگ نیز نشان داد که رقم‌های خزر و غریب

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ در تنش در هورمون‌های IAA و کائینتین بر صفات گیاهی و مولفه‌های فلورسانس ژنوتیپ‌های برنج

Table 4. Mean comparison of genotype \times drought stress \times hormone on plant characteristics fluorescence parameters of rice genotypes

Treatments	تیمارهای آزمایشی	Leaf drying score	امتیاز خشک شدن برگ	شاخص لوله شدن برگ	بازیابی خشکی	دما برگ	F0	Fm	Fv	Fv/Fm
Upland \times Non stress \times Non hormone		0.0	0.0	1.0	30.2fg	456g	1977.3o	1521.3l	0.76c	
Upland \times Non stress \times IAA		0.0	0.0	1.0	29.2g	475f	20911	1616j	0.77c	
Upland \times Non stress \times Kin		0.0	0.0	1.0	30.2fg	472f	2076m	1604.3j	0.77c	
Upland \times Stress \times Non hormone		3.0	5.0	3.0	32.2cd	421.6k	1460s	1039o	0.71d	
Upland \times Stress \times IAA		1.0	1.6	1.0	31.2d-f	452gh	1841p	1389m	0.75c	
Upland \times Stress \times Kin		1.0	3.0	1.6	31.2 ef	437ij	1733q	1296.3n	0.74c	
Sepidrood \times Non stress \times Non hormone		0.0	0.0	1.0	30.2fg	509cd	2420i	1911f	0.78c	
Sepidrood \times Non stress \times IAA		0.0	0.0	1.0	29.2g	520.6b	2529f	2008d	0.79c	
Sepidrood \times Non stress \times Kin		0.0	0.0	1.0	29.2g	518bc	2492h	1974e	0.79c	
Sepidrood \times Stress \times Non hormone		3.0	5.6	3.0	31.7de	470f	2010n	1540k	0.76c	
Sepidrood \times Stress \times IAA		1.0	2.3	1.0	30.2fg	496.6e	2352j	1856g	0.78c	
Sepidrood \times Stress \times Kin		1.6	2.3	2.3	31.2ef	490e	2321k	1831h	0.78c	
Gharib \times Non stress \times Non hormone		0.0	0.0	1.0	30.2fg	507d	2507g	2000d	0.79c	
Gharib \times Non stress \times IAA		0.0	0.0	1.0	29.2g	521.6a	2843.3a	2319.8a	0.81b	
Gharib \times Non stress \times Kin		0.0	0.0	1.0	29.2g	514b-d	2803b	2289b	0.81a	
Gharib \times Stress \times Non hormone		7.0	9.0	7.0	36.2a	422.6k	1223w	801s	0.65h	
Gharib \times Stress \times IAA		4.3	5.6	5.0	33.2bc	451gh	1442t	991.3p	0.68e	
Gharib \times Stress \times Kin		5.0	5.0	4.3	34.2b	445hi	1405v	960q	0.68ef	
Khazar \times Non stress \times Non hormone		0.0	0.0	1.0	30.2fg	510cd	2555d	1745i	0.77c	
Khazar \times Non stress \times IAA		0.0	0.0	1.0	29.2g	541.6a	2626c	2084c	0.73c	
Khazar \times Non stress \times Kin		0.0	0.0	1.0	29.2g	542.6a	2550e	2007.5d	0.78c	
Khazar \times Stress \times Non hormone		5.6	9.0	7.0	35.2a	433j	1222w	789s	0.64i	
Khazar \times Stress \times IAA		3.0	6.3	4.3	33.2bc	454gh	1421.6t	967.5q	0.68f	
Khazar \times Stress \times Kin		3.6	6.3	5.0	34.2b	448gh	1375.6v	927.5r	0.67g	

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌دار ندارند

Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly difference at 1% probability level, using Tukey's test

غريب در شرياط بدون تنش و محلول‌پاشي هورمون IAA به ميزان ۸۱/۰ بدست آمد (جدول ۴). Fv/Fm يا حداكثر کارابي کوانتمومي فتوسيستم دو يا کارابي فتوشيميايی فتوسيستم دو نشان دهنده حداكثر کارابي در جذب نور توسط کمپلکس‌هاي جمع کننده نوري فتوسيستم دو مي باشد. تنش خشكى به دليل کاهش Fm و همچنين کاهش خفيف تر Fv منجر به کاهش حداكثر عملکرد کوانتمومي يا کارابي فتوشيميايی فتوسيستم دو شد. محلول‌پاشي هورمون منجر به بهبود شرياط حياتي گياه شده و در نتيجه ميزان اين نسبت را افزایش داد. Fv/Fm گزارش شده است که در شرياط تنش نسبت کاهش مي يابد (Perez *et al.*, 2007) بطور گسترده در تعين آشفتگى‌هاي ناشي از تنش در دستگاه فتوستنتري مورد استفاده قرار مي گيرد. کاهش در اين نسبت مي تواند به دليل توسعه آهسته فرایندهای خاموشی فتوشيميايی و آسيب نوري به مراکز واکنش باشد که هردوی آنها حداكثر کارابي کوانتمومي فتوشيميايی فتوسيستم دو را کاهش مي دهند (Baker and Rosenqvist, 2004).

نتيجه گيري

نتيجه اين آزمایش نشان داد که گياه برنج در مرحله گیاهچه‌اي به تنش خشكى حساس بوده و تنش خشكى بر صفات گياهی اندازه گيري شده داراي اثرات منفي بود. تنش خشكى سبب کاهش رشد رویشي و کاهش تعداد پنجه در همه ژنوتیپ‌ها شد. در طی اعمال تنش، ميزان آب قابل دسترس برای گياه در خاک کاهش يافت و اين موضوع باعث کاهش توانايي گياه در جذب آب شده و در نتيجه تعادل آبی در گياه از بين رفته و محتواي آب نسبی برگ در گياه به شدت کاهش يافت. عدم جذب آب کافی در گياه از يك طرف و از دست دادن آب توسط روزنه‌ها از طرف ديگر باعث کاهش مقدار آب در گياه شد. کاهش محتواي آب نسبی سبب کاهش فشار آamas در گياه

در تيمار محلول‌پاشي IAA به ميزان ۵۴۲/۶ بود که با تيمار خزر در آبياري كامل در هورمون Kin تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۴). با اعمال تنش، مقدار F0 کاهش يافت، ولی با محلول‌پاشي هورمون‌هاي IAA و کايتين ميزان F0 افرايش يافت (جدول ۴). ممنوعي و سيدشريفي (Mamnoei and Seyed Sharifi, 2010) نيز گزارش نمودند که تنش خشكى منجر به کاهش ميزان F0 در ژنوتیپ‌هاي جو شد. نتاييج اين آزمایش نشان دادند که اعمال تنش خشكى مقدار F0 را کاهش مي دهد، اما هورمون‌هاي IAA و Kin توانستند تا حدودي زيادي کاهش F0 را تعديل کنند.

نتاييج تجزيه واريانس برای فلورسانس حداكثر در برگ سازگار شده با تاريكي (Fm) نشان داد که همه آثار اصلی و متقابل داراي اثر معنی‌داری بر اين پaramتر بودند. مقايسه ميانگين اثر متقابل سه جانبه نشان داد که تنش خشكى اثر منفي بر اين پaramتر داشته و منجر به کاهش Fm شد. همچنان محلول‌پاشي هورمون‌هاي IAA و Kin در هر دو شرياط بدون تنش و تنش مقدار Fm را افزایش داد (جدول ۴). كمترین مقدار Fm مربوط به ترکيب تيماري خزر در شرياط تنش خشكى بدون محلول‌پاشي هورمون و به ميزان ۱۲۲۲ بود که با تيمار غريب در تنش خشكى بدون محلول‌پاشي هورمون تفاوت معنی‌داری نداشت. بيشترین مقدار Fm نيز به تيمار غريب در شرياط بدون تنش و محلول‌پاشي هورمون IAA تعلق داشت (جدول ۴). بالاتر بودن مقدار Fm نشان دهنده حداكثر حالت احیاء شده کوئینون A و بسته بودن مراکز واکنش مي باشند. ممنوعي و سيدشريفي (Mamnoei and Seyed Sharifi, 2010) نيز گزارش نمودند که تنش خشكى منجر به کاهش Fm در ژنوتیپ‌هاي جو شد.

نتاييج تجزيه واريانس برای حداكثر کارابي کوانتمومي فتوسيستم دو (Fv/Fm) نيز نشان داد که همه آثار اصلی و متقابل داراي اثر معنی‌دار بر اين پaramتر بودند. بيشترین مقدار اين نسبت از ترکيب تيماري

نداشتند، ولی با محلول پاشی هورمون‌های IAA و کاینتین، میزان تاثیر منفی تنفس خشکی بر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه کاهش یافت. ارزیابی مولفه‌های فلورسانس کلروفیل نیز نشان داد که ارقام غریب و خزر حساسیت بیشتری به تنفس خشکی در مرحله گیاهچه‌ای داشتند. نتایج نشان داد که هورمون IAA و ژنوتیپ آپلندر شرایط تنفس خشکی نسبت به سایر تیمارهای مورد بررسی، بهترین نتیجه را دارا بود. به طور کلی ژنوتیپ‌های آپلندر و سپیدرود بر خلاف غریب و خزر، متحمل به تنفس خشکی شناخته شدند و استفاده از هورمون‌های رشد منجر به بهبود شرایط رشد آنها شد. هرچند که استفاده از هورمون‌های IAA و کاینتین باعث بهبود شرایط رشد در ارقام حساس شد. ولی این ارقام نسبت به آپلندر و سپیدرود از قدرت بازیابی کمتری برخوردار بودند.

شد، که منجر به لوله شدن برگ شد که در ارقام حساس، خشک شدن برگ نیز رخ داد. کم شدن مقدار آب در داخل بافت‌های گیاهی سبب از بین رفت و همچنین جلوگیری از سنتز کلروفیل شده و در نتیجه مقدار سبزینگی برگ نیز کاهش یافت. کاهش میزان سبزینگی برگ نیز منجر به کاهش میزان کارآیی کوانتومی فتوسیستم دو شد. کاهش محتوای آب نسبی سبب بسته شدن روزنه‌ها شد، در نتیجه خروج آب از گیاه برای کاهش دمای گیاه متوقف شد. کاهش آب در گیاه از یک طرف و افزایش دمای درون گیاه از طرف دیگر، سیالیت غشاء را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان نشت الکترولیت‌ها را به بیرون از سیتوپلاسم افزایش داد. هرچند که نشت الکترولیت‌ها در ژنوتیپ‌های متحمل، قابلیت سرمیم و بهبود را دارا بود، ولی هیچکدام از ژنوتیپ‌ها بازیابی کاملی

References

- Abarshahr, M., B. Rabiei and H. Samizadeh Lahiji.** 2011. Assessing genetic diversity of rice varieties under drought stress conditions. *Notulae Scientia Biologicae*. 3: 114- 123.
- Baker, N. R. and E. Rosenqvist.** 2004. Applications of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: an examination of future possibilities. *J. Exp. Bot.* 55: 1607-1621.
- Bocco, R., M. Lorieux, P. A. Seck, K. Futakuchi, B. Manneh, H. Baimey and M. N. Ndjiondjop.** 2012. Agro-morphological characterization of a population of introgression lines derived from crosses between IR 64 (*Oryza sativa Indica*) and TOG 5681 (*Oryza glaberrima*) for drought tolerance. *Plant Sci.* 183: 65–76.
- Deivanai, S., S. Sheela Devi and R. P. Sharmmil.** 2010. Physiochemical traits as potential indicators for determining drought tolerance during active tillering stage in rice (*Oryza sativa L.*). *Pertanika J. Trop. Agric. Sci.* 33(1): 61-70.
- Farooq, M., A. Wahid, S. M. A. Basra and I. D. Din.** 2009. Improving water relations and gas exchange with brassinosteroids in rice under drought stress. *J. Agron. Crop Sci.* 195: 262–269.
- Ghorbani Javid M., A. Sorooshzadeh, S. A. M. Modarres Sanavy, I. Allahdadi and F. Moradi.** 2011. Effects of the exogenous application of auxin and cytokinin on carbohydrate accumulation in grains of rice under salt stress. *Plant Growth Reg.* 65:305-313.
- Guo, P., M. Baum, S. Grando, S. Ceccarelli, G. Bai, R. Li, M. von Korff, R. K. Varshney, A. Graner and J. Valkoun.** 2009. Differentially expressed genes between drought-tolerant and drought-sensitive barley

- genotypes in response to drought stress during the reproductive stage. *J. Exp. Bot.* 60: 3531–3544.
- Kamoshita, A., R. Chandra Babu, N. Manikanda Boopathi and S. Fukai. 2008.** Phenotypic and genotypic analysis of drought-resistance traits for development of rice cultivars adapted to rainfed environments. *Field Crops Res.* 109: 1–23
- Kamoshita, A., R. Rodriguez, A. Yamauchi and L. J. Wade. 2004.** Genotypic variation in response of rainfed lowland rice to prolonged drought and rewetting. *Plant Prod. Sci.* 7: 406–420.
- Mamnoei, E and R. Seyed Sharifi. 2010.** Study the effects of water deficit on chlorophyll fluorescence indices and the amount of proline in six barley genotypes and it's relation with canopy temperature and yield. *J. Plant Biol.* 5: 51-62.
- Maxwell, k. and G. N. Johnson. 2000.** Chlorophyll fluorescence- a practical guide. *J. Exp. Bot.* 345: 659-668.
- Mirjalili, A. 2005.** Plants in Stressfull Environments. Noorbakhsh Press. (In Persian).
- Molla, S., P. Villar-Salvador, P. García-Fayos and J. L. Pen˜uelas Rubira. 2006.** Physiological and transplanting performance of *Quercus ilex* L. (holm oak) seedlings grown in nurseries with different winter conditions. *Forest Ecol. Manage.* 237: 218–226.
- Normanly, J. 2010.** Approaching cellular and molecular resolution of auxin biosynthesis and metabolism. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biol.* 2: 1-18.
- O'Toole, J. C. 2004.** Rice and water: the final frontier, paper presented at the First International Conference on Rice for the Future. 31 August–2 September, Bangkok, Thailand.
- Perez, J. G., J. P. Syvertsen, P. Botia and F. G. Sanchez. 2007.** Leaf water relations and net gas exchange responses of salinized *Carrizo citrange* seedlings during drought stress and recovery. *Ann. Bot.* 100: 335–345.
- Pirdashti, H., Z. Tahmasbi Sarvestani, G. Nematzadeh and A. Abdolbaghi. 2004.** Effects of drought stress at vegetative stages of rice genotypes. 8th Iranian Crop Science Congress. 24-26 August, University of Guilan, Rasht, Iran (In Persian).
- Rakwal, R., G. Kumar Agrawal, S. Tamogami, M. Yonekura, V. Prasad Agrawal and H. Iwahashi. 2003.** Novel insight into kinetin-inducible stress responses in rice seedlings. *Plant Physiol. Biochem.* 41: 453–457.
- Safaei Chaeikar, S., B. Rabiei, H. Samizadeh and M. Esfahani. 2008.** Evaluation of tolerance to terminal drought stress in rice (*Oryza sativa* L.) genotypes. *Iran. J. Crop Sci.* 9: 315-331. (In Persian with English abstract).
- Sakakibara, H. 2006.** Cytokinins: activity, biosynthesis and translocation. *Annual Rev. Plant Biol.* 57: 431–449.
- Santner, A. and M. Estelle. 2009.** Recent advances and emerging trends in plant hormone signaling. *Nature.* 459: 1071-1078.
- Sharma, P. and R. S. Dubey. 2005.** Drought induces oxidative stress and enhances the activities of antioxidant enzymes in growing rice seedlings. *Plant Growth Reg.* 46:209–221.

- Vergara, B.** 1988. Growth stages of the rice plant (self test booklet). 2nd Edition. International Rice Research Institute. Los Banos, Laguna, Philippines. 42 pp.
- Wu, N., Y. Guan and Y. Shi.** 2011. Effect of water stress on physiological traits and yield in rice backcross lines after anthesis. Energy Procedia. 5: 255–260.
- Xu, L. J. Yu, L. Han and B. Huang.** 2013. Photosynthetic enzyme activities and gene expression associated with drought tolerance and post-drought recovery in Kentucky bluegrass. Environ. Exp. Bot. 89: 28–35.
- Xu, L., L. Han and B. Huang.** 2011. Antioxidant enzyme activities and gene expression patterns in leaves of Kentucky bluegrass in response to drought and post-drought recovery. J. Am. Soc. Hort. Sci. 136: 247–255.
- Xu, Z., G. Zhou and H. Shimizu.** 2010. Plant responses to drought and rewetting. Plant Signal. Behav. 5: 649–654.
- Yue, B., W. Xue, L. Xiong, X. Yu, L. Luo, K. Cui, D. Jin, Y. Xing and Q. Zhang.** 2006. Genetic basis of drought resistance at reproductive stage in rice: Separation of drought tolerance from drought avoidance. Genetics, 172: 1213–1228.
- Zahir, Z. A., H. N. Asghar and M. Arshad.** 2001. Cytokinin and its precursors for improving growth and yield of rice. Soil Biol. Biochem. 33: 405–408.
- Zinolabedin, T. S., P. Hemmatollah, A. M. Seyed, S. Modarres and B. Hamidreza.** 2008. Study of water stress effects in different growth stages on yield and yield components of different rice (*Oryza sativa* L.) cultivars. Pakistan J. Biol. Sci. 11: 1303–1309.

Effect of IAA and Kinetin application on plant characteristics and chlorophyll fluorescence parameters in rice seedlings under drought stress condition

**Salehifar. M.¹, B. Rabiei², M. Afshar Mohammadian³ and
J. Asghari⁴**

ABSTRACT

Salehifar, M., B. Rabiei, M. Afshar Mohammadian and J. Asghari. 2014. Effect of IAA and Kinetin application on plant characteristics and chlorophyll fluorescence parameters in rice seedlings under drought stress condition. **Iranian Journal of Crop Sciences.** 16(4): 293-307. (In Persian).

To study the effect of IAA and Kinetin phytohormones on the improvement of drought tolerance in rice seedlings (*Oryza sativa* L.), an experiment was carried out as factorial experiment with three factors based in completely randomized design with three replications in Agricultural Science Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran, in 2013. The experimental factors included: 1: four rice genotypes; Gharib, Khazar, Sepidrood and Upland (IR 83750-131-1), 2: drought stress condition; control (non-stress) and drought stress from 1 to 4 of Vergara coding system and 3: hormone in three levels; control (without hormone application), IAA (5×10^{-5} M) and Kinetin (5×10^{-5} M) as foliar application. Tiller No., day to leaf rolling, leaf temperature, relative water content, electrolyte leakage, SPAD value and chlorophyll fluorescence parameters were measured. Analysis of variance indicated that all studied traits were significantly affected by all experimental factors and their interactions. Sepidrood cultivar had the highest relative water content RWC in drought condition (46.3%). The lowest relative water content (34.5%) belonged to cv. Gharib in drought stress condition. Application of IAA in both control and drought stress conditions increased RWC to 92.4% and 43.7%, respectively. In non-stress condition, Upland cultivar had the highest relative chlorophyll content (47.1%). The lowest SPAD value (30.6) belonged to Gharib in drought stress condition. IAA and Kinetin hormones increased the leaf relative chlorophyll content in Gharib cultivar to 18% and 13.7%, respectively. Drought stress without hormone application increased electrolyte leakage (32.1%). The lowest electrolyte leakage (16.3%) was observed in Sepidrood cultivar in non-stress condition. The highest photosystem II quantum efficiency (Fv/Fm) was 0.81 which belonged to Khazar cultivar in non-stress condition and IAA application. Results of this experiment indicated that the application of IAA and Kinetin hormones improved the drought tolerance related traits in rice seedlings under drought stress conditions. IAA had more effective role than Kinetin in improving drought stress tolerance in rice seedlings. Also results indicated that the Upland and Sepidrood rice cultivars were more tolerant than Gharib and Khazar. Generally, upland cultivar was more responsive to IAA application under drought stress condition.

Key words: Electrolyte leakage, Leaf rolling index, Relative water content, Rice and SPAD.

Received: April, 2014

Accepted: December, 2014

1- PhD. Student , University of Guilan, Rasht, Iran (Corresponding author) (Email: Agri20000@yahoo.com)

2 and 4. Professor, University of Guilan, Rasht, Iran

3- Associate prof., University of Guilan, Rasht, Iran