

ارزیابی مقاومت به *Cercospora beticola* در چندرقند با استفاده از قطعات جداشده برگ

Evaluation of sugar beet resistance to *Cercospora beticola* using
detached leaf disks

سعید عباسی^۱، عزیزاله علیزاده^۱، محمود مصباح^۲ و مهدیه بنی‌هاشمی^۲

چکیده

به منظور بررسی امکان استفاده از قطعات جدا شده برگ جهت ارزیابی مقاومت مواد گیاهی نسبت به عامل بیماری *Cercospora beticola* لکه برگی سرکوسپورایی، دوازده رقم چندرقند با درجات مختلف مقاومت نسبت به عامل بیماری، تحت شرایط مزرعه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار در منطقه قائم شهر که از شرایط محیطی مساعدی جهت آلدگی برخوردار می‌باشد به اجرا در آمد. در ارزیابی آزمایشگاهی، مقاومت قطعات جدا شده برگ، در محیط سترون و در ظروف مستطیل شکل از جنس پیرکس در سطح آب - آگار ۱/۵ درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی بالایی بین ارزیابی مقاومت قطعات جدا شده برگ و ارزیابی مزرعه‌ای وجود دارد و این دو روش می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. با استفاده از روش قطعات جدا شده برگ می‌توان مستقل از شرایط آب و هوایی، به سهولت مقاومت تعداد زیادی از مواد گیاهی را طی مدت کوتاهی در آزمایشگاه بررسی نمود.

واژه‌های کلیدی: چندرقند، دیسک‌برگی، مقاومت، *Cercospora beticola*

۱ - گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
۲ - مؤسسه تحقیقات چندرقند

اهمیت بوده و بر کنترل شیمیایی ارجحیت دارد

(Koch and Jung 2000; Miller et al. 1994)

به استثنای یک مورد مقاومت منژنیک (Lewellen and Whitney 1976) که به دلیل ناپایداری عملاً مورد استفاده به نژدگران قرار نگرفت (Koch and Jung 2000), مقاومت به سرکوسپورا در ارقام تجاری چندرقند از نوع کمی است. منشأ این مقاومت در واقع به برنامه به نژادی مونراتی (Munerati) در ایتالیا باز می‌گردد که در آن برنامه *Beta vulgaris* sub sp. *maritima* منبع مقاومت مورد استفاده قرار گرفت

(Panella and Frese 2000; Bilgen

et al. 1969) و بعداً ماهیت پلی ژنیک آن به اثبات رسید (Smith and Gaskill 1970; Saito 1966). به دلیل ماهیت کمی مقاومت به سرکوسپورا، انتخاب منابع مقاومت تنها در جمعیت‌های بزرگ و در شرایط استاندارد موفقیت‌آمیز خواهد بود و در این راستا، اعتبار، صحت و سهولت ارزیابی یک ضرورت به شمار می‌رود (Koch and Jung 2000). اغلب پژوهشگران برای ارزیابی مقاومت به سرکوسپورا به اپیدمی‌های طبیعی (Panella and Frese 2000) بیماری متکی بوده‌اند (Smith and Gaskill 1970) اما به تدریج روش‌هایی برای ایجاد آلودگی مصنوعی در مزرعه ابداع گردیده است (Pfleiderer and Schaufele 2000; Adams et al. 1995; Smith and Gaskill 1970)

مقدمه

بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی چندرقند (Beta vulgaris L.) می‌باشد، مهم‌ترین *Cercospora beticola* Sacc. بیماری برگی این گیاه است که در شرایط محیطی گرم و مرطوب، بیشترین خسارت را به محصول چندرقند وارد می‌کند (Skaracis and Biancardi 2000) آلوده، عملکرد ریشه و عیارقند هر دو کاهش یافته و علاوه بر آن کیفیت فرآوری نیز به دلیل افزایش ناخالصی‌ها نظیر سدیم، پتاسیم، نیترات و آمینواسیدها افت می‌کند؛ در نتیجه، عملکرد شکر قابل استحصال، به دلیل کاهش اجزاء اصلی عملکرد کاهش می‌یابد

(Rossi 2000; Shane and Teng 1992). بیماری انتشار جغرافیایی وسیعی داشته و در تمامی مناطق کشت چندرقند مشاهده شده است (Holtschulte 2000). در ایران بیماری مزبور از خوزستان، کرانه‌های دریای خزر، اردبیل، ارومیه، خوی، بجنورد، بندرعباس و کازرون گزارش شده است (Ershad 1995). استفاده از ارقام مقاوم و کاربرد قارچ‌کش‌های مختلف راههای اصلی مبارزه با این بیماری هستند (Windels et al. 1998). در این میان، استفاده از ارقام مقاوم در جهت کنترل بیماری به دلیل اقتصادی و زیست محیطی حائز

مواد و روش‌ها

۱- ارقام چغندرقند

در این مطالعه از دوازده رقم چغندرقند با درجات مختلف مقاومت به بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی که قبلاً تحت شرایط آلودگی طبیعی در آزمایش‌های مزرعه‌ای انتخاب شده بودند استفاده گردید.

ارقام انتخابی عبارت از:

پنج رقم از شرکت هیلزوک سوئد شامل Dorothea, Eudora و Monodoro, Monatunna, HM 1836 سه رقم از شرکت دپره فرانسه شامل Monohikari, Ranger و FD0018

رقم Puma از شرکت دانیسکو دانمارک رقم Kweintermono از شرکت KWS آلمان و دو رقم ایرانی شامل رسول و ۱۹۱ بودند.

۲- جداسازی و تخلیص جدایه‌های بیمار‌گر

نمونه‌های آلوده به بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی طی سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ از مناطق آلوده در استان‌های خوزستان، اردبیل (منطقه دشت مغان) و مازندران (منطقه قائم‌شهر) و گلستان جمع‌آوری گردید. به منظور جداسازی بیمار‌گر قطعه‌ای از برگ‌های آلوده که اسپورهای قارچ *Cercospora* در سطح لکه‌های آن تشکیل شده بود با استفاده از آب مقطر استریل شستشو داده شد و سوسپانسیون اسپور حاصل با رقت مناسب برروی

تحت شرایط مزرعه، عمدتاً با تعیین شدت علائم بر روی برگ‌ها به صورت مشاهده‌ای انجام گرفته و از طریق نمره‌دهی عددی انجام می‌شود. اخیراً از روش جدیدی برای ارزیابی مقاومت گیاهان انفرادی با استفاده از دیسک برگی تحت شرایط کنترل شده در ظروف سترuron استفاده شده است (Koch and Jung 2000). با این روش می‌توان در مدت کوتاهی تعدادی زیادی از گیاهان انفرادی را از نظر مقاومت به سرکوسپورا مورد ارزیابی قرار داد. لیکن به جزئیات این روش ارزیابی در منابع اشاره‌ای نشده است.

از آن جایی که ارزیابی معتبر، صحیح و آسان مقاومت، لازمه اجرای برنامه‌های به‌تزادی مربوط به مقاومت است و با توجه به این که در کشور ما تحقیقات جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، لذا در این پژوهش، امکان ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به سرکوسپورا با بهره‌گیری از تکنیک دیسک برگی، با استفاده از دوازده ژنوتیپ چغندرقند با درجات مختلف مقاومت که قبلاً تحت شرایط آلودگی طبیعی در آزمایش‌های مزرعه‌ای انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و برای اطمینان از صحت و اعتبار ارزیابی مقاومت با استفاده از قطعات جدا شده برگ، نتایج این آزمایش با نتایج ارزیابی مزرعه‌ای مورد مقایسه قرار گرفت.

محیط کشت V₈A پخش گردید و نهایتاً پس از گذشت چهار روز نگهداری در شرایط روشنایی دائم و دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، سطح پرگنه قارچ با استفاده از مهپاش دستی شستشو داده شد و غلظت سوسپانسیون حاصل پس از صاف کردن در حد $3*10^3$ اسپور در میلی لیتر تنظیم گردید.

۴ - نحوه ارزیابی مقاومت با استفاده از قطعات

جداسده برگ در آزمایشگاه

گیاهچه های ارقام آزمایشی در مرحله چهار برگی به گلدان های اصلی انتقال داده شدند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد و برای هر تکرار هشت گلدان در نظر گرفته شد. ارزیابی مقاومت سه ماه پس از انتقال گیاهچه ها انجام گرفت. در این مرحله، قطعاتی از پهنه ک برگ به صورت دوایری به قطر ۱/۸ cm (از هر گیاه چهار دیسک برگی) تهیه و در محیط سترون در ظروف دردار مستطیل شکل از جنس پیرکس به ابعاد $30*20$ سانتیمتر بر روی آب - آگار ۱/۵ % قرار داده شدند. لازم به ذکر است که قبل از تهیه دیسک های برگی، برگ ها با آب مقطر شستشو داده شدند تا گرد و خاک موجود در سطح برگ ها حذف شود و سپس در معرض هوا خشک شدند. قطعات برگ با استفاده از سوسپانسیون اسپور حاوی $3*10^3$ اسپور در میلی لیتر به طور یکنواخت با کمک یک مهپاش دستی مایه زنی شده و پس از مایه زنی در ژرمیناتور قرار گرفتند. با توجه به اهمیت سن برگ ها در حساسیت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی، در این ارزیابی سعی

محیط آب - آگار ۱/۵ درصد پخش گردید. پس از جوانه زدن اسپورها، یک اسپور جوانه زده به محیط کشت عصاره تجاری سبزیجات V₈ juice Agar (۲۰۰ میلی لیتر عصاره هشت سبزی V₈ ، ۳ گرم CaCO₃ و ۲۰ گرم آگار در یک لیتر آب) منتقل شده و به این ترتیب یک جدایه تک اسپور خالص بدست آمد. جدایه های بیمارگر سپس برای نگهداری بلند مدت به محیط کشت Potato Dextrose Agar (PDA) در لوله آزمایش انتقال داده شد و در چهار درجه سانتی گراد نگهداری شدند. به منظور جلوگیری از کاهش قدرت بیماری زایی جدایه های بیمارگر، کلیه جدایه ها قبل از انجام آزمایش تحت شرایط گلخانه بر روی رقم حساس مایه زنی گردیده و پس از ظهور علائم آلودگی، جداسازی و تخلیص بیمارگر مجدداً به ترتیبی که قبل از گردیده صورت پذیرفت.

۳ - تهیه مایه قارچ

در این مطالعه، جهت انجام آزمایش های درون شیشه ای از مخلوط هفت جدایه عامل بیماری شامل سه جدایه از خوزستان، سه جدایه از منطقه مغان و یک جدایه از منطقه قائم شهر استفاده گردید. به منظور تهیه اسپور، جدایه های مذکور بر روی محیط کشت V₈A کشت داده شده و پس از دو هفته نگهداری در شرایط روشنایی دائم و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد سطح پرگنه های قارچ خراش داده شده و پس از افزودن آب قطره سترون، سوسپانسیون حاصل مجدداً بر روی

واحد سطح محاسبه شد. در شکل یک، مراحل مختلف ارزیابی مقاومت ژنتیک‌های چغندرقند نسبت به سرکوسپورا با استفاده از قطعات جداشده برگ ارائه شده است.

شد که در همه ارقام، برگ‌های تقریباً هم سن و بالغ انتخاب شوند. ارزیابی مقاومت هشت روز پس از نگهداری در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد صورت گرفت. به این منظور تعداد لکه‌های آلوه در هر دیسک برگی شمارش شده و تعداد لکه در

برگ
آلوه در هر دیسک



Isolation of single spor using stereomicroscope

برگ



Infected leaf

Infected leaf disks 7 days after inoculation



قطعات آلوه برگ هفت روز

لکنی‌های تک




single spor colonies

کشت دو هفته‌ای
Cercospora beticola



Two-weeks old culture

لید تو



Inoculum production

Leaf disks laid on top of WA



دیسک‌های برگ در سطح

شکل ۱ - مراحل مختلف ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت با استفاده از قطعات جداسده برگ disk resistance assay

• وجود لکه‌های آلوده بر روی برگ‌های

خارجی (۳)

- لکه‌های آلوده به یکدیگر متصل شده و نواحی مرده‌ای را روی برگ تشکیل داده‌اند (۵)

- بخش وسیعی از پهنه‌ک برگ‌های خارجی خشک شده است (۷)

- از بین رفتن برگ‌های خارجی، آلودگی شدید برگ‌های داخلی به همراه تشکیل سریع برگ‌های جدید (۹)

به گیاهانی که بر اساس مقیاس فوق حالات حد وسط آلودگی داشتند، نمرات زوج (۸، ۶، ۴، ۲) اختصاص یافت.

به این ترتیب مزرعه آزمایشی قائم‌شهر طی چهار مرحله مورد بازدید قرار گرفته و درجه آلودگی یادداشت‌برداری گردید. در نهایت پس از تجزیه واریانس داده‌های حاصل از ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه‌ای، مقایسه میانگین‌ها به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام شد. لازم به ذکر است که فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS روش Capability انجام گردید و از آنجایی که داده‌های مزرعه‌ای و داده‌های مربوط به ارزیابی مقاومت در آزمایشگاه توزیع نرمال نداشتند، تبدیل داده‌ها به صورت جذر، لگاریتم بر پایه اعشاری و لگاریتم طبیعی صورت گرفت. از این میان، تبدیل از نوع لگاریتم طبیعی منجر به بیشترین کاهش در میزان نایکنواختی داده‌ها گردید. لذا، از این روش برای تبدیل

۴ - نحوه اجرای آزمایش مزرعه‌ای

آزمایش مزرعه‌ای در فصل زراعی ۱۳۸۱ در منطقه قائم‌شهر (ایستگاه تحقیقاتی قراخیل) به اجرا درآمد. ژنتیپ‌های مورد مطالعه، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای هر کرت آزمایشی یک خط کاشت به طول هشت متر در نظر گرفته شد و فاصله‌ی بین خطوط کاشت ۵۰ سانتی‌متر منظور گردید. با توجه به اهمیت رطوبت در جوانه‌زنی کنیدی و نفوذ عامل بیماری هیچ‌گونه فواصل اضافی در بین کرت‌ها اعمال نشد تا به این ترتیب تراکم پوشش گیاهی شرایط مساعدتری برای گسترش بیماری ایجاد نماید. هم چنین به منظور توزیع یکنواخت آلودگی در سطح مزرعه آزمایشی، رقم حساس ۱۹۱، در سه خط کاشت در اطراف مزرعه کشت گردید. مزرعه آزمایشی به طور مرتب در طی فصل مورد بازدید قرار گرفت. به دلیل وجود شرایط مناسب محیطی در منطقه قائم‌شهر، بیماری به سرعت گسترش یافت و از آنجا که افزایش شدت آلودگی در چنین شرایطی احتمالاً تفکیک درجات مقاومت را مشکل می‌نمود، اسپورپاشی صورت نگرفت. یادداشت‌برداری درجه آلودگی بر اساس دستورالعمل تصویری نه‌گانه (۱-۹) (Anonymous 1970) KWS یک بار، به صورت زیر صورت گرفت و هر کرت به صورت مشاهده‌ای نمره داده شد.

• برگ‌ها، کاملاً سالم (۱)

مقایسه میانگین‌های مربوطه در جدول ۳، اختلاف بین ارقام مختلف را به تفصیل نمایان می‌سازد. در جدول ۴ ضرایب همبستگی ساده بین دو روش ارزیابی مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی ارائه گردیده است. هم‌چنین دندروگرام‌های حاصل از گروه‌بندی ارقام مورد آزمایش با استفاده از داده‌های مربوط به ارزیابی مقاومت از طریق قطعات جدا شده برگ و ارزیابی مقاومت در شرایط مزرعه، در شکل‌های ۲ و ۳ ارائه شده است.

داده‌ها و تجزیه واریانس صفات مذکور استفاده شد. سپس داده‌های تبدیل شده به مقادیر اصلی خود بازگردانده شدند. نهایتاً در هر آزمایش، ارقام مورد مطالعه، بر اساس درجه مقاومت، گروه‌بندی شدند. بدین منظور از تجزیه خوش‌های به روش UPGMA و با کمک مقادیر مجدول فاصله اقلیدسی استفاده گردید.

نتایج

در جدول‌های ۱ و ۲ تجزیه واریانس ساده صفات مورد مطالعه در آزمایشگاه و مزرعه ارائه شده است.

جدول ۱ - خلاصه تجزیه واریانس داده‌های مربوط به ارزیابی مقاومت سرکوسپو را در چند رخدان تحت شرایط مزرعه
Table 1 Summary of analysis of variance of data obtained in evaluating of resistance to *Cercospora beticola* under field conditions

| میانگین مربعات MS | | | | درجه آزادی df | منابع تغییرات Source of variation |
|--|----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| دفعات مختلف یادداشت‌برداری Recording dates | | | | | |
| IV | III | II | I | | |
| 0.1272** | 0.1447** | 0.3077** | 0.4282** | 11 | تیمار Treatment |
| 0.0112 | 0.0072 | 0.0089 | 0.0147 | 60 | خطا Error |

** Significant at the 1 %level

** : معنی دار در سطح احتمال یک درصد

جدول ۲ - تجزیه واریانس ساده داده‌های مربوط به ارزیابی مقاومت سرکوسپورا در چند رخدان تحت شرایط آزمایشگاه
Table 2 Analysis of variance of data obtained in evaluating resistance to *Cercospora beticola* under laboratory conditions

| میانگین مربعات MS | | درجه آزادی df | منابع تغییرات Source of variation |
|-------------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | |
| 0.67102** | | 11 | تیمار Treatment |
| 0.0127 | | 24 | خطا Error |

** Significant at the 1 %level

** : معنی دار در سطح احتمال یک درصد

جدول ۳ - واکنش ارقام مورد مطالعه چغندرقند نسبت به بیماری لکه برگی سرکسپورایی و گروه بندی آن‌ها تحت شرایط مزرعه و آزمایشگاه

Table 3 The reactions of the sugar beet cultivars to *Cercospora* leaf spot under field and laboratory conditions and their grouping

| تراکم لکه در دیسک برگ leaf disk spot density (No./cm ²) | دفعات مختلف یادداشتبرداری در مزرعه * | | | | مواد گیاهی Genotypes |
|---|--------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------|
| | IV | III | II | I | |
| 7.34 a | 6.86 a | 7.99 a | 6.00 a | 3.66 a | 191 |
| 6.91 ab | 5.41 b | 7.24 ab | 6.00 a | 3.33 ab | Eudora |
| 5.68 cd | 5.16 b | 7.32 ab | 5.49 ab | 3.33 ab | Monatunna |
| 6.61 abc | 5.33 b | 6.84 bc | 5.96 ab | 3.17 abc | Kawaintermono |
| 6.06 bc | 5.16 b | 6.41 c | 5.00 bc | 3.02 bc | Rasool |
| 4.42 de | 4.74 bc | 7.03 bc | 4.99 bc | 3.49 ab | Monohikari |
| 6.55 abc | 4.90 bc | 6.75 b | 4.48 cd | 3.02 bc | Ranger |
| 3.94 ef | 4.90 bc | 5.79 d | 4.41 d | 2.81 c | Mondoro |
| 3.48 f | 4.14 d | 5.33 def | 3.58 e | 2.15 d | Dorothea |
| 2.42 g | 4.41 cd | 5.58 de | 3.75 e | 2.01 de | Puma |
| 2.03 g | 4.33 cd | 5.17 f | 2.98 f | 1.83 e | FD 0018 |
| 2.19 g | 4.01 d | 5.00 f | 3.67 e | 1.75 e | HM 1836 |


*میانگینهای دارای حروف مشابه از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌دار ندارند.

The mean with same symbols are not significant at 5% level .

جدول ۴ - ضرایب همبستگی ساده بین روش‌های ارزیابی مقاومت به سرکسپورا در شرایط مزرعه و آزمایشگاه


Table 4 Simple correlation coefficients between field and laboratory methods for evaluating of resistance to *Cercospora beticola*

| | دفعات مختلف یادداشتبرداری | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | یادداشتبرداری اول | یادداشتبرداری دوم | یادداشتبرداری سوم | یادداشتبرداری چهارم |
| Recording dates | 1st recording date | 2nd recording date | 3rd recording date | 4th recording date |
| 4th recording date | 0.894** | | | |
| 3rd recording date | | 0.935** | 0.968** | |
| 2nd recording date | | | 0.805** | 0.867** |
| 1st recording date | | | | 0.923** |
| یادداشتبرداری اول | | | | |
| یادداشتبرداری دوم | | | | |
| یادداشتبرداری سوم | | | | |
| یادداشتبرداری چهارم | | | | |
| تراکم لکه در دیسک برگ | | | | |
| leaf disk spot density (No./cm ²) | | | | |



شکل ۲- دندروگرام حاصل از گروه‌بندی ارقام بر اساس ارزیابی مقاومت از طریق دیسک برگی

Fig. 2 Dendrogram of cluster analysis for grouping of genotypes based on evaluation of resistance to *Cercospora beticola* using leaf disk assay



شکل ۳- دندروگرام حاصل از گروه‌بندی ارقام بر اساس ارزیابی مقاومت تحت شرایط مزرعه در منطقه قائم‌شهر

Fig. 3 Dendrogram of cluster analysis for grouping of genotypes based on evaluation of resistance to *Cercospora beticola* under field conditions in the Ghaemshahr region

سطح یک درصد معنی‌دار است. با این حال مقایسه میانگین درجات آلودگی در جدول شماره سه نشان می‌دهد که درجه آلودگی ارقام از نظر سطح مقاومت در طی فصل رشد کمی تغییر یافته است. شدت آلودگی در منطقه قائم شهر به حدی بود که در پایان فصل رشد ارقام مقاوم‌تر در مقایسه با ارقام حساس اختلاف بارزی از نظر شاخص سطح برگ داشتند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوش‌های ارقام مورد مطالعه بر اساس مجموع مراحل یادداشت‌برداری در شکل ۳ ارائه گردیده است. در این مورد نیز بهترین انتخاب، انتخاب سه گروه بوده و بر این اساس گروه‌بندی ژنتیک‌های مورد مطالعه در منطقه قائم شهر به صورت زیر است:

گروه اول: ارقام Dorothea, Puma, HM1836
FD 0018

گروه دوم: ارقام Monodoro, Ranger, Monatunna, Eudora, Rasool
Monohikari, Kaweintermono

گروه سوم: رقم ۱۹۱

با وجود این که اختلافاتی در گروه‌بندی خوش‌های ارقام مورد مطالعه در دو روش ارزیابی مزرعه‌ای و آزمایشگاهی ملاحظه می‌شود، ضرایب همبستگی این دو روش ارزیابی که در جدول شماره چهار ارائه شده است نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین این دو روش ارزیابی وجود دارد.

۱- ارزیابی مقاومت با استفاده از قطعات جدا شده برگ

ظهور اولین علائم آلودگی تقریباً شش روز بعد از مایه‌زنی صورت گرفت. علائم بیماری در همه ارقام آزمایش، کاملاً باز بوده و پوشش خاکستری رنگی از کنیدی‌های بیمارگر در سطح لکه‌ها نمایان بود. مقایسه میانگین تراکم لکه‌های آلوده در واحد سطح قطعات جدا شده برگ در جدول شماره ۳ ارائه گردیده است. شکل ۲ گروه‌بندی ژنتیک‌های تحت مطالعه را با استفاده از تجزیه خوش‌های نشان می‌دهد. با بررسی مراحل تجزیه خوش‌های و اختلاف بین مقادیر مجدول فواصل اقلیدسی که در آن گروه‌های مختلف با یکدیگر ترکیب شده‌اند، مشخص گردید که در هر دو مورد انتخاب سه گروه، بهترین انتخاب برای رتبه بندی ژنتیک‌های تحت مطالعه با استفاده از روش تجزیه خوش‌های می‌باشد. بر این اساس، ژنتیک‌های مورد مطالعه، به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند که به ترتیب درجه‌ی مقاومت آنها کاهش می‌یابد:

گروه اول : ارقام HM1836, Puma, FD 0018
گروه دوم : ارقام Monodoro, Monohikari

Dorothea, Eudora, Ranger, Monatunna, Rasool, Kaweintermono
گروه سوم : ارقام 191, Kaweintermono, Rasool, Eudora, Ranger, Monatunna, Dorothea

۲- ارزیابی مقاومت در شرایط مزرعه

تجزیه واریانس ساده یادداشت‌برداری‌های مزرعه‌ای در جدول شماره یک ارائه گردیده است. مطابق این جدول در مراحل مختلف یادداشت‌برداری اختلاف بین تیمارها در

استفاده از این روش در مدت کوتاهی می‌توان تعداد زیادی از مواد گیاهی را مورد ارزیابی قرار داد. در این روش ارزیابی هیچ گونه محدودیتی در تعداد تکرارهای آزمایش وجود نداشته و شرایط انجام آزمایش مستقل از شرایط محیطی و کاملاً قابل کنترل می‌باشد. از طرفی در این ارزیابی هیچ گونه تنشی به گیاه مورد بررسی وارد نمی‌شود؛ بنابراین چنانچه حفظ تک بوته‌های آزمایش شده به دلیل جایگاه ویژه آن‌ها در دستور کار باشد این روش ارزیابی قویاً قابل توصیه می‌باشد. تنها محدودیت این روش حفظ شادابی دیسک‌های برگی طی مدت انجام آزمایش بوده که لازم است در این زمینه مطالعات بیشتری صورت پذیرد. در این خصوص به نظر میرسد با افزودن ترکیباتی نظیر کیتین که موجب به تعویق اندختن پیری در برگ‌ها می‌شوند این روش را می‌توان بهبود بخشدید (Browne and Cooke 2004). این روش ارزیابی به منظور تعیین تعداد لوکوس‌های کمی مقاومت به سرکوسپورا QTLs با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است (Koch and Jung 2000). لیکن به جزئیات این روش ارزیابی در منابع اشاره‌ای نشده است. هم چنین گزارش‌های متعددی در خصوص استفاده موفق از برگ بریده جهت ارزیابی مقاومت در سایر بیماری‌های گیاهی نیز (Browne and Cooke 2004; Daayf and Platt 2003) به هر حال نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت با استفاده از دیسک‌های برگی روشنی معتبر، آسان و سریع بوده و برخلاف آزمایش‌های مزرعه‌ای که مستلزم صرف وقت، هزینه و امکانات زیاد است، به سهولت و با هزینه اندک قابل اجرا است.

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی بالایی بین ارزیابی مقاومت از طریق قطعات جدا شده برگ و ارزیابی‌های مزرعه‌ای وجود دارد. به گونه‌ای که درجه همبستگی ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت با هر یک از مراحل ارزیابی مزرعه‌ای بالای ۸۳ درصد بوده است. با این حال گروه‌بندی ارقام آزمایشی در این دو روش ارزیابی کاملاً یکسان نیست. به عنوان مثال رقم حساس ۱۹۱ در ارزیابی‌های مزرعه‌ای به تنها یک گروه مستقل قرار گرفته است در حالی که در روش دیسک برگی، همراه با سایر ارقام حساس گروه‌بندی شده است. لازم به ذکر است که درجه مقاومت تک‌تک گیاهان یک رقم کاملاً یکسان بوده و وجود تنوع درونی در هر رقم امری طبیعی می‌باشد. از طرفی این تنوع در ارقام مختلف متفاوت است. بدیهی است در ارزیابی‌های مزرعه‌ای از آن جایی که نمره‌دهی ارقام به صورت مشاهده‌ای صورت می‌گیرد، واکنش غالب یادداشت‌برداری شده و لذا تک بوته‌هایی که واکنشی متفاوت با واکنش کلی رقم دارند، در ارزیابی منظور نمی‌شوند. حال آن که در ارزیابی آزمایشگاهی واکنش تک‌تک بوته‌های یک رقم در ارزیابی دخیل می‌باشد و میانگین آن به عنوان واکنش رقم منظور می‌گردد. بنابراین نتایج ارزیابی‌ها کاملاً یکسان نیست. با این حال ارزیابی مقاومت به هر یک از روش‌های مزبور صورت گیرد، قابل اعتماد خواهد بود. بدیهی است هریک از روش‌های ارزیابی دارای قابلیت و محدودیت‌هایی است و لذا انتخاب روش ارزیابی، خود، به اهداف و امکانات ما بستگی دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزیابی مقاومت با استفاده از قطعات جدا شده برگ همبستگی با ارزیابی مزرعه‌ای دارد با

References**منابع مورد استفاده**

- Adams H, Schauffle WR, Marlander B (1995) A method for the artificial inoculation of sugar beet with *Cercospora beticola* under field conditions. Journal of Plant Diseases and Protection 102: 320-322
- Anonymous (1970) *Cercospora* tafel. Kleinwanzleber Saatzucht Ag. Einbeck and Giesecke
- Browne RA, Cooke BM (2004) Development and evaluation of an in vitro detached leaf assay for pre-screening resistance to Fusarium head blight in wheat. European Journal of Plant Pathology 110: 91-102
- Daayf F, Platt HW (2003) Differential pathogenicity on potato and tomato of *Phytophthora infestans* US-8 and US-11 strains isolated from potato and tomato. Canadian Journal of Plant Pathology 25: 150-154
- Ershad D (1995) Fungi of Iran. Department of Botany, Publication No 10. Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran 874 p
- Holtschulte B (2000) *Cercospora beticola*-worldwide distribution and incidence. In: Asher MIC, Holtschulte B, Richard Molard M, Rosso F, Steinrucken G, Beckers R, eds. *Cercospora beticola* Sacc. Biology, Agronomic Influence and Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2: 5-16pp
- Koch G, Jung, C (2000) Genetic localization of Cercospora resistance genes. In: Asher MIC, Holtschulte B, Richard Molard M, Rosso F, Steinrucken G, Beckers R, eds. *Cercospora beticola* Sacc. Biology, Agronomic Influence and Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2: 197-210pp
- Lewellen RT, Whitney ED (1976) Inheritance of resistance to race 2 of *Cercospora beticola* in sugar beet. Crop Science, 16: 558-561
- Miller J, Rekoske M, Quinn A (1994) Genetic resistance, fungicide protection and variety approval politics for controlling yield losses from Cercospora leaf spot infection. Journal of Sugar Beet Research, 31: 7-12

- Panella L, Frese L (2000) Cercospora resistance in *Beta* species and the development of resistant sugar beet lines. In: Asher MIC, Holtschulte B, Richard Molard M, Rosso F, Steinrucken G, Beckers R, eds. *Cercospora beticola* Sacc. Biology, Agronomic Influence and Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2, pp163-176
- Pfleiderer UE, Schaufele WR (2000) Development of a testing method for resistance against *Cercospora beticola* in sugar beet. In: Asher MIC, Holtschulte B, Richard Molard B, Rosso F, Steinrucken G, Beckers R, eds. *Cercospora beticola* Sacc. Biology, Agronomic Influence and Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2, pp147-154
- Rossi V (2000) Cercospora leaf spot infection and resistance in sugar beet. In: Asher MIC, Holtschulte B, Richard Molard M, Rosso F, Steinrucken G, Beckers R, eds. *Cercospora beticola* Sacc. Biology, Agronomic Influence and Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2, pp17-48
- Saito K (1966) Studies on the Cercospora leaf spot resistance in sugar beet breeding. Memoirs of the Faculty of Agriculture Hokkaido, 6: 113-176
- Shane WW, Teng PS (1992) Impact of Cercospora leaf spot on root weight, sugar yield and purity of *Beta vulgaris*. Plant Disease, 76: 812-820
- Skaracis GN, Biancardi E (2000). Breeding for Cercospora resistance in sugar beet. In: *Cercospora beticola* Sacc. Biology, Agronomic Influence and Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2, eds. Asher MIC, Holtschulte B, Richard Molard B, Rosso F, Steinrucken G, Beckers R, pp 177-196
- Smith GA, Gaskill JO (1970) Inheritance of resistance to Cercospora leaf spot in sugar beet. Journal of American Society of Sugar Beet Technologists, 16: 172-180
- Windels CE, Lamey HA, Hilde D, Widner J, Knudsen T (1998) A Cercospora leaf spot model for sugar beet in practice by an industry. Plant Disease, 82: 716-726