

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه

Evaluation of superior sugar beet genotypes for resistance to important root rot pathogens in the greenhouse

شیرین فتاحی^۱، دوستمrad ظفری^{۲*} و سیدباقر محمودی^۳

تاریخ دریافت: ۸۸/۹/۳۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۰/۳/۲۴

ش. فتاحی، د. م. ظفری و س. ب. محمودی. ۱۳۹۰. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه. مجله چغندرقند (۱)۲۷-۳۸: ۲۵-۳۸

چکیده

چهار ژنوتیپ اصلاح شده چغندرقند در برابر عوامل مهم پوسیدگی ریشه شامل *Pythium aphanidermatum* در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. گیاهان ۱۰ تا ۱۲ هفتادی با زادمایه هریک از عوامل بیماری‌زا مایهزنی نشدن. زاد مایه در مورد عوامل بیماری‌زا پیتیوم و فیتوفترا کشت سه تا پنج روزه آن‌ها روی محیط کشت CMA و در مورد قارچ رایزوکتونیا نه دانه ذرت آلوده به قارچ بود. ارزیابی مقاومت در قالب آزمایش‌های مجزا برای هر بیمارگر و به صورت طرح کرت‌های کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام شد. یک ماه بعد از مایهزنی میزان پوسیدگی ریشه‌ها با مقیاس‌های موجود محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌های SB1۹-P.۱۶، SB1۹-P.۴۴ و SB1۹-P.۷۸ سطحی از مقاومت را نسبت به پوسیدگی پیتیومی دارا هستند. هم‌چنین ژنوتیپ SB1۹-P.۷۸ نسبت به *P. drechsleri* پایین‌ترین آلودگی را بعد از شاهد مقاوم نشان داد. در ارزیابی ژنوتیپ‌های چغندرقند نسبت به *R. solani* با گروه آناستوموزی ۴، ژنوتیپ SB1۹-P.۱۶ از میزان آلودگی نزدیک به رقم مقاوم *Dorotea R. solani* (AG 2-2) برخوردار بود. در ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های چغندرقند مورد مطالعه نسبت به *Dorotea* سه ژنوتیپ اصلاحی SB1۹-P.۱۶، SB1۹-P.۴۴ و SB1۹-P.۷۸ با شاهد مقاوم *Dorotea* اختلاف معنی‌داری نداشتند. به نظر می‌رسد که ژنوتیپ‌های SB1۹-P.۱۶، SB1۹-P.۴۴ و SB1۹-P.۷۸ ژرم پلاسمهای مناسبی برای دورگ‌گیری و تهیه ارقام متتحمل چغندرقند به عوامل بیماری‌زا پوسیدگی ریشه باشند. این گزارش اولین مورد از وجود منبع مقاومت در گونه *Beta vulgaris* نسبت به بیمارگرهای ریشه ناشی از *P. drechsleri* و *aphanidermatum* در ایران محسوب می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پوسیدگی ریشه، چغندرقند، مقاومت، *Phytophthora drechsleri*، *Pythium aphanidermatum*، *Rhizoctonia solani*

zafari_d@yahoo.com

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه بولوی سینا - همدان
۲- دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بولوی سینا - همدان *- نویسنده مسئول
۳- استادیار موسسه تحقیقات چغندرقند - کرج

حفظ می‌شود و هم آلدگی زیست محیطی به دنبال خواهد داشت (Richard 2000). برنامه اصلاح برای مقاومت به پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه از سال ۱۹۶۶ در مؤسسه تحقیقات کشاورزی آمریکا (مرکز تحقیقات Fort Collins) شروع شده و تولید (Panella and Hanson 2004; Binancardi et al. 2005; and Hanson 2004; Panella and Hanson 2006, 2007). برنامه تاکنون چندین لاین مقاوم به Kuhn Cercospora Sacc و Rhizoctonia solani مقاومت به *R. solani* Fr. به قارچ‌های *Phoma betae* Frank و *Botrytis cinerea* (Bugbee and Campbell 1990) مقاومت نشان داده است.

گاسکیل و همکاران (Gaskill et al. 1970) اولین محققانی بودند که در سال ۱۹۶۶ توانستند دو رقم مقاوم چغندرقند به *R. solani* معرفی نمایند. بعد از آن‌ها هکر و راپل (Hecker and Ruppel 1975) یک برنامه اصلاحی مشابه تحقیقات گاسکیل و همکاران در ایالت‌های کلرادو و میشیگان اجرا کردند. لاین‌های توصیه شده به وسیله آن‌ها، به منظور توسعه مقاومت در ارقام هیبرید تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته اصلاح چغندرقند به *R. solani* با انتخاب توده‌ای و ارزیابی مشاهده‌ای در مزرعه بعد از یک آلدگی شدید و یکنواخت بیماری ایجاد شده از آلدگی مصنوعی صورت می‌گرفت (et al. 1982).

مقدمه

تمامی اندام‌های چغندرقند (*Beta vulgaris* L.) به طور تقریب در کلیه مراحل رشد به وسیله عوامل بیماری‌زای متعددی آلدود می‌شود. این بیماری‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی میزان محصول تأثیر می‌گذارند. کنترل بیماری‌های ایجاد شده توسط بیمارگرهای خاکزad نسبت به بیمارگرهای برگی مشکل‌تر بوده و ردیابی آن‌ها قبل از ایجاد خسارت مشکل است (Harveson and Rush 2002). عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در مناطق مختلف کشت این محصول در ایران متفاوت می‌باشند. این عوامل به تهایی و یا در کنار هم موجب پوسیدگی ریشه چغندرقند و سایر گیاهان می‌گردند (Behdad 1996). (Mahmoudi and Soltani 2005) بیان کردند که در میان عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند، سه نوع پوسیدگی رایزوکتونیایی، فیتوفتراپی و پیتیومی در ایران از اهمیت بالایی برخودار هستند. مدیریت بیماری‌های خاکزad به دلیل پیچیدگی محیط خاک با استفاده از روش‌های متداول شیمیایی و بهزروعی بسیار مشکل و ناکارآمد است و یکی از مؤثرترین روش‌های کنترل این بیماری‌ها، اصلاح و ایجاد ارقام مقاوم و استفاده از آن‌ها در مزارع آلدود است (Hecker and Ruppel 1977). در کنترل بیماری‌های چغندرقند، حفظ سلامت و عملکرد محصول و جلوگیری از آلدگی‌های زیست محیطی باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد، با استفاده از ارقام مقاوم هم سلامت و عملکرد چغندرقند در حد بالای

طوفه ناشی از *R. solani*, مقاومت ۲۷ رقم تجاری و لاین را در مرحله گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به رایزوکتونیا با گروه آناستوموزی ۴ مورد ارزیابی قرار داد. بهمنظور دستیابی به روشی ساده و قابل اعتماد جهت ارزیابی مواد ژنتیکی چندرقند در برابر پوسیدگی رایزوکتونیابی، مقاومت ۱۲ ژنوتیپ در شرایط مزرعه، گلخانه و درون شیشه توسط محمودی و همکاران (Mahmoudi et al. 2003B) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن‌ها با همدیگر مقایسه شد. (Mahmoudi et al. 2003A) ۲۰ ژنوتیپ چندرقند را از نظر مقاومت به عامل پوسیدگی ریشه و طوفه ناشی از قارچ *R. solani* با گروه آناستوموزی ۲ (AG-2-2) و با قدرت بیماری‌زا بala در شرایط گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار دادند. ابراهیمی کولایی و محمودی (Ebrahimi and Koulaei and Mahmoudi 2008) کوچک برای ارزیابی ۷۰ ژنوتیپ چندرقند از نظر مقاومت به بیماری پوسیدگی ریشه و طوفه ناشی از قارچ *R. solani* با گروه آناستوموزی ۲ استفاده کردند. موثرترین روش کنترل بیماری‌های ناشی از گونه‌های پیتیوم و فیتوفترا استفاده از ارقام مقاوم است (Bannet et al. 2007; Kens 2008) همکاران (Higginbotham et al. 2004) به بررسی وجود ارقام متحمل گندم نسبت به *Pythium ultimum* و *P. debaryanum* پرداختند. لوترباچر و همکاران (2000 and 2005) مقاومت ژرمپلاسم جنس *Beta* را نسبت به *P. ultimum* عامل گیاهچه

(Schneider). اما آزمایش‌های مزرعه‌ای مشکلاتی دارند از جمله این‌که، ارزیابی در هر سال یک بار بیشتر امکان‌پذیر نبوده و تغییرات محیطی را نیز نمی‌توان کنترل کرد. این مسایل باعث اخذ نتایج متغیر در سال‌های مختلف می‌شود. برای غلبه بر این مشکلات، ارزیابی گیاهان چندرقند برای مقاومت به عوامل بیماری‌زا در گلخانه توصیه شده است. لوترباچر و همکاران (Luterbacher et al. 2000) تعداد زیادی ژرمپلاسم از گونه‌های مختلف جنس *Beta* را نسبت به چندین بیماری مهم چندرقند شامل ویروس زردی (BYV)، ویروس زردی خفیف چندرقند (BMYV)، پوسیدگی سیاه ریشه چندرقند، مرگ گیاهچه ناشی از *Pythium ultimum* Trow و سفیدک پودری را مورد ارزیابی قرار دادند. بوترو همکاران (Buttner et al. 2004) ارزیابی مقاومت به *R. solani* در چندرقند را در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه‌ای بررسی و روش ارزیابی گلخانه‌ای استانداردی را بهینه‌سازی کردند. در این روش گیاهان ۱۱ هفته‌ای با اینوکلوم مایع و جامد مایه‌زنی شدند و سه هفته بعد از مایه‌زنی با مقیاس نه گانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. (Luterbacher et al. 2005) در تحقیقی گسترده حدود ۷۰۰ ژرمپلاسم از جنس *Beta* را نسبت به بیماری‌های خاکزad مورد ارزیابی قرار دادند. این ارزیابی در برابر بیمارگرهای Drechsler (*R. P. ultimum Aphanomyces cochlioides*) و رایزومانیا انجام شد. در ایران دادخواه (Dadkhah 1999) با مهمن دانستن پوسیدگی ریشه و

(Basu ۱۹۷۰) شدت بیماری را در چندین رقم و لاین یونجه نسبت به *P. megasperma* f.sp. *medicaginis* در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه‌ای مورد مقایسه قرار داد. وی اظهار داشت که به منظور افزایش دقیقت و ثبات در ارزیابی مقاومت لاین‌های یونجه نسبت به این بیمارگر آزمایش‌های گلخانه‌ای در کنار آزمایش‌های مزرعه‌ای انجام شود.

با توجه به مشاهده مقاومت چندرقند و سایر گیاهان به بیمارگرهای مهم ریشه، در این تحقیق طی بررسی‌های گلخانه‌ای، مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های چندرقند نسبت به *R. solani* با گروه آناستوموزی ۲ و ۴ و ارزیابی مقاومت این ژنوتیپ‌ها نسبت به پوسیدگی‌های ریشه‌ناشی از دو بیمارگر Tucker و *Pythium aphanidermatum* Edson در گیاهان بالغ ارزیابی شدند.

مواد و روش‌ها

جادیه‌های (PA2) *Pythium* (PA2) و *Phytophthora drechsleri* و *aphanidermatum* (PHK) جهت ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های چندرقند مورد استفاده قرار گرفت. جدایه PA2 که از ریشه گیاه چندرقند و از استان لرستان جدا شده بود، در آزمایش‌های درون شیشه‌ای و گلخانه‌ای قبلاً به عنوان بیماری‌زاترین جدایه شناخته شده است (Fattahi et al. 2008). جدایه PHK از ریشه چندرقند و از استان کرمانشاه استخراج و به عنوان جدایه منتخب در این آزمایش‌ها استفاده شد. جدایه‌های

میری چندرقند مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها منابعی از مقاومت را نسبت به این بیمارگر در این جنس پیدا کردند. در ایران ابرین‌نیا و همکاران (Abrinnia et al. 2007) مقاومت ۲۰ لاین چندرقند را تحت شرایط گلخانه‌ای نسبت به دو جدایه *P. ultimum* عامل گیاه‌چه میری چندرقند مورد ارزیابی قرار دادند. گیاهان، سه هفته پس از مایه‌زنی با مقیاس صفر تا پنج مورد بررسی قرار گرفتند. مقاومت طبیعی نسبت به فیتوفترا در بعضی از گونه‌های گیاهی دیده شده است. مقاومت اختصاصی در *infestans* De bary نسبت به سیبازمینی نسبت به Yu and *Phytophthora* و در سویا نسبت به *Phytophthora sojae* Zhuang از سال ۱۹۵۰ مطالعه شده است (Si- Ammour 2004). بانت و همکاران (2007) نشان دادند که مقاومت به دو گونه *parasitica* و *Phytophthora capsici* Leonian در ژرم‌پلاسم CM334 در گیاه فلفل وجود دارد. هورن و همکاران (Hohrein et al. 1983) از روش گلخانه‌ای برای ارزیابی مقاومت ژرم‌پلاسم‌های *megasperma* f.sp *medicaginis* یونجه نسبت به *Phytophthora Drechsler* استفاده کردند. آن‌ها روش گلخانه‌ای را یک روش سریع، ارزان و قابل اعتماد برای ارزیابی ژرم‌پلاسم‌های یونجه نسبت به پوسیدگی فیتوفترا ریشه دانسته و عنوان کردند این روش در هر فصلی امکان‌پذیر بوده و ایجاد شرایط اشباع نیز برای ایجاد آلودگی برای تمام گیاهان به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد. باسو (Basso 1988)

گردید (Mahmoudi et al. 2003B). مایه‌زنی با قرار دادن قطعات کشت یک تشتک پتری نه سانتی‌متری در هر گلدان، برای جدایه‌های پیتیوم و فیتوفترا و نه عدد بذر ذرت مایه‌زنی شده در هر گلدان، برای جدایه‌های رایزوکتونیا در عمق سه سانتی‌متری کنار ریشه صورت گرفت. در هر آزمایش و برای هر ژنوتیپ ده گلدان به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. گیاهان شاهد در آزمایش‌های مربوط به پیتیوم و فیتوفترا فقط محیط کشت آگاردار و در آزمایش‌های مربوط به رایزوکتونیا نه عدد دانه ذرت ستون دریافت کردند. بلا فاصله بعد از مایه‌زنی آبیاری صورت گرفت و شرایط اشباع برای گیاهان مایه‌زنی شده با جدایه‌های پیتیوم و فیتوفترا فراهم گردید. آزمایش‌ها به طور جداگانه و در قالب طرح کرت‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار و ۱۰ بوته در هر تکرار اجرا شدند. تمامی آزمایش‌ها در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام گرفت. تمامی شرایط از نظر نور، دما و رطوبت در حد ایجاد محیط مناسب برای رشد گیاه و عوامل بیماری‌زا فراهم گردید. چهار هفته پس از مایه‌زنی، ریشه‌ها از خاک خارج شده و پس از شستشو با استفاده از مقیاس‌های موجود مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تمامی آزمایش‌ها برای اطمینان از این که عامل بیماری‌زا همان بیمارگر مایه‌زنی شده است نمونه‌هایی از ریشه‌ها به طور تصادفی انتخاب و بر روی محیط کشت مناسب کشت داده شده و با بیمارگرهای اولیه مقایسه شدند. ارزیابی گیاهان چهار هفته بعد از مایه‌زنی با جدایه (P. *aphanidermatum* (PA2) به وسیله Altier 1995; Panella 1998) مقیاس یک تا هفت (and Theis و با اعمال یکسری تغییرات صورت

قارچ Rhizoctonia solani با گروههای آناستوموزی ۲ (AG2-2) و ۴ (AG4) از کلکسیون بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مؤسسه تحقیقات چندر قند دریافت شدند. چهار لاین اصلاحی چندر قند (۱۶) P. ۱۶- SB1۹-P.۴۴ (۴۴) SB1۹-P.۲۴ (۲۴) SB1۹-P.۷۸ (۷۸) به همراه یک شاهد حساس و بک شاهد مقاوم در این مطالعه مورد مقایسه قرار گرفتند. رقم تجاری جلگه به عنوان شاهد مقاوم به پوسیدگی Dorotea به عنوان شاهد مقاوم به پوسیدگی رایزوکتونیابی ریشه و طوقه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. لاین‌های اصلاحی و ارقام شاهد مقاوم و حساس از مؤسسه تحقیقات چندر قند تهیه شدند. تمامی بذور مورد استفاده قبل از کاشت به مدت سه دقیقه با هیپوکلرید سدیم یک درصد به صورت سطحی ضدغونی و سپس به مدت پنج دقیقه با آب جاری شسته شدند (Zang and Yang 2000). جهت جوانه‌زنی، بذرها به مدت ۲۴ ساعت در آب نگهداری شده و بعد در جعبه‌های نشاء کشت گردیدند. بعد از حدود سه الی چهار هفته نشاء‌های ژنوتیپ‌های مذکور به گلدان‌های بزرگ پنج کیلویی منتقل شدند. جهت مایه‌زنی گیاهان بالغ هشت الی ۱۰ هفته‌ای توسط گونه‌های *P. drechsleri* و *P. aphanidermatum* این جدایه‌ها در محیط کشت CMA در تشتک‌های پتری به قطر نه سانتی‌متر، کشت شدند و ریشه‌های هر تشتک به همراه محیط آگاردار به عنوان زادمایه مورد استفاده قرار گرفت (Brantner and Windels 1998; Salas et al. 2003). برای مایه‌زنی گیاهان با جدایه‌های R. *solani* با دو گروه آناستوموزی ۲ و ۴ از بذرها ذرت آلوده استفاده

مقیاس نه گانه (Buttner et al. 2004) استفاده گردید (جدول ۲). تجزیه واریانس داده‌ها با استفاده از آزمون Kruskal Wallis و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. ژنوتیپ‌ها از نظر مقاومت به عامل بیماری نیز به کمک روش غیرپارامتری توکی مقایسه شدند.

گرفت (جدول ۱). ارزیابی گیاهان مایهزنی شده با *R. solani* (AG یادداشتبرداری شد (جدول ۲) (Panella 1998). در ارزیابی گیاهان مایهزنی شده با جایه‌های *P. drechsleri* (AG2-2) و *R. solani* (PHK) از

جدول ۱ شاخص ارزیابی ژنوتیپ‌های چندرقند از نظر میزان بیماری پوسیدگی ریشه در مقیاس ۱ الی ۷

رتبه مقیاس	شرح علایم
۱	هیچ علایمی دیده نمی‌شود گیاهان سالم هستند
۲	نوك ریشه‌های موئین و ریشه اصلی نکروتیک و سفت است
۳	٪ ۲۵ ریشه نکروتیک (نرم) است
۴	٪ ۵۰ ریشه نکروتیک (نرم) است
۵	٪ ۷۵ ریشه نکروتیک و نرم است
۶	ریشه پوسیده ولی برگ‌ها سبز هستند
۷	مرگ کامل گیاه

(Altier and Theis 1995; Panella, 1998)

جدول ۲ شاخص ارزیابی ژنوتیپ‌های چندرقند از نظر پوسیدگی ریشه در مقیاس‌های صفر الی ۷ و ۱ الی ۹

رتبه مقیاس ۱-۹	شرح علایم	مقیاس ۷-۰
۱	هیچ علایمی دیده نمی‌شود گیاهان سالم هستند	صفر
۲	از سطح ریشه آلوه شده است	۱
۳	٪ ۱۵ از سطح ریشه آلوه شده است	۲
۴	٪ ۵-۱۰ از سطح ریشه آلوه شده است	۳
۵	٪ ۱۰-۲۵ از سطح ریشه آلوه شده است	۴
۶	٪ ۲۵-۵۰ از سطح ریشه آلوه شده است	۵
۷	٪ ۵۰-٪ ۷۵ از سطح ریشه آلوه شده است	۶
۸	٪ ٪ ۷۵ از سطح ریشه آلوه شده است	۷
۹	مرگ کامل گیاه، تمام ریشه پوسیده است	

(Buttner et al. 2004)

نتایج

ارزیابی مقاومت نسبت به *Pythium aphanidermatum*

نتایج تجزیه واریانس به کمک آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد (جدول ۳). جدول ۴ مقایسه جمع رتبه‌های ژنوتیپ‌ها را به روش غیرپارامتری توکی نشان می‌دهد. ژنوتیپ‌های ۴۴، ۷۸ و ۱۶ با شاهد مقاوم *Dorotea* اختلاف معنی‌داری نداشتند و ژنوتیپ ۲۴ با شاهد حساس جلگه اختلاف معنی‌داری نداشت. در عین حال بین ژنوتیپ‌ها و شاهد حساس جلگه تفاوت معنی‌دار مشاهده شد.

ارزیابی مقاومت نسبت به *Phytophthora drechsleri*

بین ژنوتیپ‌های چندرقند از نظر مقاومت به پوسیدگی ریشه ناشی از *P. drechsleri* اختلاف معنی‌داری وجود داشت (جدول ۳). مقایسه مجموع رتبه‌های ژنوتیپ‌های چندرقند مورد بررسی به روش غیرپارامتری توکی نشان داد که ژنوتیپ *Dorotea* با کمترین جمع رتبه و ژنوتیپ جلگه با بیشترین جمع رتبه به ترتیب در دو طیف مقاوم و حساس قرار گرفته و دارای اختلاف معنی‌دار بودند. با وجود این ژنوتیپ‌های

اصلاحی ۷۸، ۴۴، ۲۴ و ۱۶ اختلاف معنی‌داری با

شاهد مقاوم *Dorotea* نداشتند (جدول ۴).

ارزیابی مقاومت نسبت به *Rhizoctonia solani* با گروه آناستوموزی ۴ (AG-4)

نتایج تجزیه واریانس به کمک روش کروسکال والیس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از نظر مقاومت به *R. solani* با گروه آناستوموزی ۴ اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (جدول ۳) ولی ژنوتیپ ۱۶ با کمترین جمع رتبه از پتانسیل ویژه برای مطالعات بعدی برخوردار بود (جدول ۴).

ارزیابی مقاومت نسبت به *Rhizoctonia solani* با گروه آناستوموزی ۲ (AG-2-2)

آزمون کروسکال والیس حاکی از اختلاف معنی‌دار بین ژنوتیپ‌های چندرقند از نظر مقاومت به *Rhizoctonia solani* با گروه آناستوموزی ۲ بود (جدول ۳). نتایج حاصل از مقایسه جمع رتبه‌ها به روش غیرپارامتری توکی نشان داد که ژنوتیپ‌های ۴۴، ۷۸ و ۱۶ به ترتیب با جمع رتبه‌های ۱۵/۰، ۱۵/۸ و ۲۷/۹۹ نسبت به شاهد مقاوم *Dorotea* اختلاف معنی‌داری نداشتند و نسبت به آن از مقاومت بالاتری برخوردار بودند. ژنوتیپ حساس جلگه با جمع رتبه ۵۱ حساسیت بالایی از خود نشان داد (جدول ۴).

جدول ۳ نتایج تجزیه واریانس ژنوتیپ‌های چندرقد مورد مطالعه در مورد هر عامل پوسیدگی ریشه به کمک آزمون کروسکال والیس

میانگین مربعات(Mean square)	عوامل پوسیدگی ریشه
۱۴/۳۲*	<i>Rhizoctonia solani</i> AG(2-2)
۱۵/۹۸*	<i>Rhizoctonia solani</i> AG(4)
۱۰/۵۶ ^{ns}	<i>Pythium aphanidermatum</i>
۱۴/۳۴*	<i>Phytophthora drechsleri</i>

*- معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و ns-غیرمعنی دار

جدول ۴ مقایسه مجموع رتبه‌های ژنوتیپ‌های چندرقد مورد مطالعه در مورد هر عامل پوسیدگی ریشه با آزمون غیرپارامتری توکی

عامل پوسیدگی ریشه	تیمار	جمع رتبه‌ها (Rank sum)
<i>Rhizoctonia solani</i> AG(2-2)	SB19-P.۷۸	۸/۰۱
	SB19-P.۴۴	۱۵
	SB19-P.۲۴	۳۵/۰۱
	SB19-P.۱۶	۲۷/۹۹
	جلگه	۵۱
	Dorotea	۳۲/۹۹
<i>Rhizoctonia solani</i> AG(4)	SB19-P.۷۸	۳۶
	SB19-P.۴۴	۳۰/۹۹
	SB19-P.۲۴	۴۷/۰۱
	SB19-P.۱۶	۱۲
	جلگه	۳۰/۹۹
	Dorotea	۱۴/۰۱
<i>Pythium aphanidermatum</i>	SB19-P.۷۸	۲۵/۵
	SB19-P.۴۴	۱۴/۰۱
	SB19-P.۲۴	۴۳/۵
	SB19-P.۱۶	۶/۹۹
	جلگه	۴۹/۵
	Dorotea	۳۱/۵
<i>Phytophthora drechsleri</i>	SB19-P.۷۸	۱۸/۹۹
	SB19-P.۴۴	۲۹/۰۱
	SB19-P.۲۴	۳۶/۹۹
	SB19-P.۱۶	۲۹/۰۱
	جلگه	۵۱
	Dorotea	۶

HSD5% = ۳۷/۲۶۵*

- در مورد هر عامل پوسیدگی ریشه، تیمارهایی که تفاوت جمع رتبه آن‌ها مساوی یا بیش از ۳۷/۲۶۵ است بر مبنای آزمون غیرپارامتری توکی دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد هستند.

نسبت به چهار بیمارگ ریشه چندرقد شامل

بحث

Phytophthora *Pythium* *aphanidermatum*

در این بررسی مقاومت چهار ژنوتیپ اصلاحی

Rhizoctonia *solani* و *drechsleri*

چندرقد و یک شاهد حساس و یک شاهد مقاوم

بالغ در برابر این بیمارگر تاکنون در دنیا صورت نگرفته است.

در این بررسی درجاتی از مقاومت نسبت به پوسیدگی فیتوفتایی ناشی از *P. drechsleri* در ژنتیپ‌های منتخب مشاهده گردید. پیش از این مقاومت به فیتوفترا در گیاهان دیگر نیز دیده شده است. باسو (1988) در مطالعات خود نشان داد که درجاتی از مقاومت به *megasperma* f.sp. *medicaginis* در ژنتیپ‌های یونجه وجود دارد. وی همبستگی بالایی بین داده‌های گلخانه‌ای و مزرعه گزارش کرد. بانت و همکاران (2007) نشان دادند که مقاومت در ژرمپلاسم CM334 فلفل پلی‌ژنیک بوده و این ژرمپلاسم دارای مقاومت نسبی نسبت به فیتوفترا بوده است. تاکنون اطلاعاتی در خصوص بررسی مقاومت چندرقند به فیتوفترا در دنیا منتشر نشده است و این اولین مورد از گزارش واکنش ژنتیپ‌های چندرقند در برابر فیتوفترا است. دلیل این امر شاید چنین باشد که اکثر تولید چندرقند دنیا در اروپا انجام می‌گیرد و در این قاره، فیتوفترا به عنوان عامل بیماری‌زای چندرقند مطرح نیست. در اروپا بیمارگر *Aphanomyces* پوسیدگی سیاه ریشه ناشی از بیمارگر *cochlioides* از اهمیت بیشتری برخوردار است (Luterbacher et al. 2005). با دقت در نتایج ارزیابی مقاومت ژنتیپ‌های چندرقند در مرحله گیاه بالغ نسبت به پیتیوم و فیتوفترا (جدول ۴) می‌توان دید که ژنتیپ ۲۴ به عنوان ژنتیپ دارای حساسیت بیشتر

آناستوموزی ۴ و ۲ در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی مقاومت نسبت به *P. aphanidermatum* نشان داد که درجاتی از مقاومت نسبت به این بیمارگر در ژنتیپ‌های اصلاحی وجود دارد و حتی میزان آودگی ژنتیپ‌های ۱۶، ۴۴ و ۷۸ کمتر از رقم شاهد مقاوم بود. در تحقیقاتی که قبل از برای ارزیابی مقاومت گیاهچه‌های چندرقند نسبت به عامل مرگ گیاهچه چندرقند صورت گرفته است نیز درجاتی از مقاومت دیده شده است. در بررسی‌هایی که لوتر براچر و همکاران (2000 and 2005) انجام دادند، منابعی از مقاومت نسبت به *P. ultimum* را در گونه‌های مختلف جنس به دست آورددند و بیان کردند که سطح بالایی از مقاومت به *Aphanomyces cochlioides* و *Corollina* در دو بخش *Pultimum* از جنس *Beta* در مرحله گیاهچه‌ای *Procumbentes* دیده شده است. ابرین نیا و همکاران (2007) در تحقیقات خود چند رقم اصلاح شده چندرقند را نسبت به مرگ گیاهچه با عامل *P. ultimum* در مرحله گیاهچه‌ای مقاوم دانستند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که از ۲۰ لاین در گروه خیلی حساس تا حساس قرار دارد و فقط ۴ لاین در MsC2 و Mst231، 8150- Bulk 9597- P58 به عنوان لاین‌های مقاوم شناخته شدند. تحقیقات مشابهی برای ارزیابی مقاومت چندرقند در مرحله گیاه

گیاهچه و گیاه بالغ می‌باشند ولی از آن جایی که بذور تجاری توسط قارچ‌کش‌های مختلف تیمار شدند به همین دلیل اثر بیماری مرگ گیاهچه چندرقدن اهمیت چندانی نداشت.

در ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های چندرقدن نسبت به *R. solani* با گروه آناستوموزی ۲، ژنوتیپ ۷۸ با داشتن کمترین جمع رتبه به عنوان ژنوتیپی با مقاومت بالا شناخته شد و اختلاف آن با شاهد جلگه معنی‌دار بود. این نتایج با نتایج به دست آمده از تحقیقات ابراهیمی‌کولایی و محمودی (2008) مطابقت دارد. آن‌ها بوته‌های چندرقدن ۱۰ هفته‌ای را مایه‌زنی و مورد ارزیابی قرار دادند، براساس نتایج آن‌ها از بین ۷۰ لاین، ژنوتیپ ۷۸ با کمترین شاخص بیماری و ۵۵ ژنوتیپ دیگر با شاهد مقاوم در یک گروه آماری قرار گرفتند. در میان این ۵۵ ژنوتیپ، ژنوتیپ‌های ۱۶، ۲۴ و ۴۴ نیز قرار داشتند.

پیش از این نیز تحقیقات زیادی در مورد ارزیابی مقاومت نسبت به *R. solani* با گروه آناستوموزی ۲ روی ژنوتیپ‌های چندرقدن صورت گرفته است و ژرم‌پلاسم‌های مقاوم زیادی ثبت شده‌اند (Panella and Hanson 2004; Binancardi et al. 2005; Panella and Hanson 2006, 2007). بوتنر و همکاران (2004) با ارزیابی گیاهان ۱۱ هفته‌ای در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه‌ای نشان دادند که واریته‌های حساس به طور متوسط در مقیاس ۱ تا ۹ نمره ۸ را اخذ نمودند درحالی که

به ژنوتیپ جلگه نزدیک‌تر است بنابراین به نظر می‌رسد که مقاومت به بیمارگرهای خانواده *Pythiaceae* در چندرقدن با مکانیسم‌های نسبتاً مشابهی کنترل می‌شوند و ژنوتیپ‌های مقاوم به پیتیوم نسبت به فیتوفترا نیز مقاوم می‌باشند.

در ارزیابی نسبت به *R. solani* با گروه آناستوموزی ۴، ژنوتیپ ۱۶ با داشتن پایین‌ترین جمع رتبه از کمترین آلدگی برخوردار بود. اکثر محققان اعتقاد دارند که *R. solani* با گروه آناستوموزی ۴ عامل مرگ گیاهچه بوده و توان ایجاد پوسیدگی ریشه مشابه جدایه‌های گروه آناستوموزی ۲ را ندارد و بالعکس گروه آناستوموزی ۲ بیشتر عامل پوسیدگی ریشه بوده و قادر به ایجاد مرگ گیاهچه در قیاس با گروه (Ruppel 1972; Windels 1989) and Nabben 1989) جدایه‌های موجود در اصفهان را که باعث ایجاد علایم در مرحله گیاهچه‌ای و گیاه بالغ گردید، گروه آناستوموزی ۴ این گونه عنوان کرد. در این تحقیق ارقام و لاین‌های 20277-HM1833, 20278-HM1833, 70-H4653 و 8001-16402 نسبت به این قارچ در مرحله گیاهچه مقاومت نشان دادند. دو رقم 41RT و 20315-COMETE نسبت به قارچ مذکور مقاومت نسبی داشتند. محمودی و همکاران (2005) بر اساس آزمایش‌های گلخانه‌ای چنین استنباط کردند که جدایه‌های هر دو گروه آناستوموزی ۲ و ۴ قادر به ایجاد بیماری در مرحله

مد نظر قرار گیرند. با وجود این برای رسیدن به نتایج قطعی تر باید آزمایش‌ها با استفاده از ژنوتیپ‌های بیشتر تکرار شوند.

سپاسگزاری

لاین‌های مورد استفاده در این تحقیق توسط آقای مهندس ابراهیمی کولایی تهیه و در اختیار مجریان قرار گرفت که بدین‌وسیله از ایشان تشکر و قدردانی می‌گردد. از آقای دکتر مهیار شیخ‌الاسلامی نیز به خاطر در اختیار گذاشتن جدایه‌های قارچ تشکر می‌گردد.

ژنوتیپ‌های متحمل در محدوده بین ۶-۵ قرار گرفتند.

محمودی و همکاران (2003A) با ارزیابی گیاهان ۱۰

هفت‌های مایه‌زنی شده با قارچ *R. solani* R. با گروه

آناستوموزی ۲ عنوان کردند که ژنوتیپ‌های BP2، F-

ET5 و 41RT در گروه ژرم پلاسمهای

چندرقند مقاوم به پوسیدگی ریزوکتونیابی قرار دارند.

به نظر می‌رسد ژنوتیپ SB19-P.78، SB19-P.16 و

SB19-P.44 ژرم پلاسمهای مناسبی برای

دورگ‌گیری و تهیه ارقام چندرقند به عوامل

بیماری‌زای پوسیدگی ریشه باشند و در صورت استفاده

مؤسسه تحقیقات چندرقند از ژنوتیپ‌های اصلاحی

بهتر است این ژنوتیپ‌ها به عنوان ژنوتیپ‌های مناسب

منابع مورد استفاده

References

- Abrinnia M, Babai- Ahari A, Majidi Herava I. Assessment of resistance in sugarbeet lines to damping- off caused by *Pythium ultimum* Trow var. ultimum under greenhouse conditions. Plant Pathology Journal. 2007; 6 (3): 266 – 270.
- Altier NA, Theis JA. Identification of resistance to pythium seedling diseases in alfalfa using a culture plate method. Plant Disease. 1995; 97: 341- 346.
- Bannet J, Danan S, Boundet C, Barchi L, Sag- Palloix A, Caromel B, Palloix A, Lefebvre V. Are the polygenic architecture of resistance to *Phytophthora capsici* and *P. parasitica* independent in peper? Theoretical and Applied Genetics. 2007; 115: 253– 264.
- Basu PK. Relationship between Phytophthora root rot severity index and the percentage of resistant alfalfa plants. Canadian plant Disease Survey. 1988; 68(1)23– 26.
- Behdad A. Plant Protection Encyclopedia. Isfahan Neshat Printing house. 1996. pp. 3114. (in Persian, abstract in English)

- Biancardi E, Campbell GL, Skaracis GN, De Baggi M. Genetics and Breeding of Sugar Beet. Science Publisher, Inc., USA. 2005; pp 367.
- Brantner JR, Windels CE. Variability in sensitivity to metalaxyl in vitro, pathogenicity, and control of *Pythium* spp. on sugar beet. Plant Disease. 1998; 82:869– 899.
- Bugbee WM, Campbell LG. Combined resistance in sugar beet to *Rhizoctonia solani*, *Phoma betae* and *Botrytis cinerea*. Plant Disease. 1990; 74:353– 355.
- Buttner G, Pfahler B, Marlander B. Greenhouse and field techniques for testing sugar beet for resistance to Rhizoctonia root and crown root. Plant Breeding. 2004; 123:158- 166.
- Dadkhah A. Evaluation resistance of sugar beet varieties to Rizoctonia root rot in Isfahan. (MSc thesis). Tarbiat Modares University. 1999. pp. 120 (in Persian, abstract in English)
- Ebrahimi Koulaei H, Mahmoudi. SB. Evaluation resistance of sugar beet genotypes to Rhizoctonia root and crown rot in microplot conditions. 2008. Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress. (in Persian, abstract in English)
- Fattahi SH, Zafari D, Mahmoudi SB. Pathogenic variability of sugar beet isolates of *Pythium aphanidermatum*. 2008. Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress. (in Persian, abstract in English)
- Gaskill JO, Mumford DL, Ruppel EG. Preliminary report on breeding for combined resistance to leaf spot, curly top and rhizoctonia. Journal of the American Society of Sugar Beet Technologists. 1970; 16:207– 213.
- Harveson RM, Rush CM. The influence of irrigation frequency and cultivar blends on the severity of multiple root diseases in sugar beet. Plant Disease. 2002; 86: 901– 908.
- Hecker RJ, Ruppel EG. Inheritance of resistance to Rhizoctonia root rot in sugar beet. Crop Science. 1975; 15:487– 490.
- Hecker RJ, Ruppel EG. Rhizoctonia root rot resistance in sugar beet: breeding and related research. Journal of the American Society of Sugar Beet Technologists. 1977; 19:246– 256.

- Higginbotham RW, Paulitz TC, Campbell KG, Kidwell KK. Evaluation of adapted wheat cultivars for tolerance to *Pythium* root rot. *Plant Disease*. 2004; 88:1027– 1032.
- Hohrein BA, Bean GA, Graham JH. Greenhouse technique to evaluate alfalfa resistance to *Phytophthora megasperma* f.sp *medicaginis*. *Plant Disease*. 1983; 67:1332– 1333.
- Kens JP. Biology and management of Pythium root function in North Carolina. (PhD Thesis). North Carolina State University, USA; 2008.
- Luterbacher MC, Asher MJC, Beyer W, Mandolio G, Scolten OE, Frees L, Biancardi E, Stevanato P, Mechelke W, Slyvchenko O. Source of resistance to disease of sugar beet in related Beta germplasm: II. Soil-borne disease. *Euphytica*. 2005; 141:49– 63.
- Luterbacher MC, Smith JM, Asher MJC, Frees L. Disease resistance in collection of Beta species. *Sugar Beet Research*. 2000; 37:39– 47.
- Mahmoudi SB, Soltani J. Sugar beet root rot in Iran. Newsletter of Training Center for Studying Sugar Industry in Iran. 2005. 178:14-18. (in Persian, abstract in English)
- Mahmoudi SB, Mesbah M, Alizadeh A. Pathogenic variability of sugar beet isolates of *Rhizoctonia solani*. 2004. *Iranian Journal of Plant Pathology*. 2004. 40(3, 4):253- 280. (in Persian, abstract in English)
- Mahmoudi SB, Mesbah M, Alizadeh A. Evaluation of relative resistance in some selected sugar beet genotypes to Rhizoctonia root and crown rot. 2003A. *Journal of Crop Science*. 5:56- 63. (in Persian, abstract in English)
- Mahmoudi SB, Mesbah M, Alizadeh A, Ebrahimi Koulaei H. Comparison of different methods for evaluation of resistance to Rhizoctonia root and crown rot in selected genotypes of sugar beet. 2003B. *Journal of Sugar Beet*. 19(1)1- 22. (in Persian, abstract in English)
- Panella LW. Screening and utilizing Beta genetic resources with resistance to Rhizoctonia root rot and Cercospora leaf spot in sugar beet breeding program. *International Crop Network Series*. 1998; 12: 62- 72.

- Panella LW, Hanson LE. Registration of FC724 monogerm, O- type, sugar beet germplasm. Crop Science. 2004; 44: 361– 362.
- Panella LW, Hanson LE. Registration of FC720, FC722 and FC722CMS monogerm sugar beet germplasm resistance to Rhizoctonia root rot and moderately resistant to Cercospora leaf spot. Crop Science. 2006; 46:1009– 1010.
- Panella LW, Hanson LE. Registration of FC723. and FC723CMS monogerm sugar beet germplasm resistance to Rhizoctonia root rot and moderately resistant to Cercospora leaf spot. Journal of Plant Registrations. 2007; 1:66– 67.
- Richard AM. Towards healthier and better sugar beet. 63e Congres Institut International de Recherches Beterravieres, Interlaken, Switzerland. 2000; pp. 85-91.
- Ruppel EG. Correlation of cultural characters and sources of isolates with pathogenicity of *Rhizoctonia solani* from sugar beet. Phytopathology. 1972; 63:202– 205.
- Salas B, Secor GA, Taylor RJ, Gudmestad NC. Assessment of resistance of tubers of potato cultivars to *Phytophthora erythroseptica* and *Pythium ultimum*, Plant Disease.2003; 87:91-97.
- Schneider CL, Ruppel EG, Hecker RJ, Hogaboam GL. Effect of soil deposition in crowns of development of Rhizoctonia root rot sugar beet. Plant Disease. 1982; 66:408– 410.
- Si- Ammour A. Molecular analysis of the *Arabidopsis* Phytophthora pathosystem. Ph.D. thesis. Department of Biology University of Fribourg. Suisse. 2002; pp.108
- Windels CE, Nabben DJ. Characterization and pathogenecity of anastomosis group of *Rhizoctonia solani* isoleted from *Beta vulgaris*. Phytopthology. 1989; 79:83– 88.
- Zang BQ, Yang XB. Pathogenicity of pythium populations from corn- soybean rotation fields. Plant Disease. 2000; 84: 94-99.