

# مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکر از نظر تأثیر روی تولید و کارایی باکتری

## عامل بیوکنترل قارچ *Pseudomonas fluorescens*

### *Sclerotinia sclerotiorum*

Comparison of sugar beet and sugar cane molasses regarding their influence on production and efficiency of *Pseudomonas fluorescens*, the biocontrol agent of *Sclerotinia sclerotiorum*

فریشه حیدری تاج‌آبادی<sup>\*</sup>، مسعود احمدزاده<sup>۲</sup> و اسماعیل معین‌زاده<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۸۸/۹/۳۰؛ تاریخ پذیرش: ۸۹/۳/۱۲

ف. حیدری تاج‌آبادی، م. احمدزاده و ا. معین‌زاده. ۱۳۹۰. مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکر از نظر تأثیر روی تولید و کارایی باکتری *Pseudomonas fluorescens* عامل بیوکنترل قارچ *Sclerotinia sclerotiorum* (۱): ۵۲-۳۹.

### چکیده

برای کنترل قارچ *Sclerotinia sclerotiorum* استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست در مواردی با موفقیت همراه بوده است. از آن جا که فاکتورهای محیطی مانند منابع کربن روی استرین‌های بیوکنترلی مؤثر می‌باشد و استفاده از کربوهیدرات‌های خالص در تولید انبوه این عوامل صرفه اقتصادی نداشته از این‌رو در بسیاری موارد از ضایعات کشاورزی و صنعتی غنی از کربوهیدرات‌ها (مثل ملاس) استفاده می‌گردد. در این تحقیق جدایه UTPF614 از میان ۴۷ جدایه *Pseudomonas fluorescens* انتخاب شد. سپس تأثیر دو محیط کشت حاوی ملاس چغندرقند و نیشکر در افزایش جمعیت و خاصیت آنتاگونیستی باکتری در شرایط آزمایشگاه و خاصیت بیوکنترلی باکتری در شرایط گلخانه روی میزان آفتابگردان بررسی شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو محیط کشت حاوی ملاس چغندرقند و نیشکر از نظر تأثیر روی جمعیت و خاصیت بیوکنترلی باکتری در شرایط آزمایشگاه و گلخانه وجود ندارد اما این دو محیط کشت با شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند. در شرایط گلخانه ۸۰ درصد گیاهان به‌وسیله خاصیت بیوکنترلی باکتری حاصل از محیط کشت ملاس چغندرقند و ۷۸ درصد گیاهان به‌وسیله خاصیت بیوکنترلی باکتری حاصل از محیط کشت ملاس نیشکر در مقابل قارچ محافظت شدند. بررسی پارامترهای رشدی گیاه آفتابگردان در شرایط گلخانه نشان داد که ملاس چغندرقند تأثیر بیشتری بر افزایش وزن خشک گیاه داشت اما از نظر تأثیر بر طول ساقه، طول ریشه و وزن تر بین این دو محیط کشت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

واژه‌های کلیدی: آفتابگردان، بیوکنترل، چغندرقند، سودوموناس فلورسنس، کربوهیدرات‌ها، ملاس، نیشکر

\* - نویسنده مسئول  
1- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج  
fereshteh855@yahoo.com

2- دانشیار گروه گیاه‌پزشکی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج

3- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج

## مقدمه

برای این بیماری شناخته نشده است، (Expert and Digat 1995) استفاده از عوامل بیوکنترل علیه این قارچ می‌تواند مؤثر باشد. بررسی‌ها نشان داده است که تیمار بذرها با باکتری‌های آنتاگونیست بهطور معنی‌داری بر روی رشد گیاه از طریق حفاظت گیاه‌چه‌ها در مقابل بیمارگرهای خاکزد مؤثر بوده است (Costa et al. 2001). طبق بررسی‌های مکلولین (McLoughlin et al. 1992) مزرعه‌ای، استرین‌های *Pseudomonas cepacia* و *S. sclerotiorum* را در حضور *P. putida* و *P. fluorescens* قارچ‌های مختلف خاکزد گزارش شده‌اند (Duffy and Defago 1999). عوامل محیطی زنده و غیرزنده‌ای مانند دمه، اکسیژن، منابع غذایی و غیره عواملی هستند که بر روی فعالیت مؤلفه‌های بیوکنترل مؤثر بوده و همچنین در بیوستتر ترکیبات ضدмикروبی مانند انواع آنتیبیوتیک‌ها، سیدروفورها و غیره نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد استفاده عملی از عوامل بیوکنترل در سطح وسیع تولید انبوه آن‌ها می‌باشد. طراحی فرایندی که هم زمان با افزایش زادایی، کارایی، ماندگاری و ثبات ژنتیکی باکتری را در مراحل تولید انبوه افزایش دهد از اهمیت به سزاپی برخوردار است. به علاوه عناصر غذایی پرمصرف و کم‌صرف موجود در شرایط طبیعی و محیط کشت در بقا و کارایی عامل بیوکنترلی نقش بهسزایی دارند. منبع

قارچ *Sclerotinia sclerotiorum* یکی از مهم‌ترین بیماری‌های آفتابگردان در ایران محسوب می‌شود. این بیمارگر خاکزد بهوسیله اسکلروت‌ها می‌تواند در خاک زنده مانده و با حمله به گیاه‌چه‌های آفتابگردان باعث مرگ بوته‌ها شود. این بیمارگر همچنین به رسیه‌های در حال رشد و بالغ گیاهان حمله کرده و باعث پوسیدگی رسیه، شانکر در پایین ساقه و پژمردگی می‌شود (Shojaalsadati 2003).

یکی از راه‌های بالا بردن عملکرد محصول آفتابگردان کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های آن است، تأثیر اندک روش‌های شیمیایی در کنترل بیماری‌های گیاهی خاکزد، هزینه‌های بالای اقتصادی آن، آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از استفاده سوم، پسماندهای سوم شیمیایی در محصولات کشاورزی، پیدایش و توسعه جدایه‌های مقاوم عوامل بیماری‌زا به قارچ‌کش‌ها باعث شده است تا محققین به دنبال روش‌های مناسب‌تر و منطقی‌تر با هدف توسعه کشاورزی پایدار باشند (Duffy and Defago 1999).

کنترل بیولوژیک بهخصوص با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست در مواردی با موفقیت قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و نقش آن در کنترل بیمارگرهای مهم خاکزد به اثبات رسیده است. از آنجا که آفتابگردان یکی از گونه‌های گیاهی است که به قارچ *S. sclerotiorum* حساس است و تهیه ارقام مقاوم به پوسیدگی اسکلروتینیایی در آفتابگردان تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده و کنترل شیمیایی مؤثری نیز

بیومس *Pantoea agglomerans* استرین-2 را با کمترین قیمت (در مقایسه با سایر منابع) ایجاد کنند مشخص شد کربوهیدرات‌های ارزان قیمتی مثل سوکروز و ملاس حداکثر بیومس را تولید می‌کنند (Costa et al. 2001). تعدادی از محققین گزارش کردند که بیشترین رشد باکتری باسیلوس در محیط کشت حاوی ملاس به عنوان منبع کربن و عصاره مخمر به عنوان منبع نیتروژن صورت می‌گیرد و همچنین اسپوردهی سریع در یک محیط کشت که دارای تعادل خوبی از C/N باشد دیده شده است (Shojaalsadati 2003). هدف از این پژوهش یافتن منبع کربنی است که علاوه بر افزایش میزان رشد باکتری *P. fluorescens* استرین UTPF61 که یک عامل بیوکنترل برای قارچ *S. sclerotiorum* محسوب می‌شود، باعث افزایش کارایی بیوکنترل شود و امکان استفاده از آن در مقیاس تولید نیمه‌صنعتی و صنعتی امکان‌پذیر باشد. از آن‌جا که ملاس چندرقند و ملاس نیشکر محصول جانی کارخانه‌های تولید قند و شکر می‌باشند استفاده از این قبیل منابع کربن برای تولید انبوه باکتری‌های بیوکنترلی از جهات مختلف امکان‌پذیر است

## مواد و روش‌ها

### ۱- انتخاب باکتری

در ابتدا ۲۶ جدایه باکتریایی از کلکسیون باکتری‌های آنتاگونیست گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه گردید که

کربن برای کلیه فعالیت‌های بیوسنتری که منجر به تولید مثل، تشکیل فراورده و بقای سلول می‌شود مورد نیاز است. استفاده از کربوهیدرات‌های خالص مثل گلوكز، فروکتوز، ساکاروز، لاکتوز و قندهای دیگر در میکروبیولوژی صنعتی برای تولید انبوه عوامل آنتاگونیست باعث بالا رفتن هزینه تمام شده برای تولید محصول می‌شود از این‌رو در بسیاری موارد از ضایعات کشاورزی و صنعتی که از این قندها غنی‌اند (مثل ملاس) استفاده می‌گردد (Vazquez et al. 1997). ملاس محصول جانبی چسبناک و قهقهه‌ای رنگی است که در جریان تولید شکر از چندرقند و نیشکر به وجود می‌آید. کیفیت ملاس بستگی به میزان بلوغ چندرقند یا نیشکر، میزان شکر استخراج شده و روش استخراج دارد. ملاس چندرقند و نیشکر دارای مواد با ارزشی همچون موادمعدنی مثل قندها، ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و اسیدهای طبیعی می‌باشند (Pyghami Ashenaee 2007) یکی از با صرفه‌ترین و رایج‌ترین منبع برای تولید انبوه عوامل آنتاگونیست می‌باشد (McNeil and Harvey 2008).

طبق نتایج بررسی‌های انجام شده محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند هم برای رشد سلول و هم در کارایی و خاصیت آنتاگونیستی استرین‌های مختلف از سودوموناس و باسیلوس بر روی کپک خاکستری سیب و رایزوکتونیای لوبیا مؤثر بوده است (Pyghami Ashenaee 2007). براساس بررسی‌های انجام شده برای پیدا کردن منابع کربنی که حداکثر

ت- تأثیر روی پارامترهای رشدی آفتابگردان در گلخانه: این آزمایش طبق روش اکسپرت و دیگات (Expert and Digat 1995) با تغییراتی به شرح ذیل انجام شد: ابتدا بذور آفتابگردان رقم آذرگل به مدت ۳۰ دقیقه در محلول یک درصد هیپوکلریت سدیم ضد عفونی شد و بعد از شستشو با آب مقطر استریل، روی کاغذ صافی خشک و سپس در شرایط استریل ۱۵ الی ۲۰ عدد بذر در داخل تشتک پتی حاوی دو عدد کاغذ صافی استریل مرطوب قرار داده شدند. مجموعه حاضر به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. سپس بذور جوانه زده به مدت نیم ساعت در سوسپانسیون جدایه های باکتریایی حاوی دمای ۲۶ درجه سانتی گراد قرار داده شدند و بعد از این مرحله بذور به گلخانه منتقل شدند و درون هر گلدان محتوی خاک رس، خاک برگ و ماسه به نسبت حجمی ۱:۳:۱ استریل شده با اتوکلاو، سه عدد بذر کاشته شد و گلدان ها در شرایط ۱۶ ساعت روشنایی با دمای ۲۱ درجه سانتی گراد و هشت ساعت تاریکی با دمای ۱۸ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. صفات وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، طول ساقه و طول ریشه بعد از گذشت یک ماه اندازه گیری شدند. این آزمایش در قالب طرح کرت های کاملاً تصادفی با ۴۸ تیمار و سه تکرار اجرا شد که هر تکرار شامل چهار گیاه بود مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  $P \leq 0.01$  انجام شد.

مشخصات آن ها در جدول ۱ آمده است و ۲۱ جدایه نیز از ناحیه ریزوسفر گیاهان آفتابگردان واقع در چند مزرعه در اطراف قم در سال ۱۳۸۶ جداسازی گردید. از میان این ۴۷ جدایه باکتریایی در نهایت باکتری *P. fluorescens* UTPF61 براساس چندین آزمون انتخاب و برای آزمایش های بعدی به کار برده شد. آزمون های انجام شده روی این ۴۷ جدایه باکتریایی برای انتخاب جدایه برتر شامل موارد ذیل بوده است:

الف- هاله بازدارندگی: برای بررسی قدرت بازداری از رشد بیمارگر *S. sclerotiorum* در شرایط آزمایشگاه از (Hagedorn et al. 1989) روش هاجدرن و همکاران استفاده شد.

ب- سیانید هیدروژن: تعیین توان تولید سیانید هیدروژن (Alstrom and Burns 1989) از روش آستروم با استفاده از روش هاجدرن و همکاران (1989) انجام گردید. در صورت تولید HCN توسط باکتری های رشد یافته کاغذ صافی آغشته به معرف از رنگ اولیه زرد به قهوه ای تغییر رنگ می یابند.

پ- پروتئاز: به منظور بررسی تولید آنزیم پروتئاز توسط (SMA) Skim milk agar (Maurhofer et al. 1995) مطابق روش مارهوف و همکاران با کمی تغییر استفاده شد. این محیط شامل ۱۵ گرم پودر شیر (Skim milk)، ۵٪ گرم عصاره مخمر و ۹/۱۳ گرم آگار در یک لیتر آب مقطر می باشد. ایجاد هاله شفاف نشان دهنده تولید پروتئاز می باشد.


**جدول ۱ مشخصات جدایه‌های باکتریائی تهیه شده از کلکسیون گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و  
منابع طبیعی دانشگاه تهران**

ردیف	منطقه جمع‌آوری جوان	میزان	ملاحظات	جدایه
۱	-	کلازا	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	UTPF2
۲	دانشکده کشاورزی کرج	گندم	<i>P. fluorescens</i>	UTPF10
۳	دانشکده کشاورزی کرج	گندم	<i>P. fluorescens</i>	UTPF18
۴	دانشکده کشاورزی کرج	گندم	<i>P. fluorescens</i>	UTPF24
۵	دانشکده کشاورزی کرج	گندم	<i>P. fluorescens</i>	UTPF30
۶	دانشکده کشاورزی کرج	گندم	<i>P. fluorescens</i>	UTPF32
۷	خمین	لوبیا	<i>P. fluorescens</i>	UTPF45
۸	خمین	لوبیا	<i>P. fluorescens</i>	UTPF54
۹	قره تبه	پیاز	<i>P. fluorescens</i>	UTPF59
۱۰	شموك الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF60
۱۱	الموت قزوین	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF61
۱۲	مازندران	کلازا	<i>P. fluorescens</i>	UTPF63
۱۳	مازندران	کلازا	<i>P. fluorescens</i>	UTPF65
۱۴	الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF75
۱۵	الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF76
۱۶	قسین رود	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF81
۱۷	الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF82
۱۸	الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF83
۱۹	گازرخان	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF85
۲۰	شموك	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF86
۲۱	رازمينان	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF87
۲۲	شموك	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF90
۲۳	الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF92
۲۴	الموت	برنج	<i>P. fluorescens</i>	UTPF93
۲۵	هند	-	<i>P. fluorescens</i>	UTPF94
۲۶	هند	-	<i>P. fluorescens</i>	UTPF95

حدوداً دارای ۵۰ درصد ساکاروز بود) و ملاس نیشکر هر کدام به میزان ۱۰ گرم بر لیتر به طور جداگانه اضافه شد و برای شروع آزمایش درون فلاسک‌های ۱۰۰ میلی‌لیتری به میزان ۵۰ میلی‌لیتر از هر کدام از محیط‌های کشت در سه تکرار ریخته شد و محیط‌ها به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد اتوکلاو شدند (در این آزمایش یک فلاسک حاوی ۵۰ میلی‌لیتر از محیط کشت (NB) Nutrient broth میلی‌لیتر از محیط کشت به عنوان شاهد در نظر گرفته شد). سپس از کشت ساعته باکتری آنتاگونیست غلظت  $1 \times 10^6$  سلول باکتری

**۲- آماده‌سازی محیط کشت و مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری *P. fluorescens* استرین **UTPF61****

محیط پایه مورد استفاده محیط M1 می‌باشد: (Fuchs et al. 2000)



نحوه تهیه محیط‌های کشت به این صورت بود که به محیط‌های پایه تهیه شده منابع کربن شامل ملاس چندرقند (ملاس چندرقند مورد استفاده در این تحقیق

شرایط آزمایشگاه از روش ها جدern و همکاران (1989) استفاده شد. به این ترتیب که جدایه باکتری حاصل از محیط‌های مختلف کشت به صورت سه نقطه‌ای و در سه تکرار با فاصله ۰/۵ سانتی‌متر از لبه تشکه‌های پتروی حاوی محیط PDA کشت داده شد و پس از ۴۸ ساعت قطعات مساوی از کشت پنج روزه قارچ در وسط تشکه‌ها قرار گرفت و تشکه‌های پتروی در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از گذشت هفت روز هاله بازدارندگی مورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسه قدرت بازدارندگی باکتری، فاصله کلی باکتری تا کلنی قارچ اندازه‌گیری شد. آزمایش در قالب طرح کرت‌های کاملاً تصادفی اجرا و تحلیل شد و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح  $P \leq 0/01$  صورت گرفت.

**۵- تأثیر محیط‌های مختلف کشت بر باکتری *P. fluorescens* استرین *UTPF61* و رشد رویشی گیاه آفتابگردان در شرایط گلخانه**  
برای بررسی تأثیر باکتری‌های حاصل از محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و ملاس نیشکر روی رشد رویشی گیاه آفتابگردان آزمایشی طبق روش اکسپریت و دیگات (Expert and Digat 1995) با تعییراتی به شرح ذیل انجام شد: ابتدا بذرهای آفتابگردان رقم آذرگل به مدت ۳۰ دقیقه در محلول یک درصد هیپوکلریت سدیم خداغونی شده و بعد از شستشو با آب قطر استریل، روی کاغذ صافی خشک و سپس در شرایط استریل ۱۵ الی ۲۰ عدد بذر در داخل

در هر میلی‌لیتر به وسیله لام هماستیومتر محاسبه شد و به میزان یک میلی‌لیتر به هر کدام از فلاسک‌های حاوی محیط کشت استریل، تحت شرایط کاملاً استریل اضافه شد. سپس فلاسک‌ها به مدت ۴۸ ساعت درون شیکر انکوباتور در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و ۱۰۰ دور دقیقه قرار گرفتند. نتایج براساس طرح کرت‌های کاملاً تصادفی با دو تیمار و شش تکرار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال  $P \leq 0/01$  انجام شد.

### ۳- تأثیر محیط‌های مختلف کشت در جمعیت

#### باکتری *P. fluorescens* استرین *UTPF61*

رشد باکتری به طور مستقیم با اندازه‌گیری کدورت نوری (Optical Density) در طول موج ۶۰۰ نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر مدل Ulterospec II صورت گرفت. نتایج در قالب طرح کرت‌های کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش تکرار اجرا و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال  $P \leq 0/01$  انجام شد.

### ۴- تأثیر محیط‌های مختلف کشت بر قدرت بازدارندگی باکتری *P. fluorescens* استرین

#### *S. sclerotiorum* از رشد *UTPF61*

برای بررسی تأثیر محیط‌های مختلف کشت بر قدرت بازدارندگی از رشد بیمارگ *S. sclerotiorum* در

و ریشه)، طول ساقه و طول ریشه بعد از گذشت یکماه از شروع آزمایش اندازه‌گیری شدند.

۶- بررسی تأثیر محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر بر خاصیت آنتاگونیستی باکتری UTPF61 *P. fluorescens* علیه *S. sclerotiorum*

۶-۱- تهیه مایه قارچ بیمارگر *S. sclerotiorum* تهیه مایه تلقیح *S. sclerotiorum* به دو روش انجام شد:

روش اول: از روش سانسفورد و کولی (Sansford and Coley 1992) برای تهیه مایه قارچ استفاده گردید. ابتدا مقداری گندم رقم قدس درون الک زیر آب شسته شد و این گندمها به منظور خیس شدن در داخل بشر به همراه مقداری آب و به مدت دو ساعت نگهداری گردیدند. سپس ۶۰ گرم از این دانه‌های گندم خیس خورده در داخل ارلن ۳۰۰ میلی‌لیتر ریخته شد و ۶۰ میلی‌لیتر آب به آن اضافه گردید و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد استریل گردید. پس از سرد شدن ارلن‌ها، هر کدام با قارچ بیمارگر مایه‌زنی شدند. بدین منظور از کشت سه روزه قارچ *S. sclerotiorum* روی محیط کشت PDA استفاده شد. بعد از آن ارلن‌ها در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت سه هفته نگهداری گردیدند. ارلن‌ها هر سه روز یک بار تکان داده شدند.

روش دوم: در این روش برای تهیه مایه تلقیح از دانه‌های ارزن استفاده شد بدین ترتیب که ابتدا ارزن‌ها درون الک زیر آب شسته، سپس به مدت دو ساعت

تشتک‌های پتری حاوی دو عدد کاغذ صافی استریل مرطوب قرار داده شدند. مجموعه حاضر به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید. سپس تعدادی از بذور جوانه زده در سوسپانسیون باکتری حاصل از محیط کشت حاوی ملاس چندرقند و تعدادی در سوسپانسیون باکتری حاصل از محیط کشت حاوی ملاس نیشکر درون شیکر انکوباتور ۲۶ درجه سانتی‌گراد به مدت ۰/۵ ساعت قرار گرفتند (هر تیمار حاوی  $1 \times 10^8$  سلول در میلی‌لیتر باکتری به همراه کربوکسی متیل سلولز یک درصد بود): بذور شاهد نیز به مدت ۰/۵ ساعت درون آب مقطر استریل به همراه کربوکسی متیل سلولز یک درصد درون شیکر انکوباتور ۲۶ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. سپس بذرهای حاصل از تیمارهای مختلف به طور جداگانه درون گلدان‌های پلاستیکی به قطر ۷/۵ سانتی‌متر و عمق هشت سانتی‌متر کاشته شدند (گلدان‌ها حاوی مخلوط رس، خاک برگ و ماسه اتوکلاو شده به نسبت حجمی ۳:۱:۱ بودند و درون هر گلدان سه عدد بذر کاشته شد) سپس گلدان‌ها در گلخانه با نور روزانه ۱۴ ساعت و دمای  $22 \pm 3$  درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند و یک روز در میان آبیاری شدند.

این آزمایش در قالب طرح کرت‌های کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش تکرار اجرا شد که هر تکرار شامل چهار گیاه بود. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال  $P \leq 0/01$  صورت گرفت. شاخص‌های مورد نظر شامل وزن تر گیاه (ساقه، برگ‌ها و ریشه)، وزن خشک گیاه (ساقه، برگ‌ها

درصد قرار گرفتند و یک روز در میان آبیاری شدند و بعد از مرگ گیاهان شاهد تعداد گیاهان سالم محاسبه و درصد آنها محاسبه شد. همچنین درصد گیاهان سالم نیز یکماه بعد از مرگ کامل گیاهان شاهد محاسبه شد. این آزمایش در قالب طرح کرتھای کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش تکرار انجام شد که هر تکرار شامل چهار گیاه بود. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  $P \leq 0.01$  صورت گرفت.

## نتایج

### ۱- انتخاب جدایه باکتریایی

از میان ۴۷ جدایه باکتری *P. fluorescens* جدایه UTPF61 دارای بیشترین هاله بازدارندگی (۲۱ میلی‌متر) در شرایط آزمایشگاه بود (جدول ۲) و از نظر تأثیر بر پارامترهای رشدی گیاه آفتتابگردان در شرایط گلخانه بیشترین تأثیر را بر افزایش طول ساقه، طول ریشه و وزن خشک گیاه داشت (جدول ۳). هم چنین این جدایه متابولیت‌هایی نظیر پروتئاز و سیانید هیدروژن را نیز تولید می‌کرد.

خیس خوردند. بعد از آن، دو بار و در دو روز متولی به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد استریل شدند و هر کدام با قارچ بیمارگر مایهزنی شدند. بدین منظور از کشت سه روزه قارچ *S. sclerotiorum* روی محیط کشت PDA استفاده شد. بعد از آن تشتک‌های پتروی در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت دو هفته نگهداری شدند.

### ۶-۲- مایهزنی قارچ عامل بیماری

برای مایهزنی از بذر گندم یا ارزن حاوی *S. sclerotiorum* استفاده شد بدین ترتیب که ابتدا گلدان‌ها با مخلوط خاک رس، خاک برگ و ماسه به نسبت حجمی ۱:۱:۳ استریل شده با اتوکلاو پر گردیدند. سپس درون هر گلدان چهار عدد بذر رقم آنر گل جوانه زده کاشته شد (جوانه‌دار کردن بذور قبل از شرح داده شد همچنین این بذور مانند آنچه که در بالا شرح داده شد شامل بذور آغشته به سوسپانسیون باکتری و بذور شاهد بودند). لازم به ذکر است که خاک این گلدان‌ها ۲۴ ساعت قبل از کشت با یک گرم از مایه قارچ آلوه شده بود.

گلدان‌ها در گلخانه با نور روزانه ۱۴ ساعته و در دمای  $22 \pm 3$  درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۴۰

جدول ۲ اثر بازدارندگی جدایه‌های آنتاگونوست برتر در جلوگیری از رشد بیمارگر *S. sclerotiorum*

ردیف	نام جدایه باکتری	اندازه هاله بازدارندگی(میلی‌متر)
۱	UTPF61	۲۱ a*
۲	UTPF93	۲۰/۳ ab
۳	UTPF92	۱۹/۵ abc
۴	UTPF60	۱۷/۶۷ abc
۵	UTPF59	۱۷ bc
۶	UTPF83	۱۶ c
۷	UTPF82	۱۶ c

\* اعداد دارای حروف مشترک در ستون شان دهنده عدم اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد است (آزمون دانکن)

### جدول ۳ بررسی تأثیر برخی از جدایه‌های سودوموناس فلورسنت روی پارامترهای رشدی گیاه آفتابگردان

ردیف	نام جدایه‌های باکتری	وزن خشک (گرم)	وزن تر (گرم)	طول ساقه (میلی متر)	طول ریشه (میلی متر)
۱	UTPF61	.۰۲۸a	۴۰.۳cde	۳۱ab	۲۵a
۲	UTPF24	.۰۲۷cde	۴۰.۴abc	۲۸abcde	۲۱/۶vab
۳	UTPF90	.۰۲۸a	۴۰.۲bcd	۲۸/۶vabcde	۲۱/۷bc
۴	UTPF95	.۰۲۸a	۴۰.۴vfg	۲۸/۳abcde	۲۰-bc
۵	UTPF45	.۰۲۶abc	۴۰.۰cde	۲۹/۴abcd	۱۸cd
۶	UTPF2	.۰۲۱edf	۴۰.۰cde	۳۰/۴abc	۱۸cd
۷	UTPF63	.۰۲۷cde	۴۰.۴abc	۲۸/۷abcde	۱۸cd
۸	UTPF87	.۰۱۷ij	۷۸h	۷۷cddefg	۱۶/۳de
۹	UTPF86	.۰۲۸a	۴۰.۸a	۳۱/۳a	۱۶def
۱۰	UTPF85	.۰۲۷cde	۷۷def	۲۶/۶vcddefg	۱۶def
۱۱	UTPF59	.۰۲۷cde	۷۶/۷defgh	۷۶/۷defgh	۱۵/۶vdef
۱۲	UTPF93	.۰۱۹efghi	۷۶h	۷۷/۷ghi	۱۵/۶vdef
۱۳	UTPF18	.۰۲۷cde	۷۶defgh	۷۶defgh	۱۴/۶vdefg
۱۴	UTPF60	.۰۱۹efghi	۷۸defg	۲۸/۳abcde	۱۴efg
۱۵	UTPF83	.۰۱۹defg	۷۶defgh	۷۶defgh	۱۴efg
۱۶	UTPF94	.۰۲۶ab	۴۰.۷vab	۳۰/۴abc	۱۳/۶vfg
۱۷	UTPF75	.۰۱۸fg hij	۷۷defg	۲۶/۳defgh	۱۷/۶vfg
۱۸	UTPF32	.۰۲۷cde	۷۷defghi	۲۵/۶vdefghi	۱۷/۷vfg
۱۹	UTPF30	.۰۲۴bcd	۴۰.۸a	۳۱/۳a	۱۷/۷vfg
۲۰	UTPF76	.۰۲۰defgh	۷۷def	۷۷/۳bcdef	۱۷/۷vfg
۲۱	UTPF81	.۰۱۸ghij	۷۷fg	۲۸abcde	۱۷/۶vfg
۲۲	UTPF88	.۰۱۸ghij	۷۶vh	۷۶/۶vhi	۱۷/۳vfg
۲۳	UTPF92	.۰۱۸hij	۷۷h	۲۵/۳efghi	۱۱g
۲۴	UTPF65	.۰۱۸hij	۷۷h	۲۳/۶vfg	۱۱g
۲۵	UTPF54	.۰۲۷gh	۷۷h	۲۵/۶vdefghi	۱۱g
۲۶	control	.۰۱۵j	۷۷h	۲۲i	۱۱g

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد است (آزمون دانکن)

مشاهده شد. از طرفی در بررسی اثر محیط کشت روی قدرت بازدارندگی باکتری در شرایط آزمایشگاه مشخص شد که محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر در کشت دو نقطه به ترتیب با هاله بازدارندگی ۱۵/۳۳ و ۱۴/۶۷ میلی‌متر از نظر تأثیر بر جلوگیری از رشد میسیلیومی قارچ اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند اما هر دو این محیط‌ها با شاهد (باکتری رشد یافته در محیط NB با هاله بازدارندگی ۱۰ میلی‌متر) اختلاف معنی‌داری نشان دادند.

- بررسی تأثیر محیط‌های مختلف کشت در میزان جمعیت و قدرت بازدارندگی باکتری *P. S. fluorescens* استرین *sclerotiorum*

مطابق جدول ۴ بین محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر از نظر تأثیر روی جمعیت باکتری تفاوت زیادی وجود نداشت اما بین این دو محیط کشت و محیط کشت (Nutrient broth NB) مطابق بود که در اینجا به عنوان شاهد است اختلاف معنی‌داری

**جدول ۴ تأثیر محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر روی جمعیت و قدرت بازدارندگی باکتری *S. sclerotiorum* از رشد *P. fluorescens***

ردیف	محیط کشت	جذب نوری (OD600)	حاله بازدارندگی (میلی‌متر)
۱	M1+ sugar beet molasses	.۰/۲۵ <sup>**</sup> a	۱۵/۳۳a*
۲	M1+ sugar cane molasses	.۰/۲۲ab	۱۴/۴۷a
۳	(شاهد) NB	.۰/۳b	۱·b

\* اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون نشان‌دهنده عدم اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد است (آزمون دانکن)

\*\* میزان جذب در طول موج ۶۰۰ نانومتر اندازه‌گیری شده است

دو محیط از نظر تأثیر بر طول ساقه، طول ریشه، وزن خشک و وزن تر گیاه تفاوت معنی‌داری با شاهد نشان دادند اما در مقایسه با یکدیگر تفاوت معنی‌داری از نظر وزن تر و طول ساقه نداشته ولی از نظر تفاوت وزن خشک طول ریشه تفاوت معنی‌داری نشان دادند. به‌طوری که بیشترین تأثیر بر پارامتر مذکور مربوط به باکتری رشد یافته در محیط کشت حاوی ملاس چندرقند بود (جدول ۵).

### ۳- بررسی تأثیر محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر بر پارامترهای رشدی گیاه آفتابگردان

بررسی اثر باکتری حاصل از محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر روی پارامترهای رشدی گیاه (طول ریشه، طول ساقه، وزن تر و وزن خشک گیاه) پس از یک ماه نشان داد باکتری *P. fluorescens* UTPF61 رشد یافته در این

**جدول ۵ تأثیر باکتری حاصل از محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر بر صفات رشدی گیاه آفتابگردان پس از گذشت یک ماه**

ردیف	محیط کشت	وزن خشک (گرم)	وزن تر (گرم)	طول ساقه (سانتی‌متر)	طول ریشه (سانتی‌متر)
۱	M1+ sugar beet molasses	.۰/۲۳a	۷/۹۲a	۱۹/۵۵a*	۱۳/۳a
۲	M1+ sugar cane molasses	.۰/۱۹b	۲/۸a	۱۹/۳۳a	۱۳ab
۳	(شاهد) Control	.۰/۱۲c	۷/۹۸b	۱۲/۵۷b	۱۰/۹b

\* اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون نشان‌دهنده عدم اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد است (آزمون دانکن)

بررسی تأثیر جایه *UTPF61* حاصل از محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر در خاک آلوده به قارچ *S. sclerotiorum* نشان داد که در هر دو تیمار بعد از مرگ کامل گیاهان در شاهد، صد در صد گیاهان سالم باقی ماندند اما بعد از یک ماه که از

### ۴- بررسی تأثیر محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقند و نیشکر بر خاصیت آنتاگونیستی باکتری *P. fluorescens* UTPF61 علیه *S. sclerotiorum* در شرایط گلخانه

در UTPF61 استرین *Pseudomonas fluorescens* شرایط آزمایشگاه وجود ندارد اما از نظر تأثیر بر جمعیت باکتری در شرایط آزمایشگاه و از نظر تأثیر بر پارامترهای رشدی گیاه آفتابگردان در شرایط گلخانه بین این دو محیط کشت تفاوت جزئی وجود دارد به طوری که عملکرد باکتری در محیط کشت حاوی ملاس چندرقد اندکی بهبود یافته بود. در این تحقیق مشاهده شد که بین دو محیط کشت حاوی ملاس چندرقد و نیشکر در اکثر موارد شباهت‌هایی وجود دارد که این می‌تواند به دلیل وجود مواد مشابه زیادی در این دو محیط باشد، اما به طور کلی عملکرد باکتری در محیط کشت حاوی ملاس چندرقد مقدار جزئی بهبود یافت که این می‌تواند به دلیل وجود درصد بالاتری از ساکاروز، روی و ویتامینی مانند بیوتین در ملاس چندرقد نسبت به ملاس نیشکر باشد.

مطابق نتایج سایر تحقیقات مشخص شد که وجود ملاس در محیط کشت بر خاصیت آنتاگونیستی سودوموناس مؤثر است (Pyghami Ashenaee 2007). از طرفی میزان بالای ساکاروز موجود در ملاس چندر استفاده شده می‌تواند تا حدود زیادی تکثیر سلول‌های باکتریایی را در یک زمان مشخص به حداقل ممکن برساند. امروزه در جهان از ملاس جهت تکثیر بسیاری از میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود تکثیر بسیاری از میکروارگانیسم‌ها استفاده از Costa et al. 2001) هیدروکربن‌های خالص مثل گلوکز، فروکتوز، ساکارز، لاکتوز و قندهای دیگر در میکروبیولوژی صنعتی برای تولید انبوه عوامل آنتاگونیست باعث بالا رفتن هزینه تمام شده برای تولید محصول می‌شود از این‌رو در

مرگ گیاهان شاهد گذشت هیچ کدام از تیمارها به طور کامل از مرگ گیاه جلوگیری نکردنده بطوری که درصد گیاهان سالم در دو تیمار باکتری محصول محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقد و نیشکر به ترتیب ۸۰ و ۷۸ درصد بود و از نظر آماری تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نشان ندادند (شکل ۱).

## بحث

کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ریشه و طوفه آفتابگردان به دلیل خاکزی بودن عامل بیماری با روش‌های شیمیایی کار آسانی نمی‌باشد، هم‌چنین استفاده از ارقام مقاوم در کنترل بیماری کارایی نداشته و لازم است از روش‌های دیگر مانند کنترل بیولوژیکی (Cook 2000; Musial et al. 2004) بررسی‌ها نشان می‌دهد که سودوموناس‌های فلورست در اغلب خاک‌های زراعی وجود دارند و مسئول کاهش برخی از بیماری‌های ناشی از عوامل بیماری‌زای خاکزی بیماری می‌باشند (Weller 1983). تجاری کردن فراورده‌های تخمیری، مستلزم اقتصادی کردن فرایندها و کاهش هزینه‌ها است، کاهش قیمت تمام شده محصول نیز با استفاده از محیط کشت ارزان‌تر امکان‌پذیر است. ملاس محصول فرعی تولید قند از چندر و یا نیشکر است و ارزان‌ترین و متدائل‌ترین منبع ساکارز می‌باشد نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین محیط‌های کشت حاوی ملاس چندرقد و نیشکر از نظر تأثیر روی خاصیت بیوکنترلی باکتری

بنابراین وظیفه ماست تا با تحقیق و پژوهش بیشتر در مورد مکمل‌های غذایی و بهبود مراحل فرماناتاسیون، به تکنولوژی تولید انبوهی دست یابیم که از نظر حفظ قدرت حیات و افزایش کارایی عوامل آنتاگونیست بسیار مؤثر بوده و رضایت‌بخش باشد تا در نهایت عامل آنتاگونیست به صورت انبوه و تجاری تولید شده و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

### سپاسگزاری

این طرح از محل اعتبارات پژوهشی پردازی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به شماره گرفت ۱۴/۰۲۴-۷۱۱۰۰۲۴ و با حمایت قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌های گیاهی گروه گیاه‌پزشکی صورت گرفته است که صمیمانه تشکر می‌گردد.

بسیاری موارد از ضایعات کشاورزی و صنعتی که از این قندها غنی‌اند (مثل ملاس) استفاده می‌گردد (Vazquez et al. 1997).

از آن جا که محیط کشت روی بسیاری از توانایی‌های باکتری به خصوص روحی بقا و دوام آن مؤثر می‌باشد در این پژوهش سعی شد که ارزش ملاس چندرقند و نیشکر و تأثیر آن‌ها بر عملکرد باکتری مشخص شود و در نهایت محیط کشتی معرفی شود که در مقیاس تجاری و صنعتی قابل توجیه باشد و در عین حال حداکثر عملکرد را در شرایط آزمایشگاه در پی داشته باشد، اما از آن جا که نتایج این پژوهش در شرایط مزرعه بررسی نشد این موضوع می‌تواند یکی از اهداف اصلی در تحقیقات آینده باشد. در ضمن جزئیات محیط‌های کشت تجاری موجود در برخی کشورهای توسعه یافته در دسترس نیست و حالت محروم‌انه دارد.

### References:

### منابع مورد استفاده:

- Alstrom S, Burns RG. Cyanide production by rhizobacteria as a possible mechanism of plant growth inhibition. Biol. Fertil. Soils. 1989; 7: 232-238.
- Cook RJ. Advances in plant health management in the twentieth century. Annu. Rev. Phytopathol. 2000; 38: 95-116.
- Costa E, Teixido N, Usall J, Atares E, Vinas I. Production of the biocontrol agent *Pantoea agglomerans* strain CPA-2 using commercial products and by-products. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2001; 56: 367-371.
- Duffy BK, Defago G. Environmental factors modulating antibiotic and sidrophore biosynthesis by *Pseudomonas fluorescens* biocontrol strains. Appl. Environ. Microbiol. 1999; 65: 2429-2438.

Expert JM, Digat B. Biocontrol of Sclerotinia wilt of sunflower by *Pseudomonas putida* strains.

Can. J. Microbiol. 1995; 41: 685-691.

Farzaneh M. Study on the effect of some antagonistic bacteria on Phytophthora cactorum the agent of apple crown and root rot disease. MSc thesis. University of Tehran, Iran. 2007. 88pp. (in Persian, abstract in English)

Fuchs JG, Moenne-Loccoz Y, Defago G. The laboratory medium used to grow biocontrol *Pseudomonas* sp. Pf153 influences its subsequent ability to protect cucumber from black root rot. Soil Biol. Biochem. 2000; 32: 421-424.

Hagedorn C, Gould WD, Bradinelli RT. Rhizobacteria of cotton and their repression of seedling disease pathogens. Appl. Environ. Microbiol. 1989; 55: 2793-2797.

Heidary Tajabadi F. Study on the effect of some carbon and nitrogen sources on production process of fluorescent pseudomonads for controlling of sunflower sclerotinia rot disease. MSc thesis. University of Tehran. 2008. Iran. 63pp. (in Persian, abstract in English)

Khodaeean F. Study on synthetic growth and production of Canthaxanthin by Dietzia natronalimnaea in batch systems. Ph.D thesis. University of Tehran. Iran. 2007. (in Persian, abstract in English)

Maurhofer M, Keel C, Haas D, Defago G. Influence of plant species on disease suppression by *Pseudomonas fluorescens* strain CHA0 with enhanced production. Plant Pathol. 1995; 44: 40-50.

McLoughlin TS, Quinn JP, Betterman A, Bookland R. *Pseudomonas cepacia* suppression of sunflower wilt fungus and role of antifungal compounds in controlling the disease. Appl. Environ. Microbiol. 1992; 58: 1760-1763.

McNeil B, Harvey LM. Practical fermentation technology. John Wiley Press. 2008; pp. 488.

Musial I, Rymowicz W, Cibis E. Optimization of single-cell-biomass production by *Yarrowia lipolytica* using response surface methodology and pulse method. Electronic J. Polish Agricultural Universities. 2004; vol. 7.

Pyghami Ashenaee S. Influence of culture media on growth and antagonistic efficacy of some strain of *Pseudomonas fluorescens* and *Bacillus subtilis*. MSc thesis. University of Tehran, Iran. 2007. 71pp. (in Persian, abstract in English)

Sanford CE, Coley JR. Production and germination of sclerotia of *Sclerotinia sclerotiorum*. Plant Pathol. 1992; 41: 154-156.

Shojaalsadati A. Industrial biotechnology. University of Tarbiat Moddares. 2003. 43-45pp.

Vazquez M, Santos V, Parajo JC. Effect of the carbon source on the carotenoid profiles of *Phaffia rhodozyma* strains. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 1997; 19: 263-268.

Weller DM. Colonization of wheat roots by a fluorescent pseudomonad suppressive to take all. Phytopathology. 1983; 73: 1548-1553.