

تنظیم اسمزی چغندر قند در شرایط تنش شوری

Osmotic adjustment in sugar beet plant under salinity stress

فادی عباس^۱، احمد مهنا^۲، قاسم اللخام^۳ و انتصار الجبایوی^{۴*}

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۲/۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۷

ف. عباس، ا. مهنا، ق. اللخام و ا. الجبایوی. ۱۳۹۱. تنظیم اسمزی چغندر قند در شرایط تنش شوری. مجله چغندر قند ۲۸(۱): ۸۰-۶۷

چکیده

تحقیق حاضر در مرکز تحقیقات کشاورزی دیرالزور وابسته به کمیسیون عالی تحقیقات علمی کشاورزی (GCSAR) سوریه در فصول زراعی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ انجام گرفت و طی آن، نقش Na^+ ، K^+ ، Na^+/K^+ ، تجمع کربوهیدرات‌ها در برگ‌ها و عیار قند در تنظیم اسمزی در شرایط تنش شوری در ۱۰ ژنوتیپ چغندر قند (پنج ژنوتیپ منوژرم و پنج ژنوتیپ مولتی ژرم) بررسی شد. بوته‌های چغندر قند با آب شور که هدایت الکتریکی آن در سال اول $8/6-10$ دسی‌زیمنس بر متر و در سال دوم $8/4-10/4$ دسی‌زیمنس بر متر بود، آبیاری شدند. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث افزایش مقدار Na^+ در برگ‌ها و ریشه‌های تمام ژنوتیپ‌ها شد، اما مقدار افزایش آن در برگ‌ها بیش از ریشه‌ها بود. مقدار K^+ در برگ‌ها و ریشه‌های تمام ژنوتیپ‌ها کاهش یافت اما میزان این کاهش در ریشه‌ها کمتر از برگ‌ها بود که احتمالاً به خاطر جایگزینی Na^+ با K^+ در این شرایط بود. باین حال، در شرایط تنش شوری غلظت مواد محلول غیرآلی (Na^+ و K^+) در برگ‌ها بیشتر از ریشه‌ها بود. ژنوتیپ کاویمرا (مولتی ژرم) به خاطر مقدار بالای Na^+ در برگ‌ها و ریشه‌هایش به عنوان متحمل‌ترین ژنوتیپ شناسایی شد در حالی که حساس‌ترین ژنوتیپ تیگریس (مولتی ژرم) بود که کمترین تجمع Na^+ در برگ‌ها و ریشه‌ها را داشت. به طور کلی، تجمع قندهای محلول در برگ‌ها در ژنوتیپ‌های متحمل نسبت به ژنوتیپ‌های غیرمتحمل بیشتر بود. نتایج نشان داد بین عیار قند ریشه‌ها و تنش شوری همبستگی وجود ندارد. آنالیز همبستگی نشان داد که مقدار Na^+ و سپس قندهای محلول مهم‌ترین مواد برای تنظیم پتانسیل اسمزی برگ‌های چغندر قند در شرایط تنش شوری بودند. علاوه بر این، می‌توان مقدار ساکارز و مقدار Na^+ ریشه‌های چغندر قند را اصلی‌ترین مواد محلول برای تنظیم پتانسیل اسمزی دانست.

واژه‌های کلیدی: تنظیم اسمزی، تنش شوری، چغندر قند، ژنوتیپ، سوریه

۱- GCSAR، مرکز تحقیقات علمی کشاورزی حمص، سوریه، fadiab77@gmail.com

۲- GCSAR، واحد تحقیقات ذرت، دمشق، سوریه

۳- استاد گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه البعث، حمص، سوریه

dr.entessara@yahoo.com

۴- GCSAR، واحد تحقیقات چغندر قند، دوما، دمشق، سوریه * - نویسنده مسئول

مقدمه

شوری آب و خاک چالشی جهانی برای محیط زیست است که تولید گیاهان زراعی را در بیش از ۸۰۰ میلیون هکتار یا به عبارت دیگر، ۲۵ تا ۳۳ درصد سطح کل اراضی زراعی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Rengasamy 2010). کمبود جهانی منابع آب، آلودگی محیط زیست و افزایش شوری اراضی و منابع آب ویژگی‌های برجسته قرن بیست و یکم هستند (Djiljanov et al. 2005). این مشکل در مناطق زراعت فاریاب بسیار شدیدتر است (Zhu 2001) و این در حالی است که این مناطق یک سوم غذای جهان را تولید می‌کنند (Zhang et al. 2010) و تصفیه آب بسیار شور دریا (Flowers 2004) در آن‌ها پدیده‌ای رایج است. با این حال، در بسیاری از مناطق دنیا، شوری در زراعت دیم نیز رو به افزایش است (Rengasamy 2006). توسعه گیاهان با تحمل بیشتر به شوری به عنوان بخشی از راه‌حل این مشکل پیشنهاد شده است (Zhu 2001).

گیاهان برای مقابله با شوری، واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند. اشرف (Asheaf 2004) و سایرین (Sairam and Tyagi 2004) به بررسی جزئیات مکانیسم‌های تحمل به شوری در گونه‌های مختلف پرداخته‌اند.

بدون شک، تنظیم اسمزی در مواجهه با تنش شوری به عنوان یکی از مکانیسم‌های مهم و مؤثر تحمل به شوری در گیاهان زراعی شناخته شده است. تحقیقات حاکی از اثرات تنظیم اسمزی پرولین،

گلیسین، بتائین و یون‌ها بر توازن آب و تحمل شوری در پنبه (Rathert 1983)، اسفناج (Di Martino et al. 2003)، گندم (Abdel-Aziz and Reda 2000)، لوبیا (Shabala et al. 2000)، لوبیای چشم‌بلبلی (Freitas et al. 2001)، چغندرقد (Katerji et al. 1997؛ al. 2002)، گل مینای (Heuer et al. 1981; Ghoulam et al. 2003) و سورگوم (Ueda et al. 2003) و سورگوم (AL-Lahham et al. 2006) هستند.

چغندرقد (*Beta vulgaris* L.) از تیره *Chenopodiaceae* دارای نیاکان شوری‌پسند است. آستانه تحمل این گیاه به شوری، بالاست (۷ دسی‌زیمنس بر متر) (Katerji et al. 1997). این گیاه در طول جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچه نسبت به شوری حساس ولی در مراحل بعد نسبت به آن متحمل است، هرچند ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقد از این نظر با هم تفاوت‌هایی دارند (Sadeghian et al. 2000; Ghoulam et al.; 2002; Abbas et al. 2009).

اعضای تیره *Chenopodiaceae* از جمله چغندرقد به دلیل دارا بودن مکانیسم‌های تنظیم اسمزی ناشی از تجمع Na^+ و Cl^- در واکوئل‌ها و سیتوپلاسم‌شان می‌توانند با شوری مقابله کنند (Subbarao et al. 2001; Ghoulam et al.; 2002). ژنوتیپ‌های چغندرقد Na^+ را جذب کرده و آن را جهت تنظیم و سازگاری پتانسیل اسمزی‌شان با خاک، در بافت برگ‌هایشان ذخیره می‌کنند

ماه اوت تا اواسط آن کشت شدند. آزمایش‌ها در کمیسیون عالی تحقیقات علمی کشاورزی (CGSAR) در مرکز تحقیقات کشاورزی دیرالزور واقع در شرق سوریه انجام گرفت. این منطقه به عنوان یک منطقه خشک شناخته می‌شود و لذا شیوه رایج تولید چغندرقد در آنجا آبیاری است. این مطالعه در فصول زراعی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ جهت ارزیابی واکنش ده ژنوتیپ چغندرقد (پنج ژنوتیپ منوژرم و پنج ژنوتیپ مولتی ژرم) (جدول ۱) در شرایط تنش شوری و شرایط عادی (شاهد) اجرا شد. ژنوتیپ‌های مورد آزمایش از شرکت‌های مختلف اصلاح کننده بذر تأمین شده بودند. مزرعه با ۴۴۶ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، ۱۸۰ کیلوگرم فسفر به صورت P_2O_5 در هکتار و ۱۸۵ کیلوگرم پتاسیم به صورت K_2O در هکتار در زمان کاشت و بعد از تنک کوددهی شد. آنالیز فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی انجام شد که نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است. تمام عملیات زراعی دیگر به صورت مرسوم در منطقه انجام گرفت. عملیات برداشت ۲۱۰ روز بعد از کاشت با ± 2 روز اختلاف بین فصل‌ها انجام گرفت.

(Flowers 1988). شاید همین پدیده دلیل تحمل چغندرقد به شوری باشد.

چلوم و همکاران (Ghoulam et al. 2008) مکانیسم تنظیم اسمزی در چغندرقد در شرایط کمبود آب را به این صورت تشریح کردند که غلظت کاتیون‌های تک‌ظرفیتی (K^+ , Na^+) در دمبرگ‌ها و سطح یون‌های دوظرفیتی (Ca^{2+} , Mg^{2+}) در برگ‌های بالغ و مسن کاهش می‌یابد. غلظت کاتیون‌ها در ریشه اصلی تحت تأثیر کمبود آب قرار نمی‌گیرد. در اثر خشکی، نسبت کاتیون‌های تک‌ظرفیتی به کاتیون‌های دوظرفیتی در برگ‌های جوان و دمبرگ‌ها به شکل معنی‌داری افزایش می‌یابد.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تنش شوری بر تجمع Na^+ , K^+ , Na^+/K^+ و کربوهیدرات‌ها در برگ‌ها و عیار قند ۱۰ ژنوتیپ چغندرقد و تعیین نقش این اسمولیت‌ها بر تنظیم اسمزی بود.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق، دو آزمایش مزرعه‌ای از ابتدای

جدول ۱ کشور تولیدکننده خاستگاه، ژرمیته و میزان تحمل به شوری ژنوتیپ‌های چغندرقد مورد مطالعه

ردیف	نام ژنوتیپ	خاستگاه	ژرمیته	سطح پلوئیدی	تیپ	تحمل به شوری
۱	دیتا	بلژیک	منوژرم	دیپلوئید	N	متحمل
۲	بریگیتا	آلمان	منوژرم	دیپلوئید	NZ	متحمل
۳	پروگرس	امریکا	منوژرم	دیپلوئید	N	نیمه‌متحمل
۴	ریفل	بلژیک	منوژرم	دیپلوئید	N	حساس
۵	کانسپت	امریکا	منوژرم	دیپلوئید	NE	حساس
۶	تیگریس	دانمارک	مولتی ژرم	پلی‌پلوئید	N	حساس
۷	مونتبه‌الدو	آلمان	مولتی ژرم	تری‌پلوئید	N	متحمل
۸	پرستیل	بلژیک	مولتی ژرم	پلی‌پلوئید	NE	نیمه‌متحمل
۹	واند	آلمان	مولتی ژرم	دی‌پلوئید	N	متحمل
۱۰	کاویمرا	آلمان	مولتی ژرم	تری‌پلوئید	N	متحمل

جدول ۲ برخی خصوصیات خاک محل آزمایش

سال نمونه برداری	توزیع اندازه ذرات			نتایج تجزیه عصاره خاک		
	شن (درصد)	سیلت (درصد)	رس (درصد)	کربنات کلسیم (درصد)	هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر سانتی متر)	اسیدیته
۲۰۰۸	۳۳/۳	۳۶/۴	۳۰/۳	۱۹/۴	۱/۸	۸/۱
۲۰۰۹	۲۹/۳	۴۰/۷	۲۹/۶	۲۰/۷	۱/۹	۸/۲

قرار داده شد تا تبدیل به خاکستر شود. سپس این خاکستر در فلاسک حجمی ۵۰ میلی لیتری قرار داده شد و سپس ۵ میلی لیتر اسید هیدروکلریک دو نرمال به آن افزوده شد و با آب مقطر در حال جوش مخلوط شد و از کاغذ صافی واتمن شماره ۲ عبور داده شد. مقدار K^+ و Na^+ توسط نورسنج شعله‌ای اندازه‌گیری شده و بر حسب میلی گرم بر هر گرم وزن خشک ثبت شد.

قندهای محلول (کربوهیدرات‌ها) در مخلوط قبلی با استفاده از نورسنج طیفی در ۶۲۰ نانومتر تعیین شد (Spiro 1966).

عیار قند ریشه‌ها توسط عیار سنج و با اضافه کردن استات سرب به خمیر تازه ریشه مطابق دستورالعمل لادوکنه (Le Docte 1927) تعیین شد.

تجزیه آماری داده‌ها

داده‌ها با استفاده از برنامه GenStat جهت برآورد معنی‌داری تفاوت‌های میان ژنوتیپ‌های مورد آزمون از نظر صفات مورد مطالعه (Na^+ , K^+ , Na^+/K^+)، تجمع کربوهیدرات‌ها در برگ‌ها و عیار قند ریشه‌ها) تجزیه شد. میانگین تیمارها توسط آزمون LSD در سطوح پنج و یک درصد مطابق والر و دانکن (Waller and

در این آزمایش، گیاهان با آب شور آبیاری شدند که هدایت الکتریکی آن در سال اول ۸/۶ تا ۱۰ و در سال دوم ۸/۴ تا ۱۰/۴ دسی زیمنس بر متر بود. لازم به ذکر است که سه آبیاری اول برای سبز شدن بوته‌ها با آب بدون محدودیت شوری بود و پس از آن از آب شور در طول فصل زراعی استفاده شد. این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. اندازه هر کرت ۲۴ متر مربع بود که شامل شش ردیف کاشت به طول ۸ متر با فاصله بین ردیف ۵۰ سانتی متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف ۲۰ سانتی متر بودند.

در زمان برداشت، نمونه‌های تازه‌ای از ریشه و برگ از هر کرت برداشت شد تا مقدار Na^+ و K^+ ریشه‌ها و برگ‌ها، مقدار کربوهیدرات برگ‌ها و عیار قند ریشه‌ها تعیین شود.

مقدار Na^+ و K^+ مطابق AOAC (۲۰۰۰) تعیین شد و برای این کار از برگ‌هایی استفاده شد که در آون در دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت خشک شده و با استفاده از یک هاون پودر شده بودند. نمونه خشک برگ‌ها به وزن ۰/۵ گرم در بوته چینی در کوره الکتریکی با دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد

Duncan 1969) مقایسه شدند. ضرایب همبستگی ساده میان صفات اندازه‌گیری شده نیز برآورد شد.

افزایش مقدار Na^+ در برگ‌ها بین ۵۹۹/۰۵ درصد در تیگرریس تا ۹۶۸/۵۳ درصد در دیتا متغیر بود (جدول ۳).

نتایج و بحث

مقدار Na^+

در شرایط تنش شوری، مقدار Na^+ در برگ‌های تمام ژنوتیپ‌ها در مقایسه با شاهد بیش از هفت برابر (۷۷۸/۷۵ درصد) افزایش یافت. در واقع، ژنوتیپ‌ها از این نظر تفاوت معنی‌داری ($p < 0.01$) با هم داشتند و

مقدار Na^+ در ریشه‌ها نیز در تمام ژنوتیپ‌ها به طور کلی به مقدار ۴۳۲/۳۸ درصد افزایش یافت. مقدار افزایش این یون در ریشه‌ها بین ۲۱۶/۸۱ درصد در تیگرریس تا ۴۸۴/۸۷ درصد در کایمررا متغیر بود (جدول ۳).

جدول ۳ گروه‌بندی میانگین مقدار Na^+ در برگ‌ها و ریشه‌های ۱۰ ژنوتیپ چغندرقد تحت شرایط تنش شوری

مقدار Na^+ (میلی‌گرم بر گرم)		شرایط تنش		ژنوتیپ*
درصد افزایش یا کاهش نسبت به شاهد		ریشه	برگ‌ها	
ریشه	برگ‌ها	ریشه	برگ‌ها	دیتا
۴۲۶/۱۸	۹۶۸/۵۳	۳/۴۷b	۵۲/۱۷ bc	بریگیتا
۵۵۲/۸۷	۷۶۸/۴۶	۳/۴۳b	۴۷/۷۲de	پروگرس
۵۲۴/۲۶	۹۵۸/۰۶	۳/۲۶b	۴۶/۰۷e	ریفل
۴۷۰/۹۷	۷۳۷/۹۶	۲/۷۴c	۳۸/۰۲f	کانسپت
۳۵۶/۷۷	۶۵۵/۳۹	۲/۶۴c	۳۸/۷۲f	تیگرریس
۲۱۶/۸۱	۵۹۹/۰۵	۱/۹۶d	۳۸/۰۷f	مونه‌بالدو
۴۶۷/۱۷	۸۵۴/۳۷	۳/۲۹b	۴۸/۵۲de	پرستیل
۳۸۶/۱۲	۶۳۶/۵۸	۳/۲۵b	۴۶/۴۰de	واند
۴۳۷/۸۰	۶۸۴/۰۶	۳/۵۵b	۴۹/۴۷cd	کایمررا
۴۸۴/۸۷	۹۲۵/۰۳	۴/۳۱a	۵۵/۴۲a	میانگین
۴۳۲/۳۸	۷۷۸/۷۵	۳/۱۹	۴۵/۹۵	

* اعداد دارای حروف یکسان در هر ستون فاقد تفاوت معنی‌دار هستند ($p < 5\%$).

در میان اعضای تیره *Chenopodiaceae* (گیاهان شوری‌پسند) می‌باشد و طی آن گیاه با تجمع Na^+ ، پتانسیل اسمزی بافت‌هایش را تنظیم می‌کند (Eisa and Ali 2001).

تغییرات جذب Na^+ می‌تواند به دلیل نوعی سازگاری چندگانه به یون‌های سمی که به صورت همزمان در درون گیاه عمل می‌کنند، بوده باشد (Tester and Davenport 2003) که واکنش معمول

به طوری که این کاهش بین ۱۴/۸۰ درصد در ریفل تا ۴۳/۳۶ درصد در واند متغیر بود و تفاوت ژنوتیپ‌ها از این نظر بسیار معنی‌دار ($p < 0.01$) بود (جدول ۴). در ریشه‌ها نیز روند مشابهی مشاهده شد اما با سرعت کمتر، مگر در دیتا که در آن مقدار K^+ تحت تنش شوری به مقدار ۷/۱۹ درصد افزایش یافت. این نتایج مشابه نتایج مطالعات وارن و همکاران (Warne et al. 1990) و عبدالمتقالی (Abd-El-Motagally 2004) است. این امر شاید به خاطر نقش Na^+ در تنظیم پتانسیل اسمزی برگ‌های چغندر قند (Lindhauer et al. 1990) و جایگزینی K^+ به جای Na^+ باشد. باین حال، غلظت مواد محلول غیرآلی (Na) و (K) در برگ‌ها بیشتر از ریشه‌ها بود.

این واکنش‌ها در نقطهٔ مقابل واکنش‌های جو (به عنوان یک گیاه گلیکوفیت) قرار دارد. در این گیاه، Na^+ دفع می‌شود و ژنوتیپ‌های متحمل به شوری آن Na^+ کمتری در اندام‌های هوایی جمع می‌کنند (Pakniyat et al. 2003). به نظر می‌رسد که در چغندر قند، بیان همزمان ناقل پروتئین‌دار غشای تونوپلاست (پورت H^+ -ATPase و H^+ و آنتی-پورت Na^+/H^+) در واکوئل‌های سلول‌های برگ ژنوتیپ‌های متحمل نسبت به ژنوتیپ‌های غیرمتحمل بیشتر است (Parks et al. 2002).

مقدار K^+

مقدار K^+ در برگ‌های تمام ژنوتیپ‌ها به طور متوسط به میزان ۳۱/۰۹ درصد کاهش یافت

جدول ۴ گروه‌بندی مقدار K^+ در برگ‌ها و ریشه‌های ۱۰ ژنوتیپ چغندر قند تحت شرایط تنش شوری

مقدار K^+ (میلی‌گرم بر گرم)		شرایط تنش		ژنوتیپ ^o
درصد افزایش یا کاهش نسبت به شاهد	برگ‌ها	ریشه	برگ‌ها	
ریشه	۷/۱۹	۱۰/۸۷a	۳۷/۰۲cde	دیتا
برگ‌ها	-۴۰/۹۴	۹/۷۹ab	۳۰/۸۰g	بریگینا
ریشه	-۳۲/۲۴	۹/۰۱bc	۳۴/۸۸ef	پروگرس
برگ‌ها	-۲۵/۵۷	۱۰/۳۷a	۴۵/۷۳a	ریفل
ریشه	-۴/۳۸	۸/۹۳bc	۳۶/۱۳def	کانسپت
برگ‌ها	-۸/۸۷	۸/۵۲c	۳۸/۷۷bcd	تیگریس
ریشه	-۱/۹۱	۸/۵۵c	۳۳/۳۰fg	مونت‌بالدو
برگ‌ها	-۲۴/۲۰	۹/۸۸ab	۴۱/۱۳b	پرستیل
ریشه	-۶/۴۷	۹/۶۵abc	۳۵/۲۲def	واند
برگ‌ها	-۱۱/۸۰	۹/۶۲abc	۴۰/۳۵bc	کاویمرا
ریشه	-۲/۷۰	۹/۵۲	۳۷/۳۳	میانگین
برگ‌ها	-۰/۸۸			
میانگین	-۳/۴۱			

* اعداد دارای حروف یکسان در هر ستون فاقد تفاوت معنی‌دار هستند ($p < 5\%$).

نسبت Na^+/K^+

متحمل به شوری دانست (Abbas et al. 2010). در ریشه‌ها نیز روند مشابهی مشاهده شد ولی با آهنگ آهسته‌تر. این نسبت بین ۰/۲۵۷ در مورد تیگریس تا ۰/۴۶۸ در کاویما متغیر بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نسبت Na^+/K^+ غشای سیتوپلاسمی در ژنوتیپ‌های متحمل نسبت به ژنوتیپ‌های غیرمتحمل بالاتر بود. گزارش پاک‌نیت و آرمیون (Pakniyat and Armion 2010) نیز نتیجه این مقاله را تأیید می‌کند.

نتایج حاکی از تفاوت معنی‌دار ($p < 0.01$) بین ژنوتیپ‌های چغندر قند از نظر نسبت Na^+/K^+ بود (جدول ۵). این نسبت در ژنوتیپ‌های ریفل و تیگریس به ترتیب با مقدار ۰/۸۳۳ و ۰/۹۶۶ کمتر بود، در حالی که در مورد ژنوتیپ‌های بریجیتا، مونته‌بالدو، دیتا، کاویما و واند نسبت‌های بالاتری ثبت شد (به ترتیب ۱/۵۵۵، ۱/۴۶۴، ۱/۴۱۸، ۱/۴۱۵ و ۱/۳۸۲). گروه اول را می‌توان حساس به شوری و گروه دوم را

جدول ۵ گروه‌بندی میانگین نسبت Na^+/K^+ در برگ‌ها و ریشه‌های ۱۰ ژنوتیپ چغندر قند تحت شرایط تنش شوری

مقدار Na^+/K^+ (میلی‌گرم بر گرم)		شرایط تنش		ژنوتیپ*
درصد افزایش یا کاهش نسبت به شاهد		برگ‌ها	ریشه	
۴۳۷/۷۲	۱۷۲۲/۹۲	۰/۳۵۵bcd	۱/۴۱۸ab	دیتا
۵۹۵/۴۷	۱۱۸۳/۷۸	۰/۳۶۷bc	۱/۵۵۵a	بریجیتا
۶۱۱/۸۷	۱۳۳۳/۸۰	۰/۴۱۰a	۱/۳۳۹b	پروگرس
۵۲۵/۱۵	۸۸۵/۳۳	۰/۲۷۷cd	۰/۸۳۳e	ریفل
۴۵۵/۱۴	۹۶۱/۵۶	۰/۳۲۴bcd	۱/۰۸۱cd	کانسپت
۲۵۷/۹۵	۸۴۷/۴۶	۰/۲۵۷d	۰/۹۶۶de	تیگریس
۵۵۰/۶۰	۱۳۱۸/۱۶	۰/۴۲۳a	۱/۴۶۴a	مونته‌بالدو
۴۶۹/۹۰	۱۰۳۱/۸۹	۰/۳۴۴bcd	۱/۱۳۳c	پرستیل
۵۰۵/۲۰	۱۲۹۷/۴۱	۰/۴۰۰ab	۱/۴۱۵ab	واند
۵۱۰/۹۳	۱۶۵۸/۰۸	۰/۴۶۸a	۱/۳۸۲b	کاویما
۴۸۴/۷۹	۱۲۱۳/۰۲	۰/۳۶۳	۱/۲۵	میانگین

* اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنی‌دار ندارند.

قندهای محلول برگ‌ها

که به‌طور متوسط ۵۲/۱۰ درصد قند محلول در برگ‌های تمام ژنوتیپ‌ها به دست آمد، اما اختلاف آن‌ها معنی‌دار نبود. با وجود این، تجمع قندهای محلول در برگ‌های ژنوتیپ‌های متحمل (دیتا، بریجیتا، مونته‌بالدو و کاویما) نسبت به ژنوتیپ‌های غیرمتحمل (ریفل، کانسپت و تیگریس) بیشتر بود. این نتایج مشابه

ژنوتیپ‌ها از نظر تجمع قندهای محلول در برگ‌ها در تنش شوری اختلافات معنی‌داری ($p < 0.01$) داشتند (جدول ۶). مقدار قندهای محلول برگ‌ها از ۶۰/۸۶ میلی‌گرم در گرم در پرستیل تا ۹۶/۸۳ میلی‌گرم در گرم در دیتا متغیر بود. به رغم این

نقش مهمی در فرایند تنظیم اسمزی در شرایط تنش شوری ایفاء می‌کنند. این نکته را شاید به توان با توجه به افزایش فعالیت‌های آنزیمی بویژه آمیلازها یا با توجه به صرف انرژی بیشتر در سلول‌ها برای مقاومت در مقابل عدم توازن یونی توجیه کرد (Schawrz and Gale 1981).

نتایج شانون (Shannon 1977) می‌باشد. او دریافت که ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش شوری از نظر مقدار قندهای محلول واکنش‌های مختلفی از خود نشان دادند. اللهم و همکاران (Al-Lahham et al. 2006) با بررسی سایر گیاهان زراعی نشان دادند که در سورگوم (*Sorghum bicolor* L.) قندهای محلول

جدول ۶ گروه‌بندی مقدار تجمع قندهای محلول در برگ‌ها و ریشه‌های ۱۰ ژنوتیپ چغندر قند تحت شرایط تنش شوری

درصد افزایش یا کاهش نسبت به شاهد		شرایط تنش		ژنوتیپ*
عیار قند	تجمع قندهای محلول در برگ (میلی‌گرم در گرم)	عیار قند (%)	تجمع قندهای محلول در برگ (میلی‌گرم در گرم)	
۷/۱۲	۶۴/۹۰	a ۱۷/۲۵	a ۹۶/۸۳	دیتا
۹/۹۳	۵۷/۳۰	a ۱۷/۰۹	ab ۹۲/۳۳	بریگیتا
۱۲/۲۹	۶۱/۸۰	a ۱۷/۰۸	cd ۷۹/۹۴	پروگرس
۵/۸۵	۴۵/۸۰	bc ۱۵/۶۴	de ۷۵/۱۱	ریفل
۱۰/۰	۴۰/۲۰	b ۱۶/۰۷	ef ۶۷/۹۴	کانسپت
۶/۵۷	۲۷/۶۰	d ۱۴/۵۶	de ۷۲/۵۶	تیگریس
۷/۶۰	۶۴/۱۰	bc ۱۵/۳۷	abc ۸۸/۷۸	مونته‌بالدو
۹/۶۴	۴۶/۶۰	d ۱۴/۸۲	f ۶۰/۸۶	پرستیل
۴/۷۹	۵۴/۷۰	c ۱۵/۰۷	cde ۷۷/۷۰	واند
۶/۷۷	۵۷/۹۰	c ۱۵/۲۴	bcd ۸۱/۲۱	کاویمر
۸/۰۶	۵۲/۱۰	۱۵/۸۲	۷۹/۳۳	میانگین

* اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنی‌دار ندارند.

عیار قند

متحمل بینابین یعنی پروگرس بالاترین مقدار افزایش قند ریشه (۱۲/۲۹ درصد) را از خود نشان داد و کمترین افزایش (۴/۷۹ و ۶/۵۷ درصد) به ترتیب در ژنوتیپ‌های مولتی‌ژرم حساس واند و تیگریس و ژنوتیپ منوژرم ریفل (۵/۸۵ درصد) مشاهده شد. شاید این امر به خاطر ژرمیته باشد. همچنین معلوم شد که ژنوتیپ‌های منوژرم در مقایسه با ژنوتیپ‌های مولتی‌ژرم، عیار قند بیشتری داشتند.

داده‌های مربوط به عیار قند (جدول ۶) حاکی از وجود تفاوت‌های معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش شوری ($p < 0.01$) بود. متوسط عیار قند بین ۱۴/۴۶ درصد در تیگریس تا ۱۷/۲۵ درصد در دیتا متغیر بود. عیار قند نسبت به شرایط شاهد به طور متوسط ۸/۰۶ درصد افزایش یافت. در شرایط شاهد، ژنوتیپ‌ها از نظر افزایش عیار قند تفاوت معنی‌دار ($p < 0.05$) داشتند. در مقایسه با شاهد، ژنوتیپ منوژرم

همبستگی‌های ساده

مقدار همبستگی بین صفات اندازه‌گیری شده در جدول ۷ نشان داده شده است. نتایج حاکی از همبستگی منفی بین مقدار Na^+ و K^+ در برگ‌ها ($r = -0.24$) و هم چنین بین مقدار Na^+ و K^+ در ریشه‌ها ($r = -0.01$) بود. هم در مورد برگ‌ها و هم در مورد ریشه‌ها، همبستگی مثبت بالایی بین Na^+ و Na^+/K^+ و همبستگی منفی بالایی بین K^+ و Na^+/K^+ مشاهده شد که مشابه نتایج عیسی و علی (Eisa and Ali 2001) است. آن‌ها نیز گزارش کردند که این دو یون در برگ‌های چغندر قند بعد از تنش شوری دارای همبستگی خطی منفی بودند. همچنین دریافتند که افزایش تجمع Na^+ و کاهش مقدار K^+ حاکی از نقش بسیار مهم Na^+ در تنظیم

پتانسیل اسمزی چغندر قند در شرایط تنش شوری بود. آنالیز همبستگی حاکی از وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار بین مقدار Na^+ و قندهای محلول در برگ‌ها بود ($r = 0.32$ ، $p < 0.05$) که نشان می‌دهد مقدار قندها و Na^+ در شرایط تنش شوری افزایش یافت. می‌توان از این دو شاخص برای غربال ژنوتیپ‌های متحمل در یک جمعیت چغندر قند بهره برد.

مقدار Na^+ و قندهای محلول ریشه‌ها همبستگی مثبت با هم داشتند ($r = 0.35$ ، $p < 0.05$) که نشان می‌دهد مقدار قندها و Na^+ در شرایط تنش شوری افزایش یافت و این دو در تنظیم اسمزی تحت شرایط تنش شوری نقش ایفاء کردند.

جدول ۷ ضرایب همبستگی ساده بین مقدار اسمولیت‌های برگ‌ها و ریشه ژنوتیپ‌های چغندر قند در شرایط نرمال و تنش شوری

عیار قند	ریشه			پارامترها	برگ‌ها			پارامترها
	Na^+/K^+	K^+	Na^+		قندهای محلول	Na^+/K^+	K^+	
								تحت شرایط نرمال
			۱/۰۰	Na^+			۱/۰۰	Na^+
		۱/۰۰	-۰/۰۷	K^+		۱/۰۰	-۰/۴۱	K^+
	۱/۰۰	-۰/۵۵°	-۰/۷۹**	Na^+/K^+	۱/۰۰	-۰/۶۸°	-۰/۳۶	Na^+/K^+
۱/۰۰	-۰/۱۳	۰/۱۵	-۰/۰۲	عیار قند	۱/۰۰	-۰/۰۳	-۰/۰۹	قندهای محلول
								تحت شرایط تنش شوری
			۱/۰۰	Na^+			۱/۰۰	Na^+
		۱/۰۰	-۰/۰۱	K^+		۱/۰۰	-۰/۲۴	K^+
	۱/۰۰	-۰/۵۱°	-۰/۸۶**	Na^+/K^+	۱/۰۰	-۰/۷۸**	-۰/۷۹**	Na^+/K^+
۱/۰۰	-۰/۳۸°	-۰/۱۵	۰/۳۵°	عیار قند	۱/۰۰	-۰/۴۱	-۰/۲۸	قندهای محلول

***- معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

نتیجه گیری

چغندر قند به خوبی قادر است در واکنش به تنش شوری، پتانسیل اسمزی خود را تغییر دهد. در این خصوص لیندهاگر و همکاران (1990) نیز قبلاً گزارش کردند که نمک‌های غیرآلی مانند پتاسیم، سدیم و منیزیم نقش مهمی در تنظیم پتانسیل اسمزی برگ‌های چغندر قند داشتند در حالی که در ریشه، عیار قند در پتانسیل اسمزی نقش مهمتری داشت. یافته‌های محققان فوق با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

ژنوتیپ‌های چغندر قند برای مقابله با مسمومیت Na^+ این عامل را در واکنش‌های سلول‌های برگ خود جمع می‌کنند و به این ترتیب پتانسیل اسمزی خود را در شرایط تنش شوری تنظیم می‌کنند. به علاوه، ژنوتیپ‌های چغندر قند در شرایط مشابه، قندهای بیشتری در برگ‌ها و در ریشه‌های خود جمع می‌کنند تا بتوانند پتانسیل اسمزی را تنظیم کنند. این یافته‌ها مشابه یافته‌های تحقیقی است که بر روی آتریپلکس

به عنوان گیاه شورپسند انجام شده است و به تیره *Chenopodiaceae* تعلق دارد (Glenn et al. 1994). از نظر تحمل ژنوتیپ‌ها، متحمل‌ترین ژنوتیپ کاویما و غیرمتحمل‌ترین آن‌ها تیگریس بود. این یافته نیز مشابه یافته عباس و همکاران (Abbas et al. 2010) بود. کاویما بالاترین مقدار Na^+ را در برگ‌ها و ریشه‌هایش داشته در حالی که تیگریس پایین‌ترین مقدار را داشت.

با توجه به مقدار همبستگی، می‌توان مقدار Na^+ را به عنوان ماده محلول اصلی برای تنظیم پتانسیل اسمزی برگ‌های چغندر قند در شرایط شوری تلقی کرد و ماده محلول اصلی پس از آن، قندهای محلول است. به علاوه، هم مقدار سوکروز و هم مقدار Na^+ ریشه‌های چغندر قند را نیز می‌توان به عنوان محلول‌های اصلی برای تنظیم پتانسیل اسمزی در نظر گرفت.

منابع مورد استفاده:

References:

- Abbas F, Mohanna A, Al-Lahham G, Al-Jbawi E. Laboratory Screening Tool for Selecting Sugar Beet, *Beta vulgaris*. L. Genotypes under Salinity Stress. 7th Conference of General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR). Damascus, Syria. 2009. 2-3/8/2009. Proceeding. 34 P.
- Abbas F, Mohanna A, Al-Lahham G, Al-Jbawi E, AL-Jasem Z. Evaluation the Response of Some Sugar Beet (*Beta vulgaris* L.) Genotypes under Saline Water Irrigation Conditions. Under published in Arab Journal for Dry Environments. ACSAD. 2010.

- Abdel-Aziz SM, Reda MMA. Osmotic adjustment for two wheat varieties. Egyptian Journal of Agricultural Researches. 2000. 78: 993-1004.
- Abd-El-Motagally FMF. Evaluation of two sugar beet cultivars (*Beta vulgaris* L.) for growth and yield under drought and heat conditions . Phd thesis. Institute of Plant Nutrition University Giessen, Germany. 2004. 143 p.
- Al-Lahham G, Sabbouh M, Ibrahim AS. Study the tolerance types of some Sorghum [*Sorghum bicolor* (L.) Moench] genotypes to salinity stress at early growth stages. Damascus University Journal of Agricultural Sciences. 2006. 22(1): 255-270.
- AOAC. *Association of Official Analytical Chemistry Official Methods of Analysis*. 17th. Ed, Washington, DC USA. 2000. 2(44): 1- 43.
- Ashraf M. Some important physiological selection criteria for salt tolerance in plants. Flora. 2004. 199: 361-376.
- Di Martino C, Delfine S, Pizzuto R, Loreto F, Fuggi A. Free amino acids and glycine betaine in leaf osmoregulation of spinach responding to increasing salt stress. New Phytologist. 2003. 158 (3): 455–463.
- Djilianov D, Georgieva T, Moyankova D, Atanassov A, Shinozaki K, Smeeken SCM, Verma DPS, Murata N. Improved abiotic stress tolerance in plants by accumulation of osmoprotectants- Gene transport approach. 20th Anniversary Agro Bio Institute- Biotechnol. and Biotechnol. Eq. 19/2005. 2005. Special Issue. 63-71.
- Eisa Sayed S, Ali SH. Biochemical, Physiological and Morphological Responses of Sugar Beet to Salinization Departments of Agricultural Botany and Biochemistry Faculty of Agriculture, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 2001. pp: 1-15.
- Flowers TJ. Physiology of halophytes. Plant Soil, 1985. 89: 41-56.
- Freitas JBS, Chagas RM, Almeida IMR, Cavalcanti FR, Silveira JAC. Expression of physiological traits related to salt tolerance in two contrasting cowpea cultivars. Document Embrapa Meio-Norte. 2001. 56: 115-118.

- Ghoulam C, Foursy A, Fares K. Effect of salt stress on growth, inorganic ions and proline accumulation in relation of osmotic adjustment in five sugar beet cultivars. *Journal of Environment and Experimental Botany*. 2002. 47: 39-50.
- Glenn EP, Olsen MW, Frye RJ, Moore DW. How much sodium accumulation is necessary for salt tolerance of subspecies of halophyte *Atriplex canescense*? *Plant Cell Environ*. 1994. 17: 711-719.
- Heuer B, Plaut Z. Photosynthesis and osmotic adjustment of two sugar beet cultivar grown under saline conditions. *Journal of Experimental Botany*. 1981. 40: 437-440.
- Katerji N, Van-Hoorn JW, Hamdy A, Mastroili M. Osmotic adjustment of sugar beet in response to soil salinity and its influence on stomatal conductance, growth and yield. *Journal of Agriculture and Water Management*. 1997. 34: 557-569.
- Le Docte A. Commercial determination of sugar in beet root using the Shacks-Le Docte process, *Int. Sug. J*. 1927. 29: 488-92.[C.F. Sugar Beet Nutrition, April 1972 Applied Science Publishers LTD, London. A.P. Draycott].
- Lindhauer MG, Haeder HE, Beringer H. Osmotic potentials and solute concentrations in sugar beet plants cultivated with varying potassium/sodium ratios. *Z. Pflanzenernähr. Bodenk*. 1990. 153, 25-32.
- Pakniyat H, Kazemipour A, Mohammadi GA. Variation in salt tolerance of cultivated (*Hordeum vulgare* L.) and wild (*H. spontaneum* C. Koch) barley genotypes from Iran. *Iran Agric. Res*. 2003. 22: 45-62.
- Pakniyat H, Armion M. Sodium and proline accumulation as osmo-regulators in tolerance of sugar beet genotypes to salinity. *Pak. Journal of Biological Sciences*. 2007. 10: 4081-4086.
- Parks GE, Dietrich MA, Schumaker KS. Increase vacuolar Na^+/H^+ exchange activity in *Salicornia bigelovii* Torr. in response to NaCl. *Journal of Experimental Botany*. 2002. 53: 1055-1065.

- Rathert G. Effects of high salinity stress on mineral and carbohydrate metabolism of two cotton varieties. *Plant and Soil*. 1983. 73, 247-256.
- Rengasamy P. World salinization with emphasis on Australia. *Journal of Experimental Botany*. 2006. 57: 1017–1023.
- Rengasamy P. Soil processes affecting crop production in salt affected soils. *Functional Plant Biology*. 2010. 37: 613–620.
- Sadeghian SY, Fazli H, Mohammadian R, Taleghani DF, Mesbah M. Genetic variation for drought stress in sugar beet. *Journal of Sugar Research*. 2000. 37: 35-77.
- Sairam RK, Tyagi A. Physiology and molecular biology of salinity stress tolerance in plants. *Journal of Current Science*. 2004. 86: 407-421.
- Schwarz M, Gale J. Maintenance respiration and carbon balance. *Journal of Experimental Botany*. 1981. 32: 933-941.
- Shabala S, Babourina O, Newman I. Ion-specific mechanisms of osmo-regulation in bean mesophyll cells. *Journal of Experimental Botany*. 2000. 51: 1243-1253.
- Shannon MC. Testing Salt Tolerance Variability Among Tall Wheatgrass Lines . *Agronomy Journal*. 1977. Vol. 70, 719- 722 .
- Spiro RG. Analysis of sugars found in glycoproteins. *Methods Enzymol*. 1966. 8:3-26.
- Subbarao GV, Wheeler RM, Levine LH, Stutte GW. Glycine betaine accumulation, ionic and water relations of red beet at contrasting levels of sodium supply. *Journal of Plant Physiology*, 2001. 158: 767-776.
- Tester M, Davenport R. Na⁺ tolerance and N⁺ transport in higher plants. *Ann. Bot*. 2003. 91: 503-527.
- Ueda A, Kanechi M, Uno Y, Inagaki N. Photosynthetic limitations of a halophyte sea aster (*Aster tripolium* L.) under water stress and NaCl stress. *Journal of Plant Research*. 2003. 116: 65-70.
- Waller RA, and Duncan DB. A bays rule for the symmetric multiple comparison problem.

American Statistical Association Journal. 1969. 1485-1503 pp.

Warne P, Guy RD, Roltins L, Reid DM. The effect of sodium sulphate and sodium chloride on growth, morphology, photosynthesis and water use efficiency of *Chenopodium rubrum*.

Canadian Journal of Botany. 1990. 68: 999-1006.

Zhang JL, Flowers TJ, Wang SM. Mechanisms of sodium uptake by roots of higher plants.

Plant and Soil. 2010. 326: 45-60.

Zhu JK. Plant salt tolerance. Trends in Plant Science. 2001. 6: 66-71.

Archive of SID