

# تأثیر روش‌های آبیاری بارانی و نشتی بر شدت آلدگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

## Effects of sprinkler and furrow irrigation systems on powdery mildew disease severity in sugar beet

جهانشاه بساطی<sup>\*</sup>، مهیار شیخ‌الاسلامی<sup>۲</sup>، علی جلیلیان<sup>۳</sup>، محمدرضا جهاداکبر<sup>۳</sup> و فرج‌نماز حمدي<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۹۳/۷/۲۲؛ تاریخ پذیرش: ۹۳/۷/۲۰

ج. بساطی، م. شیخ‌الاسلامی، ع. جلیلیان، م.ر. جهاداکبر و ف. حمدي. ۱۳۹۳. تأثیر روش‌های آبیاری بارانی و نشتی بر شدت آلدگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند. چغندرقند، ۱۲۷-۱۳۹(۲): ۹۳/۷/۲۲.

### چکیده

بیماری سفیدک پودری یک بیماری قارچی است که هرساله در بیشتر مزارع چغندرقند کشور آلدگی ایجاد کرده و باعث افت عملکرد ریشه و درصد قند در این مزارع می‌گردد. هدف این تحقیق تعیین تأثیر روش‌های مختلف آبیاری بر شدت آلدگی بیماری سفیدک پودری چغندرقند بود. به همین منظور هشت رقم تجاری حساس و مقاوم چغندرقند به سفیدک پودری تحت دو روش آبیاری بارانی و نشتی طی دو سال (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) و در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه مرکب دو ساله واریانس نشان داد که در روش آبیاری نشتی میزان آلدگی به بیماری حدود ۴/۱ درصد و در روش آبیاری بارانی حدود ۵/۹ درصد بود. بنابراین تأثیر آبیاری بارانی در کنترل بیماری سفیدک پودری در چغندرقند بسیار مؤثر و کارآمد می‌باشد. میزان آلدگی در ارقام مختلف نیز متفاوت بود. بالاترین میزان آلدگی با ۳/۶ درصد در رقم SBSI004 کمترین میزان آلدگی با ۱۰/۶۲ درصد بذر رقم بریجیتا مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که روش آبیاری بر عملکرد ریشه تأثیر داشته گرچه از نظر آماری معنی‌دار نبود، به طوری که عملکرد ریشه در آبیاری نشتی حدود ۷/۰ تن در هکتار بالاتر از روش آبیاری بارانی بود. بالاترین عملکرد ریشه حدود ۶۵/۱۲ تن در هکتار بود که به رقم بریجیتا تعلق داشت و این رقم کمترین درصد آلدگی را نشان داد. روش آبیاری بر روی صفت درصد قند در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که درصد قند در روش آبیاری نشتی با ۱۵/۰ درصد بالاتر از آبیاری بارانی با ۱۳/۵ درصد بود. بنابراین روش آبیاری نشتی باعث افزایش درصد قند به میزان ۱/۴۵ درصد شده است. همچنین در روش آبیاری نشتی تجمع نیتروژن مضره و سدیم در ریشه کمتر از روش آبیاری بارانی بود.

واژه‌های کلیدی: آبیاری بارانی و نشتی، چغندرقند، شدت آلدگی، مدیریت بیماری، *Erysiphe betae*

basatij@yahoo.com

\*- نویسنده مسئول

۱- مریبی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه- بخش تحقیقات چغندرقند

۲- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

۳- مریبی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان- بخش تحقیقات چغندرقند

۴- کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات چغندرقند- کرج

## مقدمه

مطالعات زیادی نشان داده است که روش‌های آبیاری روی بیماری‌ها و آفات نیز تأثیر قابل توجهی نشان داده‌اند. (Miller and Arastad 1976) زیاد بودن آب، با آبشوئی خاک عناصر را از دسترس گیاه خارج کرده و باعث افزایش مشکلات آفات و بیماری‌های گیاهی شده و عملکرد را در نهایت کاهش می‌دهد. عدم مدیریت صحیح آب باعث افزایش حشرات، علف‌های هرز و بیماری‌ها می‌گردد و از رشد یکنواخت گیاه چغندرقند جلوگیری می‌نماید (Dainello and Hall 1996). تراکم جمعیت لارو کارادرینا درروش بارانی به صورت معنی‌دار آماری کمتر از روش نشستی بود. بین درصد آلودگی به آگروتیس و کارادرینا نیز در دو روش آبیاری بارانی و نشستی تفاوت معنی‌دار وجود داشت و درصد آلودگی درروش آبیاری نشستی بیشتر از آبیاری بارانی بود (Malekzadeh et al. 2009). آبیاری بارانی می‌تواند برکاهش خسارت آفات مکنده روی گیاه چغندرقند تأثیر داشته باشد و آبیاری بارانی مؤثرتر از آبیاری نشستی بود (Yosupov et al. 1975). کریسمن (Christman 1976) معتقد است که این نوع آبیاری باعث کاهش خسارت بعضی از بیماری‌ها و جمعیت تعدادی از حشرات چغندرقند از جمله آگروتیس، شته و کک چغندرقند می‌شود. بررسی دیگری نشان داد که آبیاری بارانی شته ریشه را بیشتر از آبیاری نشستی کنترل کرد و جمعیت شته درآبیاری نشستی بیشتر از آبیاری بارانی بود (Parihar and Name Singh 1999).

اما رابطه روش آبیاری اختصاصاً با بیماری سفیدک پودری چغندرقند نیز در برخی تحقیقات مطالعه شده است. تحقیقاتی انجام شده در آمریکا گویای این مطلب است که شرایط نیمه‌خشک و گرم برای توسعه بیماری سفیدک پودری مناسب است. شرایط میکروکلیمایی که تحت آبیاری بارانی ایجاد می‌شود باعث رطوبت زیاد شده و باعث کندی توسعه

یکی از بیماری‌های چغندرقند که باعث خسارت می‌شود و افت عملکردیشه و درصدقند را به دنبال دارد، بیماری سفیدک پودری چغندرقند است. این بیماری تقریباً در تمام مناطق چغندرکاری ایران وجود دارد و کلیه ارقام چغندرقند مورد استفاده در ایران به بیماری سفیدک سطحی حساس بوده و در اثر آلودگی متholm خسارت قابل توجهی می‌گردد (Basati 2008; Basati et al. 2003). عامل بیماری سفیدک سطحی قارچ *Erysiphe betae* نام دارد (Weltezien 1963). حضور این بیماری در زمانی است که چغندرقند به شدت در حال قندسازی و ذخیره قند است. میزان خسارت این بیماری در مناطق مختلف، متفاوت است و باعث کاهش عملکردیشه و درصدقند می‌گردد. شدت و توسعه بیماری تا حد زیادی بستگی به وضعیت آب و هوای در زستان سال گذشته و تابستان سال کشت دارد، به طوری که هر چه زستان سال قبل ملایم و تابستان سال کشت گرم و خشک باشد، آلودگی در سال بعد زودتر شروع شده و به سرعت منتشر (Whitney 1987; Asher and Dewar 2001; Asher 1987; Asher and williams 1991,1992) در سال‌های اخیر به طور میانگین حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت چغندرقند قرار گرفته است. روش‌های مختلفی برای آبیاری توسط کشاورزان اعمال می‌شود. بیشتر مزارع به روش نشستی یا سطحی آبیاری می‌شوند. اما از روش آبیاری بارانی نیز در برخی نقاط چغندرکاری استفاده می‌شود. آبیاری بارانی نه تنها باعث کاهش مصرف آب در هکتار شده، بلکه از توسعه برخی بیماری‌ها نیز جلوگیری می‌نماید (Alimoradi et al. 1998). در کشت چغندرقند در ایران از تمام روش‌های آبیاری مانند جوی پشتنه، کرتی، نواری و آبیاری بارانی استفاده می‌شود (Alimoradi et al. 1998).

مؤثری باعث کاهش بیماری سفیدک سطحی می‌شود (Gallian 2002).

روش آبیاری بر عملکردنیشه و صفات کیفی و توسعه و یا عدم توسعه برخی بیماری‌ها مؤثر است. مطالعه تأثیر دو روش آبیاری بارانی و آبیاری نشتی بر کمیت و کیفیت چغnderقند نشان داد که در روش آبیاری نشتی عملکردنیشه و قند در هکتار بالاتر از روش آبیاری بارانی بود (Eckoff *et al.* 2001). در آزمایش دیگری سه روش آبیاری بارانی، قطره‌ای و نشتی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که عملکردنیشه در روش آبیاری بارانی بالاتر از دو روش آبیاری دیگر بود (Butrus and Nimal 1981).

در یک تحقیق مشخص گردید که مصرف آب در روش آبیاری بارانی به طور میانگین نسبت به روش آبیاری نشتی حدود ۲۲/۲ درصد کمتر است. عملکردنیشه در روش آبیاری بارانی بالاتر از روش آبیاری نشتی و قطره‌ای بود ولی درصد قند در هر سه روش تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. هم‌چنین آبیاری بارانی باعث گردید تا قند در هکتار بیشتری نسبت به دو روش دیگر به دست آمد (Rezvani *et al.* 2008). بنابراین نوع و روش آبیاری نه تنها روی میزان آلودگی به بیماری سفیدک پودری تأثیر داشت بلکه شیوه آبیاری بر صفات کمی مانند عملکردنیشه و صفات کیفی مانند نیتروژن و سدیم نیز مؤثر بوده است. در آبیاری نشتی میزان عملکردنیشه بالاتر از آبیاری بارانی بود، اما میزان صفاتی مانند نیتروژن مضره و سدیم در آبیاری نشتی کاهش یافت. (Davidoff and Hanks 1989; Hosainpor 2006; (Safarian *et al.* 2006; Malekzadeh *et al.* 2009; Basati *et al.* 2011)

بیماری می‌گردد. به طور کلی توسعه بیماری سفیدک پودری در شرایط آبیاری بارانی کندر از آبیاری سطحی یا نشتی است (Gallian 2001). در آزمایش دیگری گالیان (Gallian 2012) نشان داده بیماری سفیدک پودری در آبیاری سطحی توسعه بیشتری دارد تا آبیاری بارانی، زیرا آبیاری بارانی باعث شستشوی کنیدی‌های عامل بیماری از سطح برگ شده واز استقرار بیماری جلوگیری می‌کند. گالیان (2002) هم‌چنین در تحقیقات دیگری در ایالات متحده بیان کرد که آبیاری بارانی به شدت باعث کاهش بیماری سفیدک پودری می‌شود ولی عملیات زراعی تأثیر کمی روی کنترل بیماری داشته است.

آبیاری بارانی باعث شسته شدن هیف‌های قارچ سفیدک پودری شده و آلودگی در شرایط بارانی کمتر است، زیرا این قارچ برای توسعه شرایط گرم و خشک را دوست دارد. بنابراین آبیاری بارانی باعث کاهش آلودگی می‌گردد (O Connell 2013).

به دلیل این که در شرایط میکروکلیمای حاصل شده از آبیاری بارانی، رطوبت بیش از حد نیاز قارچ است، لذا توسعه بیماری به کندی صورت می‌گیرد. بنابراین آبیاری بارانی توسعه بیماری را محدود می‌کند (Gallian 2001). تحقیقات دیگری در ایالات متحده آمریکا نشان داد که کنیدی‌های قارچ در هر رطوبتی قادر به رشد هستند بنابراین در تمام فصل این قارچ می‌تواند توسعه یافته و آلودگی ایجاد کند. فقط در شرایطی که هوا بارانی است، توسعه بیماری محدود می‌شود (Hill *et al.* 1975; Hill *et al.* 1980). بیماری سفیدک سطحی هر ساله در ایالات‌های ایداهو، اورگون و واشنگتن باعث آلودگی مزارع چغnderقند می‌شود. سایر عوامل زراعی تأثیر کمی روی گسترش بیماری سفیدک سطحی دارد، اما آبیاری بارانی به طور

استثناء میزان آلودگی در حدی است که به توان تیمارها را از یکدیگر تمایز نمود. بنابراین در این ایستگاه هر ساله به طور طبیعی میزان آلودگی به بیماری سفیدک پودری به اندازه کافی وجود دارد و نیازی به آلودگی مصنوعی نیست. هشت رقم به طور جداگانه در یک آزمایش تحت روش آبیاری بارانی کلاسیک و همان هشت رقم در یک قطعه دیگر تحت روش آبیاری نشتی بررسی شدند. تعداد دفعات آبیاری در طول دوره رشد ۱۶ بار بود.

## مواد و روش‌ها

در این آزمایش هشت رقم تجاری خارجی و داخلی چندین قند تحت دو روش آبیاری بارانی و نشتی (سطحی) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند (جدول ۱). لازم به ذکر است که در سال‌های اول که روی بیماری سفیدک پودری تحقیق انجام می‌گرفت آلودگی مصنوعی روی تیمارها ایجاد می‌گردید، ولی با انجام آزمایش در سال‌های بعد مشخص شد که هر ساله بدون

جدول ۱ ارقام مورد بررسی طی دو سال آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت (۱۳۹۰-۹۱)

ردیف	نام رقم	برخی خصوصیات رقم
۱	SBSI004	حساس به بیماری سفیدک پودری - رقم داخلی - دیپلوبیلد
۲	(SBSI005) (پارس)	حساس به بیماری سفیدک پودری - رقم داخلی - دیپلوبیلد
۳	(SBSI006) (تریت)	حساس به بیماری سفیدک پودری - رقم داخلی - دیپلوبیلد
۴	SHIRIN	حساس به بیماری سفیدک پودری - رقم داخلی - دیپلوبیلد و تیپ قندی
۵	BRIGITA	مقاوم به بیماری سفیدک پودری - رقم خارجی - دیپلوبیلد
۶	ISELLA	حساس به بیماری سفیدک پودری - رقم خارجی - دیپلوبیلد
۷	14442	مقاوم به بیماری سفیدک پودری - توده مقاوم - دیپلوبیلد
۸	Rasol	حساس به بیماری سفیدک پودری - رقم داخلی - تریپلوبیلد و تیپ نرمال

نقشه و با استفاده از بذر کار تکرده بدهی دستی کشت گردید. هر رقم در سه خط هشت متری کشت گردید. فاصله خطوط ۶۰ سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها روی خطوط حدود ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در شروع و پایان آزمایش سه خط و در ابتداء و انتهای آزمایش نیز سه متر به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد. زمانی که شدت بیماری به حد اکثر خود رسید یادداشت‌برداری برای تعیین میزان آلودگی انجام گردید. یادداشت‌برداری در هر دو قطعه تحت آبیاری بارانی و نشتی به طور جداگانه انجام شد. برای تعیین درصد آلودگی و گزینش

زمین محل اجرای آزمایش در پاییز هر سال انتخاب و پس از تهیه نمونه مرکب خاک از اعمق ۰-۳۰ سانتی‌متری، تجزیه خاک انجام و کودهای موردنیاز براساس توصیه کودی مصرف شد. تناوب اجرا شده در محل اجرای طرح گندم - آیش - چندین قند بود. بستر مناسب کاشت با استفاده از دو نوبت کولتیواتور عمود بر هم در اسفند ماه همان سال تهیه شد. نیمی از کود نیتروژن توصیه شده بعد از کولتیواتور اول در زمین پخش و با کولتیواتور دوم به زیر خاک برده شد. خطوط کشت با استفاده از فارور ایجاد و ارقام شرکت‌کننده در آزمایش برابر

در کرج ارسال گردید. پس از جمع آوری داده‌ها تجزیه واریانس ساده برای هر سال با استفاده از نرم‌افزار SAS انجام شد و در پایان تجزیه مرکب داده‌ها برای سال‌های مختلف صورت گرفت. آزمون F براساس امید ریاضی محاسبه شده و در تجزیه مرکب سال تصادفی فرض شده است. داده‌های مربوط به میزان آلدگی به دلیل این که به صورت درصد بودند ابتدا تبدیل شده و سپس مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. برای تبدیل این داده‌ها از تبدیل زاویه‌ای ( $\text{arc sin} \sqrt{Y}$ ) استفاده گردید، اما چون نتایج داده‌های تبدیل شده با داده‌های اصلی از نظر آماری تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند لذا از داده‌های اصلی در تجزیه واریانس استفاده شد (Yazdisamadi 1997).

بوته‌های سالم از روش پائولوس و همکاران (Paulus *et al.* 2001) استفاده گردید. شاخص پائولوس و همکاران (2001) جدیدترین شاخصی است که در دنیا برای ارزیابی سفیدک پودری استفاده می‌شود. در این روش به برگ‌های مورد بررسی نمره آلدگی از صفر تا پنج به ترتیب برای آلدگی ۱۰، ۳۵، ۶۵، ۹۰ و ۱۰۰ درصد داده شد. برای هر تیمار در هر تکرار تعداد ۱۰۰ برگ یاداشتبرداری و به آنها نمره آلدگی داده شد. با استفاده از نمره داده شده عدد K در این فرمول محاسبه شد. عدد K شاخص آلدگی برای یک تکرار می‌باشد. در فرمول فوق K میزان آلدگی در هر تکرار و R جمع تکرارها است.  

$$K = \frac{\sum (\text{نمره داده شده} \times \text{تعداد برگ‌ها در آن نمره})}{\text{تعداد کل برگ‌های مورد ارزیابی}}$$

## نتایج و بحث

### وضعیت آلدگی بیماری سفیدک پودری در شرایط آبیاری بارانی

اگر سال در سطح پنج درصد روی میزان آلدگی معنی‌داری بود. میانگین آلدگی سال اول ۲۸/۹۳ درصد و در سال دوم ۱۶/۱۳ درصد بود (جداول ۲ و ۳). بین روش‌های آبیاری نیز در سطح پنج درصد برای صفت آلدگی اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. در روش آبیاری بارانی میزان آلدگی حدود ۵/۹ درصد و در روش آبیاری نشتی حدود ۴۹/۱ درصد بود (جداول ۲ و ۳). بین ارقام شرکت کننده در آزمایش نیز برای صفت آلدگی درسطح پنج درصد اختلاف معنی‌دار دیده شد. بالاترین میزان آلدگی به رقم SBSI004 با ۳۶/۵ درصد و کمترین آلدگی در رقم برجیتا با ۱۰/۶۲ درصد مشاهده شد.

با استفاده از روش پائولوس و همکاران (2001) پس از محاسبه K و R با استفاده از فرمول زیر میزان درصد آلدگی تعیین شد. عدد ۱۸ یک ضریب ثابت است.

$$\text{Percent MLAD} = 100[\sin(R*18)]^2$$
  

$$\text{MLAD} = \text{Mature Leaf Area Disease \%}$$
  
 برداشت در پاییز هر سال انجام و ریشه‌ها برای هر کرت آزمایشی، شمارش و توزیع گردید. از هر کرت آزمایشی تعداد ۲۵ ریشه به طور تصادفی جدا و از آن خمیر نمونه تهیه گردید. نمونه‌های خمیر برای انجام تجزیه صفات کیفی مانند درصد قند، درصد قند قابل استحصال، خلوص شربت خام، نیتروژن، سدیم و پتاسیم به مؤسسه تحقیقات چندرقند واقع

معنی دار شد. تمام ارقام تحت شرایط آبیاری بارانی میزان آلودگی پائین‌تر و در روش نشتی، میزان آلودگی بالاتری را نشان دادند (جداول ۲ و ۳).

رقم ۱۴۴۴۲ نیز که به عنوان رقم مقاوم در آزمایش شرکت داشت، آلودگی ۲۱/۶۲ درصد را نشان داد (جداول ۲ و ۳). اثر متقابل رقم در آبیاری در سطح پنج درصد برای صفت آلودگی

**جدول ۲** میانگین واریانس صفات عملکردنده، درصدقند، قند در هکتار، ازت، سدیم، پتاسیم و درصدآلودگی

درصدآلودگی	پتاسیم	سدیم	ازت	قند در هکتار	درصدقند	عملکرد ریشه	درجه آزادی	منابع تغییر
۲۵۰/۵**	۴/۰*	۱/۳۷	۲/۸۳*	۳/۴۸	۱۱/۳۳	۲۱/۹	۱	سال <sup>۱</sup>
۱۴/۵۹	۰/۵۲	۰/۵۴	۰/۲۸	۲/۱۶	۳/۰۴	۲۷/۸	۶	خطای <sup>۱</sup>
۵۹۸۸۷/۴*	۷/۲۲	۳/۲۱*	۶/۱۸	۵۱/۳	۶۶/۸*	۱۵/۶۵	۱	آبیاری
۳۶۱/۴**	۰/۵۲	۰/۰۱	۰/۱۱	۳/۸۳	۰/۳۵	۴۲/۴	۱	آبیاری*سال
۵/۱۱	۰/۱۹	۰/۱۲	۰/۳۰	۰/۶۸	۱/۷۳	۹/۷۲	۶	خطای <sup>۲</sup>
۱۰۷۱/۵*	۱/۷۹	۰/۶۳	۷/۱۳*	۵۱/۸**	۴۴/۷**	۱۲۲/۷۰**	۷	رقم
۲۳۷/۱**	۱/۰۸*	۰/۶۶*	۱/۱۷*	۴/۵*	۵/۸*	۵۰/۴۳*	۷	رقم*سال
۱۰۳۰/۸*	۰/۳۴	۰/۲۲	۱/۹	۱/۵۷	۳/۵۳	۴/۵۱	۷	آبیاری*رقم
۱۶۲/۳**	۱/۱*	۱/۶۴**	۲/۰۹**	۱۴/۳۲**	۹/۲۸**	۸۸/۳**	۷	آبیاری*رقم*سال
۶/۳	۰/۳۹	۰/۱۹	۰/۳۳	۱/۲۲	۱/۶۲	۱۹/۷	۹۰	خطای <sup>۳</sup>
۹/۰۶	۱۳/۰۹	۱۶/۶۹	۱۹/۸۵	۱۰/۱۶	۸/۸۹	۷/۹۲	-	CV

- سال تصادفی فرض شده است و F های محاسبه شده برای تمام فاکتورهای مورد بررسی براساس امید ریاضی به دست آمده است.

\* و \*\*، به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد

**جدول ۳** گروه‌بندی میانگین صفات عملکردنده، درصدقند، قند در هکتار، ازت، سدیم، پتاسیم و درصدآلودگی

آلودگی درصد	پتاسیم	سدیم	ازت	عملکرد قند (تن در هکتار)	درصد قند	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	ارقام	روشن آبیاری	سال
<b>میلی اکی والان گرم دریکصد گرم شکر</b>									
۲۷/۹۳۲	۴/۵۹b	۲/۵۴a	۲/۰۷a	۱۱/۱۵a	۱۴/۰۲a	۵۵/۵۶a			۱
۱۶/۱۳b	۴/۹۵a	۲/۷۴a	۲/۷۷b	۱۱/۴۸a	۱۴/۶۱a	۵۶/۷۴a			۲
۴۹/۱۲	۵/۰۱a	۲/۴۸b	۲/۷a	۱۱/۹۴a	۱۵/۰۴a	۵۵/۵a		۱ نشت	
۵/۹b	۴/۵۳a	۲/۸a	۳/۱۴a	۱۰/۶۸a	۱۲/۵۹b	۵۶/۸a		۲ بارانی	
۳۶/۵a	۴/۵۸ab	۲/۶۱a	۳/۳۴ab	۱۰/۶۵c	۱۳/۳۱cde	۵۵/۴۶cd	SBSI004		
۳۱/۲۵ab	۴/۸ab	۲/۷۷a	۳/۵ab	۱۰/۸۴c	۱۲/۴۶ed	۵۹/۱۷b	SBSI005		
۳۰/۵ab	۴/۶۵ab	۲/۷۸a	۲/۷۷abc	۱۰/۷۹c	۱۱/۷۷e	۶۳/۷۵a	SBSI006		
۳۳/۸ab	۴/۶۵ab	۲/۶۸a	۲/۹bcd	۱۰/۵۸c	۱۴/۱۸bcd	۵۱/۹۶d	SHIRIN		
۱۰/۶۲c	۴/۴b	۲/۲۴a	۱/۹۵e	۱۴/۶۶a	۱۵/۶۱ab	۶۵/۱۳a	BRIGITA		
۲۶/۲۶ab	۴/۵۵ab	۲/۸a	۲/۲۲de	۱۲/۷۱b	۱۵/۲۵abc	۵۸/۰۳bc	ISELLA		
۲۱/۶۲bc	۵/۴a	۲/۴۸a	۲/۲۸cde	۸/۵۱d	۱۵/۶۵ab	۳۷/۷۶e	14442		
۲۷/۶۲ab	۵/۱۴ab	۲/۷a	۳/۸a	۱۱/۷۵bc	۱۶/۳۴a	۵۰/۰۵d	Rasol		

در هر ستون اعدادی که حرف اندیس مشابه دارند در سطح احتمال پنج درصد فرق معنی دار ندارند.

**جدول ۴** گروه بندی ترکیب تیمارهای روش اثر متقابل آبیاری در رقم برای صفات عملکرد ریشه، درصد قند، قند در هکتار، ازت، سدیم، پتاسیم و درصد آلودگی

رقم	روش آبیاری	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	درصد قند	عملکرد گرم (تن در هکتار)	ازت	سدیم	پتاسیم	درصد آلودگی
۱	۱	۵۶/۳۶ab	۱۳/۹۰ab	۱/۱۰a	۲/۲۹a	۴/۶۳a	۶۶a	
۱	۱	۵۷/۲۷ab	۱۲/۷۲ab	۷/۵۹a	۲/۹۲a	۴/۴۹a	۷C	
۲	۱	۵۷/۹۶a	۱۴/۰۵ab	۷/۱۲a	۲/۴۴a	۴/۹۶a	۵vab	
۲	۲	۵۸/۷۴a	۱۰/۱۸b	۷/۸۹a	۳/۱۰a	۴/۶۴a	۵/۰۵C	
۳	۱	۶۲/۶۳a	۱۲/۶۳eab	۷/۹۳a	۲/۷۰a	۴/۶۹a	۵۵ab	
۳	۲	۶۳/۸۷a	۱۰/۸۷b	۷/۶۱a	۲/۸۷a	۴/۶۷a	۶C	
۴	۱	۵۲/۶۴ab	۱۴/۱۴ab	۲/۵۲a	۲/۰۹a	۴/۸۴a	۶۲a	
۴	۲	۵۱/۲۳ab	۱۴/۲۲ab	۲/۸۴a	۲/۷۰a	۴/۲۴ab	۵/۰۵C	
۵	۱	۶۵/۷۸a	۱۶/۰۵ab	۱/۶۱a	۲/۱۹a	۴/۷۷a	۱۵C	
۵	۲	۶۶/۶۳a	۱۵/۱۷ab	۲/۲۹a	۲/۲۰a	۴/۰۴a	۵/۰۵C	
۶	۱	۵۷/۵۸a	۱۵/۸۵ab	۲/۱۶a	۲/۶۸a	۴/۸۶a	۴۶ab	
۶	۲	۵۷/۵۵a	۱۴/۶۵ab	۲/۲۰a	۴/۲۵a	۴/۲۵a	۶C	
۷	۱	۳۷/۶۴a	۱۶/۶۵a	۲/۴۷a	۲/۴۵a	۴/۸۵a	۳۷b	
۷	۲	۳۷/۴۶b	۱۴/۶۵ab	۲/۳۰a	۲/۶۲a	۴/۹۵a	۶/۲۵C	
۸	۱	۴۹/۴۷ab	۱۷/۰۵a	۴/۱۵a	۲/۷۰a	۵/۴۶a	۵۷ab	
۸	۲	۵۰/۷ab	۱۱/۳۰ab	۲/۷۰a	۲/۷۰a	۴/۸۲a	۵/۰۵C	

در هر سیون اعدامی که حرف اندیس مشابه دارد در سطح احتمال پنج درصد فرق معنی دار ندارد.

آفات درمزرعه گردیده است. (Yosupov *et al.* 1975; Christman 1976; Miller and Arastad 1976; Dainello Gallian 2001 and 2012; Parihar and Hall 1996; Name Singh 1999). آبیاری بارانی در این آزمایش میزان آلودگی در تیمارهای مورد بررسی را در حدود ۵/۹ درصد کنترل کرد، ولی نتایج آزمایشاتی که در منطقه کرمانشاه اجراء شده است (Basati 2008)، نشان داد که با چهار بار سمپاشی، میزان آلودگی در حد ۲۰ درصد باقی ماند. بنابراین ملاحظه می‌گردد که آبیاری بارانی برای کنترل بیماری سفیدک پودری بسیار مؤثرتر از کنترل بیماری توسط قارچ کش بوده است. میزان آلودگی به بیماری در سال‌های مختلف نوسان دارد، چنان‌که در این آزمایش آلودگی در آبیاری نشستی در سال اول ۵۲/۲۴ درصد و در سال دوم ۴۶/۰۸ درصد (میانگین دو سال ۴۹/۱ درصد) و آلودگی در آبیاری بارانی در سال اول ۶/۱۲ درصد و در سال دوم به ۵/۶۲ درصد (میانگین دو سال ۵/۹

بیماری سفیدک پودری چندین قند در شرایط خاصی فعالیت می‌کند و یکی از این شرایط میزان رطوبت موجود در هوا و در میکروکلیمای مزرعه است. اگر میزان رطوبت از حد مطلوب این بیماری بیشتر باشد فعالیت آن کم شده و در نتیجه خسارت آن نیز پائین می‌آید. آبیاری بارانی باعث ایجاد شرایط نامطلوب رطوبتی برای این بیماری می‌گردد. زیرا آبیاری بارانی باعث افزایش رطوبت میکروکلیمای مزرعه شده و همچنین باعث افزایش رطوبت نامطلوب برگ‌ها و افزایش رطوبت در شستشوی اندام‌های قارچ از سطح برگ‌ها و افزایش رطوبت در سطح برگ از رشد کنیدهای قارچ عامل بیماری جلوگیری می‌نماید. نتایج آزمایش نشان داد که در آبیاری بارانی میزان آلودگی بسیار پائین بود. زیرا همان طوری که در بالا ذکر شد آبیاری بارانی باعث ایجاد شرایط نامطلوب برای توسعه بیماری شده و گسترش بیماری را درمزرعه محدود می‌نماید. نتایج آزمایش‌های سایر محققین نیز نشان داده است که آبیاری بارانی باعث کاهش بیماری‌ها گردیده، اما آبیاری نشستی موجب توسعه بیماری‌های برگی و ریشه و همچنین افزایش تراکم

آلودگی و میزان نیتروژن موجود در ریشه در ارقام دیده شد اما هنوز معلوم نیست که آیا آلودگی باعث ذخیره بیشتر نیتروژن در ریشه می‌شود یا این که افزایش نیتروژن در ریشه موجب آلودگی بیشتر در برگ‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد ارقامی که توان بیشتری برای جذب نیتروژن دارند، زمینه را برای آلودگی بیشتر مهیا می‌کنند زیرا در این ارقام به دلیل جذب بیشتر نیتروژن، برگ‌ها شاداب‌تر و گوشتی‌تر شده و همین وضعیت شرایط را برای استقرار راحت‌تر هیف‌های قارچ ایجاد می‌کند. چون نیتروژن در تمام محصولات باعث رشد رویشی شده و توسعه برگ‌ها را به دنبال دارد. فرض دیگر این است که ارقامی که بیشتر آلوده می‌شوند به دلیل استقرار زیاد هیف‌های قارچ بر روی برگ‌ها و تغذیه از برگ، گیاه را مجبور به جذب بیشتر نیتروژن می‌نمایند. ولی آنچه مسلم است ارقام با آلودگی بیشتر، نیتروژن بیشتری در ریشه ذخیره می‌کنند. در آزمایشی که در منطقه کرمانشاه توسط سلطانی (2000) انجام شده، این موضوع تأیید شده است. ژنتیک‌هایی که نیتروژن بیشتری در ریشه داشتند میزان آلودگی بیشتری نشان دادند.

#### عملکرد ریشه

اثر سال بر روی صفات عملکرد ریشه و درصد قند معنی‌داری نبود. سال بر صفات نیتروژن و پتابیم تأثیر معنی‌داری نشان داد و میزان این عناصر در ریشه گیاه در سال آزمایش با یکدیگر تفاوت داشت. همچنین سال روی میزان آلودگی تاثیر معنی‌داری داشت و میزان آلودگی در سال اول بطور معنی‌داری بالاتر از سال دوم بود (جدول ۲).

تأثیر روش آبیاری بر روی عملکرد ریشه از نظر آماری معنی‌دار نبود، عملکرد ریشه در آبیاری نشتری حدود ۵۵/۵ تن در هکتار و در روش آبیاری بارانی حدود ۵۴/۸ تن در هکتار عملکرد ریشه در روش آبیاری نشتری حدود ۰/۷ تن در هکتار

درصد) رسید، اما تأثیر آبیاری بارانی با جلوگیری از استقرار قارچ عامل بیماری در هر دو سال مورد تأیید است.

در این آزمایش از ارقام مقاوم و حساس استفاده شده است. ارقام مقاوم تحت شرایط آبیاری نشتری مقادیر آلودگی نشان دادند ولی میزان آلودگی آنها نسبت به ارقام حساس خیلی پائین‌تر بود، اما در شرایط آبیاری بارانی ارقام حساس و مقاوم تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند، زیرا آبیاری بارانی باعث عدم توسعه بیماری در سطح برگ کلیه ارقام گردید و در نتیجه میزان آلودگی ارقام حساس و مقاوم تقریباً برابر و حدود بین ۵ تا ۶ درصد بود. میزان آلودگی در سطح مزرعه هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد، زیرا تعدادی از برگ‌ها و به خصوص برگ‌های پائین‌تر و پیتر همیشه از تماس مستقیم با آب مصون مانده و در نتیجه مقادیر آلودگی در آنها مشاهده می‌شود. در زمان تعیین میزان آلودگی چون از تمام برگ‌ها یادداشت‌برداری می‌شود، بنابراین همیشه میزان پائینی از آلودگی در مزرعه قابل مشاهده است در این آزمایش نیز میزان حدود ۶ درصد آلودگی در سیستم آبیاری بارانی ثبت گردیده است. بنابراین ارقام که مقاوم نیز مقدار کمی در حدود ۵ تا ۶ درصد آلودگی نشان می‌دهند زیرا در ارقام مقاوم هم، مقاومت صدرصد نیست و همیشه میزان کمی از آلودگی در برگ‌ها مشاهده می‌شود که این میزان در حدود ۵ تا ۶ درصد می‌باشد. لذا در آبیاری بارانی با شسته شدن کنیدی‌های قارچ، میزان آلودگی به حدود ۵ تا ۶ درصد محدود شده و در ارقام مقاوم نیز همین میزان آلودگی مشاهده می‌شود.

نتایج این آزمایش نشان داد که ارقام برجیتا، ایسلا و میزان نیتروژن نسبت به سایر ارقام میزان آلودگی کمتری نشان داده و میزان نیتروژن موجود در ریشه این ارقام نیز کمتر از سایر ارقام بود. اما ارقامی که دارای آلودگی بیشتری بودند، مقدار نیتروژن بیشتری در ریشه ذخیره کردند. رابطه‌ای بین میزان

شرايط نرمال آب بيشتری در اختيار گیاه قرار می‌گيرد و در روش آبياري نشتی نيز آب بيشتری نسبت به آبياري باراني در دسترس گیاه است (Rezvani *et al.* 2008) بنابراین عملکرديشه بيشتری نيز مورد انتظار است و در اين آزمایش نيز در روش آبياري نشتی چنان‌که در بالا ذکر شد عملکرديشه اندکی بالاتر از روش آبياري باراني بود.

#### درصد قند

روش آبياري بر روی درصد قند تأثير معنی‌داری داشت. در اين آزمایش برای صفت درصد قند بين دو روش آبياري از نظر آماري درسطح پنج درصد تفاوت معنی‌دار دیده شد (جدول ۱). نتایج نشان داد که درصدقند در روش آبياري نشتی با ۱۵/۰۴ درصد بالاتر از آبياري باراني با ۱۳/۵۹ درصد بود (جدول ۲). در بيشتر منابع نشان داده شده است که برای صفت درصدقند بين روش‌های آبياري تفاوت معنی‌داری دیده نشده است ولي داويدوف وهانگ (Davidoff and Hanks 1989) نشان دادند که با افزایش مقدار آب تمایل به افزایش درصدقند در ريشه وجود دارد. یعنی در روش آبياري نشتی که مقدار بيشتری آب در اختيار گیاه قرار می‌گيرد افزایش درصدقند در ريشه مورد انتظار است و البته در اين آزمایش نيز چنین نتيجه‌های حاصل شده است و در آبياري نشتی ميزان درصد قند بالاتر از روش آبياري باراني بود.

در بسياري از منابع ذکر شده است که تنش آبی باعث افزایش درصد قند در گیاه شده است (Carter *et al.* 1980; Fotohi *et al.* 2008; Abaspor 2003; Ebrahimipak 2010; Jehadakbar 2003; Noorjo and Bagae 2004). تنش آبی را می‌توان با آبياري باراني مقایسه نمود، زира در آبياري باراني نيز ميزان آبی که در اختيار گیاه قرار می‌گيرد

بالاتر از روش آبياري باراني بود (جدوال ۲ و ۳). تأثير روش آبياري بر روی عملکرديشه همیشه يكسان نیست، برخی منابع نشان دهنده آن است که در روش آبياري باراني عملکرد ريشه (Butrus and Nimal 1981; Eckoff *et al.* 2001; Rezvani *et al.* 2008; Jahedi *et al.* 2012) نشان می‌دهد عملکرديشه در روش آبياري نشتی بالاتر از روش آبياري باراني است (Davidoff and Hanks 1989; Hoseinpor 2006; Malekzadeh *et al.* 2009). ملاحظه می‌گردد که روش آبياري به تنهايی باعث افزایش و يا کاهش عملکرد ريشه در چغندرقند نمي‌گردد. اگر چه در هریک از روش‌های آبياري ممکن است عملکرديشه با يكديگر تفاوت داشته باشد، اما اين تفاوت از نظر آماري معنی‌دار نیست و نمي‌توان اظهار نمود که روش آبياري باعث کاهش و يا افزایش عملکرديشه مي‌گردد.

با توجه به اين که در آبياري نشتی، آب بيشتری در اختيار گیاه قرار می‌گيرد (Rezvani *et al.* 2008) لذا می‌توان انتظار داشت که در شرايط آبياري نشتی اندکی عملکرديشه بالاتر از شرايط آبياري باراني باشد. زيرا آبياري باراني را می‌توان يك نوع استرس نسبت به آبياري نشتی لحاظ نمود، چون مقدار آبی که در روش آبياري باراني در دسترس گیاه قرار می‌گيرد كمتر از آبياري نشتی است. تحقیقات نشان داده است که در هر دو روش آبياري باراني و نشتی، وقتی که تنش اعمال شد، عملکرديشه و سايير صفات مانند درصد قند، نيتروژن، سديم و پتاسيوم تعیير کرد. در روش آبياري نشتی بدون تنش، عملکرديشه بالاتر از سايير تيمارها بود، همچنين در شرايط تنش همیشه عملکرديشه كمتر از شرايط آبياري نرمال بود (Carter *et al.* 1980; Fotohi *et al.* 2008; Abaspor 2003; Ebrahimipak 2010; Jehadakbar 2003;

فاصله کم عملکردنیشه در آبیاری بارانی نسبت به آبیاری نشتی به دلیل کنترل بیماری در آبیاری بارانی است. بنابراین در روش آبیاری بارانی نه تنها آب کمتری مصرف گردیده است، بلکه بیماری نیز در حد مطلوبی کنترل شده است. چنانکه کنترل شیمیائی بیماری، میزان آلودگی را تا حد ۲۰ درصد پائین نگه داشته است (Basati 2008)، ولی آبیاری بارانی همان‌طور که قبلًا نیز بیان شد، آلودگی سطح برگ‌ها را تا حد پنج درصد کنترل نموده است. بنابراین مزیت آبیاری بارانی این است که عملکردنیشه و درصدقند را در حد آبیاری نشتی تولید نموده، درحالی که مصرف آب را کمتر و کشاورز را از انجام عملیات سمپاشی برعلیه بیماری سفیدک پودری بی‌نیاز می‌نماید.

### صفات کیفی چغندرقند

صفات کیفی چغندرقند از جمله نیتروژن، سدیم و پتاسیم نیز تحت تأثیر روش آبیاری قرار گرفتند. روش آبیاری در سطح پنج درصد تأثیر معنی‌داری روی سدیم داشت ولی اثرات برای دو صفت نیتروژن و پتاسیم از نظر آماری معنی‌دار نبود. به ترتیب در آبیاری نشتی و بارانی میزان نیتروژن ۲/۷ و ۳/۱۴ میزان سدیم ۲/۸ و ۲/۴۸ میلی‌اکیوالان گرم در یکصد گرم ریشه بود. بنابراین میزان نیتروژن و سدیم در آبیاری نشتی کمتر از آبیاری بارانی بود، اما میزان پتاسیم در آبیاری نشتی بالاتر از آبیاری بارانی بود (جداول ۲ و ۳). منابع مورد بررسی نشان داد که وقتی که گیاه دچار تنش می‌شود و مقدار آب کمتری دریافت می‌نماید تجمع عناصر نیتروژن و سدیم در ریشه بالا می‌رود. بر عکس وقتی که آب کافی در اختیار گیاه باشد میزان نیتروژن و سدیم در ریشه کاهش می‌یابد (Carter et al. 1980; Fotohi et al. 2008; Abaspor 2003; Ebrahimipak 2010; Jehadakbar 2003; Noorjo and Bagaei 2004). در این آزمایش نیز در آبیاری نشتی یعنی

کمتر از آبیاری نشتی است. در این آزمایش نتایج به دست آمده با نتایج آقای داویدوف و هانگ (1989) مطابقت دارد.

### عملکرد قند

برای صفت عملکردنیشه، روش آبیاری تأثیر معنی‌داری نداشت. عملکردنیشه در هکتار در روش آبیاری نشتی حدود ۱۱/۹۴ و در روش آبیاری بارانی حدود ۱۰/۶۸ تن در هکتار بود (جداول ۲ و ۳). ملاحظه می‌گردد که قند در هکتار در روش آبیاری نشتی حدود ۱/۲۶ تن بیشتر از روش آبیاری بارانی بود. صفت قند در هکتار در واقع برآیندی از دو صفت عملکرد ریشه و درصدقند است و در این آزمایش هر دو صفت عملکردنیشه و درصدقند در روش نشتی بالاتر از روش بارانی بود، لذا انتظار همین بود که عملکرد قند در هکتار نیز در روش نشتی بالاتر از روش بارانی باشد. در آبیاری نشتی میزان آبی که در اختیار گیاه قرار می‌گیرد حدود ۲۲/۲ درصد بیشتر از آبیاری بارانی است (Rezvani et al 2008) و همین مسئله باعث افزایش رشد ریشه و درصدقند گردیده و در نهایت میزان قند در هکتار در روش آبیاری نشتی بالاتر از آبیاری بارانی است. در روش آبیاری نشتی میزان آلودگی به بیماری بالا بوده که این امر باعث خسارت گردیده و کاهش عملکردنیشه و درصدقند را به دنبال خواهد داشت. چنانچه در این آزمایش با وجود روش آبیاری نشتی، اگر بیماری سفیدک پودری نیز کنترل می‌گردد، به طور یقین عملکرد بیشتری به دست می‌آمد. اما به دلیل شدت بیماری، عملکردنیشه در حد ۵۵/۵ تن باقی ماند. در آبیاری بارانی به دلیل کنترل بیماری، خسارت بیماری تقریباً از بین رفته و عملکرد به دست آمده تقریباً برابر عملکرد آبیاری نشتی است. حسن‌پور (2006) نشان داد که آبیاری نشتی حدود شش درصد عملکرد بیشتر نسبت به آبیاری بارانی تولید می‌کند در حالی که در این آزمایش عملکردنیشه در آبیاری نشتی کمتر از یک درصد (۰/۷ تن در هکتار) بیشتر از آبیاری بارانی بود و این

پارس به ترتیب با ۱۳/۶۵، ۶۳/۷۵، ۵۹/۱۷ و ۵۹/۶۳ تن در هکتار بالاترین عملکرد ریشه را نسبت به سایر ارقام داشتند. در این آزمایش رقم تربت که یک رقم ایرانی جدید است قابل توجه می‌باشد زیرا این رقم با داشتن عملکرد بالا، میزان آلودگی متوسطی داشت و از این رقم می‌توان برای بسیاری از مناطق که آلودگی سفیدک پودری دارند استفاده نمود.

وقتی که میزان آب بیشتری در اختیار گیاه قرار گرفت تجمع نیتروژن و سدیم در ریشه کمتر بود و در آبیاری بارانی میزان این عناصر افزایش یافت. بنابراین نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت دارد. بین ارقام برای صفت عملکرد ریشه از نظر آماری تفاوت مشاهده معنی‌دار دیده شد (جدول ۲). ارقام بریجیتا، تربت و

## References:

## منابع مورد استفاده:

- Abbaspoor F. Sugar Beet: Guide of Farmers. Research and Service Sugar Beet Agricultural Co. Khorasan. 2003. (in Persian)
- Alimoradi A, Dehganshoar M, Sadegian SY, Hashemi P, Yavari N, Goharim J, Galebi S, Arjmand M, Gadiri V, shikholeslami R. Sugar beet from scientific to Practice (translation), Olom-e-Keshavarzi Press.Tehran, Iran.731pp. 1998. (in Persian)
- Asher M. Powdery mildew a problem of the south-east of England. British Sugar Beet Review, 1987. 55: 37-39.
- Asher M, Dewar A. Pests and diseases in sugar beet in 2000. British Sugar Beet Reiew .2001 69: 21-26
- Asher M, Williams G. Forecasting the national incidence of sugar beet powdery mildew from weather data in Britain. British Sugar Beet Review, 1991. 40: 100-107.
- Asher M, Williams G. Controlling leaf disease: powdery mildew. British Sugar Beet Review,1992. 60: 35-37.
- Basati J, Mesbah M, shikholeslami M. Effect of powdery mildew on quality and quantity of sugar beet genotype in Kermanshah. Journal of Sugar Beet. 2000.16(2): 25-39. (in Persian, abstract in English)
- Basati J, Mesbah M, Shikholeslami M. Effect powdery mildew on quality and quantity of sugar beet genotype in kermanshah. Journal of Sugar Beet .2008 .16(2):44-61. (in Persian, abstract in English)
- Basati J, Zebarjadi A, Jalilian A, Abdolahian M, Abdi F. Effect of Time of irrigation cutoff in the end season of growth and silage in sugar beet. Journal of Sugar Beet. 2011. 26(2):157-167. (in Persian, abstract in English)
- Basati J, M Zarabi, fazli H. Investigation of comercial variety for powdery mildew tolerance. Journal of Sugar Beet. 2003. 19(2):97-107. (in persian, abstract in english)
- Basati J. Evaluation of commercial variety for powdery mildew resistance report. Kermanshah: agricultural research center (Iran); 2008 . 19-27 p. report. (in Persian)

- Butrus LE, Nimal MN. potato and sugar beet yield and water use efficiency under different irrigation system and water stress. Agronomy Abstract.73<sup>rd</sup>. Annual Meeting American Society of Agronomy. P:209. .1981.
- Carter GN, Jensen ME, Traveller DI. Effect of mid-and late season water stress on sugar beet growth and yield. Agronomy Journal. 1980. 72(5):806-815
- Christman J. Interrelation between irrigation and pests and disease of sugar beet. Compt Rendu Congress. 1976. 39: 149-160.
- Dainello FJ, Hall CR. General management practices to improve efficiency of pest control. Vegetable Production and Marketing. 1996. 6(9).
- Davidoff B, Hanks RJ. Sugar beet production an influenced by limited irrigation. Journal of Irrigation Science. 1989.10: 1-17.
- Ebrahimipak NA. Reaction of sugar beet yield to low irrigation in different step of sugar beet growth. Journal of Sugar Beet.2010.26(1):67-79.
- Eckoff JLA, Bergman JW. Sugar beet (*Beta vulgaris*) production under sprinkler and flood irrigation. Montana State University. Strength Agricultural Research Center Available on: [http://www.sidny.ars.usda.gov/state/publications/sbflood\\_and\\_sprinkler.htm](http://www.sidny.ars.usda.gov/state/publications/sbflood_and_sprinkler.htm). 2001.
- Fotohi K, Ahmadasi J, Noorjo A, Pedram A, Khorshid A. Irrigation of management based on humidity of soil in different step of growth in sugar beet in Miandoab. Journal of Sugar Beet.2008.24(1):43-60. (in persian, abstract in english)
- Galian JJ. Sugar beet powdery mildew: Biology ,economic importance and disease management. Snake River Sugar Beet Conference. Twin fall Idaho, January 11-12, 2001.
- Galian JJ. Powdery mildew spread in sugar beet fields. Capitalpress.com/Idaho. The west"s Ag website. .2012.
- Galian JJ, Vargas D, Foote P. Fungicide for control of sugar beet powdery mildew. University Idaho. [www.uiweb.uidaho.edu](http://www.uiweb.uidaho.edu). 2002.
- Hills FJ, Chiarappa L, Geng S. Powdery mildew of sugar beet.: Disease and crop loss assessment. Phytopathology 1980. 70: 680- 682.
- Hills FJ, Hall DH, Kontaxis DG. Effect of powdery mildew on sugar beet production. Plant Dis. Rep 1975. 59:513- 515
- Hoseinpor M, Soroshzadeh A, Alikhani M, Khoramian M, Taleghani D. Effect of two irrigation method (furrow and Drop) on quantity and quality of sugar beet in Khozestan. Journal of Sugar Beet. 2006. 22(1):39-57. (in Persian, abstract in English)

- Jahedi A, Norozi A, Hamdi F. Effect of irrigation different method and nitrogen on quantity and quality of sugar beet. Journal of Sugar Beet. 2012.28(1):43-53.
- Jehadakbar M, Ebrahimian H, Torabi M, Gohari J. Effect of low irrigation on quantity and quality of sugar beet in Esfahan. Journal of Sugar Beet. 2003. 19(1):81-93. (in Persian, abstract in English)
- Malekzadeh M, Orazizadeh M, Moaieri M, arbabtafti R. Effect of different system of irrigation on Agrotis Larva Karaderina and Proderina infected. Journal of Sugar Beet. 2009. 25(2):163-174. (in Persian, abstract in English)
- Miller DE, Arastad JS. Yield and sugar content of sugar beet as affected by deficit high frequency irrigation. Agronomy Journal .1976.68(23) :231-234.
- Noorjo A, Abasi F, Bagaeekia M, Jalali A. Effect of irrigation on quantity and quality of sugar beet in Miandoab. Journal of Sugar Beet. 2006. 22(2):53-66. (in Persian, abstract in English)
- Noorjo A, Bagaeekia M. Effect of cut irrigation in different step of sugar beet growth on quantity and quality of sugar beet. Journal of Sugar Beet. 2004.20(1):27-38. (in Persian, abstract in English)
- O' Connell J. Powdery Mildew Spred in Sugar Beet Field. Capital Press. The West's Ag Website. 2013.
- Parihar SB, Nam Singh S. Influence of irrigation methods of the aphid,*myzus persicae*(sulzer). Insect Environment. 1999.5(1): 25-26.
- Paulus AO, Harvey OA, Nelson J, Meek V. Fungicides and timing for control of sugar beet powdery mildew. Plant Disease Reporter.2001; 59: 516-517.
- Rezvani SM, Norozi A, Azari K. Effect of different irrigation method and rate nitrogen upon root yield and water use efficiency in sugar beet. Journal of Sugar Beet.2008.24(2):57-72. (in Persian, abstract in English)
- Safariantosi MJ, Talegani D, Khodadadi S, Beigpanah H, Dehganshoar M. Effect of Later irrigation on quantity and quality of two variety of sugar beet in Mashhad. Journal of Sugar Beet. 2006. 22(1):13-23. (in Persian, abstract in English)
- Yazdi Samadi B, Rezaee B, Aand Valizadeh M. Statistical Designs in Agricultural Research. Tehran University Press. 764 pp. .1997. (in Persian)
- Yusupov TYU, Markov FI, Polvoi VV. Irrigation- also a method of control. Zashchita-Rastenii. 1975.3: 20-21.
- Weltzien HC. *Erysiphe betae* (Vanha), the powdery mildew of beet. Phytopathology. 1963. 47: 123-123.
- Whitney ED. High level of resistance to powdery mildew in *Beta maritime*. Phytopathology. 1987. 77: 1723.