

غربال ژنوتیپ‌های چغندرقد نسبت به نماتد سیستی

Screening of sugar beet genotypes to beet cyst nematode

لیلا مطیعان^۱، مهدی نصر اصفهانی^۲ و مجید اولیا^۳

تاریخ دریافت: ۹۴/۵/۳۱؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۸/۲۲

ل. مطیعان، م.ن. اصفهانی و م. اولیا. ۱۳۹۵. غربال ژنوتیپ‌های چغندرقد نسبت به نماتد سیستی. چغندرقد، ۳۲(۲): ۱۰۷-۱۲۱

چکیده

نماتد سیستی (*Heterodera schachtii* Schmidt) یکی از عوامل محدودکننده رشد چغندرقد می‌باشد. با توجه به اهمیت و گستردگی این نماتد در ایران و به منظور جلوگیری از کاهش خسارت آن استفاده از ارقام مقاوم توصیه می‌شود. پیش نیاز تهیه رقم مقاوم، وجود ژنوتیپ‌های مقاوم است. در این تحقیق مقاومت ۷۰ ژنوتیپ چغندرقد در برابر نماتد سیستی به صورت طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سطح گلخانه و طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سطح مزرعه در اصفهان بررسی شد. تجزیه آماری داده‌های حاصل از آزمایشات گلخانه‌ای و مزرعه‌ای با نرم افزار SAS و گروه‌بندی خوشه‌ای آن‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نشان داد که ژنوتیپ‌های ۵۳ (SB-2)، ۶۹ (NE 0911)، ۱۶ (SB32-HSF-5) کمترین تعداد سیست و ژنوتیپ‌های ۱۶ (SB32-HSF-5) و ۵ (SB31-HSF-2) کمترین میزان تخم و لارو و فاکتور تولیدمثل را دارا بودند. دو لاین ۱۶ (SB32-HSF-5) و ۵ (SB31-HSF-2)، به عنوان مقاوم‌ترین ژنوتیپ‌ها شناخته شدند و در یک خوشه قرار گرفتند. به این ترتیب، می‌توان از ژنوتیپ‌های فوق‌الذکر در برنامه‌های اصلاحی به منظور تهیه رقم مقاوم بهره جست.

واژه‌های کلیدی: چغندرقد، نماتد سیستی، مقاومت، *Heterodera schachtii*

۱- کارشناس ارشد گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

۲- دانشیار بیماری شناسی گیاهی، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران * - نویسنده مسئول mne2011@gmail.com

۳- دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

مقدمه

نماتد سیستی چغندر قند (*Heterodera schachtii*) از مهم‌ترین عوامل خسارت‌زای این محصول به حساب می‌آید و در غالب مناطق چغندرکاری دنیا از جمله اروپا، آمریکای شمالی و آسیا یافت می‌شود (Draycott 2006). این نماتد در ایران برای اولین بار از مزارع تربت حیدریه استان خراسان جمع‌آوری و گزارش شد. پس از آن نماتد در مزارع چغندر قند مشهد، بیرجند، مرودشت، اراک و میاندوآب مشاهده شد. از آن زمان تاکنون، نماتد مذکور از اکثر مناطق استان‌های خراسان، فارس، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی گزارش گردیده است.

(Sharafeh and Teymoori 1980; Mehdikhani Moghadam et al. 1996; Kalali and ForivarMahin 1979; Parvizi 1989).

در استان اصفهان اولین مورد آلودگی به نماتد چغندر قند در یکی از مزارع چغندرکاری کمال آباد برخوار در سال ۱۳۶۴ مشاهده و گونه آن *H. schachtii* تشخیص داده شد (Akhyani et al. 1993). هم‌اکنون این نماتد در مزارع چغندر قند استان‌های خراسان، اصفهان، آذربایجان غربی و فارس خسارت وارد می‌کند (Jafarpoor and Mahdikhani 1997). خسارت محصول در قسمت‌هایی از مزرعه که آلودگی بالایی دارد به صورت پژمردگی در اوقات گرم روز نمایان می‌شود. در گیاهان مبتلا، ریشه اصلی کوتاه و ریشه‌های فرعی متعددی ایجاد می‌شود (Whitney and Duffus 1986). سیست‌های سفید یا شیری رنگ روی ریشه‌های فرعی با چشم غیر مسلح قابل رویت است. کاهش خلوص شربت خام با افزایش املاح معدنی در ریشه از دیگر مکانیسم‌های خسارت نماتد سیستی است که در نهایت منجر به کاهش کیفیت محصول می‌شود (Parvizi et al. 1993). روش‌های مختلفی از

جمله تناوب، کاشت زود هنگام، استفاده از نماتدکش، گیاهان تله و ارقام مقاوم در مبارزه با نماتد سیستی چغندر قند اعمال می‌گردد. تناوب سه تا هفت ساله با گیاهان غیر میزبان در کنترل این نماتد ضروری است (Steel and Savitsky 1981). ولی، هر روش مبارزه‌ای باید اقتصادی، قابل اجرا در سطح وسیع و با کمترین اثرات سوء زیست محیطی باشد. با وجود این، چغندر قند در مقایسه با سایر گیاهان زراعی از ظرفیت ژنتیکی محدودی برخوردار است. اغلب ژن‌های مقاومت در رابطه با تنش‌های زنده و غیرزنده در گونه‌های دیگر جنس *Beta* دیده شده است. انتقال ژن از منابع مقاومت به چغندر قند امری بس دشوار است، زیرا در برخی موارد یا تلاقی امکان‌پذیر نبوده و یا در صورت انجام تلاقی، نتاج حاصل از تلاقی عقیم بودند (Van Geyt et al. 1990). علاوه بر این در بسیاری موارد نیز محصول تلاقی و انتقال ژن، قابل عرضه به بازار نبوده زیرا به همراه ژن یا ژن‌های مورد نظر تعداد زیادی از صفات ناخواسته هم منتقل می‌گشت که حتی با چندین نسل تلاقی برگشتی اثرشان از جامعه حذف نمی‌شد (Van Geyt et al. 1990). در گروه چغندر قندهای زراعی، منبع مقاومتی وجود ندارد (Muller 1998). مقاومت به نماتد سیستی چغندر قند در گروه Procumbentes در گونه‌های *B. procumbens*، *B. webbiana* و *B. paterllaris* دیده شده است. در این گونه‌ها، مقاومت کامل و واکنش میزبان به صورت فوق حساسیت است (Muller 1998). ژن مقاوم به نماتد که روی کروموزوم شماره ۱ گونه *B. Procumbens* شناسایی گردید را *HSI^{Pro1}* نام نهادند. هم‌اکنون چند ژن مقاومت روی کروموزوم‌های مختلف گونه‌های وحشی گروه Procumbentes شناسایی شده‌اند (Mesbah 1997). مقاومت به صورت ناقص در گونه *B. vulgaris* ssp. *maritima* یافت شده است. این مقاومت به صورت چند ژنی و

مادری و در نهایت، تهیه رقم‌های مقاوم به وجود آمده است. غربال بوته‌ها در گلخانه، و استفاده از نشانگر مولکولی پیوسته با ژن *HS1^{Pro1}* از جمله تکنیک‌هایی است که در تهیه رقم‌های مقاوم مورد استفاده قرار گرفته است (Bani-Hashemi et al. 2013; Rahmani et al. 2004). ارزیابی مقاومت به نماتد در شرایط گلخانه با مایه‌زنی لاروهای سن دوم زنده و فعال انجام می‌شود. گیاهچه‌های چغندر قند با ۳۰۰ لارو سن دوم نماتد سیستمی چغندر قند مایه‌زنی و یک ماه بعد تعداد سیستم تشکیل شده روی ریشه مبنای مقایسه مقاومت بوته‌ها قرار گرفته است. معمولاً گیاهان دارای کمتر از ۱۰ عدد سیستم، مقاوم در نظر گرفته می‌شوند (Mesbah 1997).

در تحقیقات رحمانی و همکاران (Rahmani et al. 2006) ژنوتیپ‌های W-1009، W-1010 و رقم تجاری نماکیل به عنوان مقاوم تشخیص داده شدند که مبنای کار آن‌ها تعداد سیستم بوده که چندان ملاک عمل نیست. ژن مقاوم *HS1^{Pro1}* شناسایی و توالی‌یابی شده و پایداری آن در نسل‌های بعدی نیز به اثبات رسیده است (Capistrano 2013; Jajer 2010). هم‌چنین، کیاو و همکاران (Qiao et al. 2013) توانسته‌اند ژن مقاوم به نماتد سیستمی چغندر قند را از چغندر وحشی کلون نمایند. رحمانی و همکاران (2013) با استفاده از دو آغازگر OP-D-13 و Sat-121 نشانگرهای مولکولی مرتبط با ژن‌های مقاوم به نماتد سیستمی چغندر قند را شناسایی کرده‌اند. هم‌چنین، در کشور آلمان، ژن مقاوم *Hs1-2* در دو ژنوتیپ چغندر قند شناسایی و انتقال یافته است (Capistrano 2010). رحمانی و همکاران (2006) نیز بر اساس تعداد سیستم‌های تشکیل شده در ریشه و خاک، تعدادی ژنوتیپ مقاوم به نماتد سیستمی چغندر قند را در شرایط گلخانه معرفی نمودند، هم‌چنین اخیراً مؤسسه تحقیقات

مغلوب به ارث می‌رسد (Heijbroek 1977). از منبع مقاومت چند ژنی *B. vulgaris* ssp. *maritima* نیز برای تهیه رقم‌های مقاوم به نماتد سیستمی و ویروس ریزومانیا استفاده شده است (Lewellen 2006). در بین گونه‌های وحشی مقاوم به نماتد فقط *B. maritima* قادر به تلاقی با چغندر قند است و سایر گونه‌های وحشی تلاقی‌پذیری پایینی دارند. با وجود موانع بسیار زیاد در تلاقی بین گونه‌ای چغندر قند با گونه‌های وحشی که مقاومت کامل و تک ژنی دارند، بالاخره، گیاهان دیپلوئید زراعی با یک کروموزوم اضافی تهیه و از آن‌ها به عنوان منبع مقاومت در تهیه رقم‌های مقاوم به نماتد استفاده شد (Taleghani et al. 2010). در نهایت، ژنوتیپ B883 که دارای کروموزوم شماره ۱ از *B. procumbens* بود، مقاومت کامل به نماتد مولد سیستم از خود نشان داد (Taleghani et al. 2010). در ایران برای اولین بار دو منبع مقاوم به نماتد شامل W-1009 (منبع مقاوم تک ژنی حاصل از قطعه‌ای از کروموزوم *Beta procumbens* دارای ژن *HS1^{Pro1}*) و W-1010 (منبع مقاوم چند ژنی از منشا *Beta maritima*) با لاین‌های نر عقیم چند جوانه NB1 و C2 تلاقی و سپس با تک جوانه‌های نر عقیم ژنتیکی پرمحصول ۲۳۱ و ۲۶۱ چغندر قند تلاقی داده شدند تا مقاومت به آن‌ها منتقل شود. بعد از تلاقی مجدد توده‌های اولیه، مقاومت به نماتد به توده‌های تک جوانه و چند جوانه چغندر قند منتقل شد (Vahedi et al. 2008; Mahmoudi 2007). مؤسسه‌ی تحقیقات چغندر قند در چند سال اخیر با استفاده از منابع مقاوم گونه‌های وحشی و انتقال مقاومت از آن‌ها به چغندر قند، توده‌های اصلاحی مقاوم امیدبخش تهیه کرده است (Mesbah 1997). با وجود ژن‌های مقاومت و فراوانی آن‌ها در توده‌های چغندر قند و استفاده از تلاقی برگشتی و خودگشتی بوته‌های مقاوم، توده‌های در خور توجهی برای اصلاح گرده‌افشان، والد

خردکن خرد کرده و هر یک از گیاهچه‌های چغندر قند داخل گلدان‌ها از مرحله چهار برگی در چهار نوبت با ۱۰۰۰ لارو سن دوم فعال نماتد در مجموع ۴۰۰۰ لارو و تخم در چهار مرحله در فواصل زمانی هفت روزه مایه‌زنی شدند. دو ماه پس از آخرین مایه‌زنی فقط تعداد سیست‌های تشکیل شده روی ریشه و داخل خاک گلدان‌ها مورد شمارش قرار گرفتند. از هر نمونه به صورت جداگانه به میزان ۲۰۰ گرم خاک برداشته و سیست‌های آن به روش فنویک استخراج شد. سیست‌ها توسط سیست خردکن خرد شده و تخم و لارو آن‌ها آزاد گردید. پس از آن حجم سوسپانسیون به ۲۰۰ میلی‌لیتر رسید و شمارش جمعیت نهایی لارو و تخم نماتد توسط اسلاید انجام و در گرم خاک هر گلدان در سه تکرار محاسبه شد.

ب- مطالعات مزرعه‌ای

در ابتدای آزمایش، مزرعه‌ای با سابقه کشت چغندر قند و آلودگی به نماتد سیستی در منطقه یقه‌هاب خوراسگان در اطراف کارخانه‌ی قند اصفهان انتخاب گردید. گونه مورد نظر (*H. schachtii*) پس از جداسازی از خاک و ریشه چغندر قند و تهیه برش از مخروط انتهایی بدن سیست‌ها و بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتريکی آن‌ها و لاروهای سن دوم با استفاده از کلیدهای مول موی و مرگان‌گلدن شناسایی گردید. برجستگی تاول مانند نزدیک مخرج بزرگ و شبیه دندان آسیاب، پهنای هاله شفاف دور پنجره‌های خروجی لارو که نصف عرض پنجره‌هاست از *H. schachtii* مشخصاتی است که گونه را از گونه‌های مشابه متمایز می‌کند. زمین انتخابی، ۶۵۰ متر بود. برای تعیین جمعیت اولیه‌ی (Pi) نماتد سیستی چغندر قند در خاک، ابتدا یک نمونه مرکب از عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری جمع‌آوری و پس از مخلوط کردن آن‌ها، یک نمونه‌ی مرکب دو کیلوگرمی تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد.

اصلاح و تهیه بذر چغندر قند دو رقم متحمل به نماتد سیستی به نامهای آریا و شکوفا معرفی کرده است.

هدف از این مطالعه بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف چغندر قند نسبت به نماتد سیستی در شرایط گلخانه و مزرعه بوده است.

مواد و روش‌ها

به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های چغندر قند نسبت به نماتد سیستی، در این تحقیق تعداد ۷۰ ژنوتیپ چغندر قند در سه تکرار به صورت طرح کامل تصادفی در گلخانه و طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سطح مزرعه بررسی شدند.

الف- مطالعات گلخانه‌ای

این بررسی‌ها در گلخانه‌ی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام گرفت. از گلدان‌های یک کیلوگرمی استفاده گردید، که با خاک استریل با ترکیب خاک و ماسه به میزان ۱:۱ پر شدند، در هر گلدان چهار بوته نگهداری شد. به منظور تهیه زادمایه نماتد، مزرعه‌ای با سابقه آلودگی به نماتد در منطقه خوراسگان در اطراف کارخانه قند اصفهان انتخاب و مزرعه آلوده به چهار بخش فرضی تقسیم شد. از هر بخش نمونه‌های مرکب خاک از عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری خاک تهیه شد. مقدار زیادی خاک (که در هوای معمولی خشک شده بود) با استفاده از روش فنویک (Fenwick 1940) و الک ۶۰ مش (۲۵۰ میکرون) شسته شد و سیست‌های موجود در خاک با استفاده از نوارهای کاغذی مخصوص و الک جدا گردید. لازم به ذکر است که سیست‌های جدا شده بر اساس شاخص‌های ریخت شناسی و اندازه سیست فقط سیست‌های *Heterodera schachtii* جدا شد. جهت تهیه لارو نماتد، سیست‌های جدا شده را با استفاده از سیست

در شاهد حساس، اگر متوسط تعداد سیست کمتر از ۴۰ باشد آزمایش حذف می‌شود.

اگر بین ۸۰-۴۰ باشد، کیفیت اجرای آزمایش متوسط و آزمایش ادامه می‌یابد. گیاهان با تعداد سیست کمتر از ۸-۴ مقاوم. اگر بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ سیست باشد کیفیت اجرای آزمایش خوب و آزمایش ادامه می‌یابد. گیاهان با تعداد سیست کمتر از ۱۰ تا ۱۵ مقاوم.

اگر بیش از ۱۲۰ سیست باشد کیفیت اجرای آزمایش عالی و آزمایش ادامه می‌یابد. گیاهان با تعداد سیست کمتر از ۲۵ تا ۳۰ مقاوم

ولی، جهت سهولت و نتیجه قاطع‌تر تغییراتی به شرح ذیل در جدول ۱ در آن ایجاد و ژنوتیپ‌ها ارزیابی گردید. در نهایت فاکتور تولید مثل طبق روش اوستن برینک (Oostenbrink 1966) بر اساس فرمول $RF = Pf/Pi$ محاسبه گردید و مبنای مقایسه ارقام قرار گرفت (Doney and Whitney 1969).

جدول ۱ ارزیابی مقاومت بر اساس شاخص تعداد تخم و لارو

شاخص تعداد تخم و لارو	درجه مقاومت
۰-۵	مقاوم
۵-۱۰	نسبتاً مقاوم
۱۰-۲۵	متحمل
۲۵-۵۰	نسبتاً حساس
بیشتر از ۵۰	حساس

تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های حاصل از بررسی‌های گلخانه و مزرعه با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میانگین‌ها

سپس، ۲۰۰ گرم از خاک هر نمونه در هوای معمولی خشک و سیست‌های موجود در آن با روش فنویک استخراج شد (Fenwick 1940). کلیه‌ی سیست‌های پر (حاوی لارو و تخم سن دوم) با بررسی در زیر استرئو میکروسکوپ جدا و پس از خرد کردن آن‌ها با سیست خردکن، جمعیت اولیه‌ی لارو و تخم سن دوم موجود در ۲۰۰ گرم خاک و در نهایت در یک گرم خاک به میزان ۴/۳۸ عدد محاسبه شد. جهت بررسی میزان حساسیت و مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف چغندر قند به نماتد سیستی، ژنوتیپ‌های مورد نظر به صورت خطی در اسفند ماه ۱۳۹۱ در خاک آلوده مزرعه کشت شدند. زمین مورد آزمون به ۲۱۰ خط تقسیم شد که طول هر خط شش متر، فواصل بین بذور کاشته شده نیم متر و فاصله بین هر پشته با پشته بعدی ۳۰ سانتی‌متر بود. که ژنوتیپ ۵۶ به عنوان شاهد مقاوم و ژنوتیپ ۷۰ شاهد حساس در نظر گرفته شد. عملیات برداشت در آبان ماه ۱۳۹۲ صورت پذیرفت. جهت تعیین جمعیت نهایی ۲۱۰ نمونه، پس از خارج کردن گیاهان از زمین، مقدار ۲۰۰ گرم از خاک اطراف بوته برداشته شده و پس از مخلوط کردن به صورت یک نمونه واحد به آزمایشگاه منتقل شد. از هر نمونه به صورت جداگانه به میزان ۲۰۰ گرم خاک برداشته و سیست‌های آن به روش فنویک استخراج شد. سیست‌ها توسط سیست خردکن خرد شده و تخم و لارو آن‌ها آزاد گردید. پس از آن حجم سوسپانسیون به ۲۰۰ میلی‌لیتر رسید و شمارش تخم و لارو در سه تکرار صورت گرفت. در نهایت جمعیت نهایی لارو و تخم موجود در هر گرم خاک مزرعه مربوطه محاسبه شد.

برای ارزیابی ریشه‌های ۱۶ گیاه از هر ژنوتیپ‌های چغندر قند مورد آزمون، از روش ذیل استفاده گردید:

(P<0/01). سپس ژنوتیپ‌های ۵۰ (NE-0910-HSF-43) و ۶۳ (F-20603) به طور مشترک با ۱/۴۹ و ژنوتیپ ۱۹ (SB32-HSF-10) با ۱/۳۶ در گروه آماری دیگری قرار گرفتند. همچنین، ژنوتیپ‌های ۵۳ (SB-2)، ۶۹ (NE 0911) و ۵۴ (SB-SB) (3) به طور مشترک با ۰/۱۵ سیستم، کمترین تعداد سیستم را در این بررسی در شرایط گلخانه داشتند. نتایج حاصل از ارزیابی گلخانه نشان داد که بیشترین تخم و لارو و فاکتور تولیدمثل مربوط به ژنوتیپ ۳۵ (SB35) با ۱۰۹/۳۳ و ۲۷/۳۳ عدد می‌باشد. سپس رقم پالما با ۱۰۴/۵۵ و ۲۶/۱۴ عدد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثل در گروه دوم قرار گرفت. پس از این دو، ژنوتیپ ۱۹ (SB32-HSF-10) و رقم گیادا در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین، کمترین میزان تخم و لارو و فاکتور تولیدمثل مربوط به ژنوتیپ ۱۶ (SB32-HSF-5) با ۲/۵۰ و ۰/۶۳ عدد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثل می‌باشد. سپس ژنوتیپ‌های ۵ (SB31-HSF-2)، ۳ (SB27-HSF-10)، رقم توکان و کاکتوس کمترین تعداد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثل را به خود اختصاص دادند (جدول ۳).

با آزمون چنددامنه‌ای دانکن مقایسه شدند. برای دسته‌بندی ژنوتیپ‌ها فقط بر اساس تعداد تخم و لارو به روش تجزیه خوشه‌ای از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.

نتایج

نتایج حاصل از ارزیابی گلخانه و مزرعه و همچنین ارزیابی مرکب نشان داد که تعدادی از ژنوتیپ‌ها از نظر صفات فوق اختلاف معنی‌داری با یکدیگر دارند. آزمون چنددامنه‌ای دانکن در سطح یک درصد ژنوتیپ‌ها را در پنج گروه مقاوم، نسبتاً مقاوم، متحمل، نسبتاً حساس و حساس دسته‌بندی کرد.

الف- نتایج حاصل از ارزیابی گلخانه

نتایج حاصله از داده‌های گلخانه در خصوص میانگین تعداد سیستم روی ژنوتیپ‌های مختلف نشان داد که تفاوت معنی‌دار در بین ژنوتیپ‌ها وجود دارد (جدول ۲). در این خصوص ژنوتیپ ۳۵ (SB35) با بیشترین تعداد سیستم (۲/۳۴ عدد) نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌داری نشان داد

جدول ۲ خلاصه تجزیه واریانس شاخص‌های ارزیابی مقاومت به نماتد سیستمی روی ژنوتیپ‌های چغندر قند در شرایط گلخانه و مزرعه

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات			
		تعداد تخم و لارو		فاکتور تولیدمثل	
		گلخانه	مزرعه	گلخانه	مزرعه
تکرار	۲	۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۲ ^{ns}	۴۶/۴۱	۱۴/۵۸
تیمار	۶۹	۰/۴۷	۰/۵۷	۲۰۴۷/۰۳	۱۵۰/۷۰
خطا	۱۳۸	۰/۰۹	۰/۰۱	۳/۱۶	۰/۲۷
CV		۱۵/۴۱	۱۴/۱۹	۷/۴۰	۷/۴۰

ns و * * به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک در صد

جدول ۳ میانگین تعداد سیست، تخم و لارو و فاکتور تولید مثل نماد *Heterodera schachtii* روی ژنوتیپ‌های چغندر قند در شرایط گلخانه و مزرعه

ردیف	ژنوتیپ	اسامی ژنوتیپ‌ها	تعداد سیست		تعداد تخم و لارو		فاکتور تولیدمثل	
			گلخانه	مزرعه	گلخانه	مزرعه	گلخانه	مزرعه
۱	۳۵	SB35	۲/۳۴a	۲/۶۲a	۱۰۹/۳۲a+	۱۲۳/۱۸b+	۲۷/۲۳a	۲۸/۲۳ b
۲	۶۲	Palma	۱/۱۲k	۱/۲۷h	۱۰۴/۵۵b+	۱۱۸/۶۷c+	۲۶/۱۴b	۲۷/۲۲ b
۳	۱۹	SB32-HSF-10	۱/۳۶g	۱/۴۹f	۹۸c+	۱۴۸a+	۲۴/۵c	۲۳/۸۷ a
۴	۶۳	Giada	۱/۴۹f	۱/۵۸ef	۸۷/۸۵d+	۱۰۱/۰۳d+	۲۱/۹۶d	۲۳/۱۵ c
۵	۲۳	SB35-HSF-8	-/۸۶p	-/۹۶n	۷۵/۶۱e+	۸۵/۳۱e+	۱۸/۹e	۱۹/۵۶ d
۶	۳۹	S1-89134	-/۹۷m	۱/۰۱l	۷۴/۶e+	۸۱/۵۱f+	۱۸/۶۵e	۱۸/۶۹ d
۷	۷۰	191	۱/۱۲k	۱/۱۵j	۷۲/۲۳e+	۸۳/۲۳ef+	۱۸/۰۸e	۱۹/۰۸ d
۸	۵۰	NE-0910-HSF-43	۱/۴۹f	۱/۶e	۷۶/۶۲f+	۵۸/۶۹g+	۱۵/۹۲f	۱۵/۹۵ e
۹	۴۱	SB28-HSF-14	-/۷۲q	-/۰۸z	۶۲/۲۶f+	۷۱/۲۸g+	۱۵/۱۲f	۱۶/۳۶ e
۱۰	۳۴	SB33	۱/۱k	۱/۲۷gh	۴۹/۶۵g++	۵۸/۲۲h+	۱۲/۴۱g	۱۳/۳۰ f
۱۱	۲	SB27-HSF-2	۱/۲۷h	۱/۶e	۴۹/۵۵g++	۵۸/۲۱h+	۱۲/۳۹g	۱۳/۲۸ f
۱۲	۲۴	261*(20314*W-1009)- F2-S1-11-S1-3	-/۷۲q	-/۸۱p	۴۳/۶۴h++	۵۵/۱۳h+	۱۰/۹۱h	۱۲/۶۴ f
۱۳	۶۷	SB30	-/۶s	-/۷۲q	۳۵/۸۱i++	۵۰/۴۲i++	۸/۹۱i	۹/۹۹ g
۱۴	۵۵	SB-4	-/۵۷t	-/۶۳s	۳۴/۲۹j++	۳۹/۷۱j++	۸/۵۵j	۹/۱۴ g
۱۵	۴۷	SB34-HSF-28	۱/۱۲k	۱/۳۱h	۳۲/۲۶j++	۳۸/۷۱j++	۸/۳۴j	۸/۹۲ g
۱۶	۴۲	SB34-HSF-1	-/۶s	-/۶۵qs	۳۲/۷j++	۳۹/۲۹j++	۸/۱۸k	۹/۰۱ g
۱۷	۴۳	SB34-HSF-2	-/۴۸u	-/۵۶st	۳۱/۹۲k++	۳۸/۲۱j++	۷/۹۸۱l	۸/۷۸ g
۱۸	۱۳	SB32-HSF-2	-/۵۷t	-/۵۹st	۲۹/۹۱l++	۳۳/۱۶k++	۷/۴۹۱l	۷/۶۱ h
۱۹	۳۶	(7112*SB36)*SB31	-/۸۵np	-/۸۹np	۲۹/۵۷l++	۳۳/۳۵k++	۷/۳۹۱l	۷/۶۴ h
۲۰	۳۳	SB32	-/۸۷np	۱l	۲۷/۸۷m++	۳۲/۴۸k++	۶/۹۷m	۷/۴۵ i
۲۱	۵۱	NE-0910-HSF-46	-/۹۶n	۱/۰۱l	۳۷/۷۲m++	۳۰/۲۲k++	۶/۹۲n	۷/۴ i
۲۲	۴۸	NE-0910-HSF-21	-/۵۸st	-/۶۸qs	۲۴/۱n***	۲۲/۹۹k++	۶/۰۲o	۶/۷۸ i
۲۳	۲۲	SB35-HSF-4	-/۷۶pq	-/۸۷np	۲۲/۸۲n***	۳۱/۳۹k++	۵/۹۶o	۷/۱ i
۲۴	۴۰	SB28-HSF-2	-/۶u	-/۴۵u	۲۳/۷۲n***	۲۸/۲۶j++	۵/۹۲o	۶/۴۸ j
۲۵	۳۷	(7112*SB36)*SB32	-/۶۷qs	-/۷۶pq	۲۰/۷۴o***	۵۰/۲۶m***	۵/۱۸p	۵/۶۵ k
۲۶	۱۵	SB32-HSF-4	-/۸۶p	-/۹۶n	۱۷/۸۲p***	۲۰/۷۱n***	۴/۴۵p	۴/۷۵ m
۲۷	۲۱	SB35-HSF-1	-/۵۷t	-/۵۷st	۱۷/۲۷q***	۱۸/۵۹o***	۴/۲۳pr	۴/۲۷ o
۲۸	۵۹	Saccara	-/۸۶p	-/۹۶n	۱۶/۱۵r***	۲۲/۷۹m***	۴/۰۴q	۵/۲۱ l
۲۹	۳۲	SB31	-/۳۳x	-/۳۸ux	۱۶/۰۹s***	۱۸/۲۰r***	۴/۰۲q	۴/۲ o
۳۰	۱۰	SB31-HSF-9	-/۶۲s	-/۷۲q	۱۵/۹۴s***	۱۸/۹۰***	۳/۹۹r	۴/۳۴ o
۳۱	۴۶	SB34-HSF-13	-/۳۱x	-/۳۸ux	۱۵/۷۲t***	۱۸/۲۸o***	۳/۹۲r	۴/۱۹ o
۳۲	۱۸	SB32-HSF-9	۱/۳۱h	۱/۳۸g	۱۵/۱۴t***	۲۳/۲۱m***	۳/۷۸s	۵/۳۲ l
۳۳	۶۸	SB34	-/۳۱x	-/۶u	۱۴/۷۵t***	۲۰/۰۶n***	۳/۶۹t	۴/۵۹ kn
۳۴	۱۲	SB32-HSF-1	-/۱۹z	-/۲۴y	۱۴/۵۸t***	۱۷/۸۵o***	۳/۶۵t	۴/۰۹ p
۳۵	۱۷	SB32-HSF-8	-/۲۸xy	-/۳۳x	۱۲/۶۷t***	۱۶/۱۲p***	۳/۴۲u	۳/۶۹ q
۳۶	۲۷	261*(20314*W-1009)- F2-S1-11-S1-20	-/۳۲y	-/۲۸xy	۱۲/۱۱u***	۱۵/۱۹q***	۳/۲۸v	۳/۴۸ r
۳۷	۱۱	SB31-HSF-10	-/۳x	-/۳۴x	۱۲/۹۵t***	۱۵/۲۲q***	۳/۲۴v	۳/۴۹ r
۳۸	۲۵	261*(20314*W-1009)- F2-S1-11-S1-11	-/۶۷qs	-/۷۲q	۱۲/۱۱v***	۱۴/۶۶t***	۳/۰۳w	۳/۳۶ s
۳۹	۵۳	SB-2	-/۱۵z	-/۱۹z	۱۱/۸۹v***	۱۵/۷۱q***	۲/۹۷w	۳/۶۱ q
۴۰	۵۴	SB-3	-/۱۵z	-/۲۱y	۱۱/۸۹v***	۱۶/۷۶p***	۲/۹۷w	۳/۸۴ mp

۴۱	۶۵	SB28	-.۶۸s	-.۷۳q	۱۱/۸۷***	۱۶/۶۲p***	۲/۹۷w	۳/۸۱ mp
۴۲	۶۶	SB29	-.۶۶qs	-.۷۵pq	۱۱/۶۶***	۱۶/۱۶p***	۲/۹۲x	۳/۷۱ q
۴۳	۴۹	NE-0910-HSF-38	-.۴۸u	-.۵۵t	۱۱/۶۵***	۱۵/۱۱q***	۲/۹۱x	۳/۴۶ r
۴۴	۵۷	Fernando	-.۶۸s	-.۶۹qs	۱۱/۵۹***	۱۷/۵۸o***	۲/۹x	۴/۰۵ p
۴۵	۷	SB31-HSF-6	-.۴۷u	-.۴۷tu	۱۱/۲۴***	۱۳/۲۴t***	۲/۸۱x	۳/۰۴ t
۴۶	۱۴	SB32-HSF-3	-.۷۵pq	-.۸۴p	۹/۱۶x**	۱۳/۹۲s***	۲/۲۹xy	۳/۲ t
۴۷	۲۸	(7112*SB36)*S1-3	-.۸۵np	۱/۰۲l	۸/۲۴x**	۱۲/۱۲u***	۲/۲۴xy	۲/۷۸ u
۴۸	۶۹	NE 0911	-.۱۵z	-.۱۹z	۸/۲۴x**	۱۳/۲۲t***	۲/۰۹xy	۳/۰۴ t
۴۹	۴۴	SB34-HSF-5	-.۲۷y	-.۲۶xy	۷/۸۱y**	۹/۲۷**	۱/۹۵y	۲/۱۴ u
۵۰	۴	SB31-HSF-1	-.۷۷pq	-.۸۹np	۷/۴۲xy**	۸/۲۹wx**	۱/۸۵y	۱/۹۱ v
۵۱	۳۱	(7112*SB36)*S1-20	-.۴۷tu	-.۵۶st	۷/۰۲xy**	۸/۱۹wx**	۱/۷۶y	۱/۸۷ w
۵۲	۳۰	(7112*SB36)*S1-16	-.۴۷u	-.۵۳t	۶/۹۵y**	۹/۹۶w**	۱/۷۴y	۲/۲۹ u
۵۳	۶۴	SB26	-.۵۹st	-.۶۹qs	۶/۶۴y**	۱۰/۷۵v***	۱/۶۶y	۲/۴۶ u
۵۴	۱	SB27-HSF-1	-.۳x	-.۳۵ux	۶/۱۵y**	۷/۴۲x**	۱/۵۴y	۱/۷ w
۵۵	۲۶	261*(20314*W-1009)- F2-S1-11-S1-16	-.۶۷qs	-.۷۵pq	۵/۸۹yz**	۸/۴۷v**	۱/۴۷yz	۱/۹۵ l
۵۶	۶	SB31-HSF-5	-.۲۸xy	-.۳۳x	۵/۸۵yz**	۷/۲۷x**	۱/۴۷yz	۱/۶۷ wx
۵۷	۵۸	Sanetta	-.۲۶xy	-.۳۳x	۵/۸۴yz**	۸/۸۷**	۱/۴۶yz	۲/۰۱ v
۵۸	۹	SB31-HSF-8	-.۲x	-.۳۶ux	۵/۰۹yz**	۶/۶۹y**	۱/۲۸yz	۱/۵۴ wx
۵۹	۳۸	S1-89074	-.۳۱x	-.۳۴x	۴/۹۹z*	۶/۳۲y**	۱/۲۵yz	۱/۴۵ x
۶۰	۴۵	SB34-HSF-10	-.۶۲s	-.۷۲q	۴/۷۱z*	۷/۶۴x**	۱/۱۸yz	۱/۷۵ w
۶۱	۸	SB31-HSF-7	-.۱۹z	-.۲۷y	۴/۲۱z*	۵/۵۹yz**	۱/۰۵z	۱/۲۸ xy
۶۲	۲۰	SB33-HSF-1	-.۳۶ux	-.۴۲u	۳/۹۷z*	۶/۱۱y**	۱z	۱/۴ x
۶۳	۵۲	SB-1	-.۴۷u	-.۵۱t	۳/۹۱z*	۶/۲۸y**	۰/۹۸z	۱/۴۴ x
۶۴	۵۶	Pauletta	-.۲۲y	-.۲۹xy	۳/۷۸z*	۷/۷۳x**	۰/۹۴z	۱/۷۷ w
۶۵	۲۹	(7112*SB36)*S1-11	-.۶۲s	-.۴۸u	۳/۷۵z*	۵/۳۲yz**	۰/۹۴z	۱/۹۵ l
۶۶	۶۱	Cactus	-.۱۹z	-.۲۸xy	۳/۷۴z*	۵/۵۷yz**	۰/۹۴z	۱/۲۸ xy
۶۷	۶۰	Toucan	-.۳۸ux	-.۴۱u	۳/۷۴z*	۳/۵۶z*	۰/۹۳z	۰/۸۲ y
۶۸	۳	SB27-HSF-10	-.۲۵xy	-.۲۹xy	۳/۵۳ac*	۴/۲۷z*	۰/۸۸d	۰/۹۷ y
۶۹	۵	SB31-HSF-2	-.۳۶ux	-.۷۲q	۳/۱۹bc*	۴/۲۷z*	۰/۸d	۰/۹۸ y
۷۰	۱۶	SB32-HSF-5	-.۱۶z	۰/۲y	۲/۵c*	۳/۲۱z*	۰/۶۳d	۰/۷۴ z

+ حساس

++ نسبتاً حساس

*** متحمل

** نسبتاً مقاوم

* مقاوم

- اعداد با حروف مشابه از نظر آماری فاقد اثر معنی دار هستند.

ب- نتایج حاصل از ارزیابی مزرعه

نتایج حاصله از داده‌های مزرعه در خصوص میانگین تعداد سیست روی ژنوتیپ‌های مختلف مورد بررسی نشان داد که تفاوت معنی‌دار در بین ژنوتیپ‌ها وجود دارد. در این خصوص ژنوتیپ ۳۵ (SB35) با بیشترین تعداد سیست در گرم خاک یعنی ۲/۶۲ عدد در رأس قرار گرفت که در یک گروه مجزا و با اثر معنی‌دار واقع شده است. سپس ژنوتیپ‌های ۲ (SB27-HSF-2)، ۵۰ (NE-0910-HSF-43) به طور مشترک با ۱/۶۰ و رقم پالما با ۱/۵۸ در

یک گروه آماری جدا قرار گرفتند. همچنین، ژنوتیپ ۵۳ (SB-2) و ۶۹ (NE 0911) به طور مشترک با ۰/۱۹ عدد سیست و ژنوتیپ ۱۶ (SB32-HSF-5) با ۰/۲۰ کمترین تعداد سیست را در این بررسی در شرایط مزرعه داشتند. در این ارزیابی از لحاظ تعداد تخم و لارو و فاکتور تولیدمثل، ژنوتیپ ۱۹ (SB32-HSF-10) با بیشترین تعداد تخم و لارو و فاکتور تولیدمثل یعنی ۱۴۸ و ۳۳/۸۷ عدد در رأس قرار گرفت. سپس ژنوتیپ ۳۵ (SB35) با ۱۳۳/۱۸ و ۲۸/۲۳ عدد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثل در ردیف دوم و پس از

این دو، ژنوتیپ ۶۲ (F-20583) و ۶۳ (F-20603) به ترتیب با ۱۸/۶۷ و ۲۷/۲۲، ۱۰/۱۰۳ و ۲۳/۱۵ عدد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثل در ردیف بعدی قرار گرفتند. ژنوتیپ ۱۶ (SB32-HSF-5) با ۳/۲۱ و ۰/۷۴ عدد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثل و سپس رقم توکان، ژنوتیپ‌های ۳ (SB27-) مزرعه داشته‌اند (جدول ۴ و ۵).

جدول ۴ خلاصه تجزیه واریانس مرکب تعداد سیست، تخم و لارو و فاکتور تولید مثل نماتد سیستی روی ژنوتیپ‌های چغندر قند در شرایط مرکب گلخانه و مزرعه

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات تعداد سیست	میانگین مربعات تعداد تخم و لارو	میانگین مربعات فاکتور تولیدمثل
مکان	۱	۰/۷۹**	۲۷۴۳/۹۱**	۴۷/۴۱**
تکرار	۴	۰/۰۰۳ ^{ns}	۲۵/۶۷**	۷/۸۴**
تیمار	۶۹	۱/۰۴**	۴۸۵/۵۱**	۲۷۶/۷۲**
مکان * تیمار	۶۹	۰/۰۰۴ ^{ns}	۵۹/۹۶**	۱/۸۹**
خطا	۲۷۶	۰/۰۰۹	۲/۹۳	۰/۲۳
CV		۱۴/۷۶	۶/۴۳	۷/۶۹

ns و ** به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد

جدول ۵ میانگین تعداد سیست، تخم و لارو و فاکتور تولید مثل نماتد *Heterodera schachtii* روی ژنوتیپ‌های چغندر قند در شرایط مرکب گلخانه و مزرعه.

ردیف	ژنوتیپ	اسامی ژنوتیپ‌ها	تعداد سیست	تعداد لارو و تخم	فاکتور تولیدمثل
۱	۱۹	SB32-HSF-10	۱/۴۳ g	۲۹/۱۹ a	۱۲۳ a+
۲	۳۵	SB35	۲/۴۸ a	۲۷/۷۸ b	۱۱۶/۲۶ b+
۳	۶۲	Palma	۱/۲۰ j	۲۶/۶۸ c	۱۱۱/۶۱ c+
۴	۶۳	Giada	۱/۵۴ f	۲۲/۵۶ d	۹۴/۴۴ d+
۵	۲۳	SB35-HSF-8	۰/۸۹ np	۱۹/۲۳ e	۸۰/۴۶ e+
۶	۳۹	191	۰/۹۷ l	۱۸/۶۷ e	۷۸/۰۶ ef+
۷	۷۰	S1-89134	۱/۱۴ k	۱۸/۵۸ e	۷۷/۷۸ f+
۸	۴۱	SB28-HSF-14	۰/۷۷ pq	۱۶/۰۹ f	۶۷/۳۲ g+
۹	۵۰	NE-0910-HSF-43	۱/۵۴ f	۱۵/۹۴ f	۶۶/۶۶ g+
۱۰	۳۴	SB33	۱/۱۹ k	۱۲/۸۶ g	۵۳/۹۲ h+
۱۱	۲	SB27-HSF-2	۱/۴۴ g	۱۲/۸۳ g	۵۳/۸۸ h+
۱۲	۲۴	261*(20314*W-1009)-F2-S1-11-S1-3	۰/۷۷ pq	۱۱/۷۸ h	۴۹/۳۹ I++
۱۳	۶۷	SB30	۰/۶۶ qs	۹/۴۸ i	۳۹/۶۹ j++
۱۴	۵۵	SB-4	۰/۵۷ st	۸/۸۶ j	۳۷/۰۴ k++
۱۵	۴۷	SB34-HSF-28	۱/۲۲ j	۸/۶۳ j	۳۶/۰۷ k++
۱۶	۴۲	SB34-HSF-1	۰/۶۳ s	۸/۶۰ j	۳۵/۹۹ k++
۱۷	۴۳	SB34-HSF-2	۰/۵۲ t	۸/۳۸ j	۳۵/۰۹ k++
۱۸	۱۳	(7112*SB36)*SB31	۰/۵۶ st	۷/۵۵ k	۳۱/۵۷ I++
۱۹	۳۶	SB32-HSF-2	۰/۸۷ pq	۷/۵۲ k	۳۱/۴۶ I++
۲۰	۳۳	SB32	۰/۹۴ n	۷/۲۱ l	۳۰/۱۸ I++
۲۱	۵۱	NE-0910-HSF-46	۰/۹۷ l	۷/۱۷ m	۳۰/۰۱ lm++
۲۲	۲۲	SB35-HSF-4	۰/۸۲ p	۶/۵۷ mn	۲۷/۶۱ n++

۲۳	۴۸	NE-0910-HSF-21	./۶۳ s	۶/۴۵ mn	۲۷/۰۵ n+++
۲۴	۴۰	SB28-HSF-2	./۴۳ u	۶/۲۱ n	۲۵/۹۸ n+++
۲۵	۳۷	(7112*SB36)*SB32	./۷۲ q	۵/۴۲ o	۲۲/۶۲ o***
۲۶	۵۹	Saccara	./۹۰ n	۴/۶۳ p	۱۹/۴۷ p***
۲۷	۱۵	SB32-HSF-4	./۸۹ np	۴/۶۰ p	۱۹/۲۷ p***
۲۸	۱۸	SB32-HSF-9	۱/۳۴ h	۴/۵۵ q	۱۹/۱۷ p***
۲۹	۲۱	SB35-HSF-1	./۵۴ t	۴/۳۰ q	۱۷/۹۲ q***
۳۰	۱۰	SB31-HSF-9	./۶۸ qs	۴/۱۶ r	۱۷/۴۲ r***
۳۱	۶۸	SB34	./۳۶ ux	۴/۱۴ r	۱۷/۴۱ r***
۳۲	۳۲	SB31	./۳۶ ux	۴/۱۱ s	۱۷/۱۹ r***
۳۳	۴۶	SB34-HSF-13	./۳۵ ux	۴/۰۶ t	۱۷/۰۱ s***
۳۴	۱۲	SB32-HSF-1	./۲۲ y	۳/۸۷ u	۱۶/۲۱ st***
۳۵	۱۷	SB32-HSF-8	./۳۱ x	۳/۵۶ v	۱۴/۹۰ t***
۳۶	۵۷	SB-3	./۶۵ qs	۳/۴۸ v	۱۴/۵۹ t***
۳۷	۵۴	SB28	./۱۸ z	۳/۴۱ w	۱۴/۳۲ tu***
۳۸	۶۵	SB29	./۶۷ qs	۳/۳۹	۱۴/۲۵ tu***
۳۹	۲۷	261*(20314*W-1009)-F2-S1-11-S1-20	./۲۷ xy	۳/۳۸ w	۱۴/۱۵ tu***
۴۰	۱۱	SB31-HSF-10	./۳۲ x	۳/۳۶ w	۱۴/۰۹ tu***
۴۱	۶۶	SB29	./۷۰ q	۳/۳۱ w	۱۳/۹۱ u***
۴۲	۵۳	SB-2	./۱۷ z	۳/۲۹ w	۱۳/۸۰ u***
۴۳	۲۵	261*(20314*W-1009)-F2-S1-11-S1-11	./۷۰ q	۳/۲۰ w	۱۳/۳۹ uv***
۴۴	۴۹	NE-0910-HSF-38	./۵۱ t	۳/۱۹ x	۱۳/۳۸ uv***
۴۵	۷	SB31-HSF-6	./۴۴ u	۲/۹۳ x	۱۲/۲۴ v***
۴۶	۱۴	SB32-HSF-3	./۷۹ pq	۲/۷۴ x	۱۱/۵۴ v***
۴۷	۶۹	NE 0911	./۱۷ jk	۲/۵۶ x	۱۰/۷۹ v***
۴۸	۲۸	(7112*SB36)*S1-3	./۹۴ n	۲/۵۱ xy	۱۰/۵۴ v***
۴۹	۶۴	NE-0910-HSF-38	./۶۴ s	۲/۰۶ xy	۸/۶۹ w**
۵۰	۴۴	(7112*SB36)*S1-16	./۲۳ y	۲/۰۵ xy	۸/۵۶ w**
۵۱	۳۰	(7112*SB36)*S1-16	./۴۸ t	۲/۰۱ xy	۸/۴۶ w**
۵۲	۴	SB31-HSF-1	./۸۳ p	۱/۸۸ y	۷/۸۶ w**
۵۳	۳۱	(7112*SB36)*S1-20	./۵۱ t	۱/۸۱ y	۷/۶۱ w**
۵۴	۵۸	Saccara	./۳۰ x	۱/۷۴ y	۷/۳۲ x**
۵۵	۲۶	261*(20314*W-1009)-F2-S1-11-S1-16	./۷۱ q	۱/۷۱ y	۷/۱۸ x**
۵۶	۱	SB27-HSF-1	./۳۳ x	۱/۶۲ y	۶/۷۹ x**
۵۷	۶	SB31-HSF-5	./۳۰ x	۱/۵۷ y	۶/۵۶ xy**
۵۸	۴۵	SB34-HSF-10	./۶۸ qs	۱/۴۶ yz	۶/۱۷ xy**
۵۹	۹	SB31-HSF-8	./۳۳ x	۱/۴۱ yz	۵/۸۷ y**
۶۰	۵۶	Pauletta	./۲۷ xy	۱/۳۶ yz	۵/۷۶ y**
۶۱	۳۸	S1-89074	./۳۳ x	۱/۳۵ yz	۵/۶۶ y**
۶۲	۵۲	SB-1	./۴۷ tu	۱/۲۱ z	۵/۰۹ yz**
۶۳	۲۰	SB33-HSF-1	./۳۹ ux	۱/۲۰ z	۵/۰۴ yz**
۶۴	۸	SB31-HSF-7	./۲۱ y	۱/۱۷ z	۴/۹۰ z*
۶۵	۶۱	Cactus	./۲۷ xy	۱/۱۱ z	۴/۶۶ z*
۶۶	۲۹	(7112*SB36)*S1-11	./۲۱ y	۱/۰۸ z	۴/۵۲ z*
۶۷	۶۰	Toucan	./۶۸ qs	۰/۹۶ z	۴/۰۱ z*
۶۸	۳	SB27-HSF-10	./۲۷ xy	۰/۹۳ z	۳/۸۹ z*
۶۹	۵	SB31-HSF-2	./۳۹ ux	۰/۸۱ z	۳/۳۸ z*
۷۰	۱۶	SB32-HSF-5	./۱۸ z	۰/۶۹ z	۲/۸۶ z*

+ حساس

++ نسبتاً حساس

*** متحمل

** نسبتاً مقاوم

* مقاوم


- در هر ستون اعداد با حروف مشابه از نظر آماری فاقد اثر معنی دار هستند

نتایج حاصل از ارزیابی مرکب گلخانه و مزرعه

تجزیه‌ی مرکب نتایج حاصله از داده‌های گلخانه و مزرعه، در خصوص میانگین تعداد سیست روی ژنوتیپ‌های مختلف نشان داد که تفاوت معنی‌دار در بین ژنوتیپ‌ها وجود دارد (جدول ۴). در این خصوص، ژنوتیپ ۳۵ (SB35) با بیشترین تعداد سیست یعنی ۲/۴۸ عدد در راس قرار گرفت که در یک گروه مجزا و با اثر معنی‌دار واقع شده است. سپس، ژنوتیپ‌های ۵۰ (NE-0910-HSF) و ۴۳ (F-20603) به طور مشترک با ۱/۵۴ و ۲ (SB27-HSF-2) با ۱/۴۴ در گروه آماری دیگری قرار گرفتند. همچنین، ژنوتیپ‌های ۵۳ (SB-2)، ۶۹ (NE 0911) و ۵۴ (SB-3)، ۱۶ (SB32-HSF-5) به ترتیب با ۰/۱۷ و ۰/۱۸ سیست کمترین تعداد سیست را در این بررسی‌ها داشتند (جدول ۵). نتایج حاصل از مجموع هر دو آزمایش در خصوص تعداد لارو و تخم و فاکتور تولیدمثلی در گرم خاک گلخانه و مزرعه بیان‌گر تفاوت قابل توجه در واکنش

لاین‌ها و ژنوتیپ‌های مورد آزمون بوده است. مقایسه میانگین تعداد تخم و لارو تشکیل شده در ژنوتیپ‌های مختلف بین ۱۳۳ عدد در ژنوتیپ ۱۹ (SB32-HSF-10) تا ۲/۸۶ عدد در ژنوتیپ ۱۶ (SB32-HSF-5) متغیر بود. در مورد فاکتور تولیدمثلی نیز از همین روند پیروی می‌کند؛ به طوری که دامنه تغییرات آن از ۲۹/۱۹ در ژنوتیپ ۱۹ (SB32-HSF-10) تا ۰/۶۹ در ژنوتیپ ۱۶ (SB32-HSF-) (۵) متغیر است. این امر نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌ها از نظر مقاومت به نماتد می‌باشد (جداول ۳ و ۵).

برای گروه‌بندی نهایی میانگین نتایج ژنوتیپ‌ها در گلخانه و مزرعه از تجزیه خوشه‌ای استفاده شد. نتایج تجزیه خوشه‌ای نشان داد که همه ژنوتیپ‌های مقاوم و نسبتاً مقاوم در یک خوشه و در گروه دو و همچنین، ژنوتیپ‌های حساس در دو خوشه و در گروه‌های چهار و پنج قرار گرفتند (شکل ۱).



شکل ۱ خوشه بندی ژنوتیپ‌های چغندرقد به نماتد *Heterodera schachtii* بر اساس میانگین تعداد تخم و لارو در گلخانه و مزرعه

بحث

نتیجه‌گیری کرده‌اند و ژنوتیپ‌های w-1009، w-1010 و رقم تجاری نماکیل را با کمترین تعداد سیست مقاوم معرفی نموده‌اند. هم‌چنین، در همین راستا مصباح (1997)، کیم و همکاران (1995) و مولر (1998) بر همین اساس، ژنوتیپ‌های چغندر قند را در واکنش به نماتد سیستی ارزیابی نموده‌اند. در این ارزیابی ملاک اصلی برای تعیین مقاومت تعداد لارو و تخم موجود در سیست می‌باشد. چرا که در ارزیابی بر اساس سیست، مواردی مثل اندازه سیست و نیز تعداد متفاوت لارو و تخم درون سیست‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها در خصوص تعداد لارو و تخم در گرم خاک گلخانه و مزرعه و در مجموع هر دو مشخص نمود که واکنش لاین‌ها و ژنوتیپ‌های مورد آزمون با یکدیگر متفاوت و قابل توجه بوده است. ژنوتیپ‌های ۱۶ (SB32-HSF-5)، پنج (SB31-HSF-2) و سه (SB27-HSF-10) به ترتیب با ۲/۸۶، ۳/۳۸ و ۳/۸۹ عدد لارو و تخم کمترین تعداد لارو و تخم را نسبت به سایر ژنوتیپ‌های مورد آزمون داشته‌اند (جدول ۵). کاهش تعداد لارو و تخم این ژنوتیپ‌ها، ۴۳ و ۳۲ برابر ژنوتیپ‌های حساس بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق با گزارش‌های محققین دیگر هم‌خوانی دارد. در همین راستا، نتایج حاصل از تلاقی بین گونه‌ای چغندر قند با گونه‌های وحشی دارای مقاومت کامل و تک‌ژنی بیان‌گر وجود ژنوتیپ B883 مقاوم بوده است (Taleghani *et al.* 2010). اکثر ژنوتیپ‌های مورد آزمون در اثر تلاقی‌های گوناگون ایجاد شده‌اند و توانسته‌اند ژن مقاوم یعنی همان ژن $HS1^{pro1}$ را به برخی از ژنوتیپ‌ها انتقال و در آن‌ها تثبیت نمایند. هم‌چنین، با انتقال مقاومت چندژنی، ژنوتیپ‌های مقاوم به نماتد سیستی چغندر قند به دست آمده‌اند. لذا، با توجه به ژنوتیپ‌های موجود در این آزمایش‌ها که شجره‌نامه‌ی آن‌ها نیز نسل‌های حاصل را

با توجه به اینکه انتقال ژن یا ژن‌های مقاوم از منابع وحشی یا خویشاوندی زراعی باعث افزایش وسعت ژنتیکی می‌گردد، لذا به نظر می‌رسد ارزیابی اولیه به منظور دستیابی به ژنوتیپ‌های جدید اصلاحی که از لحاظ مقاومت به نماتد و صفات زراعی دارای برتری باشند الزامی است (Vahedi *et al.* 2013). بررسی‌های تعداد سیست در این آزمایش‌ها روی ژنوتیپ‌های چغندر قند مورد آزمون نتایج متفاوتی را برای ژنوتیپ‌های مربوطه نشان داد و آن‌ها را برحسب تعداد سیست تفکیک و متمایز نمود. ولی، آیا، شمارش تعداد سیست می‌تواند ملاک قطعی در تفکیک ژنوتیپ‌ها باشد؟ نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه‌ی چندان مستقیمی در این راستا وجود ندارد. چرا که، نتایج تفکیکی گلخانه و مزرعه به طور جداگانه و یا به طور مرکب نشان می‌دهد که ژنوتیپ ۳۵ (SB35) در این آزمایش‌ها بیشترین تعداد سیست را با ۲/۴۸ عدد داشته و پس از آن ژنوتیپ ۵۰ (NE-0910-HSF-43) با ۱/۵۴ عدد سیست در گرم خاک می‌باشد. در صورتی که از نظر تعداد تخم و لارو ژنوتیپ ۱۹ (SB32-HSF-10) با ۱۲۳ عدد لارو و تخم و سپس ژنوتیپ ۳۵ (SB35) با ۱۱۶/۲۶ عدد بوده است. هم‌چنین، ژنوتیپ‌های ۶۳ (F-20603)، ۲ (SB27-HSF-2) و ۱۹ (SB32-HSF-10) به ترتیب با ۱/۵۳، ۱/۴۴ و ۱/۴۳ عدد سیست بوده‌اند، در صورتی که از نظر تعداد لارو و تخم به ترتیب ۱۱۱/۶۱، ۵۳/۸۸ و ۱۲۳ عدد تخم و لارو داشته‌اند. این نتایج با گزارشات رحمانی و همکاران (2006) در این که تعداد سیست نماتد چغندر قند را در ارزیابی ژنوتیپ‌ها یا ارقام مقاوم ملاک عمل قرار داده‌اند موافقت ندارد. ایشان بر این اساس ژنوتیپ‌های چغندر قند مورد بررسی را در سه گروه مقاوم، حساس و بسیار حساس جمع‌بندی و

برنامه مدیریت نماتد سیستمی چغندرقد و انتقال ژن (ژن-های) مقاومت به ارقام زراعی مطلوب استفاده خواهد شد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از مؤسسه تحقیقات چغندرقد به خاطر تهیه و ارسال بذر ژنوتیپ‌های مورد استفاده در اجرای این تحقیق و همچنین، از بخش تحقیقات گیاه پزشکی اصفهان به خاطر همکاری در این تحقیق تقدیر و تشکر می‌گردد.

نشان می‌دهد، وجود مقاومت در برخی ژنوتیپ‌ها بالاخص ژنوتیپ ۱۶ را حاصل نموده است که با نتایج سایر محققین نیز تطابق دارد. در تحقیقات رحمانی و همکاران (2006) ژنوتیپ‌های W-1010، W-1009 و رقم تجاری نماکیل به عنوان مقاوم تشخیص شناخته شدند که برخی از این ژنوتیپ‌ها (۲۶، ۲۹ و ۱۶)، ژن‌های مقاومت را از این دو منبع دریافت نموده‌اند (Rahmani et al. 2006).

در نهایت آنچه که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره کرد دستیابی به ژنوتیپ‌هایی است که به نماتد مولد سیستم مقاومت نشان دادند. از این ژنوتیپ‌های مقاوم در

References:

منابع مورد استفاده:

- Akhyani A, Damadzadeh M, and Ahmadi A. Evaluation of contaminated areas, causes emissions and increase sugar beet cyst nematode in Isfahan province. Iranian Plant Protection Congress, Rasht. 1993; P. 124.
- Bani-Hashemi M, Mesbah M, and Mahmoudi B. Assessment of sugar beet breeding material resistant to cyst nematode in greenhouse conditions. 16th Iranian Plant Protection Congress. Iran, Tabriz. 2004; P. 165.
- Capistrano GGG. A candidate sequence for the nematode resistance gene *Hs1-2* in sugar beet (PhD thesis). St Germany, Qld: University of Kiel; 2010.
- Doney D, and Whitney ED. Screening sugar beet for resistance to *Heterodera schachtii* Sch. Journal of the American Society of Sugar Beet Technologist. 1969; 15: 546-552.
- Draycott AP. Sugar Beet. Blackwell Publishing Co Ltd. UK. 2006; 514 pp.
- Fenwick DW. Methods for recovery and counting of *Heterodera schachtii* from soil. Journal of Helminthology. 1940; 18: 155-177.
- Heijbroek W. Partial Resistance of sugar beet to beet cyst eelworm. Euphytica. 1977; 26: 257-262.
- Jafar Pur B, and Mahdikhani Moghadam A. An Introduction to the nematodes of plants. Mashhad Ferdowsi University Press. 1997; 363 p.
- Jäger SC. Hybrid Assembly of Whole Genome Shotgun Sequences of Two Sugar Beet (*Beta vulgaris* L.) Translocation Lines Carrying the Beet Cyst Nematode Resistance Gene *Hs1-2* and Functional Analysis of Candidate Genes, Doctoral Thesis, Qld: Christian-Albrechts University of Kiel. 2013.
- Kalali GH, and Forivar Mahin H. Some studies on sugar beet nematode (*H. schachtii*) in Khorassan. Entomol. J. Plant Path. 1979; 47: 1-18.
- Lewellen RT. Registration of CN12 and CN72 sugarbeet germplasm population with resistance to cyst nematode. Crop Sci. 2006; 46: 1414-1415.

- Mahmoudi B. Diseases of sugar beet in Iran. First sugar beet crop Conference. 2007;41-49.
- Mehdikhani Moghadam E, Kheiri A, and Okhovat M. morphological and morphometrical study of three endoparasitic nematodes of sugar beet in Mashhad region. Iran. J. Plant Path. 1996; 32: 1-8.
- Mesbah M. Characterization of alien chromosomes in monosomic additions of *Beta*. Ph.D. Thesis. Wageningen Agricultural University, the Netherlands. 1997;106 pp.
- Muller J. Newpathotypes of the beet cyst nematode (*Heterodera schachtii*). Nematology. 1998;21(5): 519-526.
- Mulvey RH, and Golden MA. An illustrated key to the cyst forming genera and species of Heteroderidae in the western hemisphere with species morphometrics and distribution. Nematology J. 1983; 15(1): 1-59.
- Oostenbrink M. Major characteristics of the relation between nematods and plant. M.A. Thesis. Landbouwhogeschool Wageningen. 1966; 66:1-46
- Parvizi R. Distribution of sugar beet nematode in West Azarbaijan. (Abst.) Ninth Plant Protect. Congr. Of Iran: 1989; P. 175.
- Parvizi R, Eshtiaghi H, and Kheyri M. Distribution areas of *Heterodera schachtii* in West Azarbaijan. Applied Entomology and Phytopathology. 1993; 60(1&2): 73-79.
- Qiao F, Jung C, and Defan B. Cloning of a beet cyst nematode resistance gene from the wild beet *Patellifolia procumbens*. <http://www.Plantbreeding.unikel.de/de/forschung/>. 2013.
- Rahmani N, Mesbah M, and Mahmoudi B. Evaluation of selected genotypes resistance to the beet cyst nematode in greenhouse conditions. 19th Congress of Crop Sciences, Tehran University Pardis, Aborayhan. 2006; p.463.
- Rahmani N, Mesbah M, and Norouzi P. Identification of molecular markers linked to sugar beet cyst nematode resistance gene(s). Journal of Sugar Beet. 2013; 28(2): 81-85.
- SAS Institute. SAS/STAT User's Guide. Version 9.1.3. Cary: SAS Institute I. 2004.
- Sharafeh M, and Teymoori F. Survey on infested areas to sugar beet nematode and other cyst forming nematodes in Fars, Iran. J. Plant Path. 1980; 48: 75-81.
- Steele AE, Savitsky H. Resistance of trisomic and diploid hybrids of *Beta vulgaris* and *B. procumbens* to the sugarbeet nematode, *Heterodera schachtii*. Journal of Nematology. 1981;13:352-257.
- Taleghani D, Sadeghzadeh hemaeti S, and Mesbah M. National strategic document of sugar beet. Improvement Research Institute of sugar beet seed. 2010; 520 pp.
- Vahedi S, Soltani J, Mahdi Khani P, and Mahmoudi B. Assessment of resistance to the beet cyst nematode populations breeding. Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress. Iran, Hamedan. 2008;2: 562.
- Vahedi S, Mahmoudi B, Rajabi A, and Aghaei Zadeh M. Beet cyst nematode resistance evaluation masses of sugar beet to *Heterodera schachtii*. Journal of Plant Protection. 2013;35(3)

Van Geyt JPC, Lange W, Oleo M, and De Bock TSM. Natural variation within the genus *Beta* and its possible use for breeding sugar beet: A review. *Euphytica*. 1990; 49:57-76.

Whitney ED, and Duffus JE. *Compendium of Beet Diseases and Insects*. American Phytopathological Society, Minnesota. 1986; 76 pp.

Archive of SID