

## درمان هرپس تناسلی عودکننده با Imiquimod

دکتر میرهادی عزیز جلالی<sup>۱</sup>، دکتر حبیب انصاریان<sup>۱</sup>، دکتر میترا دل بخش<sup>۲</sup>

۱-دانشیار گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۲-متخصص زنان و زایمان

ویروسی می‌باشد. تحریک انترفرون آلفا و انترلوکین ۱ در خون محیطی و کراتینوسیت‌های انسانی به دنبال تماس با این ماده رخ می‌دهد. از mRNA سوی دیگر این دارو ساعت از دیاد انترلوکین‌های ۶، ۲ و ۸ می‌شود لذا در بهبودی زگیل‌های مقاوم تنازلی مؤثر است. از آنجاییکه این بیماری می‌تواند خود بخود هم فروکش نماید، جهت نتیجه‌گیری قطعی احتیاج به مطالعات دقیق‌تری می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** هرپس تنازلی عودکننده، Imiquimod، Aldara، تنظیم کننده موضعی اینمی

در این مقاله بیماری ۳۲ ساله گزارش می‌شود که ۳ سال از ضایعه هرپس تنازلی راجعه و آزاردهنده ناشی از ویروس HSV-II رنج می‌برد و به درمانهای رایج پاسخی نداده بود. ولی این بیمار با مصرف کرم ۵٪ Imiquimod سه بار در هفته به مدت سه ماه نتیجه درمانی خوبی حاصل نمود و تا ۷ ماه پس از قطع درمان عود نداشت. از آنجا که تبخل تنازلی راجعه ناشی از یک سری از اختلالات اینمی در محل ابتلاء توسط ویروس هرپس می‌باشد، به نظر می‌رسد تنظیم سیستم اینمی در موضع سبب کاهش عود یا فروکش نمودن آن گردد. Imiquimod یک ماده تنظیم کننده سیستم اینمی بوده و دارای قدرت ضد توموری و ضد

طولانی و بدون تاثیر آن از مصرف دارو امتناع نمود. لذا درمان موضعی با کرم ۵ درصد (Aldara) Imiquimod ۳ با در هفته تجویز گردید. این درمان زمانی شروع شد که درد و التهاب موضعی به سوی خاموشی می‌رفت. در طی ۳ ماه درمان با آن هیچگونه عود هرپسی مشاهده نشد. ۶ هفته پس از شروع درمان با Imiquimod واکنش موضعی با آن رخ داد که در انتهای درمان شروع به کاهش نمود. در پیگیری بیمار تا ۷ ماه پس از قطع درمان هیچ حمله‌ای از هرپس مشاهده نشد.

### معرفی بیمار

خانمی ۳۲ ساله با تاریخچه عفونت‌های مکرر هرپس تنازلی از ۳ سال پیش مراجعه نمود. حملات هر ۱-۲ ماه رخ می‌داد و هر بار حدود یک هفته طول می‌کشید. در معاینه ضایعات هرپسی در لایای ماینور مشاهده شد. در کشته از ناحیه ولو HSV-II بدست آمد. ابتدا بیمار با تزریق وریدی آسیکلوفیر ۲۰۰ میلیگرم ۴ بار در روز به مدت ۵ روز درمان شد و سپس تجویز خوراکی آن با دوز نگهدارنده پیشنهاد شد. ولی بیمار به علت استفاده قبلی و

مؤلف مسئول: دکتر میرهادی عزیز جلالی - بخش پوست، بیمارستان حضرت رسول (ص)، تهران، ایران

هرپس آنژینیال ناشی از عفونت با ویروس هرپس سیمپلکس تیپ II و بعضاً تیپ I می‌باشد. اندازه ویروس ۱۰۰-۱۰۰ نانومتر بوده و دارای یک هسته مرکزی با رشته فربی شکل دو رشته‌ای DNA می‌باشد که توسط کاپسیدی که از ۱۵۰ هاله شش ضلعی و ۱۲ کاپسوم پنج ضلعی تشکیل شده احاطه می‌گردد.<sup>(۱)</sup>

از نظر همه گیرشناصی در ایالات متحده امریکا با بررسی سروولوزی HSV II، ۱۷/۴ درصد افراد در سنین ۱۵-۷۴ سالگی (قریباً ۲۵ میلیون نفر) مبتلا بوده‌اند.<sup>(۲)</sup> از آنجاییکه ویروس در گانگلیون‌های ریشه خلفی ساکرال S2-S4 مخفی می‌شود و ممکن است باعث حملات مکرر و آزاردهنده و نیز عوارض ناشی از آن گردد، همیشه نام گذاری simplex برای آن صحیح نمی‌باشد. در موارد هرپس باعوهای بسیار مکرر (status herpeticus)، اختلال Natural Killer Cell همچنین مشکلاتی در تحرک پلی‌مورفونوکلرها و نیز عدم پاسخ بلاستوزنز لنفوسيت‌ها در برابر ویروس وجود دارد. یافته‌های بالینی و ایمونولوژیک به وضوح این موضوع را تائید می‌نماید که اختلال این‌نی سلولی در هرپس به طور موضعی رخداده و سبب بروز حملات مکرر آن می‌گردد.<sup>(۳)</sup> در حالیکه آنتی‌بادی سیرکولان در پیشگیری و عود حملات هرپس نقش مهمی ندارد و حتی وجود میزان بالای آن در سرم نشانگر درگیری پیشتر گانگلیون‌ها با ویروس است.

در حالیکه در غالب موارد حملات حاد هرپس با آسیکلوویر کنترل می‌گردد، انواع عودکننده

و مزمن آن که در سال ییش از ۱۲ بار عود نماید Archive of SID مشکل ساز گشته و از معضلات بیماری‌های مقاربی به شمار می‌رود. در حال حاضر درمان موارد مزمن با مصرف خوراکی و طولانی آسیکلوویر صورت می‌گیرد به طوریکه می‌تواند تعداد حملات را در سال کاهش داده و حتی سبب مخفی شدن دائم علائم بیماری در ۲۰٪ از بانوان گردد. ولی قطع درمان طولانی نیز ممکن است سبب عود مجدد بیماری شود و میزان عود نیز برابر با کسی است که اصلادارو مصرف نموده است. با استفاده از انترفرون سیستمیک یا موضعی نیز دلایل کافی مبنی بر عدم عود مجدد با آن وجود ندارد.<sup>(۳)</sup>

Imiquimod یک ماده تنظیم‌کننده سیستم ایمنی بوده و دارای قدرت ضدتوموری و ضد ویروسی می‌باشد. این دارو سبب تحریک انترفرون آلفا، انترکولین ۱ و فاکتور نکروز توموری آلفا در خون محیطی و کراتینوسیتهای انسانی که در معرض آن قرار گرفته می‌شود. ضمن اینکه این ماده سبب افزایاد mRNA مربوط به IL-8، IL-6، IL-2، از دیدار شده و باعث بهبودی زگیل‌های مقاوم تناسلی با افزایش میزان موضعی انترفرون‌های آلفا، بتا و گاما و نیز فاکتور نکروز توموری آلفا می‌گردد.<sup>(۴،۵)</sup>

البته در بیمار معرفی شده نمی‌توان گفت که درمان موضعی Imiquimod می‌تواند عود بیماری را برای همیشه متوقف نماید زیرا بعضی حملات عود بیماری می‌تواند خودبخود هم خاموش شود. برای مثال در یک مطالعه با دارونما تحلیل بیماری در ۱۵٪ موارد مشاهده شد. به هر حال نتیجه‌گیری کامل از این موضوع احتیاج به بررسی‌های ییشت و مطالعات دقیق‌تر دارد.

منابع

- 1- Csonka CW, Oates JK (eds). Sexually transmitted diseases. 1990: 129-51.
- 2- Johnson RE. A seroepidemiologic study of the prevalence of herpes simplex virus type 2 infection in the United States. *N Engl J Med* 1989;321:7.
- 3- Aranyi, Tyring SK. Activation of local cell mediated immunity in interferon responsive patient with human papilloma virus associated lesion. *J Interferon Cytokines Res* 1996;16:453-60.
- 4- McMillon A. The management of difficult anogenital warts. *Sex Transm Infec* 1999;75:192-94.
- 5- Beutner KR, Spruance SL, Haugham AJ, et al. Treatment of genital warts with an immune response modifier (Imiquimod). *J Am Acad Dermatol* 1998;38:230-39.