

درمان تعریق شدید زیربغل با سم بوتولینوم نوع A

Archive of SID

دکتر رحمت ا... سلمانپور^۱، دکتر محمد جواد رحمانیان^۲

۱- استادیار ۲- دستیار، گروه پوست؛ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیماران تزریق شد.

یافته‌ها: همه بیماران بدون هیچ عارضه‌ای درمان را به خوبی تحمل کردند و حدوداً یک هفته بعد از تزریق دارو توقف نسبتاً کامل تعریق (آنھیدروز) زیر بغل را بمدت ۷-۴ ماه تجربه کردند.

نتیجه گیری: توکسین بوتولینوم نوع A می‌تواند به عنوان یک درمان مناسب و موثر و سریع برای تعریق شدید زیر بغل معرفی شود.

واژه‌های کلیدی: توکسین بوتولینوم نوع A، هیپرھیدروزیس، درمان

مقدمه: تعریق شدید زیر بغل موجب استرس شدید در اشخاص مبتلا به این عارضه می‌شود. روشهای درمانی موضعی و جراحی موجود چنان موثر نبوده یا همراه با عوارض غیرقابل قبول برای بیماران می‌باشد.

هدف: در این مطالعه اثر توکسین بوتولینوم نوع (Dysport) A در درمان این عارضه بررسی گردید.

بیماران و روشهای: این مطالعه طی ۷ ماه بر روی ده نفر مبتلا به تعریق شدید زیر بغل انجام شد. بعد از مشخص کردن ناحیه تعریق شدید زیر بغل با استفاده از تست یید-نشاسته (Iodine-starch test) مقدار ۱۲۵ واحد از دارو (Dysport) بصورت درون جلدی در زیر بغل

اسکار، از دست دادن موی زیر بغل، درد و گاهی عود تعریق همراه می‌باشد^(۱).

اخیراً از توکسین بوتولینوم نوع A (که به دو فرم Dysport و Botox موجود است) به عنوان دارویی موفق و موثر در درمان تعریق موضعی نامبرده می‌شود^(۴ و ۳). مکانیسم اثر این دارو از طریق مهار ترشح استیل کولین در نواحی پری سیناپتیک (Presynaptic) می‌باشد^(۶-۴). در این مطالعه اثر درمانی تزریق درون جلدی این دارو بر تعریق شدید زیر بغل بررسی شده است.

بیماران و روشهای

در این مطالعه ده بیمار که همه آنها از کودکی دچار تعریق شدید زیر بغل بودند و به درمانهای معمول پاسخ مناسب نداده بودند انتخاب شدند.

مقدمه
تعریق شدید زیر بغل یک عارضه استرس زا بوده و موجب خیس و کثیف شدن لباسها می‌شود. اشخاص مبتلا اغلب در حالت شدید و ناراحت کننده جهت درمان به پزشک مراجعه می‌کنند^(۱). روشهای درمانی موجود عبارتند از: درمان‌های موضعی، داروهای آنتی کولیسنزیک سیستمیک و یونتوفروز (Iontophoresis)^(۱). اگر این درمانها موثر نباشند و یا ایجاد عارضه و ناراحتی کنند می‌توان از روشهای جراحی جهت درمان کمک گرفت^(۲ و ۱). جراحی بطور شایع با عوارضی همچون خونریزی،

مؤلف مسئول: دکتر رحمت ا... سلمانپور - شیراز، خیابان زند، درمانگاه فوق تخصصی شهید دکتر فقیه‌ی، طبقه چهارم، درمانگاه پوست

تعریق زیربغل در ۵ بیمار ۷ ماه، در یک بیمار ۶ ماه، در ۳ بیمار ۵ ماه و در یک بیمار ۴ ماه بطول انجامید. پس از این *Unilevel* مدت زیربغل دوباره شروع به عرق کردن نمود. موفقیت در درمان و توقف تعریق زیربغل بیماران بطور سریال با تست ید-نشاسته و فتوگرافی قبل (شکل ۱) و بعد از درمان (شکل ۲) نشان داده شد.

بیماران بدون هیچ عارضه‌ای تزریق دارو را تحمل نمودند و تغیری در قدرت عضلانی بیماران مشاهده نشد.

بحث

این مطالعه نتایج مطالعات قبلی (۸ و ۹) در مورد تأثیر توکسین بوتولینوم نوع A در درمان تعریق شدید زیربغل را تایید نمود. تزریق درون یا زیرجلدی توکسین بوتولینوم نوع A در درمان بیماران مبتلا به تعریق شدید موضعی بسیار موثر و بدون عارضه است (۱۰ و ۷). توکسین بوتولینوم نوع A با مهار انتقال کولینزیک استیل کولین به عدد عرقی باعث کاهش تولید عرق می‌شود (۱۰ و ۵).

در این مورد هیچ عارضه‌ای و به ویژه ضعف عضلانی در ناحیه شانه مشاهده نشد. شاید این موضوع را این گونه بتوان توجیه کرد که میزان داروی تزریقی در زیربغل بقدرتی کم بوده که تأثیری روی عضلات بزرگ کمربند شانه‌ای نگذاشته است.

در نتیجه تزریق درون جلدی توکسین بوتولینوم نوع A یک درمان جدید و ساده و نسبتاً بی خطر برای کنترل تعریق شدید زیربغل می‌باشد و ممکن است به عنوان بهترین درمان جهت تعریق موضعی که به دیگر درمانهای موجود جواب مناسب نداده‌اند شناخته شود.

این بیماران در معاینه عصبی و پوستی مشکلی بجز تعریق شدید نداشتند. قبل از مورد روش کار و عوارض احتمالی درمان با بیماران صحبت شد. سپس قبل از تزریق دارو نواحی تعریق شدید زیربغل در دو طرف بطور جداگانه با استفاده از روش ید-نشاسته مشخص گردید. در این تست زیربغل را با محلول ید (دو گرم ید در ۱۰ سی سی روغن کرچک حل شد و حجم آن با الکل به ۱۰۰ سی سی رسانده شد) رنگ آمیزی نموده و بعد از خشک شدن پودر نشاسته روی آن پاشیده شد. این ترکیب با عرق به رنگ آبی تیره درمی‌آید. سپس توکسین بوتولینوم نوع A^{*} (Dysport) را با ۲ سی سی نرمال سالین رقيق نموده و حجم آنرا به ۲ سی سی رسانده و تحت شرایط بهداشتی و آسپتیک با استفاده از سوزن gauge ۲۷، نیم سی سی (۱۲۵ واحد) از دارو به روش درون جلدی در ۶-۵ نقطه در هر طرف زیربغل بطور جداگانه در نواحی که قبل از رنگ آمیزی به رنگ آبی تیره درآمده بود تزریق شد. سپس بیماران به مدت ۷ ماه به ترتیب ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۲۸ هفته بعد از درمان با استفاده از تست ید-نشاسته بطور متواتی تحت نظر قرار گرفتند.

یافته‌ها

در این مطالعه ۳ بیمار زن و ۷ بیمار مرد که در محدوده سنی ۲۱-۵۹ سال (سن متوسط ۳۴/۸ سال) بودند درمان شدند. ۵-۳ روز (متوسط ۴ روز) بعد از تزریق دارو کاهش تزریق زیربغل توسط بیماران محسوس شد. عرق کردن زیربغل از روز هفتم به بعد بطور نسبتاً کامل متوقف گردید و این توقف ۴-۷ ماه (متوسط ۵/۵ ماه) بطول انجامید. عدم

* Ipsen limited, 1 Bath Road, Maidenhead , Berkshire, England, 500 Mouse Units



شکل شماره ۱: تعریق شدید زیربغل قبل از تزریق توکسین بوتولینوم که با تست ید-نشاسته به رنگ آبی تیره درآمده است.



شکل شماره ۲: توقف تعریق پس از درمان (آنھیدروز) که با تست ید-نشاسته رنگ آبی تیره حاصل نشده است.

1. Bushara KO, Park DM, Jones JC, et al. Botulinum toxin- a possible new treatment for axillary hyperhidrosis. *Clin Exp Dermatol* 1996; 21:276-78.
2. Heckmann M, Breit S, Baumann A, et al. Side - controlled intradermal injection of Botulinum toxin A in recalcitrant axillary hyperhidrosis. *J Am Acad Dermatol* 1999; 41:987-90.
3. Naumann M, Zellner M, Toyka KV, et al. Treatment of gustatory sweating with botulinum toxin. *Ann Neurol* 1997; 42:973-75.
4. Schulze Bonhage A, Schroder M, Febert A. Botulinum toxin in the therapy of gustatory sweating. *J Neurol* 1996; 243:143-46.
5. Odderson IR. Axillary hyperhidrosis: treatment with botulinum toxin A. *Arch Phys Med Rehabil* 1998; 79:350-52.
6. Schnider P, Binder M, Auff E, et al. Double - blind trial of botulinum A toxin for the treatment of focal hyperhidrosis of the palms. *Br J Dermatol* 1997; 136:548-52.
7. Naumann M, Bergmann I, Hofmann U, et al. Botulinum toxin for focal hyperhidrosis: technical considerations and improvements in application. *Br J Dermatol* 1998; 139:1123-24.