

تلانژیکتازی خوش خیم ارثی: گزارش ۶ مورد در یک خانواده

دکتر زردی جاویدی^۱، دکتر مسعود ملکی^۱، دکتر وحید مشایخی^۲، دکتر یلدا ناهیدی^۳، دکتر امیر امیدوار بربنا^۳

^۱-دانشیار، ^۲-استادیار، ^۳-دستیار، گروه پوست؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلانژیکتازی خوش خیم ارثی یک اختلال ایدیوپاتیک بسیار ناشایع پوستی است که با تلانژیکتازی ژنرالیزه و ضایعه‌های آنژیوماتوز در پوست مشخص می‌شود و باید در هر بیمار با تلانژیکتازی جلدی، سابقه خانوادگی مثبت، نداشتن اختلال‌های خون‌ریزی دهنده همراه و نبود درگیری مخاطی، این تشخیص را مدنظر داشته باشیم. در این گزارش، خانواده‌ای بالتلای ۶ نفر از سه نسل مختلف را معرفی می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: تلانژیکتازی، تلانژیکتازی خوش خیم ارثی، ارثی

فصلنامه بیماری‌های پوست ۱۳۹۶؛ دوره ۸ (۶): ۵۱۱-۵۱۵

وصول مقاله ۱۴/۶/۷ پنیرش: ۱۴/۷/۲۳

ضایعه‌هایش را از ۱۱ سالگی ذکر می‌کند و هم چنین

مدعی است که ضایعه‌هایش با دوره‌های عادت ماهیانه‌اش تخفیف می‌یابد. برادر کوچک بیمار ۴ ساله است که هنوز در وی آثاری از ضایعه‌های جلدی مشهود نیست. پدر و مادر بیمار باهم نسبت خوبی‌شاندی ندارند. با توجه به ضایعه‌های تلانژیکتاتیک متشر با توزیع در مناطق در معرض آفات، طرح و راثتی منطبق با الگوی اتوزومی غالب، نداشتن درگیری سیستمیک، مخاطی و نداشتن اختلال‌های خون‌ریزی دهنده، تشخیص تلانژیکتازی خوش خیم ارثی برای این بیمار و اعضای خانواده‌اش مطرح شد. شایان ذکر است که این بیمار، به بیوپسی رضایت نداد.

بحث

تلانژیکتازی ارثی خوش خیم که برای اولین بار توسط Well و Dowling در سال ۱۹۷۱ شرح داده شده است (۱-۳)، یک اختلال ارثی بسیار نادر با وراثت اتوزومی غالب (۴-۷) و (۲) از گروه تلانژیکتازی‌های ایدیوپاتیک یا

بیمار پسر ۱۴ ساله‌ای است که با تلانژیکتازی‌های جلدی متعدد روی صورت، گوش‌ها، لب‌ها و پشت دست‌ها مراجعه کرده است (تصاویر شماره ۱ و ۲). وی شروع ضایعه‌ها را از سال پیش ذکر و عنوان می‌کند که ضایعه‌ها از ۶ ماه پیش بیشتر شده‌اند. محل اولیه شروع ضایعه‌ها شقیقه بوده است ولی هیچ سابقه‌ای از خون‌ریزی از ینی، دهان، دستگاه گوارش و سایر مخاطها نمی‌دهد. علایمی به نفع درگیری ارگان‌های داخلی ندارد. در معاینه مخاط بینی، سپتوم بینی، گوش خارجی و دهان هیچ گونه ضایعه مخاطی مشاهده نمی‌شود. وی عضو خانواده ۶ نفره‌ای است که مادر سالم ولی پدر، خواهر و یکی از برادرانش ضایعه‌هایی شبیه ضایعه‌های بیمار با توزیع مشابه دارند.

عمه و مادر بزرگ پدری نیز همین تظاهرهای بالینی را دارند. به طور کلی این ۶ نفر بیمار از سه نسل مختلف هستند. برادر بزرگ بیمار ۲۰ ساله است و ضایعه‌ها را از ۱۰ سالگی پیدا کرده است. خواهر ۱۸ ساله بیمار، شروع

مؤلف مسؤول: دکتر زردی جاویدی - مشهد، بخش پوست بیمارستان امام رضا (ع)

پست الکترونیک: zari_javidi@yahoo.com

تصویر شماره ۱ - نمای بالینی ضایعه‌های روی صورت بیمار از روی

تصویر شماره ۲ - نمای بالینی ضایعه‌های روی دست بیمار

کرده‌اند و در حقیقت مدعی شده‌اند که تلانژیکتاازی خوش خیم ارثی و مالفورماسیون مویرگی دو اختلال از یک طیف فنوتیپی وسیع هستند که جایگاه CMC ۱ در هر دو دخالت دارد چرا که آسیب شناسی هر دو ضایعه نیز یکسان است، البته جایگاه مربوط به تلانژیکتاازی خوش خیم ارثی منطقه کوچک‌تری را در داخل جایگاه CMC ۱ شامل می‌شود(۱۱).

در یک بررسی نشان داده شده است که عروق درم رتیکولار سطحی، متسع و دارای دیواره ضخیم هستند و هیچ گونه جداشدگی در دیواره عروق مشاهده نمی‌شود. این یافته برخلاف یافته‌های آسیب‌شناسی موجود در تلانژیکتاازی هموراژیک ارثی است و همین نبود جداشدگی در دیواره، نبود خون‌ریزی در تلانژیکتاازی خوش خیم ارثی را توجیه می‌کند(۱۵). بنابراین می‌توان از بررسی‌های آسیب‌شناسی و میکروسکوپ الکترونی برای افتراق تلانژیکتاازی خوش خیم ارثی Hereditary Benign Telangiectasia (HBT) از Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) تلانژیکتاازی هموراژیک ارثی که یک اختلال خون‌ریزی دهنده با درگیری سیستمیک و با پیش آگهی کاملاً متضاد است، استفاده کرد(۱۵ و ۵).

البته افتراق این دو اختلال در اکثر موارد بر اساس فقدان اختلال هموراژیک در HBT به سادگی امکان پذیر است. امکان دارد ضایعه‌ها در HBT، مانند HHT با آناستوموزهای شریانی وریدی همراهی داشته باشند (۱۶ و ۵). در حال حاضر، درمان مؤثری برای این اختلال ذکر نشده است اما در دو مطالعه جداگانه، موفقیت درمان ضایعه‌ها با Flash Intense pulsed light (IPL) و lamp-pumped pulsed dye laser گزارش شده است(۶ و ۱۷).

تلانژیکتاازی‌ها اتساع دایمی مزمن عروق انتهایی به

اولیه است که با ضایعه‌های تلانژیکتاازیک با شروع در کودکی و نبود همراهی با اختلال‌های سیستمیک مشخص می‌شود(۹ و ۸ و ۵). احتمال دارد بیماری با شیوع کم‌تر در زمان تولد هم ظاهر شود(۵)، به طوری که در یک گزارش از یک خانواده ژاپنی، به ابتلای پدر و فرزند دختر ۲ ساله و ۵ ماهه‌اش با تظاهر پیچ‌های پراکنده اریتماتو با اندازه‌های متعدد از زمان تولد اشاره شده است(۱۰).

مورفولوژی ضایعه‌ها در تلانژیکتاازی ارثی خوش خیم، punctate، plaque like arborising یا radiating است(۱۱ و ۲).

ضایعه‌ها، در بیماران جوان‌تر، کوچک‌تر و قرم‌تر هستند و با افزایش سن، ضایعه‌ها بزرگ‌تر، صاف‌تر و رنگ پریده‌تر می‌شوند که اغلب شبیه پوست طبیعی به نظر خواهد آمد(۱۱). ضایعه‌ها عمدتاً در مناطق در معرض آفتاب از جمله صورت، تن، بازو و ورمیلیون لب‌ها تظاهر پیدا می‌کند(۵ و ۲).

مبليان مانند تلانژیکتاازی هموراژیک ارثی عالیمی به نفع درگیری ارگان‌های داخل نظری سیستم عصبی مرکزی، ریه، کبد و غیره ندارند و برخلاف این بیماری، سابقه‌ای از اختلال‌های هموراژیک به خصوص خون‌ریزی از بینی نمی‌دهند (۱۲-۱۴ و ۵). غشاها مخاطی هم درگیری ندارند (۵ و ۴ و ۲). ضایعه‌ها بدون علامت هستند و امکان دارد سالیان متمادی بدون تغییر باقی بمانند و بر سلامت عمومی فرد هیچ تأثیری نداشته باشند و فقط ممکن است از نظر زیبایی ایجاد مشکل کند (۱۱ و ۷). در بررسی بافت‌شناسی ضایعه‌ها، اپiderم طبیعی همراه با اتساع عروق کوچک درم فوقانی دیده می‌شود(۲).

علت این اختلال ناشناخته است(۷). اما در یک بررسی ژنتیکی، ناحیه‌ای را روی کروموزوم ۱۴q5 مرتبط بر محل ژن CMC که ژن شناخته شده برای مالفورماسیون مویرگی‌ها است، به عنوان عامل ژنتیکی این اختلال ذکر

با توجه به شرح حال بیمار این گزارش و اعضای خانواده‌اش سایر علل تلانژیکتازی در آن‌ها رد می‌شود.

ضایعه‌های تلانژیکتازیک در مناطق در معرض آفتاب در هر ۶ بیمار، سابقه خانوادگی مثبت (در سه نسل متواالی)، سلامت کامل جسمی، نبود علایم درگیری سیستمیک و مخاطی و از همه مهم‌تر نداشتن سابقه خون‌ریزی در اعضای این خانواده به نفع تشخیص HBT است.

این اختلال بسیار نادر است به طوری که از سراسر دنیا فقط تعداد معده‌دی خانواده مبتلا گزارش شده است (۱۸).

به طور کلی باید در هر مورد با ضایعه‌ها تلانژیکتازیک منتشر به خصوص در مناطق در معرض آفتاب، با سابقه خانوادگی مثبت، بدون درگیری سیستمیک و مخاطی و نبود دیاتز هموراژیک، این تشخیص را برای بیمار گذشت و آن را از اختلال‌هایی مانند HHT که می‌تواند یک بیماری بالقوه کشنده باشد افتراق داد.

خصوص ونول‌ها در شبکه ساب پاپیلاری درم فوکانی هستند ولی گاهی امکان دارد منشأ مویرگی یا شریانی هم داشته باشند (۱۱). تلانژیکتازی، اتساع از قبل موجود در عروق، بدون هیچ گونه رشد عروق جدید (آژیوژنژ) است، در حالی که مالفورماسیون‌های عروقی آنومالی در تکامل جینی عروق هستند (۵).

تلانژیکتازی‌ها را علاوه بر اختلال‌های اولیه‌ای مانند generalized congenital HBT، HHT و telangiectasia می‌توان به طور ثانوی و به علل دیگری مانند افزایش سن، اشعه فرابنفش، ترومما، تابش اشعه X، سیگار و مصرف داروهای مسدودکننده کانال کلسیم مشاهده کرد (۵).

هم چنین ممکن است تلانژیکتازی، علامتی از بیماری سیستمیک مانند لوپوس اریتماتوی سیستمیک، درماتومیوزیت، اسکلرودرمی، ماستوسیتوز پوستی و لنفوم آژیوتروپیک باشد (۵).

References

- 1-Zahorcsuk Z, Schneider I. Hereditary benign telangiectasis. Dermatology 1994 ; 189(3): 286-8.
- 2-Sanchez JL, Ackerman AB. Vascular proliferation of skin and subcutaneous fat. Hereditary benign telangiectasia. In: Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, editors. Dermatology in general medicine. 4th ed. New York: Mc Graw Hill, 1993; p.1225.
- 3-Wells RS, Dowling G. Hereditary benign telangiectasia. Br J Dermatol 1971 Jan; 84(1): 93.
- 4-Sredoja Tisma V, Dobric II, Pasic A. Hereditary benign telangiectasia. Acta Dermatovenereol Croast 2004 Aug; 12(3): 169-72.
- 5-Mortimer PS, Burnand KG. Diseases of the veins and arteries, leg ulcers, telangiectases. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors. Rook's textbook of dermatology. 7th ed. Oxford: Blackwell Publishing 2004: p.50.45-50.54.
- 6-Grenz H, Peschen M, Wiek K, et al. Hereditary benign telangiectasia: a rare form of primary telangiectasia with successful treatment with flash-lamp-pump pulsed dye laser. Vasa 1998 Aug; 27(3): 192-5.
- 7-Puppin DJ, Rybojad M, Morel P. Hereditary benign telangiectasia: Two case reports. J Dermatol 1992 Jun; 19(6): 384-6.
- 8-Gold MH, Erarro L, Prendiville JS. Hereditary benign telangiectasia. Pediatr Dermatol 6: 194, 1989 Sep; 6(3): 194-7.

- 9-Ryan TJ, Wells RS. Hereditary benign telangiectasia. Trans St John's Hosp Dermatol Soc 1971; 57: 148-56.
- 10-Watanabe M, Tomita Y, Tagami H. Hereditary benign telangiectasia: a congenital type. Dermatologica 1990; 181(2): 152-3.
- 11-Brancati F, Valente EM, Tadini G, et al. Autosomal dominant hereditary benign telangiectasia maps to the CMC1 locus for capillary malformation on chromosome 5q14. J Med Genet 2003 Nov; 40(11): 849-53.
- 12-Dong SL, Reynold SF, Steiner IP. Brain abcess in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Case report and literature review. J Emerg Med 2001 Apr; 20(3): 247-51.
- 13-Roman G, Fisher M, Perl DP, Poser CM. Neurological manifestations of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber disease): report of 2 cases review of the literature. Ann Neurol 1978 Aug; 4(2): 130-44.
- 14-Daly JJ, Schiller AL. The liver in hereditary hemorrhagic telangiectasia (Osler Weber Rendu disease). Am J Med 1976 May 10; 60(5): 723-6.
- 15-Tsianakas P, Teillac-Hamel D, Fraitag S, et al. Ultrastructural study of hereditary benign telangiectasia. Differential diagnosis from Osler Rendu disease. Ann Dermatol Venereol 1995; 122(8): 517-20.French.
- 16-Onishi Y, Ohara K, Shikala Y, Satomi H. Hereditary benign telangiectasia: image analysis of hitherto unknown association with arteriovenous malformation. Br J Dermatol 2001 Oct; 145(4): 641-5.
- 17-Purcell E, Condom C. Intense pulsed light therapy in the management of hereditary benign telangiectasia. Br J Plast Surg 2004 Jul; 57(5): 453-5.
- 18-Mc Nicholl F, McMullin MF, Nevin NC, McMillan C. Hereditary benign telangiectasia-first family in Northern Ireland. Ulster Med J 1999 Nov; 68(2): 106-7.