

مجموعه‌های شبه ضربی بسته در مدول‌ها

ولی گرجی‌زاده و مریم داودیان*

گروه ریاضی - دانشگاه شهید چمران اهواز

*دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ایذه

پست الکترونیکی : Gorjizadeh_v@cua.ac.ir

چکیده

در این مقاله زیرمجموعه‌های خاصی از مدول M را که شبه ضربی بسته نامیده‌ایم، تعریف کرده و بسیاری از قضایای ضربی بسته حلقه‌ها از جمله قضیه معروف کهن را در مورد مدول‌ها اثبات کردایم. شبه ضربی بسته اشباع شده را تعریف کرده و نشان داده‌ایم تعمیمی از ضربی بسته اشباع شده حلقه‌ها است. چنانچه S زیرمجموعه شبه ضربی بسته یک مدول باشد، نشان داده‌ایم کوچکترین زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده شامل S وجود دارد و

عبارت است از $P = \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$. مدول کسرها را تعریف کرده و ارتباطی بین

زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول M و زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول کسرهای S در M پیدا کرده‌ایم. همچنین چنانچه N زیرمدولی از M باشد، نشان داده‌ایم تناظری یک به یک بین زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول $\frac{M}{N}$ که شامل صفر نیستند و زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول M که مجزای از N است وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: مجموعه ضربی بسته، مجموعه شبه ضربی بسته، زیرمدول اول.

مقدمه

در این مقاله R حلقه‌ای تعویض‌پذیر و یکدار و کلیه مدول‌ها یکانی فرض می‌شوند. زیرمدول سرء P از M را اول می‌نامیم هرگاه از $ra \in P$ نتیجه شود $a \in P$ یا $rM \subseteq P$. مجموعه همه زیرمدول‌های اول M را طیف M نامیده و با $\text{Spect}(M)$ نمایش می‌دهیم. بر خلاف حلقه‌ها که همواره $\text{Spect}(R) \neq \emptyset$ در $-R$ -مدول‌ها چنین نیست. برای مثال در $-Z$ -مدول Z_{p^∞} داریم $\text{Spect}(Z_{p^\infty}) = \emptyset$. (رجوع شود به [۲] و [۳] و [۴] و [۵]). چنانچه N زیرمدولی از $-R$ -مدول M باشد مجموعه $\{r \in R \mid rM \subseteq N\}$ با $(N : M)$ نمایش داده می‌شود و این مجموعه یک ایدآل حلقه R است.

زیرمجموعه‌های ضربی بسته در حلقه‌ها تعریف شده‌اند (رجوع شود به [۷] و [۸]).

در بخش اول این مقاله زیرمجموعه‌های خاصی از مدول M را که شبه ضربی بسته نامیده‌ایم تعریف کرده و قضایای متناظر با زیرمجموعه‌های ضربی بسته در حلقه R از جمله قضیه معروف کهنه را اثبات نموده‌ایم (قضیه ۱-۲).

در بخش دوم این مقاله زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته اشباع شده یک $-R$ -مدول را تعریف کرده و نشان داده‌ایم مفهوم شبه ضربی بسته اشباع شده مدول‌ها تعمیمی از مفهوم شبه ضربی بسته اشباع شده حلقه‌ها است، و همچنین نشان داده‌ایم که قضایای متناظر با ضربی بسته اشباع شده حلقه‌ها در اینجا نیز بر قرار هستند (قضیه ۲-۲).

فرض کنیم N یک زیرمدول داده شده‌ای از $-R$ -مدول M باشد. در بخش سوم

این مقاله به ارتباط بین زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول خارج قسمتی $\frac{M}{N}$ و مدول M پرداخته‌ایم (قضایای ۱-۳ و ۲-۳). همچنین اگر S زیرمجموعه شبه ضربی بسته $-R$ -مدول M باشد، مدول کسرهای S در M را که با $S^{-1}M$ نمایش می‌دهیم تعریف کرده و به ارتباط بین زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول $S^{-1}M$ و مدول M پرداخته‌ایم (قضایای ۳-۳ و ۴-۳).

۱- زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته یک مدول

تعریف ۱-۱ فرض کنیم M یک R -مدول باشد، زیرمجموعه ناتهی S از M را شبه ضربی بسته می‌نامیم هرگاه برای هر $r \in R$

$$(1) \text{ اگر } rS \subseteq S \text{ و } rM \cap S \neq \emptyset \text{ آن‌گاه}$$

(۲) اگر $N \cap S = \emptyset$ و N زیرمدولی از M باشد به طوری که آنگاه $N \cap S = \emptyset$ و $S \cap (rM + N) = \emptyset$.

تعریف ۲-۱ گیریم R حلقه‌ای تعویض‌پذیر و یکدار باشد و S زیرمجموعه‌ای از R باشد. S را ضربی بسته می‌نامیم هرگاه از $s_1, s_2 \in S$ و $s_1 s_2 \in S$ نتیجه شود که

تذکر ۱-۱ اگر S زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مدول باشد، آنگاه S زیرمجموعه ضربی بسته حلقه R است.

تذکر ۲-۱ به آسانی دیده می‌شود که اگر M یک R -مدول و S زیرمجموعه ضربی بسته حلقه R و N زیرمدولی از M باشد آنگاه $\{sn \mid s \in S, n \in N\}$ زیرمجموعه شبه ضربی بسته مدول M است.

قضیه ۱-۱ گیریم M یک R -مدول و P زیرمدول اوّل M باشد. در این صورت $S = M - P$ زیرمجموعه شبه ضربی بسته M است.

اثبات: گیریم r عضوی از R باشد. اگر $rM \cap S \neq \emptyset$ ، آنگاه

$$rM \not\subset P \quad (1)$$

فرض کنیم $s \in S$ و $rs \in P$ و $rs \notin S$. پس $rs \in P$ و از اوّل بودن P نتیجه می‌شود که $rM \subseteq P$ و این نتیجه در تنافض با رابطه (۱) است؛ در نتیجه $rS \subseteq P$ و اگر $N \cap S = \emptyset$ و N زیرمدولی از M باشد به طوری که آنگاه $N \cap S = \emptyset$ و $rM \cap S = \emptyset$

$$(N + rM) \cap S = \emptyset \quad \text{زیرا } N \subseteq P \text{ و } rM \subseteq P \text{ در این صورت}$$

$$\blacksquare. rM + N \subseteq P$$

مثال زیر نشان می‌دهد که هر زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مدول M لزوماً به صورت $M - P$ که زیرمدول اول M باشد، نیست.

مثال ۱-۱ Z -مدول Z را در نظر می‌گیریم. در این صورت $\{0, 1, -1\}$

زیرمجموعه شبه ضربی بسته Z است. بدیهی است که S به صورت $Z - P$ که P

زیرمدول Z_Z باشد نیست و S زیرمدول M هم نیست.

حال نتیجه زیر که تعمیم قضیه کهن در مورد مدول‌ها است به دست می‌آید.

قضیه ۲-۱ فرض کنیم S زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مadol M باشد. گیریم N

زیرمدولی از M باشد و $S \cap N = \emptyset$. در این صورت زیرمدول اول P وجود دارد به

طوری که $S \cap P = \emptyset$ و $N \subseteq P$.

اثبات: قرار می‌دهیم $F = \{N' \mid N \subseteq N'$ و $N \in S\}$ زیرمدول M باشد

بدیهی است که $N \in F$ و از این رو $F \neq \emptyset$. با رابطه شمول، F مجموعه‌ای جزئی مرتب است. گیریم Ω یک زنجیر در F باشد، به راحتی دیده می‌شود که $\bigcup_{N' \in \Omega} N'$ و

$\bigcup_{N' \in \Omega} N'$ کران بالایی برای Ω است. بنا بر لم زرن F دارای عضو ماکسیمال است. این

عضو ماکسیمال را P می‌نامیم و ادعا می‌کنیم P زیرمadol اول M است. گیریم $ra \in P$ و

$a \notin P$. از ماکسیمال بودن P در مجموعه F نتیجه می‌شود که

$(\langle a \rangle + P) \cap S \neq \emptyset$. از این رو $t \in P$ و $r' \in R$ وجود دارند به طوری که

$$r'a + t = s \in S \quad \text{در نتیجه}$$

$$rs = r(r'a + t) = r'(ra) + rt \in P \quad (1)$$

اگر $rM \cap S \neq \emptyset$ آنگاه بنا بر (۱)، $rs \in S \cap P$ و این با فرض $P \in F$ در تناقض است. بنابراین $rM \cap S = \emptyset$ لذا $P \in F$ و $(P + rM) \cap S = \emptyset$ و در نتیجه $P + rM \in F$. از طرفی $P \subseteq P + rM$ و عضو ماقسیمال F است. پس $rM + P = P$ و لذا $rM + P = P$ است. ■

در قضیه فوق اگر $N = (0)$ و $0 \notin S$ آنگاه زیرمدول اول وجود دارد. تمام قسمت اول [۲] در مورد زیرمدول‌های بدون اول $(\text{Spec}(M) = \emptyset)$ است. در اینجا ما نتیجه واضح زیر را داریم.

نتیجه ۱-۱ R -مدول M بدون اول است اگر و تنها اگر هر زیرمجموعه شبه ضربی بسته M شامل صفر باشد.

اگر در تعریف ۱-۱ شرط ۲ را حذف کنیم قضیه ۱-۱ ثابت می‌شود ولی قضیه ۱-۲ دیگر صادق نیست. مثال زیر را ببینید.

مثال ۲-۱ Z -مدول $Z \oplus Z$ را در نظر می‌گیریم. در این صورت روشن است که $\{(1, 3), (1, -3), (-1, 2), (-1, -2)\} = S$ زیرمجموعه‌ای از $Z \oplus Z$ است که فقط شرط ۱ تعریف زیرمجموعه شبه ضربی بسته را دارد. فرض کنیم $N = 2Z \oplus 3Z$. بدیهی است که $N \cap S = \emptyset$ و N اول نیست. به راحتی دیده می‌شود که تنها زیرمدول‌های اول شامل N عبارتند از $P_1 = Z \oplus 3Z$ و $P_2 = 2Z \oplus Z$. از طرفی $P_1 \in S \cap P_2$ و $P_2 \in S \cap P_1$. بنابراین قضیه ۱-۲ در این حالت صادق نیست.

این بخش را با اشاره به بعضی از حقایق مربوط به زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول‌ها خاتمه می‌دهیم.

در واقع اگر M یک R -مدول و N زیرگروه آن باشد، در این صورت N زیرمجموعه شبه ضربی بسته M است اگر و تنها اگر N زیرمدول M باشد.

مثال زیر نشان می دهد که اجتماع دو زیرمجموعه شبه ضربی بسته در حالت کلی یک زیر مجموعه شبه ضربی بسته نیست.

مثال ۳-۱ Z - مدول را در نظر می گیریم. گیریم S_1 مجموعه اعداد صحیح فرد و $S_2 = Z - S_1$. در این صورت S_1 و S_2 زیرمجموعه های شبه ضربی بسته Z هستند ولی $S' = S_1 \cup S_2$ شبه ضربی بسته نیست؛ زیرا $S' \subsetneq S_1 \cup S_2$.

مثال زیر نشان می دهد اشتراک دو زیرمجموعه شبه ضربی بسته در حالت کلی یک زیر مجموعه شبه ضربی بسته نیست.

مثال ۴-۱ Z - مدول را در نظر می گیریم. اگر $S_2 = Z - 3Z$ و $S_1 = Z - 2Z$ آن گاه S_1 و S_2 زیرمجموعه های شبه ضربی بسته Z هستند ولی $S' = S_1 \cap S_2$ شبه ضربی بسته نیست. زیرا $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ و $2Z \cap (S_1 \cap S_2) = \emptyset$ ولی $\bullet. 2Z \oplus 3Z \cap (S_1 \cap S_2) \neq \emptyset$

قضیه ۳-۳ فرض کنیم M یک R - مدول باشد . گیریم A زیرمدول M و S زیرمجموعه شبه ضربی بسته M باشد به طوری که $S \cap A = \emptyset$. در این صورت $S + A = \{s + a \mid s \in S, a \in A\}$ زیرمجموعه شبه ضربی بسته M است .

اثبات: گیریم $rM \cap (S + A) \neq \emptyset$. به آسانی دیده می شود که $rM \cap S \neq \emptyset$. پس $rS \subseteq S$ و در نتیجه $rM \cap (S + A) = \emptyset$. اگر $r(S + A) \subseteq S + A$ و همچنین N یک زیرمدول M باشد که $N \cap (S + A) = \emptyset$ ، به آسانی دیده می شود که $rM \cap S = \emptyset$ و $(A + N + rM) \cap S = \emptyset$ و بنابر شبه ضربی بسته بودن S داریم $(N + A) \cap S = \emptyset$. در نتیجه $(N + rM) \cap (S + A) = \emptyset$. بنابراین $S + A$ نیز زیرمجموعه شبه ضربی بسته است . ■ .

قضیه زیر با الهام از قسمت دوم لم ۴ از [۱] می باشد.

قضیه ۴-۱ گیریم M بک R -مدول و S زیرمجموعه شبه ضربی بسته M و A زیرمدولی از M باشد که $S \cap A = \emptyset$. فرض کنیم P زیرمدول اول M باشد. در این صورت $A \subseteq P$ و $P \cap (S + A) = \emptyset$ اگر و تنها اگر P در زیرمدول اول Q با خواص $A \subseteq Q$ و $Q \cap S = \emptyset$ قرار گیرد.

اثبات: (\Rightarrow) گیریم P زیرمدول اول M باشد و $P \subseteq Q$ ، به گونه‌ای که Q زیرمدول اول M است و $A \subseteq Q$ و $Q \cap S = \emptyset$. در این صورت Q مجزای از $S + A$ است و $P \cap (S + A) = \emptyset$. پس $P \cap (S + A) \subseteq Q \cap (S + A) = \emptyset$ بدیهی است که $(P + A) \cap S = \emptyset$. بنابر قضیه ۱-۲، اگر P مجزای از $S + A$ باشد آنگاه $(P + A) \cap S = \emptyset$. لذا $Q \subseteq P + A \subseteq Q$ و $Q \cap S = \emptyset$. زیرمدول اول Q وجود دارد به طوری که $A \subseteq Q$ و $Q \cap S = \emptyset$.

■ $A \subseteq Q$ و $Q \cap S = \emptyset$ است و M زیرمدول اول است.

۲ - زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته اشباع شده در مدول‌ها

تعریف ۱-۲ گیریم S زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مدول M باشد. S را شبه ضربی بسته اشباع شده می‌نامیم هر گاه به ازای هر $a \in M$ و $r \in R$ از $ra \in S$ نتیجه شود. $a \in S$

به راحتی دیده می‌شود که اگر M یک R -مadol و P زیرمدول اول M باشد، آنگاه P زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده M است. همچنین به سادگی دیده می‌شود که اگر S زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده R -مadol R باشد آنگاه S زیرمجموعه ضربی بسته اشباع شده حلقة R است.

یادآوری می‌شود که اشتراک زیرمجموعه‌های ضربی بسته یک حلقه خود ضربی بسته است. مثال ۴-۱ نشان می‌دهد که در مورد زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته مدول‌ها این مطلب درست نیست. اما داریم:

قضیه ۱-۲ گیریم S زیرمجموعه شبه ضربی بسته R مدول M باشد. در این صورت اشتراک همه زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته اشباع شده شامل S زیرمجموعه‌ای شبه ضربی بسته اشباع شده و شامل S است.

اثبات: فرض کنیم $\{S_i\}_{i \in I}$ خانواده همه زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته اشباع شده شامل S باشد. چون M یک زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده و شامل S است، این خانواده ناتھی است. بدیهی است که $.S \subseteq \bigcap_{i \in I} S_i$ گیریم

$$rM \cap \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) \neq \emptyset$$

آنگاه

$$.r \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} S_i$$

حال فرض کنیم $rM \cap \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) = \emptyset$ یک زیرمدول M باشد به طوری که

$$N \cap \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) = \emptyset$$

پس

$$N \cap S = \emptyset \text{ و } rM \cap S = \emptyset$$

از این رو

$$S \cap (rM + N) = \emptyset$$

بنابر قضیه ۱-۲ زیرمدول اول P وجود دارد به طوری که

$$rM + N \subseteq P \text{ و } P \cap S = \emptyset$$

پس

$$S \subseteq M - P$$

چون $M - P$ زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده است، لذا $j \in I$ وجود دارد به طوری که

$$M - P = S_j$$

و از این رو

$$(rM + N) \cap S_j = \emptyset$$

و در نتیجه

$$(rM + N) \cap \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) = \emptyset$$

بنابراین $\bigcap_{i \in I} S_i$ زیرمجموعه شبه ضربی بسته M و شامل S است. بدینهی است که $\bigcap_{i \in I} S_i$ اشباع شده است.

تعريف ۲-۲ فرض کنیم S یک زیرمجموعه شبه ضربی بسته M باشد. در این صورت کوچکترین زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده شامل S وجود دارد و آن را با \bar{S} نمایش می‌دهیم.

یادآوری می‌شود که اگر S زیرمجموعه ضربی بسته حلقه R باشد آنگاه \bar{S} کوچکترین زیرمجموعه ضربی بسته شامل S وجود دارد. می‌توان نشان داد که

$$\bar{S} = R - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(R) \\ P \cap S = \emptyset}} P \quad (\text{رجوع شود به } [\forall] \text{ و } [\wedge]. \text{ در مدول های نیز داریم.})$$

قضیه ۲-۲ فرض کنید M یک R -مدول و S یک زیرمجموعه شبه ضربی بسته M باشد

$$\bar{S} = M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \quad \text{و } 0 \notin S \text{ در این صورت}$$

اثبات: $0 \notin S$ بنابراین از قضیه ۲-۱ نتیجه می‌شود که $\text{Spect}(M) \neq \emptyset$ گیریم r عضوی

از R باشد. فرض کنیم

$$rM \cap \left(M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \right) \neq \emptyset$$

در این صورت به راحتی دیده می‌شود که

$$r \left(M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \right) \subseteq M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$$

حال فرض کنیم $rM \cap \left(M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \right) = \emptyset$ که

$$N \cap \left(M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \right) = \emptyset$$

$$(rM + N) \cap S = \emptyset$$

و بنابر قضیه ۲-۱ زیرمدول اول P_0 وجود دارد به طوری که

$$rM + N \subseteq P_0 \quad \text{و} \quad P_0 \cap S = \emptyset$$

پس

$$rM + N \subseteq \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$$

و در نتیجه

$$(rM + N) \cap \left(M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \right) = \emptyset$$

بنابراین $M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$ زیرمجموعه شبه ضربی بسته M است.

به آسانی دیده می‌شود که $M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$ اشباع شده است و $S \subseteq M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$.

$$\bar{S} \subseteq M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$$

حال فرض کنیم T یک مجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده شامل S باشد. گیریم

$$x \in M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$$

فرض کنیم $x \notin T$. چون T اشباع شده است

$$\langle x \rangle \cap T = \emptyset$$

پس

$$\langle x \rangle \cap S = \emptyset$$

و بنابر قضیه ۲-۱ زیرمدول اول P_0 وجود دارد به طوری که
 $P_0 \cap S = \emptyset$ و $\langle x \rangle \subseteq P_0$

از این رو

$$x \in \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P$$

و این با انتخاب x در تناقض است. لذا $M - \bigcup_{\substack{P \in \text{Spec}(M) \\ P \cap S = \emptyset}} P \subseteq T$ و اثبات قضیه تمام است. ■

۳ - مدول کسرهای S در M

گیریم M یک R -مدول و S زیرمجموعه شبه ضربی بسته M باشد به گونه‌ای که
 $0 \notin S$. در این صورت $\{r \in R \mid \exists m \in M \quad rm \in S\}$ یک زیرمجموعه
 ضربی بسته حلقه R است و آن را با $S \div M$ نشان می‌دهیم. در ضمن $1_R \in S \div M$
 و $0 \notin S \div M$. مجموعه $P = \{r \in R \mid rM \cap S = \emptyset\}$ یک ایدآل اول حلقه R است و
 به علاوه چنانچه P' زیرمدول اولی از M باشد به گونه‌ای که
 $(P' : M) \subseteq P$ آنگاه $P' \cap S = \emptyset$.

به راحتی می‌توان دید که چنانچه S زیرمجموعه ضربی بسته حلقه R باشد آنگاه

$$\bar{S} = S \div R = \left\{ r \in R \mid \exists r' \in R, rr' \in S \right\}$$

قضیه ۱-۳ گیریم M یک R -مدول باشد. فرض کنیم N زیرمدولی از M و $S \cap N = \emptyset$. در این صورت

$$\frac{S}{N} = \left\{ s + N \mid s \in S \right\}$$

$$0_{\frac{M}{N}} \notin \frac{S}{N}$$

اثبات: فرض کنیم $r \left(\frac{M}{N} \right) \cap \frac{S}{N} \neq \emptyset$. با استفاده از قضیه ۱-۳ به راحتی دیده می‌شود که

$$\frac{M}{N} \text{ و } \frac{N'}{N} \text{ همچنین زیرمدولی از } \frac{S}{N} \text{ هستند. حال فرض کنیم } r \frac{S}{N} \subseteq \frac{S}{N}$$

باشد به طوری که $N' \cap S = \emptyset$. در این صورت $rM \cap S = \emptyset$ و در $\frac{N'}{N} \cap \frac{S}{N} = \emptyset$ و در

$$\frac{S}{N} \cdot \left(r \frac{M}{N} + \frac{N'}{N} \right) \cap \frac{S}{N} = \emptyset . \text{ از این رو } (rM + N') \cap S = \emptyset$$

زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مدول $\frac{M}{N}$ است. بدیهی است که

قضیه ۲-۳ فرض کنیم M یک R -مدول و N یک زیرمدول آن باشد. گیریم S' یک

زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مدول $\frac{M}{N}$ باشد. قرار می‌دهیم

$$S = \left\{ s \in M \mid s + N \in S' \right\}$$

$S \cap N = \emptyset$ است و به علاوه اگر $s \in S'$

اثبات: گیریم r عضوی از R باشد. اگر $rM \cap S \neq \emptyset$ ، آنگاه $rM \cap S' \neq \emptyset$ و در

نتیجه $r \frac{M}{N} \cap S' = \emptyset$. اگر $rM \cap S = \emptyset$ ، آنگاه $rS \subseteq S$. اگر $rS' \subseteq S'$ ، پس

فرض کنیم N' زیرمدولی از M باشد به طوری که $N' \cap S = \emptyset$. به آسانی دیده می‌شود که $S' \cap \left(r \frac{M}{N} + \frac{N'+N}{N}\right) = \emptyset$. بنابراین $\frac{N'+N}{N} \cap S' = \emptyset$ و در نتیجه $(rM + N') \cap S = \emptyset$ است. از این رو S زیرمجموعهٔ شبه ضربی بسته R -مدول M است.

■ $S \cap N = \emptyset$ لذا $0 \in S'$

از مشاهدات بالا نتیجه می‌شود که چنانچه N زیرمدول داده شده‌ای از R -مدول M باشد آنگاه یک تناظر یک به یک بین زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته M که مجزای از N هستند و زیرمجموعه‌های شبه ضربی بسته R -مدول $\frac{M}{N}$ که شامل صفر نیستند وجود دارد. نتیجهٔ بالا در مورد حلقه‌ها به صورت زیر است.

نتیجه ۱-۳ فرض کنیم I یک ایدآل حلقه R باشد. در این صورت یک تناظر یک به یک بین زیرمجموعه‌های ضربی بسته حلقه R که مجزای از I هستند و زیرمجموعه‌های ضربی بسته حلقه $\frac{R}{I}$ که شامل صفر نیستند وجود دارد.

یادآوری می‌شود که اگر M_R و S زیرمجموعهٔ ضربی بسته حلقه R باشد به طوری که $R \notin 0, R - M$ تعریف شده و خواص آن مورد بررسی قرار گرفته است (رجوع شود به [۷] و [۸]). در اینجا اگر S یک زیرمجموعهٔ شبه ضربی بسته R -مدول M باشد تعریف می‌کنیم:

تعریف ۱-۳ فرض کنیم M یک R -مدول و S زیرمجموعهٔ شبه ضربی بسته آن باشد به طوری که $S \notin 0$. لذا $S \div M$ زیرمجموعهٔ ضربی بسته حلقه R است. تعریف می‌کنیم $S^{-1}M = (S \div M)^{-1}M$. بنابراین $S^{-1}M$ یک R -مدول و نیز یک R -مدول است.

قضیه ۳-۳ فرض کنیم M یک R -مدول و S زیرمجموعه شبه ضربی بسته M باشد به

$$\text{گونه‌ای که } S \notin 0. \text{ در این صورت } (S \div M)^{-1} S = \left\{ \frac{s'}{s_0} \mid s' \in S, s_0 \in S \div M \right\} \text{ یک}$$

زیرمجموعه شبه ضربی بسته R -مدول $S^{-1}M$ است و به علاوه اگر S اشباع شده باشد $(S \div M)^{-1} S$ نیز اشباع شده است.

اثبات: فرض کنیم r عضوی از حلقه R باشد. اگر $r(S \div M)^{-1} M \cap (S \div M)^{-1} S \neq \emptyset$

به آسانی دیده می‌شود که $rM \cap S \neq \emptyset$ و از این رو $rS \subseteq S$ و در نتیجه

$$N' = r(S \div M)^{-1} M \cap (S \div M)^{-1} S = \emptyset. \text{ اگر } r(S \div M)^{-1} M \subseteq (S \div M)^{-1} S$$

زیرمدولی از $(S \div M)^{-1} M$ باشد به طوری که $N' \cap (S \div M)^{-1} S = \emptyset$ ، در این صورت

$$N' = (S \div M)^{-1} N \text{ به طوری که } N \text{ زیرمدولی از } M \text{ است. به آسانی دیده می‌شود که}$$

$$(rM + N) \cap S = \emptyset \text{ و } rM \cap S = \emptyset \text{ و در نتیجه } N \cap S = \emptyset$$

$$(S \div M)^{-1} (rM + N) \cap (S \div M)^{-1} S = \emptyset \text{ زیرمجموعه شبه}$$

ضربی بسته $(S \div M)^{-1} M$ است. حال فرض کنیم به ازای M و $\frac{s'}{s_0} \in (S \div M)^{-1} M$

$$S \in R \text{ داشته باشیم } r \frac{s'}{s_0} = rs' \in (S \div M)^{-1} S \text{ در نتیجه } rs' \in S \text{ و چون } S$$

زیرمجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده R -مدول M است $s' \in S$. در

$$\text{نتیجه } S \in (S \div M)^{-1} S \text{ و } \frac{s'}{s_0} \in (S \div M)^{-1} R \text{ اشباع شده است.} \blacksquare$$

در واقع به راحتی می‌توان دید که اگر M یک R -مدول و S یک زیرمجموعه

شبه ضربی بسته آن باشد به طوری که $s \in S$ ، آنگاه

$$(S \div M)^{-1} S = \left\{ \frac{s'}{s_0} \mid s' \in S, s_0 \in S \div M \right\} \text{ یک زیرمجموعه شبه ضربی}$$

بسته $(S \div M)^{-1} M$ است و همچنین اگر S اشباع شده باشد

$$(S \div M)^{-1} S \text{ نیز اشباع شده است.}$$

قضیه ۴-۳ فرض کنیم M یک R -مدول و S' زیرمجموعه ضربی بسته حلقة R باشد.

گیریم S'' زیرمجموعه شبه ضربی بسته R مدول $S'^{-1}M$ باشد. اگر قرار دهیم

$$S = \left\{ m \in M \mid \exists s \in S \div M, \frac{m}{s} \in S'' \right\}$$

M -مدول است و به علاوه اگر S'' اشباع شده باشد S نیز اشباع شده است.

اثبات: گیریم r عضوی از R باشد. اگر $rM \cap S \neq \emptyset$ به آسانی دیده می‌شود که

$$rS'^{-1}N \cap S'' = \emptyset \quad \text{و} \quad rS'^{-1}M \cap S'' = \emptyset$$

$$(rM + N) \cap S = \emptyset \quad \text{بنابراین} \quad S'' \cap (rS'^{-1}M + S'^{-1}N) = \emptyset$$

ضربی بسته M است. اثبات قسمت آخر قضیه ساده است. ■

گیریم M یک R -مدول و S' زیرمجموعه ضربی بسته حلقة R باشد. فرض کنیم S''

زیرمجموعه شبه ضربی بسته $S'^{-1}R$ - مدول $S'^{-1}M$ باشد. اگر

$$S = \left\{ m \in M \mid \exists s \in S', \frac{m}{s} \in S'' \right\}$$

ضربی بسته R -مدول M است. به علاوه اگر S'' اشباع شده باشد آنگاه S نیز اشباع شده است.

قضیه ۵-۳ فرض کنید M یک R -مدول و N زیرمدول M و S زیرمجموعه شبه ضربی

بسته M باشد به طوری که $S \cap N \neq \emptyset$. در این صورت $S \cap N \subseteq S'$ زیرمجموعه شبه

ضربی بسته N است.

اثبات: گیریم r عضوی از R باشد. اگر $rN \cap S' \neq \emptyset$ آن گاه $rM \cap S \neq \emptyset$. از طرفی

چون S ضربی بسته است پس $rS \subseteq S$. در نتیجه $r(S \cap N) \subseteq (S \cap N)$ یا

$$rS' \subseteq S'$$

اگر $rN \cap S' = \emptyset$ و $N' \cap S' = \emptyset$ باشد به طوری که $N' \cap S' = \emptyset$ ، به راحتی

دیده می‌شود که $rN \cap S = \emptyset$ و نیز به وضوح $N' \cap S = \emptyset$ زیرمدولی از M است.

اگر $r(S \cap N) \subseteq S \cap N$ آنگاه $rM \cap S = \emptyset$ و از این‌رو

$rN \cap S = \emptyset$ و این نتیجه با فرض $r(S \cap N) \cap (S \cap N) \subseteq rN \cap S$ تناقض است. بنابراین $(rM + N') \cap S = \emptyset$. لذا $rM \cap S = \emptyset$. در نتیجه $(rN + N') \cap S' = \emptyset$.

■.

مراجع

- [1] Bergman, G., “Arrays of prime ideals in commutative rings” J. Algebra. 261 (2003) 389- 410.
- [2] McCasland, R.L., Moore, M.E. and Smith, P.F., “Spectrum module over commutative ring” Comm. Algebra, 25 (1997) 97-103.
- [3] McCasland, R.L. and Moore, M.E., “Prime submodules” Comm. Algebra, 20 (1992) 1803-1817.
- [4] McCasland, R.L. and Smith, P.F., “Prime submodules of Noetherian modules” Roky Mtn. J. 22 (1996) 457-471.
- [5] McCasland, R.L. and Smith, P.F., “Modules with Bounded Spectra” Comm. Algebra, 26, 10 (1998) 3403-3417.
- [6] McCasland, R.L. and Smith, P.F., “Prime Submodules of Noetherian modules” Rocky Mtn. J. 23, 3 (1993) 1041-1062.
- [7] Kaplansky, I., Commutative Rings; University of Chicago Press: Chicago; (1974).
- [۸] رودنی شارپ، گام‌هایی در جبر تعویض‌پذیر، ترجمه محمد مهدی ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶.