

## مقایسه تأثیر درمانی آنتولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی در بیماران با پرفشاری خون

<sup>۱۰</sup> علیرضا خسروی \* ، اصغر مزارعی \*\* ، مسعود پورمقدس \*\*\* ، رضوان انصاری ° ، شاهین شیرانی <sup>۰</sup>  
مقدمه:

برفشاری خون یکی از مهمترین عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی است. بتابلوکرها و دیبورتیکهای تیازیدی بدلیل نقش آنها در کاهش موربیدیتی و مورتالیتی قلبی عروقی، بعنوان اولین داروی انتخابی در بسیاری از مطالعات بررسی شده‌اند هدف از این مطالعه مقایسه اثر درمانی آنتولول بعنوان شایعترین بتابلوکر توصیه شده به بیماران پرفشاری خون در اصفهان از دو شرکت تولید داخلی و خارج از ایران می‌باشد.

این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی دو سویه کوچک بر روی بیماران پرفشاری خون شهرستان اصفهانک از نوع استان اصفهان می‌باشد که بصورت تصادفی بعد از سه هفته عدم مصرف دارو در دو گروه ۵۰mg قرص آنتولول ساخت شرکت داروپخش ایران (۱۰۰ نفر) و ۵۰mg قرص آنتولول خارجی (۱۰۰ نفر) در شرایط درسوکور قرار گرفتند. طول درمان ۳ ماه بود که هر هفته بیماران از نظر فشارخون سیستول و دیاستول و تعداد ضربان قلبی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند.

فشارخون سیستول نسبت به قبل از شروع درمان در گروه مورد (آنتولول ساخت شرکت داروپخش ایران) و شاهد (آنتولول خارجی) به ترتیب در ماه اول  $-21 \pm 18$  و  $-21 \pm 52$ - میلی‌متر جیوه، ماه دوم  $-23 \pm 16$  و  $-29 \pm 21$ - میلی‌متر جیوه و ماه سوم  $-26 \pm 15/4$  و  $-30 \pm 21/2$ - میلی‌متر جیوه کاهش یافت که تفاوت معنی‌داری از نظر آماری بین دو گروه در هر مقطع زمانی مشاهده شد. همچنین تغییرات فشارخون دیاستول به ترتیب در ماه اول  $-12/92 \pm 9/01$  و  $-7/39 \pm 8/07$ - میلی‌متر جیوه و ماه دوم  $-12/6 \pm 7/5$  و  $-7/87 \pm 7/05$ - میلی‌متر جیوه و ماه سوم  $-13/2 \pm 8/5$  و  $-8/1 \pm 8/8$ - میلی‌متر جیوه گزارش شده که از نظر آماری در دو ماه آخر تفاوت معنی‌دار بود.

( $P < 0.05$ ) تفاوت معنی‌داری از نظر تغییرات ضربان قلب بین دو گروه و در طول مدت مطالعه مشاهده نشد.

آنچه از نتایج این مطالعه بدست آمده بیانگر کارآیی کنترل و درمان هر دو داروی آنتولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی در بیماری پرفشاری خون می‌باشد و البته این مطالعه نشان داد آنتولول خارجی نسبت به نوع مشابه داخلی‌اش سرعت اثر بیشتری در کنترل فشارخون سیستولیک دارد ولی قرص آنتولول ساخت شرکت داروپخش ایران باعث کاهش بیشتری در فشارخون دیاستولیک می‌گردد از طرفی درمان با داروی ایرانی دربیماران با فشار خون متوسط سبب کنترل فشارخون در سطح مطلوب می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پرفشاری خون، آنتولول، ایران

\* متخصص قلب و عروق، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان تلفن: ۰۳۱۱-۳۳۵۹۷۹۷ (مؤلف مستول)

\*\* رزیدنت قلب و عروق، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق

\*\*\* متخصص قلب و عروق، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

◊ کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق

○ متخصص قلب و عروق، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

محصولات دارویی، توجه زیادی به ساخت، تولید و عرضه داروهای داخلی می‌شود. به رغم حرکتهای مثبت در این جهت، هنوز مطالعات کلینیکی قابل اعتمادی جهت بررسی کارآیی این داروها در دست نمی‌باشد. شاید به همین دلیل شک و تردید نسبت به اثربخشی مناسب بعضی از این داروها در بین بسیاری از پزشکان و بیماران بوجود آمده است. با توجه به اینکه آتنولول با ۵۱/۴٪ (۱) به عنوان شایعترین رژیم تک داروئی نسبت به داروهای دیگر کاهش دهنده فشارخون، مصرفی گسترده در بین بیماران ما دارد و به رغم نتایج مطالعه انجام شده در سال ۱۳۷۴ مبنی بر عدم تفاوت معنی‌دار آماری پارامترهای فارماکوکنیتیک آتنولول ساخت شرکت داروپیش ایران با مشابه خارجی (۲)، هنوز مطالعه‌ای کلینیکی، کارایی آن را بررسی نکرده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی کارآیی قرص آتنولول ساخت شرکت داروپیش ایران و مقایسه آن با قرص‌های مشابه خارجی (به عنوان شاهد) در کنترل فشارخون بالا طراحی گردیده است.

#### مواد و روشها:

این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی بالینی و دوسویه کور تصادفی شده می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه مبتلایان پرفشاری خون ساکن شهرستان اصفهانک (از منطقه مناطق اطراف استان اصفهان) می‌باشد. به این ترتیب که بعد از هماهنگی با معاونت بهداشتی استان و بررسی آمار جمعیتی و شیوع پرفشاری خون منطقه

#### نتایج:

پرفشاری خون یکی از مهمترین عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی است. (۱۳ و ۲۰ و ۲۰) در ایران مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی طی ماههای اخیر رو به افزایش بوده است (۱). مطالعات انجام شده در اصفهان نشان داده است که شیوع پرفشاری خون ۱۸ درصد بوده که فقط ۸ درصد بیماران فشارخونشان کنترل می‌شده است (۱۳). کنترل فشارخون باعث کاهش حدود ۵۰٪ نارسایی قلب، ۴۲ درصد حوادث مغزی، ۱۴ درصد بیماریهای عروق کرونر می‌گردد (۱۹-۱۸). برای عدم کنترل پرفشاری خون علل گوناگون ذکر کرده‌اند، که مهمترین آنها شامل عدم آگاهی از ابتلا به بیماری، عدم مصرف دارو، مصرف نامنظم دارو، مصرف ناکافی دارو و نیز کیفیت نامناسب دارو می‌باشد. امروزه تعداد زیادی داروهای پائین آورنده فشارخون در دسترس هستند که استفاده صحیح آن بجز نقش کنترل پرفشاری خون، اثرات مفیدی در افزایش طول عمر و کاهش مورتالیتی بیماران دارد که از آن جمله داروهای بتابلوکر می‌باشند (۱۶). از مدت‌ها قبل بتابلوکرهای بدلیل نقش آنها در کاهش موربیدیتی و مورتالیتی قلبی عروقی، عنوان اولین داروی انتخابی در بسیاری از مطالعات توصیه شده‌اند (۵ و ۷ و ۹ و ۱۶) و اکنون بیش از گذشته به عنوان یک بتابلوکر استفاده می‌شود.

امروزه با توجه به سیاست هدفمند کشورمان ایران در جهت استقلال پیدا کردن تولید و عرضه

ضدالتهاب غیر استروئیدی ، قرص های خوراکی جلوگیری از بارداری (OCP) و یا سیکلوسپرین، همچنین افراد فاقد هرگونه کتراندیکاسیون مطلق مصرف بتابلو کرها، مانند بیماران آسمی، بلوک پیشرفته قلبی و بیماری عروق محیطی پیشرفته. شرط خروج از مطالعه حین درمان عبارت بودند از : ضربان قلب کمتر ۵۰ (دفعه در دقیقه) ، بلوک پیشرفته قلب ، ایجاد حمله آسم که نیاز به مصرف بتابلو کر باشد.

در آغاز نمونه گیری بیمارانی که از بین موارد جدید فشارخونی تشخیص داده شده بودند انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد طبق تعریف بالا قرار گرفتند ولی در مورد بیمارانی که از قبل با تشخیص پرسنل فشارخونی تحت درمان بودند به مدت ۳ هفته بعنوان Washout period زیر نظر پزشک معالج، داروی ضد پرسنل فشاری آنها قطع می شد و سپس در صورت دارا بودن شرط ورود به مطالعه بطور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار می گرفتند. در طول مدت Washout برای کنترل وضعیت بیماران و در طول ۳ ماه انجام مطالعه ، طبق پروتکل مورد نظر پژوهشگران هر هفته فشارخون و ریت قلبی بیماران اندازه گیری می شد و در صورت وجود یکی از دو شرط  $DBP \geq 160$  و یا  $SBP \geq 100$  و یا  $DBP < 90$  و یا  $SBP < 140$  از مطالعه حذف می گردیدند.

فشارخون به روش استاندارد اندازه گیری می شد بدین ترتیب که فشارخون افراد بعد از ۵ دقیقه

دشتی که از توابع شهرستان اصفهانک بوده و تحت پوشش «طرح کشوری ادغام پرسنل خون» قرار داشت بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید بعد از چند جلسه توجیهی با مسئولین، پزشک مرکز بهداشت و کارданان و بهورزان آن منطقه، در خصوص اهداف و روش اجرای طرح توضیحاتی داده شد. حجم نمونه ۲۰۰ نفر برآورد گردید که با احتساب ۲۰ درصد احتمال خروج در طول مطالعه ۲۴۰ نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی - سیستماتیک ۱۲۰ نفر در گروه مورد یعنی رژیم ۵۰ میلی گرم در روز قرص آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و ۱۲۰ نفر در گروه شاهد با رژیم قرصهای ۵۰ میلی گرمی در روز آتنولول خارجی قرار گرفتند. قابل ذکر است شرط Double blind نیز رعایت شد به این ترتیب که پزشک و بیماران از اینکه کدام قرص ایرانی و کدام یک از نوع خارجی است مطلع نبوده و قرصهای همنگ در پاکت و با کد A و B توسط پژوهشگران قرار گرفته و در اختیار پزشک معالج و بیماران گذاشته می شد. پزشک همکار طرح هفته ای یکبار با مراجعه به مرکز اجرای طرح در خانه های بهداشت ضمن معاینه گروههای تحت مطالعه نسبت به ادامه درمان اقدامات لازم را انجام می داد.

شرط ورود به مطالعه شامل : سن  $\geq 25$  سال ، فشارخون سیستولیک  $> 160$  و  $\geq 140$  و یا دیاستولیک  $> 100$  و  $\geq 90$  میلی متر جیوه ، تحت رژیم نبودن با داروی لیتیوم، داروهای

$49.79 \pm 14.83$  سال بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشتند ( $P > 0.05$ ). تفاوت معنی داری در دو گروه شاهد (آتنولول خارجی) و مورد (آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران) از نظر گروههای جنسی زن و مرد مشاهده نشد ( $P > 0.05$ ).

از نظر چاقی بر حسب شاخص توده بدنی متوسط BMI در گروه شاهد  $30.78 \pm 5.1$  و گروه مورد  $28.05 \pm 5.1$  گزارش شد که اگرچه تفاوت معنی دار نبود ولی هر دو گروه بطور متوسط در حد چاق گزارش شدند (جدول ۱).

همانطور که جدول ۳۰۴ میانگین فشارخون های سیستول و دیاستول را قبل از شروع درمان و در زمان های مورد مطالعه را نشان می دهد در هر دو گروه مورد و شاهد به تفکیک بر حسب زمانهای بررسی میانگین فشارخون سیستول و دیاستول در دو گروه زن و مرد تفاوت آماری معنی دار نبود ( $P > 0.05$ ) تنها در ماه دوم در گروه شاهد تفاوت معنی داری بین دو جنس از نظر فشارخون دیاستول مشاهده شد. ضمن اینکه بین بیماران در دو گروه مورد و شاهد از نظر میانگین فشارخون سیستول بعد از یک هفته و دیاستول بعد از یکماه تفاوت معنی دار بدست آمد، به این معنی که فشارخون هم سیستول و هم دیاستول در گروه شاهد سریعتر از گروه شاهد کنترل شده بود (جدول ۳۰۴). جدول ۵ و ۶ میانگین تغییرات فشارخون سیستول و دیاستول را قبل و بعد از درمان نشان می دهد.

همچنین از نتایج فعلی مشاهده شد تفاوت معنی داری از نظر میانگین تغییرات فشارخون سیستول و دیاستول در دو گروه مورد و شاهد در

استراحت در وضعیت نشسته، دو بار به فاصله ۳ دقیقه، از هر دو دست راست و چپ با فشارسنج جیوه ای که قبلاً کالیبره شده بود و اعتبار و اعتماد آن مورد تأیید قرار گرفته است، توسط پزشک همکار طرح اندازه گیری شد. در فرمهای مخصوص ثبت گردید و سپس متوسط فشارخون سیستول و دیاستول از دست راست و چپ تعیین می شد و سپس فشارخون بالاتر بعنوان مبنای تصمیم گیری و فشارخون بیماران تحت مطالعه ثبت و وارد رایانه می شد که سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

از کلیه بیماران قبل از شروع درمان فرم اطلاعات دموگرافیک و سابقه چربی خون، استعمال سیگار، فشارخون و بیماری عروق کرونر در بیمار و خانواده درجه اول تکمیل شد. همچنین قد، وزن و دور شکم و باسن توسط بهورزان آموزش دیده با متر پارچه ای نو و سالم و ترازوی Seca اندازه گیری و ثبت گردید.

کلیه اطلاعات بعد از جمع آوری تحت نرم افزار آماری SPSS وارد رایانه شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و تحلیلی t student-test و Chi-square test قرار گرفت که در صورت  $P < 0.05$  تفاوت معنی دار مورد قبول واقع یافته های مطالعه بصورت جداول ارائه شده است.

#### نتایج:

میانگین سنی در گروه بیماران پرفشاری خون رژیم دارویی آتنولول خارجی  $15.23 \pm 5.6$  سال و رژیم دارویی آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران

درمانی، مشاهده نشد( $P<0.05$ ). در کلیه بیماران مورد مطالعه فشارخون سیستول و دیاستول در هر دو گروه با درمان فوق به سطح مورد نظر ( $140/90$ ) رسید.

هفته اول، دوم و سوم وجود داشته است. همچنین از فاکتورهای مورد بررسی در این مطالعه ارزیابی ریت قلبی در دو گروه مورد و شاهد در مقاطع زمانی مورد مطالعه بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین میانگین ریت قلبی در طی دوره های

جدول ۱) مقایسه وضعیت اولیه دموگرافیک و سطوح چربی در دو گروه درمانی آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی

گروه آتنولول ساخت شرکت گروه آتنولول خارجی ( $n=100$ )		سن (سال)
	داروپخش ایران ( $n=100$ )	میانگین (انحراف معیار)
۵۶±۱۵/۲۳	۴۹/۷۹±۱۴/۳	دامنه
(۲۵-۷۵)	(۲۵-۷۵)	
۶۸(۶۸)	۵۸(۵۸)	جنس
۳۲(۳۲)	۴۲(۴۲)	زن:
۳۰/۷±۵/۱	۲۸/۱۵±۵/۰۱	تعداد (درصد)
۹(۲۸/۱)	۱۶(۳۸/۱)	مرد:
۴۹(۷۲/۱)	۴۸(۸۲/۸)	تعداد (درصد)
<b>BMI</b>		
میانگین (انحراف معیار)		
<b>WC</b>		
مردان<۱۰۳		
زنان>۸۸		

در همه موارد فوق بین دو گروه مصرف گروه آتنولول اختلاف معنی دار نبود ( $P>0.05$ ).

جدول ۲) مقایسه سابقه ابتلا به بیماری در خانواده در دو گروه درمانی آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی

		گروه آتنولول ساخت شرکت	
		داروپخش ایران (n=۱۰۰)	
سابقه فشارخون			
	۳۷(۳۷/۴)	۳۸(۴۱/۳)	سابقه مشبت فامیلی
	۱۴(۱۴/۱)	۱۵(۱۶/۵%)	سابقه چربی خون
	۳۰(۳۰/۳)	۲۴(۲۶/۴%)	مشبت فامیلی
<b>CHD</b>			مشبت در مددجو
	۱۷(۱۷/۲)	۲۲(۲۴/۲)	سابقه فامیلی
	۱۲(۱۲/۱)	۶(۶/۶)	استعمال سیگار
	۲/۱۹±۳/۵	۱/۸±۳/۶	الان
	۰/۸۹-۳/۴	۳/۵-۱/۵	تعداد در روز

در همه موارد فوق بین دو گروه مصرف کننده آتنولول اختلاف معنی دار نبود ( $P<0.05$ ).

آنتولول ساخت شرکت داروپخش ایران

کل آنتولول ساخت		کل آنتولول خارجی		کل آنتولول دارو پخش		کل آنتولول خارجی		کل آنتولول ساخت	
P.value	م رد	Zن	P.value	م رد	Zن	P.value	م رد	Zن	
قبل از درمان	۱۵۶/۴۵۰±۱۳/۱	۱۱۹/۰۴±۱۲/۸	۱۵۷/۴۵±۱۸/۵۷	۱۱۸/۱۲±۱۷/۰۲	۱۵۷/۰۵±۱۸/۵۷	۱۵۷/۴۳±۱۳/۱	۱۵۷/۴۳±۱۳/۱	۰/۰۳	
خطنه اول	۱۳۵/۳۱±۱۵/۱۸	۱۳۷/۵۵±۱۱/۵۲	۱۳۵/۳۲±۱۳/۵۸	۱۳۵/۸۵±۱۳/۷۰	۱۳۵/۸۷±۱۴/۴۲	۱۳۵/۸۷±۱۴/۴۲	۱۳۵/۸۷±۱۴/۴۲	۰/۲	
خطنه دوم	۱۳۳/۳۸±۱۲/۷۱	۱۳۳/۳۸±۱۲/۷۱	۱۳۱/۲۵±۱۵/۳۱	۱۲۹/۲۱±۱۴/۴	۱۲۹/۲۱±۱۴/۴	۱۲۹/۲۱±۱۴/۴	۱۲۹/۲۱±۱۴/۴	۰/۳	
خطنه سوم	۱۳۲/۵۰±۱۲/۴۷	۱۳۲/۵۰±۱۲/۴۷	۱۳۴/۴۵±۱۲/۷۵	۱۳۱/۱۵±۱۳/۸۵	۱۳۰/۱۵±۱۳/۸۵	۱۳۰/۱۵±۱۳/۸۵	۱۳۰/۱۵±۱۳/۸۵	۰/۸	
ماه اول:	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۱۳۱/۱۰۷±۱۳/۵۸	۰/۳	
ماه دوم:	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۱۳۱/۱۰۰±۱۳/۰۴	۰/۹	
ماه سوم:	۱۳۲/۵۷۵±۱۱/۵۱	۱۳۲/۵۷۵±۱۱/۵۱	۱۳۴/۴۵۲±۱۱/۴۷	۱۳۱/۱۱۸±۱۱/۷	۱۳۱/۱۱۸±۱۱/۷	۱۳۱/۱۱۸±۱۱/۷	۱۳۱/۱۱۸±۱۱/۷	۰/۸	

جدول ۴) میانگین های فشار خون دیاستولیک نسبت به قبل از شروع درمان در گروه درمانی آنقولول ساخت شرکت دارو پخش ایران و خارجی بر حسب جنس

		آنقولول ساخت شرکت دارو پخش ایران			آنقولول خارجی				
		کل آنقولول ساخت		کل آنقولول خارجی		مرد		زن	
P.value	mean±SD	mean±SD	P.value	mean±SD	mean±SD	P.value	mean±SD	mean±SD	P.value
۰/۲	۸۵/۵±۸/۵	۸۵/۹±۷/۲	۰/۲	۸۵/۱۷±۱/۳۷	۸۵/۱۲±۷/۵	۰/۳	۸۵/۰۰±۰/۰۰	۸۵/۲۳±۷/۵	۰/۲
۰/۲	۷۸/۷±۶/۴	۸۰/۰۷±۹/۲	۰/۳	۸۰/۰۷±۹/۲	۸۰/۰۷±۹/۲	۰/۰	۸۰/۰۴±۰/۰۵	۸۰/۰۴±۰/۰۵	۰/۲
۰/۲	۷۷/۱۸±۹/۷	۷۷/۱۸±۹/۷	۰/۵	۷۷/۱۴±۶/۸	۷۷/۱۴±۶/۸	۰/۵	۷۷/۱۷±۶/۹	۷۷/۱۷±۶/۹	۰/۵
۰/۰۳	۷۶/۱۸±۹/۰	۷۶/۱۸±۹/۰	۰/۴	۷۷/۰۷±۵/۱	۷۷/۰۷±۵/۱	۰/۴	۷۶/۰۵±۷/۱	۷۶/۰۵±۷/۱	۰/۰۹
۰/۰۰۴	۷۶/۱۱±۵/۰	۷۶/۱۱±۵/۰	۰/۴	۷۶/۰۵±۵/۱	۷۶/۰۵±۵/۱	۰/۴	۷۵/۱۹±۱/۸	۷۵/۱۹±۱/۸	۰/۶۸
۰/۰۰۰۱	۷۶/۰۳±۵/۵	۷۶/۰۳±۵/۵	۰/۰۴	۷۶/۰۳±۵/۵	۷۶/۰۳±۵/۵	۰/۰۱	۷۴/۹۹±۰/۹۵	۷۴/۹۹±۰/۹۵	۰/۸۱
	۷۶/۰۷±۱/۸	۷۶/۰۷±۱/۸	۰/۰۰۷	۷۶/۰۹±۱/۰	۷۶/۰۹±۱/۰	۰/۰۱	۷۳/۶۹±۰/۸۱	۷۳/۶۹±۰/۸۱	۰/۰۴

قبل از درمان  
هفته اول  
هفته دوم  
ماه اول:  
ماه دوم:  
ماه سوم:

جدول ۵) میانگین تغیرات فشارخون سیستولیک نسبت به قبل از شروع درمان در دو گروه درمانی آنالول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی بر حسب جنس

آنالول ساخت شرکت داروپخش ایران		آنالول خارجی	
کل آنالول ساخت	کل آنالول خارجی	کل آنالول ساخت شرکت داروپخش ایران	کل آنالول خارجی
P.value	P.value	P.value	P.value
مود	زن	مود	زن
ایران	ایران	ایران	ایران
mean±SD	mean±SD	mean±SD	mean±SD
-۲۳۸±۲۴/۳۲	-۱۵/۵±۱۵/۱	-۲۳/۴۵±۲۴/۹۱	-۱۱/۵±۱۲/۹
-۲۷/۵۳±۲۱/۰۹	-۱۷/۴۵±۱۳/۹	-۲۶/۸۴±۲۲/۹۴	-۲۱/۷۳±۱۵/۲۳
-۲۷/۷۸±۲۲/۳۶	-۱۶/۱۸±۱۵/۱	-۲۷/۹۷±۱۵/۱	-۱۴/۵۴±۱۱/۰۷
-۲۷/۹۷±۱۵/۱	-۱۶/۱۸±۱۵/۴	-۲۲/۵۱±۱۲/۵	-۲۲/۵۸
-۲۸/۷۸±۲۱/۵۲	-۲۱/۱۷±۱۵/۰	-۲۸/۷۸±۱۵/۰	-۲۸/۷۸±۱۵/۰
-۲۸/۷۸±۱۵/۰	-۱۷/۱۸±۱۰/۰	-۲۳/۵۵±۲۵/۲۸	-۲۳/۵۵±۲۵/۲۸
-۳۲/۹۸±۱۶/۰۷	-۲۸/۴۳±۱۶/۰۷	-۳۲/۹۸±۱۶/۰۷	-۳۲/۹۸±۱۶/۰۷
-۳۳/۴۴±۱۵/۰۴	-۲۶/۸۹±۱۵/۰۴	-۲۶/۸۹±۱۵/۰۴	-۲۶/۸۹±۱۵/۰۴
ماه سوم:	ماه دوم:	ماه اول:	هدته دوم
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱

جدول ۶) میانگین تغییرات فشارخون دیاستولیک نسبت به قبل از شروع درمان در دو گروه درمانی آنولول ساخت شرکت داروپخش ایران

		آنولول ساخت شرکت داروپخش ایران			آنولول خارجی		
		کل آنولول ساخت			کل آنولول خارجی		
P.value	آرایان	شرکت داروپخش	کل آنولول خارجی	P.value	مرد	زن	P.value
.۰۴	-۵/۸±۱/۰/۸	-۲/۸±۱/۰/۵	-۰/۰±۱/۰/۰	.۰۰۱	-۰/۷۵±۰/۹/۰	-۰/۰۱	-۰/۰۰±۰/۰/۰
.۰۳	-۷/۲۱±۱/۱/۷/۸	-۹/۰/۰±۱/۱/۷/۷	-۰/۰۳	.۰۰۱	-۰/۵±۰/۸/۸/۵	-۰/۰۰۱	-۰/۰۲۴±۰/۰/۰۵
.۰۱	-۵/۸/۰±۱/۱/۲/۲	-۱/۰/۰±۱/۱/۰/۰	.۰۰۴	.۰۰۱	-۰/۹/۳±۱/۱/۲/۷	-۰/۰۲	-۰/۰۲۴±۰/۰/۰۵
.۰۲	-۷/۰/۰±۱/۱/۰/۷	-۱/۰/۰±۱/۱/۰/۰	.۰۰۴	.۰۰۱	-۰/۹/۳/۲±۱/۲/۲/۷	-۰/۰۰۲	-۰/۰۳۰±۰/۰/۰۰
.۰۰۱	-۷/۰/۰/۰±۱/۱/۰/۰	-۱/۰/۰/۰±۱/۱/۰/۰	.۰۰۴	.۰۰۱	-۰/۹/۰/۰±۱/۰/۰/۰	-۰/۰۰۲	-۰/۰۰۳/۰±۰/۰/۰۰
.۰۰۰	-۷/۰/۰/۰/۰±۱/۱/۰/۰/۰	-۱/۰/۰/۰/۰±۱/۱/۰/۰/۰	.۰۰۰	.۰۰۰	-۰/۹/۰/۰/۰±۱/۰/۰/۰/۰	-۰/۰۰۰	-۰/۰۰۰±۰/۰/۰۰۰
.۰۰۰	-۷/۰/۰/۰/۰/۰±۱/۱/۰/۰/۰/۰	-۱/۰/۰/۰/۰/۰±۱/۱/۰/۰/۰/۰	.۰۰۰	.۰۰۰	-۰/۹/۰/۰/۰/۰±۱/۰/۰/۰/۰/۰	-۰/۰۰۰	-۰/۰۰۰±۰/۰/۰۰۰

جدول ۷) مقایسه میانگین ریت قلبی در طی دوره درمان در دو گروه آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی

P.value	اتنولول خارجی	آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران	قبل از درمان
۰/۵	۷۶/۶±۸/۰۱	۸۰/۴۸±۸/۹	قبل از درمان
۰/۰۷	۷۶/۱۱±۷/۷	۷۸/۳۴±۸	هفته اول
۰/۰۸	۷۵/۸±۷/۱	۷۷/۹±۷/۸	هفته دوم
۰/۵	۷۶/۲۶±۶/۷	۷۷/۰۳±۸/۰۳	هفته سوم
۰/۵	۷۵/۵۸±۷/۲	۷۶/۳۴±۸/۱	ماه اول
۰/۵	۷۴/۶±۷/۲	۷۵/۵±۹/۵	ماه دوم
۰/۶	۷۵/۴±۶/۴	۷۴/۸±۸/۰۱	ماه سوم

به شرط  $P<0/05$  تفاوت معنی دار است.

مردان است ( $P=0/01$ ). در ماه سوم سرعت کاهش

فشارخون سیستولیک در گروه شاهد بطور معنی داری بیش از گروه مورد بوده است که احتمالاً علت این تفاوت خواص فارماکولوژیک دارویی است و البته این موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

در مطالعه Holger و همکاران پس از سه ماه مصرف ۵۰mg آتنولول در روز،  $13/4$  mmHg کاهش در فشارخون سیستولیک دیده شد (۱۴). مطالعه ما در گروه مورد و شاهد به ترتیب  $15/۴±18/۰۱$  و  $15/۲۳±1۳/۱$  و  $24/۳۴±28/۲۰$  و  $26/۹۳±2۸/۲۱$  در ماه سوم رسید میلی متر جیوه کاهش با مصرف ۵۰mg آتنولول در روز دیده شد.

میانگین DBP در گروه مورد و شاهد به ترتیب از  $۸۵/۵±۸/۳$  و  $۸۶/۹±۷/۳$  ( $P=0/۲$ ) به  $۱۰/۸$  و  $۷۳/۷±۷/۱$  ( $P=0/۰۰۰۱$ ) رسیده است که بیانگر کارآیی هر دو نوع آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی در کنترل و نگهداری فشارخون سیستولیک می باشد. که این کارآیی در هر دو گروه زن و مرد مشاهده شد. میزان کاهش فشارخون سیستولیک در ماه سوم در گروه مورد در زنان بیش از

### بحث:

میانگین سنی هر دو گروه بیماران پرفشاری خون تحت درمان با رژیم دارویی آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و آتنولول خارجی از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشتند، هر دو گروه از نظر لیپیدپروفایل و چاقی در آغاز ورود به مطالعه تفاوت معنی دار نداشتند.

میانگین SBP در گروه مورد و شاهد به ترتیب از  $15/۷/۴±1۸/۰۱$  و  $15/۲۳±1۳/۱$  در شروع درمان ( $P=0/۰۵$ ) به  $12/۶/۹۳±1۲/۳۱$  و  $12/۵/۹۶±11/۱$  در ماه سوم رسید که بیانگر کارآیی هر دو نوع آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی در کنترل و نگهداری فشارخون سیستولیک می باشد. که این کارآیی در هر دو گروه زن و مرد مشاهده شد. میزان کاهش فشارخون سیستولیک در ماه سوم در گروه مورد در زنان بیش از

مشاهده شد کل بیماران تحت درمان با آتنولول فشارخونشان کنترل شده که علت آن احتمالاً بدليل نحوه انتخاب و درمان منظم و کامل همه بیماران فشارخونی تحت مطالعه در مصرف قرصهای آتنولول تجویز شده می‌باشد.

کاهش HR (Heart Rate) یکی از اثرات مهم بتایلوکر است و در مطالعه ما تفاوتی در میزان HR در گروه مورد و شاهد دیده نشد.

مطالعه ما بیان کرد که آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران به صورت درمان تک دارویی در فشارخونهای خفیف تا متوسط دارویی مؤثر و کار آمد است و باعث کنترل فشارخون بیماران در سطح مناسب می‌شود ولی هنوز تفاوت‌های معنی‌داری در میزان و سرعت کاهش فشارخون سیستولی با نوع خارجی دارد. و بر عکس آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران باعث کنترل سریعتر فشارخون دیاستولیک با میزان بیشتری می‌شود.

می‌باشد میزان کاهش فشارخون دیاستولیک پس از ۱۲ هفته به ترتیب در گروه مورد و شاهد  $13/2 \pm 8/5$  و  $8/1 \pm 8/8$  ( $P=0/05$ ) بوده است که بیانگر کاهش بیشتر در گروه مورد است این کاهش در مطالعه Holger و همکاران (۲۲) ۱۷ میلی‌متر جیوه بوده، و بیانگر کاهش بیشتر فشارخون دیاستولیک در آن مطالعه نسبت به یافه‌های مطالعه ما می‌باشد.

در گروه مورد فشارخون دیاستولیک در مردان نسبت به زنان کاهش بیشتری داشته است (در ماه سوم  $P=0/02$ ) ولی در گروه شاهد این کاهش در زنان بیشتر از مردان بوده است ( $P=0/02$ ) که ما توجیهی جهت کاهش بیشتر فشارخون دیاستولیک در زنان نسبت به مردان با آتنولول ایرای در مقایسه با فشارخون سیستولیک نداریم و شاید به خواص فارماکولوژیک یا ژنتیکی افراد جامعه ربط داشته باشد.

گرچه در دستورالعمل JNC VII بیان شده است که در بیش از ۶۰٪ بیماران جهت کنترل فشارخون لازم است که چند دارو مصرف شود ولی در این مطالعه

#### منابع:

۱- انصاری ر، خسروی ع، بقائی ع م . علل عدم کنترل پرفشاری خون در افراد بالای ۶۵ سال. مجله علوم پزشکی فزوین. (در نوبت چاپ).

۲- خسروی ع ، محمدی ن ، شرف زادگان ن . شیوع مصرف داروهای ضد فشارخون در اصفهان. مجله علوم پزشکی اراک. (در نوبت چاپ).

۳- صابری سع. فراهم زیستی دو فراورده آتنولول ساخت داخل در مقایسه با تنورمین پاپان‌نامه دکترای داروسازی (۱۳۹۲، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵)

4- Ambresion GB; Strasse T; et al. Effect of intervention on community awareness and treatment of hypertension: Results of a WHO study. Bulletin of the World Health Organization , 66(1): 107-113,1999.

5- Arm V; George L; Herry R; et al. (JNC VII) Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. JAMA , 42: 1206-1252, 2003.

6- Chiang HT; Hou ZY; Lee DK; Wu TL; Chen CY. A comparison of antihypertension effects between two formulations of atenolol: tenolol and tenormin. Zhonghua Yi Xue Za Zhi , 55(5): 366-70,1995.

- 7- Freedam DD; Walters DD. Second generation dihydropyridine calcium antagonists. Greater vascular selectivity and some unique applications drugs , 34: 518-598, 1987.
- 8- Guidelines committee, 2003 European society of Hypertension- European Society of cardiology Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertension , 21: 1011-5, 2003.
- 9- Guideline for the management of mild hypertension: memorandum from a WHO/ISH meeting. Bull World Health Organization , 71: 503-17,1993.
- 10- Hurst J-Willis. The Heart, New York, Mc Graw Hill, 190-192, 1994.
- 11- Jurate Klumbiene K; et al. The relationship of childhood to adult blood pressure, longitudinal study of hypertension patients in Lithuania. Journal of Hypertension , 8(5): 531-538, 2000.
- 12- Jerome M; Xakellis GC; Angstman G; et al. Initial medication selection for treatment of hypertension in an open. Panel HMO. J Am Board Fam Pract , 8: 1-6, 1995.
- 13- Khosravi AR; et al. Ten Trend of Prevalence Hypertension in Isfahan 1991-2001 Iranian Heart J, 5(1,2): 33-38, 2004.
- 14- Kraiczi H; Hedner J; Peker Y; Grote F. Anti hypertensive treatment in patient with obstructive sleep apnea. Am J Respir cnt care Med , 161(5): 1423-8, 2000.
- 15- Nordic/Baltic Heart Statistics. In: Nielsen J (Editor): NOMESCO (Nordic Medico Statistical Communities), Copenhagen , 77, 1996.
- 16- Pyorala K; De Beker; Graham L; Pool-Wilson P. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the task force of the European Arteriosclerosis Society and European Society of Hypertension. Eur Heart J, 15: 1300-1331, 1994.
- 17- Psay BM; Smith M; Siscevick DS; et al. Heart outcomes associates with antihypertensive therapies uses as first-line agents: A systemic review and meta-analysis. JAMA, 277: 739-743, 1997.
- 18- Rawogli A; Trazzi S; Villani A. Early 24 hour blood pressure elevation in normotensive subjects with parental hypertension. Hypertension , 16(5): 491-497,1990.
- 19- Staessen JA; Fagard R; Thijs L; et al. Effects of 2 different therapeutic approaches on total and cardiovascular mortality in a cardiovascular study in the elderly. Jpn Heart , 35: 589-600, 1994.
- 20- SHEP Cooperative Research Group. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). JAMA , 265: 3244-64,1991.
- 21- 1999 World Health Organization International Society of Hypertension. Guidelines for the Management of Hypertension. Guidelines Subcommittee J Hypertension , 17: 151-183,1999.
- 22- Wofford MR; Anderson DC Jr; Brown CA; et al. Antihypertensive effect of alpha- and beta-adrenergic blockade in obese and lean hypertensive subjects. Am J Hypertens ,14(7 pt 7): 694-8, 2001.