

# تحلیل سؤالات جامع آزمون نهایی پرستاری در دانشکده علوم پزشکی شهرورد

علی دادگری<sup>\*</sup>، حسین ابراهیمی<sup>\*\*</sup>، محمدرضا حسنی<sup>\*\*\*</sup>، یدالله مشایخی<sup>٠</sup>

## چکیده:

هر آزمونی به عنوان ابزار سنجش و اندازه‌گیری می‌باید دارای روابی و پایایی کافی برای سنجش صفت مورد نظر باشد. با استفاده از آزمونهای ریاضی و آمار می‌توان آزمونها را تحلیل نمود و صحت عمل آنها را سنجید. هدف از انجام این تحقیق تحلیل سؤالات جامع آزمون نهایی پرستاری به عنوان اصلی ترین روش ارزشیابی تکوینی در دانشکده علوم پزشکی شهرورد می‌باشد. در این پژوهش هر یک از ۳۶۰ سؤال مجموع سؤالهای آزمون جامع نهایی از نظر ضریب دشواری، ضریب تمیز، روابی، پایایی، وجود گزینه‌های انحرافی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند تا نقاط ضعف و قوت هر سؤال و کل آزمون تعیین گردد. نتایج کسب شده در خصوص میزان دشواری هر سؤال در هر یک از خرده آزمونها نشان داد که دروس بهداشت جامعه و بهداشت مادران و نوزادان به ترتیب با ۴۲ و ۴۰ سؤال با ضریب دشواری بسیار بالا (۷۱-۱٪) دارای بیشترین سؤال آسان در مجموعه آزمونها بود. در حالی که در درس داخلی جراحی ۱۸ سؤال با ضریب دشواری بسیار بالا، کمترین سؤالات آسان را دارا بود. عدمه ترین مشکلات طراحی سؤال در آزمون جامع نهایی پرستاری در دانشکده علوم پزشکی شهرورد طراحی سؤالات با ضریب سهولت بالا (دشواری آنکه) و دارای گزینه‌های فاقد کارآیی برای تعبییر ساختن دانشجویان قوی از ضعیف می‌باشد علاوه بر این استفاده از آزمونهای مناسب برای تحلیل سؤالات آزمون احتساب ناپذیر است. پژوهشگران استفاده از روش دو نیمه کردن را به جای روش کودر - ریچاردسون ۲۰ توصیه می‌نمایند.

واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، آزمون، پرستاری.

## مقدمه:

رایج‌ترین شکل ارزشیابی، ارزشیابی دانشجو است (۱). آزمونهای مورد استفاده در مؤسسات آموزش عالی در کشور ما عمده‌تاً به صورت چهارگزینه‌ای طراحی می‌گردد. به ویژه هنگامی که آگاهی دانشجو در حیطه شناختی موضوع مورد ارزشیابی می‌باشد (۳). هر

ارزشیابی یکی از بنیادی ترین وظایف هر مؤسسه آموزشی محسوب می‌گردد. ارزشیابی به اشکال و با اهداف مختلفی صورت می‌پذیرد. ممکن است ارزشیابی در مورد آزمون، مؤسسه، دانشجو و هر فرآیند اجرایی دیگر صورت پذیرد. در مؤسسات آموزشی

<sup>\*</sup> عضو هیأت علمی گروه پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی شهرورد - دانشکده پرستاری - تلفن: ۰۳۳۶۰۱۷-۲۷۳ (مؤلف مسئول).

<sup>\*\*</sup> عضو هیأت علمی گروه پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی شهرورد. <sup>\*\*\*</sup> کارشناس ارشد اینگلشیاسی و عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات و فناوری.

<sup>٠</sup> عضو هیأت علمی گروه بافت‌شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شهرورد.

نظر گرفته شد.

### مراحل تحلیل آزمون:

پاسخهایی که شرکت کنندگان در آزمون به سؤالات داده‌اند به عنوان داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابتدا باید دانشجویان را بر اساس نمرات کسب شده ایشان در دو گروه قوی و ضعیف طبقه‌بندی کرد. برای طبقه‌بندی دانشجویان بر اساس تعداد، در آزمونهای تا ۴۰ نفر شرکت کنند، ۱۰ نفر از احراز کنندگان با بهترین نمره آزمون و ۱۰ نفر از احراز کنندگان با پایین ترین نمرات آزمون را انتخاب می‌کنیم و در دو گروه قوی و ضعیف تقسیم می‌نمائیم. اگر تعداد آزمون شوندگان بیشتر از ۴۰ نفر باشد توصیه شده که ۲۷ درصد را به عنوان گروه قوی و ۲۷ درصد شرکت کنندگان را به عنوان گروه ضعیف در نظر بگیریم (۱).

در تحلیل هر سؤال باید روی کارت مشخصات مربوط به آزمون و سؤال مربوطه به همراه گزینه‌ها نوشه شود و گزینه صحیح نیز تعیین گردد (تصویر شماره ۱).

### موضوع آزمون:

درس: پرستاری اعصاب	داخلی جراحی ۱
سوال: کدامیک از مایعات تزریقی زیر برای کاهش فشار مغزی بیمار مبتلا به خربه سر مناسب‌تر است؟	
الف - نرمال سالین ۹٪	ب - رینگر لاکتات
ج - رینگر ساده	د - مانیتوول ۲۰٪

### تصویر شماره ۱: کارت مشخصات آزمون

در پشت همین کارت می‌باید تعداد پاسخهای آزمون شوندگان به هر یک از گزینه‌های الف، ب، ج یا د به تفکیک گروه قوی و ضعیف مشخص گردد (تصویر شماره ۲).

آزمونی به عنوان ابزار سنجش و اندازه‌گیری می‌باید که دارای روایی و پایایی کافی برای سنجش صفت مورد نظر باشد. متوفانه بسیاری از آزمونهای معلم ساخته و استاندارد نشده با اشکالات متعددی همراه هستند (۵،۴). با استفاده از آزمونهای ریاضی و آمار می‌توان صحت عمل آزمونها را سنجید و هر آزمونی را به استاندارد طراحی و اجرا نمود.

در این دانشکده دانشجویان در پایان دوره چهارساله پرستاری و پیش از فراغت از تحصیل و کسب مدرک کارشناسی در آزمون جامع نهایی شرکت می‌کنند. این آزمون از ۶ جزء، یا خرده آزمون تشکیل یافته است. خرده آزمونها شامل درس بیماریها و پرستاری داخلی - جراحی ۱، بیماریها و پرستاری داخلی جراحی ۲، پرستاری بیماریهای کودکان، پرستاری بیماریهای روانی، پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری بهداشت مادران و نوزادان می‌باشد. هر خرده آزمونی از ۶۰ سؤال تشکیل یافته و در ۶ روز متوالی کل آزمونها برگزار می‌گردند.

هدف از انجام این تحقیق تحلیل آزمون جامع نهایی به عنوان اصلی ترین روش ارزشیابی از نظر ضریب دشواری، ضریب تمیز، پایایی و روایی در دانشکده علوم پزشکی شاهروд می‌باشد.

### مواد و روشها:

در این پژوهش هر یک از ۳۶۰ سؤال آزمون جامع نهایی یک به یک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند تا نقاط ضعف و قوت هر سؤال و کل آزمون تعیین گردد. جهت تحلیل سؤالات آزمون جامع نهایی در دانشکده علوم پزشکی شاهرود ۱۰ نفر از دانشجویان حائز بالاترین نمرات در هر خرده آزمون و ۱۰ نفر از دانشجویان حائز پایین ترین نمرات در هر خرده آزمون به ترتیب به عنوان گروههای قوی و ضعیف در نظر گرفته شدند. جهت تحلیل هر آزمون مراحل زیر در

نامید. با وجود این کاربرد واژه ضریب دشواری رایج تر است (۱).

#### تفسیر ضریب دشواری:

صاحب نظران معتقدند که ضریب دشواری بین ۰/۳ تا ۰/۷ بیشترین اطلاعات را در مورد میزان سهولت یا دشواری آزمون به ما می‌دهد. آنها توصیه می‌کنند در آزمونهای متداول درسی این محدوده به عنوان مناسب‌ترین محدوده در نظر گرفته شود، اما در برخی آزمونهای خاص با اهداف ویژه می‌توان ضریب دشواری بیشتر یا کمتر را مناسب‌تر دانست. مثلاً در آزمون انتخاب دانش آموزان برای پذیرش در دوره پیش دبستانی ضریب دشواری بسیار بالا توصیه می‌گردد. در حالی که برای پذیرش دانشجو در مقطع دکترا بی‌تردید ضریب دشواری بسیار اندک یعنی سوالات بسیار دشوار کارآمد بیشتری دارند (۲).

در این پژوهش، گروههای قوی و ضعیف به تعداد ده نفر در هر گروه بر اساس نمره نهایی به دست آمده انتخاب شدند. سوالات هر یک از خرده آزمونها یک به یک در گروههای قوی و ضعیف بررسی گردید و در کارت مربوط به هر سوال تعداد پاسخهای داده شده به هر گزینه در هر دو گروه مشخص شد.

#### محاسبه ضریب تمیز:

طبق تعریف، ضریب تمیز و قدرت هر سوال برای متمایز ساختن دانشجوی قوی از دانشجوی ضعیف است و با حرف  $\Delta$  نشان داده می‌شود. برای تعیین ضریب تمیز از فرمول زیر استفاده شد:

انتخابهای درست گروه یاین - انتخابهای درست گروه بالا  
تعداد افراد در یک گروه

بر اساس این فرمول مشخص می‌شود که هر چه ضریب تمیز سوالی بیشتر باشد قدرت تفکیک دانشجوی قوی و ضعیف در این سوال بیشتر است (۱).

موضع آزمون:						
داخلی جراحی ۱						
درس: پرستاری اعصاب						
گروه	الف	ب	ج	د	بدون پاسخ	تعداد کل
قوی	۰	۰	۰	۱۰	۶	۲۶
ضعیف	۰	۰	۱	۰	۱۰	۲۰

**تصویر شماره ۲:** تعداد پاسخهای آزمون شوندگان به هر یک از گزینه‌های الف، ب، ج یا د به تفکیک گروه قوی و ضعیف

در تصویر شماره ۲ علاوه بر تعیین تعداد پاسخهای صحیح در دو گروه ضعیف و قوی، همچنین مشخص می‌گردد که آزمون شوندگان به کدام گزینه‌ها، چه صحیح و چه غلط بیشتر توجه کرده‌اند. به عبارت دیگر تعیین می‌گردد که:

(الف) در گروه قوی چه تعداد از شرکت کنندگان گزینه صحیح یا گزینه‌های غلط را برگزیده‌اند.

(ب) در گروه ضعیف چه تعداد از شرکت کنندگان گزینه صحیح یا گزینه‌های غلط را برگزیده‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از بند الف و ب فرق می‌توان ضریب دشواری (ضریب سهولت) و ضریب تمیز هر سوال را مشخص کرد (۱).

#### محاسبه ضریب دشواری:

طبق تعریف، دشواری درصد پاسخهای صحیح داده شده به هر سوال است که با حرف  $P$  نشان داده می‌شود و با فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$\frac{100 \times (\text{انتخابهای درست گروه یاین} + \text{انتخابهای درست گروه بالا})}{\text{تعداد افراد در یک گروه} \times 2}$$

محدوده ضریب دشواری بین صفر تا ۱۰۰ درصد متغیر است. بر اساس این فرمول مشخص می‌شود که هر چه ضریب دشواری سوالی بزرگتر باشد آن سوال آسانتر است و از این رو شاید بهتر باشد آن را ضریب سهولت

آزمون شونده کارآیی پیشتری دارد (۱).

### تفسیر ضریب تمیز

ضریب تمیز بر خلاف ضریب دشواری که فقط از صفر تا صد در صد را شامل می‌شد، می‌تواند محدوده وسیع‌تری را شامل شود و حتی نمرات منفی را نیز احراز کند. اگر ضریب تمیز آزمونی  $0/9$  محاسبه شود نشان دهنده بالا بودن قدرت تمیز آن سؤال در آزمون است در حالی که اگر ضریب تمیز در سؤالی  $2/0$  شود بیانگر ضعف آن سؤال در تفکیک افراد قوی و ضعیف خواهد بود. چنانچه ضریب تمیز سؤالی منفی باشد، بسی شک ساختار سؤال مربوطه دارای اشکالات اساسی است به نحوی که باعث شده دانشجوی قوی آن سؤال را غلط پاسخ دهد و دانشجوی ضعیف به آن سؤال پاسخ صحیح دهد. چنین سؤالی باید اصلاح و یا کلاً حذف گردد (۱).

### تحلیل گزینه‌ها:

در هر آزمون چهار گزینه‌ای، تنها یک گزینه کاملاً صحیح و سه گزینه غلط وجود دارد. هدف از کاربرد این سه گزینه سنجش قدرت دانشجو در انتخاب گزینه صحیح در میان چهار گزینه پیشنهادی است. گزینه‌های غلط باید نقش راهنمایی کننده داشته باشد. تحلیل گزینه‌ها به طراح سؤال این امکان را می‌دهد تا نکات انحرافی یا راهنمایی کننده هر گزینه که از نظر طراح سؤال دور مانده را شناسایی و به اصلاح ساختار آزمون پردازد (۲، ۱). در تحلیل گزینه‌ها باید دید که چند نفر از دانشجویان گروه ضعیف گزینه ناصحیح را انتخاب کرده یا انتخاب نکرده‌اند. اگر هیچ یک از دانشجویان گروه ضعیف گزینه ناصحیحی را انتخاب نکند، احتمالاً آن گزینه آن چنان غلط آشکاری دارد که توانسته به شکلی آزمون شونده را به ناصحیح بودن آن هدایت کند و یا گزینه صحیح آن چنان هدایت کننده و آشکار طراحی شده است که سایر گزینه‌ها اصلاً توجه آزمون شونده را به خود جلب نکرده‌اند. چنین حالتی در گروه دانشجویان ضعیف بررسی می‌شود و در تعداد نمونه‌های بالا از نظر

### پایایی آزمون:

در سؤالات چهار گزینه‌ای همواره ارزیابی پایایی آزمون مورد نظر و توجه متخصصین ارزشیابی دوره است (۴، ۲). بررسی پایایی آزمون میزان صحت آزمون برای سنجش صفت مورد نظر را به ما نشان می‌دهد. برای تعیین میزان پایایی (ضریب همبستگی) آزمونها روشهای مختلفی به کار گرفته می‌شوند. دو روشهای بیشتر کاربرد دارند، به نام "روش دو نیمه کردن آزمون" و "روش کودر - ریدیچاردسن ۲۰" می‌باشند.

(الف) روش دو نیمه کردن:

$$r_{tt} = \frac{2r \frac{1}{2} \frac{1}{2}}{1+r \frac{1}{2} \frac{1}{2}}$$

$r_{tt}$  = reliability

$$r \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \text{Correlation of two halves}$$

در این روش هر آزمون بر اساس سؤالات فرد و زوج، به صورت دو آزمون در نظر گرفته می‌شود و ضریب همبستگی این دو آزمون با فرمول اسپیرمن - براون ارزیابی می‌گردد و به عنوان پایایی آزمون در نظر گرفته می‌شود (۲).

(ب) روش کودر - ریدیچاردسن ۲۰ :

$$r_{tt} = \left( \frac{n}{n-1} \right) / \left[ 1 - \frac{\sum pq}{\sigma^2} \right]$$

$r_{tt}$  = reliability of the exam

$n$  = number of questions

$\sigma^2$  = variance

$p$  = ratio of correct answers

$q = 1-p$

$\sum pq$  = sum of  $pq$

### نتایج:

نتایج حاصل از تحلیل سؤالات آزمون جامع نهایی، میزان ضریب دشواری هر سؤال در هر یک از خرده آزمونها نشان داد که دروس پرستاری بهداشت جامعه،

**جدول شماره ۲: ضریب تمیز سؤالات به تفکیک خرده آزمونها**

خرده آزمونهای پرستاری آزمونها	منفی	بلا	اندک	۰-۰/۴	۰/۴۱-۱
کودکان	۱۳	۴۵	۲	۰	۰/۴۱-۱
بهداشت جامعه	۸	۵۲	۰	۰-۰/۴	۰-۰/۴
بهداشت مادران	۱۲	۴۶	۲	۰-۰/۴	۰/۴۱-۱
داخلی جراحی ۱	۸	۴۰	۷	۰-۰/۴	۰-۰/۴
داخلی جراحی ۲	۱۰	۴۶	۴	۰-۰/۴	۰/۴۱-۱
روانی	۸	۴۸	۳	۰-۰/۴	۰/۴۱-۱

سؤالات هر خرده آزمون بر اساس ضریب تمیز به سه گروه با ضریب تمیز منفی (کمتر از صفر)، اندک با ضریب تمیز (۰-۰/۴) و بالا با ضریب تمیز (۰/۴۱-۱) تقسیم شده‌اند.

یکی دیگر از اهداف اختصاصی این تحقیق بررسی گزینه‌های هر سؤال از نظر جلب توجه آزمون شوندگان بود. بررسی نتایج مؤید این واقعیت بود که در برخی سؤالات یک، دو و یا حتی هر سه گزینه ناصحیح فاقد کارآیی لازم بودند. نتایج نشان داد که در کل آزمون، ۳۲ سؤال به گونه‌ای طراحی شده بودند که حتی در گروه دانشجویان ضعیف نیز هیچ فردی گزینه‌های ناصحیح را انتخاب نکرده بود. در بین خرده آزمونها نیز دروس پرستاری بیماریهای روانی و پرستاری بیماریهای داخلی جراحی ۲، به ترتیب با ۱۴ و صفر سؤال دارای ۳ گزینه فاقد کارآیی، بیشترین و کمترین آمار در این زمینه را دارا بودند (جدول شماره ۳).

نکته مهمی که از نظر پژوهشگران نیاز به توجه بیشتری دارد ناکارآمد بودن روش "کودر - ریچاردسن" در تعیین پایایی آزمونهای چهارگزینه‌ای است، چرا که این روش مختص آزمونهای صحیح - غلط می‌باشد و باید از آن در سؤالات چهارگزینه‌ای استفاده کرد (۲) با وجود این پژوهشگران با استفاده از این روش سعی

**جدول شماره ۱: ضریب دشواری سؤالات به تفکیک خرده آزمونها**

خرده آزمونهای پرستاری آزمونها	مشکل	متوسط	آسان	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا
کودکان	۷	۱۳	۴۰	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا
بهداشت جامعه	۷	۱۱	۴۲	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا
بهداشت مادران	۸	۱۲	۴۰	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا
داخلی جراحی ۱	۱۰	۱۹	۳۱	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا
داخلی جراحی ۲	۱۴	۲۸	۱۸	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا
روانی	۹	۱۴	۳۷	۰/۷۱-۱	۰/۴۱-۰/۷	۰-۰/۴	بلا

سؤالات هر خرده آزمون بر اساس ضریب دشواری به سه گروه آسان (با ضریب دشواری ۰/۷۱-۱)، متوسط (با ضریب دشواری ۰-۰/۴) و مشکل (با ضریب دشواری ۰-۰/۴) تقسیم شده‌اند.

پرستاری بیماریهای کودکان و پرستاری بهداشت مادران و نوزادان به ترتیب با ۴۰، ۴۲ و ۴۰ سؤال با ضریب دشواری بسیار بالا (۰/۷۱-۱٪) دارای بیشترین سؤال آسان در مجموعه آزمونها بودند. در حالی که درس داخلی جراحی ۲ با ۱۸ سؤال با ضریب دشواری بسیار بالا کمترین سؤالات آسان را دارا بود (جدول شماره ۱). با استفاده از فرمول ضریب تمیز در مورد هر سؤال آزمون، دیده شد که می‌توان سه دسته ضریب تمیز را مشخص نمود. ضریب تمیز کمتر از صفر (یا منفی)، ضریب تمیز بین صفر تا ۰/۴ و ضریب تمیز بین ۰/۴ تا ۱. بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب تمیز هر یک از سؤالات در خرده آزمونها دیده شد که در دروس پرستاری بیماریهای کودکان و پرستاری بهداشت مادران - نوزادان، با دارا بودن ۱۳ و ۱۲ سؤال با ضریب تمیز منفی بیشترین تعداد سؤال را در این گروه داشتند. در حالی که کمترین تعداد سؤال با ضریب تمیز منفی (۸ سؤال) در درس داخلی جراحی ۱، پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری روانی دیده شد (جدول شماره ۲).

### بحث:

سؤالات چهار گزینه‌ای شکل متداول آزمون برای ارزشیابی دانشجویان است (۴،۳،۲). اشکالات و نقايس طراحی سؤالات چهار گزینه‌ای در تحقیقات مختلف بررسی شده‌اند. اشکالات ساختاری در طراحی این سؤالات بکرات دیده می‌شود. از شایع‌ترین اشکالات ساختاری، نارسا بودن ساقه سؤال، مبهم بودن سؤال یا گزینه‌ها، کاربرد منفي در منفي در سؤال، عدم تطابق گزینه‌ها با ساقه سؤال از نظر جمله بندی و منطقی و غيره باشد (۴).

آن چنان که از نتایج این تحقیق نیز بر می‌آید عمدترين مشكلات طراحی سؤال در آزمون جامع نهايی پرستاري در دانشكده علوم پزشكى شاهروд طراحی سؤالات با ضريب سهولت بالا (دشواری اندك) و داراي گزينه‌های فاقد کارآيی برای متمایز ساختن دانشجویان قوی از ضعیف می‌باشد. با وجود اين، پایايش خرده آزمونها در بیشتر موارد خوب و قابل قبول بود.

با توجه به متدال بودن چنین اشکالاتی در تمامي مؤسسات آموزشي، استاندارد کردن سؤالات در آزمونهاي معلم ساخته در علوم پزشكى ضرورتی اساسی در آموزش می‌باشد (۵،۳). چنین سؤالاتی را می‌توان برای استفاده در آزمونهاي بعدی در بانک سؤالات دانشكده ذخیره نمود.

بدون استاندارد کردن آزمون، قضاوت در مورد آگاهی و دانش فراگيران بسيار دشوار و گاه غير ممکن می‌نماید و بدیهی است که چنین سؤالاتی نمی‌تواند اعتبار لازم برای سنجش آموخته‌های دانشجویان را داشته باشند (۴،۲،۱).

پژوهشگران پيشنهاد می‌کنند که دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي سؤالات تمامي آزمونها را با روش‌هاي فوق استاندارد نمايند.

**جدول شماره ۳:** گزینه‌های فاقد کارآيی در سؤالات به تفکيک خرده آزمونها

خرده آزمونهاي پرستاري	۰ گزينه	۱ گزينه	۲ گزينه	۳ گزينه	کودکان
	۱	۲۳	۱۹	۱۷	
بهداشت جامعه	۴	۱۶	۲۵	۱۵	
بهداشت درمان	۱۱	۱۶	۱۶	۱۷	
داخلی جراحی ۱	۲	۱۶	۲۶	۱۶	
داخلی جراحی ۲	۰	۵	۱۹	۳۶	
روانی	۱۴	۱۴	۱۰	۳۲	

گزینه‌های فاقد کارآيی به گزینه‌های اطلاق می‌گردد که به شکل واضحی ناصحیح بودن آنها مشخص است، به گونه‌ای که در گروه دانشجویان ضعیف نیز حتی یک نفر آنها را به عنوان پاسخ انتخاب نکرده است.

داشتند اختلاف موجود را به شکل ملموس‌تری نشان دهند. لذا کاربرد روش دونيمه کردن آزمون، نتایج قابل اعتمادتری نسبت به روش کودر - ریچاردسن ۲۰ به ما نشان می‌دهد (جدول شماره ۴).

**جدول شماره ۴:** ضريب همبستگي يا پایايش خرده آزمونها به دو روش "کورد-ریچاردسن ۲۰" و "دونيمه کردن آزمون"

خرده آزمونهاي پرستاري	روش A	روش B	کودکان
	۰/۷۹	۰/۲۶	
بهداشت جامعه	۰/۸۶	۰/۶۸	
بهداشت مادران	۰/۹۰	۰/۶۴	
داخلی جراحی ۱	۰/۸۳	۰/۷۷	
داخلی جراحی ۲	۰/۷۳	۰/۶۴	
روانی	۰/۹۳	۰/۲۵	

مقایسه ضريب همبستگي آزمون به دو روش کودر-ریچاردسن ۲۰ و دونيمه کردن آزمون نشان دهنده اختلاف نتایج به دست آمده می‌باشد. A. روش کودر-ریچاردسن ۲۰، B. روش دونيمه کردن آزمون.

**تشکر و قدردانی:**

بدینوسیله از کلیه کسانی که ما را در این امر بازی نمودند

قدرتانی می‌گردد.

**منابع:**

- ۱- سیف علی اکبر، اجراء و نمره در: سیف علی اکبر، روشهای سنجش و اندازه‌گیری، انتشارات دوران، تهران: چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ۲۷۱-۳۰۵.
- ۲- سیف علی اکبر، پایابی آزمون، در: سیف علی اکبر، روشهای سنجش و اندازه‌گیری، انتشارات دوران، تهران: چاپ چهارم، ۱۳۷۸-۲۳۹، ۳۷۷-۳۷۸.
- ۳- نوریان جواد؛ دادگری علی، مقایسه روشهای یادگیری و ارزشیابی، پژوهش در عنوان پژوهشی: ویژه نامه همایش آموزش پژوهشی، اصفهان: نوریان جواد؛ دادگری علی، مقایسه روشهای یادگیری و ارزشیابی، پژوهش در عنوان پژوهشی: ویژه نامه همایش آموزش پژوهشی، اصفهان: ۱۳۷۵، ۱۰۸-۹.
- 4- Gareth H.; Elzubier M. Imprecise terms in UK medical multiple - choice questions: what examiners think they mean. Med Educ, Glasgow: UK, 32: 343-50, 1998.
- 5- McLeod PJ.; Snell L. Student-generated MCQs. Med Educ, Glasgow: UK, 18: 23-4, 1996.
- 6- Polit DF.; Hungler BP. Data Quality. In: Polit DF.; Hungler BP. Essentials of nursing research: methods appraisal and utilization: From Lippincott Company. NewYork: USA, Chapt 9. 3rd ed. 249, 1993.