

بررسی نسبت لاکتان دهیدروژنаз تام به لاکتان دهیدروژناز مقاوم به حرارت، در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و آنژین صدری ناپایدار

دکتر حمیدرضا قاسمی بصیر^{*}، دکتر میترا حیدرپور^{**}، دکتر فرزاد امامی^{***}، دکتر محمد جعفری[†]، امین افتخاری^{*}، علیرضا مصباح*

*زینت پاتولوژی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، **استادیار گروه پاتولوژی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ***استادیار گروه داخلی- دانشگاه علوم پزشکی همدان، †استادیار گروه پاتولوژی- دانشگاه علوم پزشکی همدان

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۹/۱۷ تاریخ تایید: ۱۷/۱۰/۱۷

چکیده:

زمینه و هدف: اندازه گیری آنزیم های سرم به صورت معیار متداولی جهت تشخیص بیماران مشکوک به انفارکتوس میوکارد در آمده که از میان آنها می توان به لاکتان دهیدروژناز (LDH) و ایزوآنژین های آن اشاره کرد. هدف این مطالعه مقایسه نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت، در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد (MI) و آنژین صدری ناپایدار (UA) بود.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۱۱۰ بیمار با MI و ۱۱ بیمار با UA، بسترهای در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص بیماری فرد بر اساس علایم بالینی، نوار قلب (ECG) و تغییرات آنژیمی بود. میزان LDH تام و LDH مقاوم به حرارت سرم ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از بسترهای بر اساس مقدار مصرف نیکوتین دینوکلئوتید فسفات (NADH) و تبدیل آن به نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید (NAD) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها: نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت در بیماران مبتلا به $MI = 27.0 \pm 1.8$ و در بیماران مبتلا به $UA = 5.1 \pm 1.3$ بود ($P < 0.001$). با کاهش نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت، وسعت درگیری میوکارد (تعداد لیدهای درگیر) و میزان کراتینین فسفوکیناز (CPK) افزایش می یافت ($P < 0.01$). نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت با سن و جنس و نوع MI و بروز بلوک به دنبال MI و بروز آرتیمی به دنبال MI ارتباط معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: از اندازه گیری LDH مقاوم به حرارت می توان به عنوان وسیله ای جهت تشخیص دقیق تر MI استفاده کرد.

واژه های کلیدی: انفارکتوس قلبی، آنژین صدری ناپایدار، لاکتان دهیدروژناز تام، کراتین فسفوکیناز.



مقدمه:

جهت تشخیص بیماران مشکوک به ابتلاء به انفارکتوس میوکارد در آمده و از میان آنژین های متعددی که از میوکارد انفارکته به داخل خون آزاد می شوند فقط تعداد کمی از آنها جهت تشخیص انفارکتوس به صورت روتین کاربرد دارد. اندازه گیری فعالیت کلی لاکتان دهیدروژناز (LDH=Dehydrogenase Lactate) و کراتین فسفوکیناز (CPK=Creatine Phosphokinase)

امروزه بیماری های ایسکمیک قلب و انفارکتوس میوکارد یکی از شایع ترین علل مرگ و میر و ناتوانی در جوامع می باشد. با افزایش میانگین سنی جمعیت بر بروز و شیوع این بیماری ها روز به روز افزوده شده و تشخیص دقیق این بیماری ها، بخصوص انفارکتوس حاد میوکارد بسیار حائز اهمیت است. اندازه گیری آنزیم های سرم به صورت معیار متداولی

^۱نویسنده مسئول: اصفهان- خیابان حفظه- بیمارستان الزهراء(س)- آزمایشگاه پاتولوژی- تلفن: ۰۹۱۸۱۱۵۰۵۵ E-mail:hrgb2004@yahoo.com

مقادیر افزایش یافته LDH در سرم عمدتاً از LDH-1 و LDH-2 دو ایزوآنزیمی که در میوکارد به مقدار زیاد یافت می شوند تشکیل شده است (۲،۱).

اندازه گیری LDH-1 می تواند دقیق تر از LDH تام در افتراق انفارکتوس میوکارد MI از ایسکمی میوکارد کمک نماید (۳،۴).

هنگامی که LDH افزایش می یابد و نسبت LDH-1/LDH-2 بیشتر از ۱ باشد افزایش LDH-1/LDH-2 به ۲-۲ LDH را طرح Flipped LD نامند که این تغییر بعد از انفارکتوس حاد میوکارد، انفارکتوس حاد کلیه و در موارد همولیز نظری آنمی همولیتیک مشاهده می گردد. طرف ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از انفارکتوس حاد میوکارد نمودار مربوط به ایزوآنزیم های LDH بصورت طرح Flipped در می آید. در ۸۰ درصد بیمارانی که دچار انفارکتوس میوکارد می شوند این طرح طی ۴۸ ساعت اول بیماری باقی می ماند ولی ضرورتاً تداوم نمی یابد. بطوری که در کمتر از نیمی از بیماران مبتلا به MI ممکن است تا پایان هفته اول حتی با وجود بالا بودن مقدار LDH سرم، طرح LD Flipped وجود نداشته باشد (۶). بسیاری از آزمایشگاه ها نسبت LDH-1/LDH-2 را گزارش می کنند که در MI افزایش می یابد (۵،۱).

نسبت ۲-LDH-1/LDH-2 بیشتر از ۱ به عنوان معیار تشخیصی MI می باشد. حتی نسبت ۷۶/۰ نیز تا ۹۰ درصد جهت تشخیص MI حاد اختصاصی بوده است (۶).

در یک مطالعه نشان داده شد افزایش LDH-1 به میزان بیشتر از ۱۰۰ IU/L و نسبت LDH-1/LDH-T بیشتر از ۰.۴۰ در ۹۳ درصد بیماران مبتلا به MI اتفاق می افتد (۷).

LDH و ایزوآنزیم های آن در مواردی که CPK به حد طبیعی برگشته است یعنی وقتی که از انفارکتوس میوکارد ۲ تا ۴ روز گذشته نیز به کار می رود (۶).

روش ایمونوھیستوکمیستری جهت LDH-1 که بر روی سکشن های بافتی انجام می شود، روشنی دقیق

سرم کاربرد گسترده ای دارد. میزان، زمان آغاز و طول مدت افزایش هر آنزیم جنبه تشخیصی دارد.

افزایش فعالیت آنزیم LDH ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از شروع انفارکتوس حاد میوکارد (MI=Myocardial Infarction) آغاز می شود و طرف ۳ تا ۶ روز از شروع درد به حد اکثر می رسد و ۸ تا ۱۴ روز پس از انفارکتوس به حد طبیعی باز می گردد. لاکتات (LDH-t=Lactate Dehydrogenize total) حساسیت بالایی دارد ولی اختصاصی نمی باشد و موارد مثبت کاذب در بیماران دچار همولیز، آنمی مگالو بلاستیک، لوکمیا، بیماریهای کبدی، احتقان کبدی، بیماری های کلیوی، انواع نشوپلاسم ها، آمبولی ریوی، میوکاردیت، بیماری های عضلاتی و شوک مشاهده می شود (۱).

LDH از ۵ ایزوآنزیم تشکیل شده است. تفکیک LDH سرم به ۵ ایزوآنزیم دقت تشخیصی را افزایش می دهد. در مطالعات انجام شده بر روی ایزوآنزیم های LDH، طی بیماری های مختلف طرح های غیر طبیعی متفاوت مشاهده شده است که مشخص کننده نسوج در گیر می باشد. برای مثال افزایش LDH-1 در انفارکتوس میوکارد، آنمی مگالو بلاستیک، آنمی همولیتیک و دیستروفی عضلانی دیده می شود و LDH-2 در انفارکتوس میوکارد، لوکمیا، پانکراتیت، کارسینوم ها، آنمی مگالو بلاستیک، آنمی همولیتیک و دیستروفی عضلانی افزایش می یابد. در لوکمیا، پانکراتیت و کارسینوم ها LDH-3 افزایش می یابد و افزایش LDH-4 و ۵ در انفارکتوس ریه، نارسایی احتقانی قلب، هپاتیت های ویروسی و سیروز کبدی مشاهده می گردد. LDH-5 عمدتاً در بیماران با احتقان کبدی افزایش می یابد. امروزه مواردی مانند بیماری های کبدی و عضلانی که باعث افزایش LDH تام (LDH-t) می شوند با اندازه گیری ایزوآنزیم های LDH از انفارکتوس حاد میوکارد افتراق داده می شوند (۱).

بطور طبیعی ۲۷-۲۷ LDH-1 درصد کل LDH تام را شامل می شود. در انفارکتوس حاد میوکارد

مقاوم به حرارت می توان به میزان فعالیت LDH-1 پی برد. ۴- افزایش LDH-1 به میزان بیشتر از LDH-1/LDH-t نسبت ۱۰۰ IU/L بیشتر از ۰.۴۰ در ۹۳ درصد بیماران مبتلا به MI مشاهده می شود. لذا این مطالعه با هدف جایگزین کردن نسبت LDH-1 به LDH (LDH مقاوم به حرارت) به جای طرح LDH-1/LDH-2) Flipped بردن درصد تشخیص درست MI به روش دیگر انجام بردن درصد تشخیص درست MI به روش دیگر انجام شد.

روش بورسی:

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی کلیه بیماران بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان در مدت ۶ ماه که با شک به MI یا UA بستری شده بودند جامعه مورد مطامعه را تشکیل می دادند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده (Simple Random) تعداد ۲۲۰ بیمار مشتمل بر ۱۱۰ بیمار مبتلا به MI و ۱۱۰ بیمار مبتلا به UA بر اساس روش نمونه گیری ساده جهت مطالعه انتخاب گردیدند. روش جمع آوری داده ها به صورت پر کردن چک لیست بر اساس اطلاعات موجود در پرونده بیماران بود. تشخیص بیماری فرد در هنگام ترخیص بر اساس معیارهای استاندارد سازمان جهانی بهداشت WHO (علایم بالینی، نوار قلب ECG، تغییرات آنزیمی) صورت می گرفت.

روش نمونه گیری: آزمایش بر روی باقی مانده نمونه سرم بیمار که به صورت روتین جهت اندازه گیری LDH ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از بستری گرفته می شد، انجام می گرفت. (هیچگونه خونگیری اضافی به بیمار تحمیل نشد) میزان LDH توتال و LDH مقاوم به حرارت سرم ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از بستری اندازه گیری شد. از آنجا که همولیز سبب افزایش LDH-1 می شود، مراقبت های لازم جهت جلوگیری از ایجاد همولیز در نمونه به عمل آمد.

با استفاده از کیت اندازه گیری LDH شرکت بیوسیستم (Biosystem) بر روی نمونه سرم بعد از حرارت

در تعیین انفارکتوس در بافت قلب می باشد (۸).

در یک مطالعه کاهاش متاپولیسم هوایی میوکارد با کاهاش نسبت LDH-5/LDH-1 مرتبط دانسته شده است (۹). در مطالعه بر روی موش ها به این نتیجه رسیده اند که هایپوکسی می تواند پترن ایزوآنزیم های LDH را تغییر دهد. بدین صورت که پس از برگرداندن موش ها از هایپوکسی ایجاد شده افزایش سریع در LDH-1 و LDH-2 مشاهده شد (۱۰).

با اندازه گیری مقدار آلفا هیدروکسی بوتیرات دهیدروژناز (HBD= alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase)

نیز می توان LDH-1 را تخمین زد. امروزه مشخص شده است که فعالیت HBD نمایانگر فعالیت مربوط به ایزوآنزیم های LDH و بخصوص LDH-t می باشد (۱۱). سنجش فعالیت HBD توسط تکنیکی مشابه با تکنیک اندازه گیری LDH انجام می گیرد. معمولاً نسبت LDH-t/HBD بین ۱/۶ تا ۱/۲ متغیر است. در انفارکتوس میوکارد این نسبت به ۰/۸ تا ۱/۲ می رسد (۱).

توسط اندازه گیری همزمان CPK (Creatine Phospho Kinase) و LDH، تلفیقی از حساسیت بالا مربوط به CPK و ویژگی بالا مربوط به LDH حاصل می شود (۱۲).

معیارهای تلفیقی دقیق تر شامل وجود طرح Creatine Phosphokinase-MB و Flipped LD (CPK-MB) ظرف ۴۸ ساعت اول پس از حمله حاد مشکوک به MI می باشد. طرح Flipped LD پس از ظاهر شدن CPK-MB ایجاد می شود. هرگاه ظرف ۲۴ ساعت هر دو معیار مشاهده شوند تشخیص قطعی خواهد بود. هر گاه ظرف ۴۸ ساعت ۲ معیار فوق مشاهده شوند MI رد خواهد شد. قاطعیت تشخیص معیارهای تلفیقی در رد MI پس از ۴۸ ساعت به اندازه مرحله حاد یعنی ۴۸ ساعت اول نمی باشد (۲۰).

با توجه به این اینکه: ۱- ارتباط مستقیم بین نسبت LDH-t/HBD و وقوع MI وجود دارد. ۲- افزایش HBD در ارتباط مستقیم با افزایش LDH و بخصوص ایزوآنزیم LDH-1 می باشد. ۳- با اندازه گیری مقدار

از بین می رود. بر این اساس برای تخمین مقدار LDH، LDH-1 مقاوم به حرارت را اندازه گیری نمودیم. بر اساس نتایج تست های K-S و Levens آماری t-test و من ویتنی جهت آنالیز آماری استفاده شد.

یافته ها:

در این مطالعه ۱۱۰ بیمار مبتلا به MI و ۱۱۰ بیمار مبتلا به UA مورد بررسی قرار گرفتند که گروه MI شامل نفر (۷۳/۶٪) مرد و نفر (۲۶/۴٪) و گروه UA شامل نفر (۵۶/۴٪) مرد و نفر (۴۳/۶٪) زن بود. متوسط سنی بیماران گروه MI ۵۹±۱۲ سال و متوسط سنی بیماران گروه UA ۶۲±۱۳ سال بود.

متوسط میانگین CPK در گروه بیماران مبتلا به UA، MI ۱۹۲۴±۱۷۳۳ و در گروه مبتلا به UA MI ۱۴۹±۱۸۴ U/L بود. میانگین LDH-t در گروه MI ۱۴۵±۷۵۳ و در گروه UA ۵۵۵±۲۲۸ بود. میانگین LDH-1 در گروه MI ۱۱۸۳±۶۶۵ و در گروه UA ۲۷۱±۱۷ بود.

۵۶°C بمدت ۳۰ دقیقه اندازه گیری گردید که ممکنیسم آن بدین شرح می باشد: پیروات در مجاورت لاکتات دهیدروژناز اجاء شده به لاکتات تبدیل می گردد. مصرف نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید فسفات (NADH=Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) و تبدیل آن به نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید (NAD=Nicotinamide adenine dinucleotid) متناسب با فعالیت آنزیم LDH می باشد. به روش اسپکتروفوتومتری میزان تغییر غلظت NADH تعیین می شود. نتایج حاصل بر حسب U/L بیان می گردد که این واحد عبارت است از تعداد میکرومول هایی از NADH که هر دقیقه با یک لیتر از نمونه تحت بررسی وارد واکنش می شوند.

تخمین میزان LDH-1 که ایزو آنزیم میو کاردی می باشد توسط تکنیکی صورت می گیرد که به سادگی اندازه گیری فعالیت LDH تام است. ایزو آنزیم LDH در حرارت ۵۶°C بمدت ۳۰ دقیقه تخریب نمی شود در حالی که تحت این شرایط فعالیت چهار ایزو آنزیم دیگر

جدول شماره ۱: مقایسه درصد انفرکتوس حاد میو کارد (MI) و آنژین صدری ناپایدار (UA) در فاصله های تعیین شده از نسبت لاکتات دهیدروژناز تام به لاکتات دهیدروژناز مقاوم به حرارت

	فواصله های تعیین شده	نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت
>۱/۸۰	انفارکتوس	تعداد
۱/۷۱-۱/۸۰	حاد میو کارد	درصد
۱/۶۱-۱/۷۰	آنژین صدری	تعداد
۱/۵۱-۱/۶۰	ناپایدار	درصد
۱/۴۱-۱/۵۰		
۱/۳۱-۱/۴۰		
۱/۲۱-۱/۳۰		
۱/۱۱-۱/۲۰		
۱/۰۱-۱/۱۰		

LDH=Lactate Dehydrogenase

.(P<0.001)
هر چه نسبت LDH-t به LDH-1 کمتر شده و به عدد ۱ نزدیک می گردد، درصد افراد مبتلا به MI که در هر گروه قرار می گیرند افزایش می باید به

میانگین نسبت LDH-t به LDH-1 در گروه MI ۱/۲۷±۰/۱۸ و در گروه UA ۲/۵۱±۱/۳۹ بود که اختلاف این دو نسبت نشان دهنده ارتباط معنی دار بین وقوع MI و میزان نسبت LDH-t به LDH-1 می باشد

ارتباط بین سن و جنس مبتلایان به MI با نسبت LDH-t به ۱/LDH-1 ارتباط معنی داری وجود نداشت.

بحث:

یافته های این مطالعه ثابت کرد کاهش نسبت LDH-t به LDH-1 (LDH مقاوم به حرارت) در بیماران دچار MI می تواند در افراق MI از UA کمک کننده باشد. مطالعات قبلی که ایزوآنزیم LDH-1 را به صورت مستقیم اندازه گیری نموده بودند نیز بر این موضوع تأکید می نمایند (۱-۷).

با توجه به اینکه اندازه گیری CPK و LDH تام به علت وجود منابع مختلف تولید در تشخیص MI از قدرت کمتری نسبت به معیارهای تلفیقی مانند Flipped LD + CPK-MB بروخوردار است بنابراین با پیدا کردن معیارهای تلفیقی جدید مثل کاهش نسبت CPK + LDH-t/LDH-1(heat stable) توتال شاید بتوان این کمبود را جبران کرد.

در این مطالعه از تلفیق نسبت LDH-t به LDH-1 در میزان CPK توتال می توان به تشخیص قطعی تر MI دست یافت بدین صورت که اگر تنها نسبت LDH-t به MI کمتر یا مساوی ۱/۵۰ باشد احتمال وقوع LDH-1 درصد است و اگر میزان CPK به تنها بیشتر از ۸۲/۹ باشد احتمال وقوع MI ۹۴/۱ درصد است ولی در صورتی که اگر این نسبت کمتر یا مساوی ۱/۵۰ باشد و CPK نیز بیشتر از ۵۰۰ باشد با احتمال ۹۸/۸ درصد می توان وقوع MI را پیش بینی نمود.

در این مطالعه از ۱۱۰ بیمار مبتلا به MI ۳۳ نفر LDH توتال کمتر از ۱۰۰۰ UL داشتند که از این تعداد در ۲۷ نفر نسبت LDH-t به LDH-1 کمتر از ۱/۵۱ بود و همچنین ۱۵ نفر از مبتلایان به MI کمتر از UL ۵۰۰ داشتند که در هر ۱۵ نفر نسبت مذکور کمتر از ۱/۵۱ بود. بنابراین می توان با اندازه گیری این نسبت به همراه CPK و LDH موارد منفی کاذب اندازه گیری آنزیم های سرم (CPK و LDH تام) جهت تشخیص MI را کاهش داد و به این طریق بر حساسیت تشخیص

نحوی که تمامی بیمارانی که این نسبت در آنها کمتر از ۱/۱۰ می باشد مبتلا به MI هستند. با افزایش نسبت فوق، درصد افراد مبتلا به UA افزایش می یابد بطوری که در گروهی که نسبت آنها بیشتر از ۱/۸۰ می باشد تمام افراد مبتلا به UA هستند (جدول شماره ۱). ضمناً در این گروه بندی میانگین CPK در افراد مبتلا به MI مورد مقایسه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بین این نسبت و میانگین CPK توتال ارتباط معنی داری وجود دارد ($P<0.001$) (جدول شماره ۲).

بین تعداد لیدهای در گیر و نسبت LDH-t به LPH-1 ارتباط معنی داری وجود داشت. به این صورت که با کاهش نسبت مذکور، تعداد لیدهای در گیر افزایش یافت. البته این ارتباط در گروه مبتلا به UA مشاهده نمی شد.

جدول شماره ۲: نتیجه تلفیق نسبت لاکتات دهیدروژناز تام به لاکتات دهیدروژناز مقاوم به حرارت و کراتینین فسفولیناز در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد

CPK	نسبت LDH تام به LDH مقاوم به حرارت	درصد تشخیص MI
۲۰۰>	۱/۲<	%۹۷/۷
۳۰۰>	۱/۳<	%۹۸/۶
۴۰۰>	۱/۴<	%۹۸/۷
۵۰۰>	۱/۵<	%۹۸/۸
۶۰۰>	۱/۶<	%۹۸/۹
۷۰۰>	۱/۷<	%۹۸/۸
۸۰۰>	۱/۸<	%۹۸/۸

MI: انفارکتوس حاد میوکارد

LDH: لاکتات دهیدروژناز

CPK: کراتینین فسفولیناز

میانگین نسبت LDH-t به LDH-1 در افراد دچار MI در دو گروه Q-wave و NonQ-wave گروه دارای آریتمی به دنبال MI و بدون آریتمی، گروه دارای بلوک به دنبال MI و بدون بلوک مقایسه فوق وجود نداشت.

می باشد ولی نسبت LDH-1 به LDH مقاوم به حرارت در افراد مبتلا به MI به طور واضح بالاتر از افراد مبتلا به UA است که این خود تاکیدی بر توانایی آین روش ابتكاری ساده در تشخیص MI از UA می باشد. به بیان دیگر توانایی نسبت مذکور در تشخیص MI در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول بسیار بالاتر از دیگر این مطالعه بیانگر این موضوع است که LDH-t مقاوم به حرارت که روشنی کم هزینه می باشد را می توان بجای اندازه گیری مستقیم LDH-1 استفاده نمود.

نتیجه گیری:

با توجه به این که در بسیاری از مراکز درمانی کوچک ایزوآنزیم های LDH و شاخص های اختصاصی تر Cardiac Specific Troponin T MI مانند LDH-1 Cardiac Specific Troponin I LDH-1 نمی شوند و از آنجایی که روش اندازه گیری-1 به روش حرارت دادن سرم بسیار راحت، ارزان و در دسترس می باشد می توان در همه بیماران مشکوک به علاوه بر CPK و LDH-t LDH مقاوم به حرارت MI (LDH-1) را اندازه گیری نمود و حساسیت و ویژگی LDH-t و CPK و LDH را در تشخیص MI بالا برد.

تشکر و قدردانی:

بدینوسیله نویسندهای از پرسنل بیمارستان اکباتان همدان که در انجام این تحقیق همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می نمایند.

MI افروده می شود.

۵ نفر از افراد مبتلا به UA در این مطالعه بیشتر از UL1000 LDH-t داشتند که از این تعداد ۴ نفر نسبت LDH-t به LDH-1 بیشتر از ۱/۸۰ داشتند و همچنین ۶ بیمار مبتلا به UA، CPK بیشتر از UL500 داشتند که از این ۶ نفر نیز ۴ نفر نسبت بیشتر از ۱/۸۰ داشتند. بنابراین می توان با اندازه گیری این نسبت موارد مثبت کاذب CPK و LDH تام را کاهش داد و بر اختصاصی بودن این تست ها افزود.

این مطالعه مشخص کرد که هر چه تعداد لیدهای در گیر در بیماران مبتلا به MI بیشتر باشد میانگین نسبت LDH-t به LDH-1 کمتر است یا به عبارت دیگر وسعت MI و ناحیه نکروزه با میزان این نسبت مرتبط است. در مطالعات قبلی نیز اثبات شده که میزان آنزیم های آهسته رهش شامل LDH-1 LDH و HBD مرتبط با اندازه منطقه انفارکته می باشد (۱۳) همچنین از عدم ارتباط بین وقوع بلوک و نسبت فوق می توان به این نتیجه رسید که آسیب سیستم هدایتی قلب در جریان MI ارتباطی با این نسبت ندارد. مطالعات انجام شده قبلی به این نتیجه رسیده بودند که بافت هدایتی قلب نسبت به بافت عضلانی LDH-1 بیشتری تولید می کند (۱۴).

با وجود اینکه حداقل مقدار LDH سرم ۳ تا ۶ روز پس از سکته قلبی ایجاد می گردد ولی طرح Flipped در ایزوآنزیم ها و افزایش نسبی LDH-1، LDH-t تا ۲۴ ساعت بعد از MI به وقوع می پیوندد. بنابراین با وجود اینکه در طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول مقادیر LDH-t و LDH نسبت به روز ۳ تا ۶ پایین تر و غیر تشخیصی

منابع:

- Naif Z. Abraham JR, Robert P. Carty. Clinical Enzymology. In: Henry JB. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21st ed. Philadelphia: Saunders; 2007. p: 258-60.
- Jay L. Evaluation of cardiac injury and function. In: Henry JB. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21st ed. Philadelphia: Saunders; 2007. p: 219-27.
- Fogh-Andersen N, Sorensen P, Moller-Petersen J, Ring T. Lactate dehydrogenase isoenzyme 1 in the diagnosis of myocardial infarction. J Clin Chem Clin Biochem. 1982; 20(5): 291-4.

4. Ladi RN, Hollaar L, Sovereign JH, van der Laarse A. Quantization of cumulative release of lactate dehydrogenase isoenzyme-1 in plasma of patients with acute myocardial infarction using a commercially available test. *Clin Physiol Biochem.* 1990; 8(5): 250-5.
5. Rotenberg Z, Davidson E, Weinberger I, Fuchs J, Sperling O, Agmon J. The efficiency of lactate dehydrogenase isoenzyme determination for the diagnosis of acute myocardial infarction. *Arch Pathol Lab Med.* 1988; 112(9): 895-7.
6. Antman EM, Braunwald E. ST-segment elevation myocardial infarction. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS. *Harrison's principles of internal medicine.* 16th Ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p: 1450-1.
7. Weidner N. Laboratory diagnosis of acute myocardial infarct: usefulness of determination of lactate dehydrogenase (LDH)-1 level and of ratio of LDH-1 to total LDH. *Arch Pathol Lab Med.* 1982; 106(8): 375-7.
8. Liu F, Belding R, Usategui-Gomez M, Reynoso G. Immunochemical determination of LDH-1. *Am J Clin Pathol.* 1981; 75(5): 701-7.
9. Prognostic value of myocardial lactate dehydrogenase subunit ratio in heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant.* 1998; 17(10): 959-68.
10. Changes in plasma LDH isoenzymes in rats during hypoxia and its recovery stage. *Masui.* 1992; 41(9): 1455-60.
11. Kikuchi Y, Kita T, Furuya K, Kato K. Lactic dehydrogenase isozyme patterns and alpha-hydroxybutyrate dehydrogenase activities in serum from newborns, patients with ovarian cancer or myocardial infarction. *Cancer Biochem Biophys.* 1988; 10(2): 125-9.
12. Libby P, Bonow RO. Approach to the patient with chest pain. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P, Libby BZ. *Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine.* 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2005. p: 1132-4.
13. Bruschke AV, van der Laarse A, van der Wall EE. Assessment of the size of acute myocardial infarction. I: Biochemical methods. *Cleve Clin J Med.* 1990 Sep; 57(6): 547-50.
14. Herrmann G, Crotet V, Maly P, Sasse D. Microquantitative determination of LDH isoenzymes in the myocardial & conducting system. *Histochem J.* 1994 Jul; 26(7): 597-600.