

بررسی ارتباط وضعیت دید دو چشمی با سردردهای میگرنی

حامد مومنی مقدم^{*}، حسین انصاری^{**}، دکتر هادی استادی مقدم^{***}، دکتر حبیب الله نعمتی[†]، مرضیه احسانی[‡]، سمیرا مسروور[‡]

^{*}مریبی گروه بینایی سنجی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ^{**} مریبی گروه اپیامیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ^{***} دانشیار گروه بینایی سنجی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، [†] دانشیار گروه مغز و اعصاب - دانشگاه علوم پزشکی مشهد، [‡] کارشناس بینایی سنجی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

تاریخ دریافت: ۸۸/۲/۲۷ تاریخ تایید: ۸۸/۷/۲۰

چکیده:

زمینه و هدف: با توجه به نتایج ضد و نقیض در مورد ارتباط بین سردردهای میگرنی و اختلالات دید دو چشمی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین برخی از پارامترهای دید دو چشمی با میگرن انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، ۳۰ نفر بیمار میگرنی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به همراه ۳۰ نفر بدون سردرد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا بیماران با استفاده از پرسشنامه استاندارد سردرد غربال شده و تایید نهایی توسط نورولوژیست انجام شد. عیوب انکساری به روش رتینوسکوپی تعیین و سپس نقطه نزدیک تقارب، تقارب پرشی، استریوپسیس، ذخایر فیوژنی، انحراف دور و نزدیک در دو گروه تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های من- ویتنی و رگرسیون لجستیک تک متغیره و چندگانه تحلیل شد.

یافته ها: میانگین استریوپسیس در گروه مورد و شاهد به ترتیب 49.0 ± 26.1 و 154.7 ± 33.8 ثانیه بر کمان بود و به ترتیب در گروه مورد و شاهد میانگین فوریای نزدیک 8.3 ± 6.7 و 6.5 ± 2.8 و ذخایر فیوژنی مثبت دور 10.7 ± 2.7 و 7.07 ± 5.07 و ذخایر فیوژنی منفی دور 18.2 ± 4.7 و 11.0 ± 7.37 و ذخایر فیوژنی مثبت نزدیک 16.5 ± 4.49 و 13.97 ± 8.72 و ذخایر فیوژنی منفی نزدیک 5.22 ± 2.2 و 2.27 ± 1.4 پریزیوم دیوپتر بود. متوسط متغیرهای فوق و تقارب پرشی در دو گروه تفاوت معنی داری داشت ($P < 0.05$) ولی متوسط سایر متغیرها در دو گروه معنی دار نبود. در رگرسیون لجستیک چندگانه فقط تقارب پرشی، تقارب فیوژنی مثبت در دور و نزدیک در مدل باقی ماند ($P < 0.05$).

نتیجه گیری: این مطالعه نسبت بالاتر اختلالات دید دو چشمی (تقارب پرشی غیر طبیعی، فوریای زیاد در نزدیک، ذخایر فیوژنی غیر طبیعی و کاهش استریوپسیس) را در گروه میگرنی نسبت به شاهد نشان داد. بنابراین لازم است بیماران میگرنی به طور منظم جهت بررسی وضعیت دید دو چشمی خود به اپتومتریست یا چشم پزشک مراجعه کنند.

واژه های کلیدی: آنومالی های دید دو چشمی، سردرد، میگرن.

مقدمه:

ضرباندار یکطرفه و اختلال سیستم عصبی خودکار مشخص می شود و درصد تمامی سردردها را شامل می شود (۲). غالباً اپتومتریست ها با بیماران میگرنی مواجه می شوند که بیمار یا سایر متخصصین، اختلالات بینایی را عامل سردرد می دانند. بنابراین میگرن یکی از

سردرد یکی از شایع ترین شکایات بیماران مراجعه کننده به اپتومتریست می باشد و تقریباً ۸ درصد بیماران جوان مراجعه کننده به کلینیک های بینایی سنجی از سردرد شکایت دارند (۱). میگرن یک اختلال شایع، مزمن و عروقی- عصبی بوده که اساساً با سردرد

می تواند باعث ایجاد میگرن شود اما در این مطالعه تفکیک بین ایزوفوریا و اگزوفوریا انجام نشده بود (۱۰). بررسی های الکتروموگرافی نشان دادند که دردهای مشابه میگرن می تواند با تحریک مستقیم عضلات خارج چشمی ایجاد شود. این یافته ها گزارش می کند که سردرد ایجاد شده به خاطر عدم بالانس عضلانی (هتروفوریا) می تواند با اصلاح انحراف با پریزم، تمرین های اورتاپتیک (ورزش چشم) و یا حتی جراحی در صورت نیاز درمان شود (۱۱). چندین محقق نیز ارتباط بین هتروفوریای غیر جبرانی و ناتوانی تقاربی را با سردرد (۱۲، ۱۳) یا ارتباط بین اختلالات دید دو چشمی را با خستگی عمومی گزارش کردند (۱۴). هر چند این محققین به طور اختصاصی سردردهای میگرنی را مورد بررسی قرار ندادند. Evans و همکارانش در مقایسه‌ی بیماران مبتلا به میگرن با افراد سالم به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین این دو در ارتباط با استرایسم و یا هایپرفوریا وجود ندارد. هر چند اگزوفوریای غیر جبرانی تا حدی در گروه میگرنی بیشتر بود (۱۵). Harle و Evans در بررسی ارتباط بین اختلالات دید دو چشمی و میگرن گزارش کردند که این اختلالات عمدتاً به سردرد یا خستگی چشم مربوط بوده و نمی توان این اختلالات را عامل اصلی ایجاد کننده‌ی میگرن Evans دانست (۱۶). در بررسی دیگری که Harle و انجام شد، گزارش کردند که در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با گروه کنترل به طور متوسط شیوع هتروفوریا بالاتر و استریوپسیس کمتر می باشد اما این تفاوت‌ها جزیی می باشد. به طور کلی ارتباط مشخصی بین اختلالات دید دو چشمی و میگرن گزارش نشده، هر چند که در بررسی های اولیه این چنین ارتباط هایی بدست آمده بود، ولی مطالعات اخیر با گروه کنترل ارتباط مشخصی پیدا نکرده و گزارش دادند که اختلالات دید دو چشمی می توانند باعث سردرد (نه اختصاصاً میگرن) یا استنوبی شود (۱۷).

متناقض بودن نتایج بررسی های قبلی در مورد ارتباط بین میگرن و وضعیت دید دو چشمی یکی از

شایع ترین انواع سردردهایی است که اپтомتریست‌ها با آن مواجه‌اند.

اتیولوژی میگرن کاملاً شناخته شده نیست گرچه عوامل عروقی، هورمونی و عصبی وابسته به سردرد و نقش این فاکتورها تا حدی شناخته شده ولی مکانیسم دقیق ایجاد سردرد هنوز ناشناخته است. اگرچه میزان پیشرفت حملات سر درد متغیر است اما اغلب یک محرك که می تواند یک اختلال بینایی نیز باشد فرد را از ایجاد حملات آگاه می کند. دو جنبه‌ی بالقوه‌ای که اپтомتریست می تواند از این طریق به بیماران میگرنی کمک کند، عبارتند از، کمک به تشخیص سریع مشکل و ارجاع جهت درمان کلینیکی مناسب و نقش اپتمتریست در حذف یا کاهش اختلالات بینایی (فاکتورها یا عوامل هشدار دهنده) (۳). اپتمتریست‌ها غالباً سومین مشاوری هستند که بیماران با سردرد به آنها مراجعه می کنند که به لزوم انجام معاینات مربوط به سیستم بینایی و ارزیابی دقیق تر وضعیت سردرد اشاره دارد (۴).

بررسی های اولیه نشان می دهند که اختلالات دید دو چشمی عامل سردردهای میگرنی می باشند. Celebisoy و همکاران کاهش ذخایر فیوژنی تباعی و تقاربی را در بیماران مبتلا به میگرن عامل سردرد دانسته و تجویز پریزم های قاعده به داخل را به عنوان یک درمان موثر در بیمار با میگرن کلاسیک شدید معرفی کرد (۵). تا سال ۲۰۰۰ نیز استفاده از پریزم قاعده به داخل جهت حذف یا کاهش سردردهای میگرنی توصیه می شد (۶). Wilkins و همکاران، هتروفوریا بوسیله ایزوفوریا را به عنوان یک عامل سردرد، بخصوص وقتی همراه با میوپی باشد گزارش کرد (۷). Friedman استرس روی سیستم فیوژنی که عامل مشکلات دید دو چشمی می باشد را به عنوان یک عامل ایجاد کننده‌ی میگرن گزارش کرد (۸). Biondi اگزوفوریا را عامل ایجاد سردرد میگرنی می داند اما در مطالعه‌ی او گروه کنترلی وجود نداشته است (۹). Waters گزارش داد که هتروفوریای افقی عامل ایجاد سردرد نبوده اما هایپرفوریا

انجام شد. برای اندازه گیری نقطه نزدیک تقارب از یک تار گت تطبیقی که یک ردیف عمودی با اندازه ۲۰/۳۰ یا ۶/۹ از چارت استلن کوچک بوده استفاده شد به این صورت که تار گت از فاصله ۴۰ سانتی متری و در امتداد خط وسط به طور یکنواخت با سرعت ۳ تا ۵ سانتی متر در ثانیه به سمت پل بینی فرد حرکت داده شد و از فرد خواسته شد به چارت نگاه کند و زمانی که تار گت دو تا می شود را گزارش کند یا نقطه ای که یکی از چشم ها فیکسیشن خود را از دست می دهد به عنوان نقطه نزدیک تقارب در نظر گرفته و با خط کش فاصله ی این نقطه تا کاتوس خارجی بیمار بر حسب سانتی متر اندازه گیری شد (۱۸).

برای بررسی وضعیت تقارب پرشی به دو محرك که معمولاً نوک خود کار یا حروف کوچک هستند، نیاز است. یک خود کار را در فاصله ۱۵ سانتی متر و دیگری را در فاصله ۵۰ سانتی متر از چشم و در امتداد خط میانی قرار داده و از فرد خواسته می شود از تار گت دور به نزدیک نگاه کند. در این صورت وضعیت تقارب پرشی فرد ارزیابی می شود که می تواند طبیعی یا یکی از حالت های غیر طبیعی شامل حرکت ورژنی، تاخیر تقاربی (راست یا چپ)، عدم تقارب و تقارب بیش از حد باشد.

برای تعیین انحراف دور و نزدیک از روش کاور تست متناسب به همراه پریزم در فاصله ۴۰ سانتی متری و ۶ متری استفاده شد، تار گت انتخابی یک ردیف عمودی با اندازه معادل ۲۰/۳۰ چارت استلن کوچک برای فاصله ۴۰ سانتیمتری و یک ردیف عمودی از خط ۲۰/۳۰ چارت استلن دور برای فاصله ۶ متری می باشدند. برای اندازه گیری استریوپسیس از تست دید عمق TNO استفاده شده که دامنه دیسپاریتی این تست از ۱۵ تا ۴۸۰ ثانیه بر کمان متغیر می باشد. این تست شامل ۷ صفحه است که صفحات اول و دوم و سوم صفحه اسکرینینگ و صفحه چهارم ساپرشنی و صفحات ۷-۵ آستانه دید عمق را مشخص می کند. روش اندازه گیری بدین صورت است که در اتاق با نور

دلایل توجیه انجام مطالعه حاضر می باشد که علاوه بر تکمیل نتایج مطالعات قبلی می تواند در روند درمان سردردهای میگرنی مفید می باشد. بنابراین در صورت وجود رابطه معنی دار بین سر دردهای میگرنی و وضعیت دید دوچشمی، ارزیابی وضعیت دید دوچشمی در بیمارانی که از سردردهای میگرنی شکایت دارند به عنوان یکی از مراحل اولیه درمان توصیه خواهد شد.

روش بررسی:

در این مطالعه مورد- شاهدی، تعداد ۳۰ نفر بیمار میگرنی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به همراه ۳۰ تفر شاهد (افراد بدون سابقه میگرن و اختلالات شدید عصبی) که از نظر سن و جنس همسان شده و از اطرافیان بیمار بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران میگرنی افرادی بودند که به کلینیک ویژه مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده بودند. لازم به ذکر است که گروه شاهد از افرادی که عیوب انکساری آنها با گروه میگرن تفاوت معنی داری نداشت، انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن حداقل یک بار تجربه ی سردرد در ماه، نداشتن سابقه بیماری سیستمیک و چشمی، عدم استفاده از داروهایی که بر عملکرد ینایی تاثیر می گذارد. ضمناً بیماران حامله از مطالعه خارج گردیدند (۳). جهت رعایت و ملاحظات اخلاقی کلینیکی قبل از انجام مطالعه به بیمار اطلاعات لازم در مورد نحوه انجام تست ها و اثرات آنها داده شده و پس از کسب رضایت آنها مراحل بعدی مطالعه انجام شد. جهت غربالگری بیماران میگرنی پرسشنامه طراحی شده توسط بیماران تکمیل و بعد از تکمیل تایید نهایی توسط نورولوژیست صورت گرفت. ابتدا عیوب انکساری افراد به صورت ایژکتیو با استفاده از رتینوسکوپ خطی هاین بتا- ۲۰۰- تعیین و سپس بصورت سایزکتیو با استفاده از جعبه عینک، تریل فرم، کراس سیلندر و چارت تیزبینی استلن ۶ متری نتایج رتینوسکوپی تصحیح شدند و در نهایت بالانس دو چشمی با استفاده از تست بایکروم

یافته ها:

در گروه مورد ۲۵ نفر زن (۸۳٪) و ۵ نفر مرد (۱۶٪) و در گروه شاهد تعداد زن و مرد به ترتیب ۲۴ و ۶ (۲۰٪) بود. دامنه‌ی سنی افراد تحت مطالعه در گروه مورد ۱۴-۵۰ و میانگین سنی ۳۱/۸۷±۹/۷۱ سال و در گروه شاهد دامنه‌ی سنی ۱۸-۴۸ و میانگین سنی ۳۲/۸۳±۹/۱۹ سال بوده است. دو گروه از نظر سطح تحصیلات نیز تفاوت معنی داری نداشتند ($P > 0.05$). در این مطالعه شیوع انواع میگرن در گروه مورد به ترتیب میگرن شایع (۹۳٪)، کلاسیک (۳٪) و بازیلر (۳٪) بوده و بیشتر سردردهای میگرنی محدود به ناحیه‌ی فرونتو تمپورال یک طرف و دو طرف بوده است.

با توجه به واریانس‌ها، بیشترین اختلاف بین گروه مورد و شاهد مربوط به تقارب فیوژنی مثبت دور و نزدیک می‌باشد. آزمون من ویتنی نشان داد که از متغیرهای مورد بررسی تنها میانگین انحراف نزدیک ($P < 0.05$ ، استریوپسیس ($P < 0.01$)، تقارب فیوژنی منفی در دور ($P < 0.05$)، تقارب فیوژنی منفی در نزدیک ($P < 0.01$) و تقارب فیوژنی مثبت در نزدیک ($P < 0.01$) در دو گروه تفاوت معنی داری از لحاظ آماری داشته ولی میانگین سایر متغیرهای مورد بررسی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند ($P > 0.05$) (جدول شماره ۱).

با آزمون مربع کای تقارب پرشی تفاوت معنی داری از لحاظ آماری در دو گروه داشت ($P < 0.01$) و شیوع حالت‌های غیر طبیعی تقارب پرشی در گروه میگرنی نسبت به کنترل بیشتر بود. به منظور ارزیابی رابطه بین میگرن با متغیرهای مورد بررسی از آزمون رگرسیون لجستیک تک متغیره نیز استفاده شد (جدول شماره ۲).

از بین متغیرهای تحت بررسی تنها استریوپسیس ($P < 0.01$)، تقارب فیوژنی مثبت در نزدیک ($P < 0.01$) و تقارب فیوژنی مثبت در دور ($P < 0.01$) اختلاف معنی داری در دو گروه کنترل و میگرن داشته ولی سایر

کافی فیلترهای قرمز و سبز روی کارکشن فرد قرار داده شده و کتابچه‌ی تست را در فاصله ۴۰ سانتی‌متری از بیمار به گونه‌ای قرار داده که محور بینایی بر صفحه تست عمود باشد. حداقل دیسپاریتی تشخیص داده شده از روی دفترچه راهنمای تست تعیین و بر حسب ثانیه برآرک ثبت شد. ذخایر فیوژنی با پریزم بار ابتدا در دور و سپس در نزدیک تعیین شدند. به این ترتیب که فرد به یک ردیف عمودی ۲۰/۳۰ چارت اسلن کوچک شده در فاصله ۴۰ سانتی‌متر و یک ردیف عمودی از خط ۲۰/۳۰ چارت اسلن دور در فاصله ۶ متری نگاه می‌کند. در حالی که بهترین کارکشن روی چشم قرار دارد ابتدا پریزم را به صورت قاعده به داخل (ذخیره فیوژنی منفی) مقابل چشم قرار داده و با افزایش قدرت پریزم، فرد ابتدا شسی را صورت واضح و یکی می‌بیند از فرد خواسته می‌شود با افزایش قدرت پریزم سعی کند تارگت را واضح بیند و هر گونه تاری را گزارش کند. تاری که بیشتر از ۲ ثانیه طول بکشد، ثبت می‌شود. سپس قدرت پریزم را افزایش داده و از فرد خواسته می‌شود که سعی کند تارگت را واحد نگاه دارد و وقتی تارگت دو تا به نظر رسید را گزارش کند اولین نقطه‌ای که دویینی ثابت (بیشتر از ۵ ثانیه) رخ داد به عنوان نقطه دویینی ثبت می‌شود و بعد از گزارش دویینی ثابت، قدرت پریزم را به آرامی و مرحله به مرحله کاهش می‌دهیم تا جایی که فرد دوباره یکی شدن اما نه لزوماً وضوح تارگت را گزارش کند که این نقطه بازگشت مجدد دید واحد دو چشمی نامیده می‌شود. برای تعیین ذخایر فیوژنی مثبت با منشور قاعده به خارج مراحل بالا را انجام و مقادیر بدست آمده را ثبت می‌کنیم در دور با منشور قاعده به داخل نباید فرد تاری را گزارش کند (۱۸). لازم به ذکر است که در تمامی مراحل انجام آزمایشات روشنایی اتفاق باید استاندارد و کارکشن فرد روی صورت او قرار داشته باشد. اطلاعات فوق مربوط به هر بیمار در فرم اطلاعاتی خاصی ثبت شد و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های من ویتنی و رگرسیون لجستیک تک متغیره و چندگانه تحلیل شدند.

جدول شماره ۱: بررسی میزان متغیرهای دوچشمی در گروه مورد و شاهد

متغیر	گروهها		P-value
	گروه شاهد	گروه مورد	
انحراف دور	-۰/۸۷±۱/۶۵	-۱/۴۷±۴/۳۹	P>۰/۰۵
انحراف نزدیک	-۶/۵±۲/۸۵	-۸/۳±۶/۷۲	P<۰/۰۵
استریوپسیس	۴۹/۰±۲۶/۱۱	۱۵۴/۱۷±۳۳/۸۲	P<۰/۰۱
نقشه نزدیک تقارب	۸/۸۳±۲/۹۸	۱۰/۱۰±۴/۸۴	P>۰/۰۵
تقارب فیوژنی منفی دور	۱۰/۷±۲/۷۶	۶/۰۷±۵/۰۷	P<۰/۰۵
تقارب فیوژنی منفی مشبت دور	۱۸/۲±۴/۷	۱۱/۰±۷/۳۷	P<۰/۰۱
تقارب فیوژنی منفی نزدیک	۱۶/۵±۴/۴۹	۱۳/۹۷±۸/۷۲	P<۰/۰۵
تقارب فیوژنی منفی مشبت نزدیک	۲۲/۷±۵/۲۲	۱۴/۶۷±۹/۲۵	P<۰/۰۱

گروه مورد: افراد مبتلا به سردرد میگرنی گروه شاهد: افراد بدون سابقه سردرد میگرنی
داده ها بر اساس "انحراف معیار \pm میانگین" می باشد.

فاکتورهای چشمی که در ایجاد میگرن نقش بسزایی داشته و به منظور حذف متغیرهای مخدوش کننده از آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه نیز استفاده شد (جدول شماره ۴).

متغیرها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند ($P>0/05$). افزایش در مقدار استریوپسیس و کاهش در مقدار تقارب فیوژنی مشبت نزدیک و تقارب فیوژنی مشبت دور شانس ابتداء به میگرن را افزایش می دهند (جدول شماره ۳). به منظور تعیین مهمترین

جدول شماره ۲: بررسی میزان تقارب پرشی در گروه مورد و شاهد

گروه	تقارب پرشی					نرمال
	عدم تقارب	تاخیر تقاربی	حركت ورزشی	تقارب بیش از حد	نرمال	
گروه مورد	۱۱	۱	۴	۱۲	۲	
گروه شاهد	۱۸	۱	۳	۵	۳	
کل	۲۹	۲	۷	۱۷	۵	

گروه مورد: افراد مبتلا به سردرد میگرنی گروه شاهد: افراد بدون سابقه سردرد میگرنی
بین دو گروه از نظر تقارب پرشی اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید ($P<0/01$).

افراد میگرنی از گروه کنترل داشتند و در مدل باقی ماندند. شانس داشتن میگرن در کسانی که تقارب پرشی غیر طبیعی داشتند تقریباً ۲ برابر کسانی

بعد از حذف متغیرهای مخدوش کننده تنها تقارب پرشی، تقارب فیوژنی مشبت در دور و تقارب فیوژنی مشبت در نزدیک ($P<0/01$) ارزش تشخیصی افتراقی

جدول شماره ۳: رابطه میگرن با متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون لجستیک تک متغیره همراه با ضرایب برآورده شده

متغیر	شاخص های آماری			
	ضریب رگرسیونی	نسبت شانس (OR)	نسبت شانس برای نسبت شانس ۹۵٪ دامنه اطمینان	P مقدار
استریوپسیس (ثانیه بر آرک)	۰/۰۱۹	۱/۲	۱/۰۱-۱/۰۴	P>۰/۰۵
نقطه نزدیک تقارب (سانتی متر)	۰/۰۷۶	۱/۰۸	۰/۹۴-۱/۲۴	P>۰/۰۵
انحراف نزدیک (پریزم دیوپتر)	-۰/۰۷	۰/۹۳	۰/۸۳-۱/۰۳	P>۰/۰۵
انحراف دور (پریزم دیوپتر)	-۰/۰۶	۰/۹۴	۰/۷۹-۱/۱۱	P>۰/۰۵
تقارب فیوژنی مثبت نزدیک (پریزم دیوپتر)	۰/۱۳	۰/۸۷	۰/۸-۰/۹۵	P<۰/۰۱
تقارب فیوژنی منفی نزدیک (پریزم دیوپتر)	-۰/۰۶	۰/۹۴	۰/۸۷-۱/۰۲	P>۰/۰۵
تقارب فیوژنی مثبت دور (پریزم دیوپتر)	-۰/۱۷	۰/۸۴	۰/۷۵-۰/۹۳	P<۰/۰۵
تقارب فیوژنی منفی دور (پریزم دیوپتر)	-۰/۱۲	۰/۸۸	۰/۷۶-۱/۰۱	P>۰/۰۵

در تقارب فیوژنی مثبت در نزدیک ۱۳ درصد از شانس ابتلا به میگرن کاسته می شود (جدول شماره ۴).

است که تقارب پرشی آنها طبیعی بود. همچنین به ازای یک پریزم دیوپتر افزایش در تقارب فیوژنی مثبت در دور ۱۷ درصد و به ازای یک پریزم دیوپتر افزایش

جدول شماره ۴: بررسی رابطه میگرن با متغیرهای مورد بررسی در یک مدل رگرسیون لجستیک چند گانه

متغیر	شاخص های آماری			
	ضریب رگرسیونی	نسبت شانس (OR)	دامنه اطمینان ۹۵٪ برای نسبت شانس	P مقدار
طبیعی	-	۱	-	-
تقارب پرشی	۰/۷۱	۲/۰۴	۱/۱۴-۳/۶۵	P<۰/۰۵
غیر طبیعی	-۰/۱۸	۰/۸۳	۰/۷۳-۰/۹۷	P<۰/۰۱
تقارب فیوژنی مثبت در دور	-۰/۱۳	۰/۸۷	۰/۷۸-۰/۹۶	P<۰/۰۱
تقارب فیوژنی مثبت در نزدیک	-	-	-	- مقادیر پایه

بحث:

شاهد از نظر آماری معنی دار نبود. در رگرسیون لجستیک چند گانه فقط تقارب پرشی، تقارب فیوژنی مثبت در دور و تقارب فیوژنی مثبت در نزدیک در مدل باقی ماند.

متوسط انحراف افقی نزدیک در گروه کنترل و میگرن به ترتیب ۶/۵ و ۸/۳ پریزم دیوپتر اگزوفوریا بوده

به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین هتروفوریای نزدیک، استریوپسیس، وضعیت تقارب پرشی و ذخایر فیوژنی مثبت و منفی در دور و نزدیک در گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری از نظر آماری داشت و تفاوت مشاهده شده بین میانگین انحراف دور و نقطه نزدیک تقارب در دو گروه مورد و

معنی داری بین تقارب فیوژنی منفی در دور در دو گروه به دست آمده که با نتایج مطالعه‌ی ما مطابقت داشته ولی در نزدیک تفاوت معنی داری به دست نیاورده است که با نتایج ما مغایرت دارد.

تقارب فیوژنی مثبت نزدیک در گروه کنترل و میگرن به ترتیب ۲۲/۷ و ۱۴/۶۷ پریزم دیوپتر بوده و این مقادیر برای فاصله‌ی دور ۱۸/۲ و ۱۱ پریزم دیوپتر بوده که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری در دو گروه داشته است که با نتایج Harle و Evans (۱۷) مغایرت دارد.

نتیجه گیری:

به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که در افراد میگرنی اختلالات جزئی در دید دو چشمی در مقایسه با افراد گروه کنترل وجود داشته که می‌تواند باعث افزایش خطر غیر جبرانی شدن هتروفویریا و کاهش استریوپسیس شود. در این مطالعه وضعیت تقارب پرشی در دو گروه کنترل و میگرن تفاوت معنی داری داشته و موارد غیر طبیعی تقارب پرشی (حرکت ورژنی، تقارب بیش از حد، تاخیر تقاری و عدم تقارب چشم) به طور شایع تری در گروه مبتلا به میگرن دیده می‌شود، ولی در مطالعات قبلی این متغیر بررسی نشده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی لازم است به طور منظم جهت ارزیابی وضعیت دید دو چشمی به اپتومتریست یا چشم پزشک مراجعه کنند.

لازم به ذکر است در مطالعاتی که در آینده صورت می‌گیرد بهتر است متغیرهای بینایی بیشتری از جمله ارزیابی وضعیت میدان بینایی، حساسیت به نور یا خیرگی، بررسی وضعیت سیستم تطبیقی و... در گروه میگرنی و کنترل مورد بررسی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی:

از تمامی افرادی که در انجام این مطالعه با ما همکاری کردند؛ صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.

که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت که با نتایج بررسی Harle و Evans (۱۷) و همکارانش (۱۵) مغایرت دارد. متوسط انحراف افقی دور در دو گروه کنترل و میگرن به ترتیب ۰/۸۷ و ۱/۴۷ پریزم دیوپتر اگزوفوریا بوده که تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نداشته که با نتایج Evans و همکارانش (۱۵) مطابقت دارد. Harle و Evans در اندازه گیری انحراف افقی دور با کاوتر تست تفاوت معنی داری در دو گروه به دست نیاورده اند (۱۷) که موید نتایج ماست، ولی در اندازه گیری انحراف افقی دور با استوانه‌ی مادوکس و مادوکس وینگ ارتباط معنی داری بین دو گروه به دست آورده‌اند که با نتایج مطالعه‌ی حال حاضر مغایرت دارد. چون مطالعه‌ی (۹) و Waters (۱۰) فاقد گروه کنترل بوده، ارزش مقایسه‌ای چندانی ندارد.

متوسط استریوپسیس در گروه میگرن و کنترل به ترتیب ۱۵۴/۱۷ و ۴۹ ثانیه بر آرک بوده که تفاوت معنی داری از لحاظ آماری داشته است که با مطالعه‌ی Harle و Evans (۱۷) مطابقت دارد، ولی با نتایج مطالعه‌ی Evans و همکارانش (۱۵) مغایرت دارد.

میانگین نقطه‌ی نزدیک تقارب در گروه کنترل و میگرن به ترتیب ۸/۸۳ و ۱۰/۱۰ سانتی متر بوده که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشته است که با نتایج Harle و همکارانش (۱۵) مطابقت دارد. Evans و Evans (۱۷) متوسط نقطه‌ی نزدیک تقارب را در گروه میگرن ۵/۱۲ و در گروه کنترل ۴/۸۸ گزارش کرده‌اند که تفاوت معنی داری در دو گروه وجود نداشته که با نتایج مطالعه‌ی ما مطابقت داشته، هر چند که مقادیر نقطه‌ی نزدیک تقارب تا حدی با هم متفاوت است.

در این مطالعه میانگین تقارب نسبی منفی در نزدیک و دور در گروه میگرن و کنترل به ترتیب ۱۳/۹۷، ۱۶/۵ و ۱۰/۰۷ پریزم دیوپتر بوده که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه بدست آمده است، که با نتایج Harle و Evans (۱۷) مغایرت دارد. در مطالعه Evans و همکارانش (۱۵) ارتباط

منابع:

- 1.Jenkins TA, Pickwell LD, Yekta AA. Criteria for decomposition in binocular vision. *Ophthalmic Physiol Opt.* 1989; 9(2): 121-5.
- 2.Leone M, Filippini G, D'Amico D, Farinotti M, Bussone G. Assessment of International headache society diagnostic criteria: a reliability study. *Cephalgia.* 1994; 14(4): 280-4.
- 3.Goadsby PJ, Lipton RB, Ferrari MD. Migraine current understanding and treatment. *N Engl J Med.* 2002; 346(4): 257-70.
- 4.Linet MS, Stewart WF, Celentano DD, Ziegler D, Sprecher M. An epidemiolog study of headache among adolescent's and young adults. *JAMA.* 1989 Apr; 261(15): 2211-16.
- 5.Celebisoy N, Sirin H, Gokcay F. Ophthalmoplegic migraine: two patients, one at middle age with abducens palsy. *Cephalalgia.* 2005; 25(2): 151-3.
- 6.Nestoriuc Y, Martin A. Efficacy of biofeedback for migraine: a meta-analysis. *Pain.* 2007; 128(1-2): 111-27.
- 7.Wilkins AJ, Patel R, Adjaman P, Evans BJ. Tinted spectacles and visually sensitive migraine. *Cephalalgia.* 2002; 22: 711-19.
- 8.Friedman N. Migraine: fusional eye movement stress. *J Am Optom Assoc.* 1977; 48(10): 1281-9.
- 9.Biondi DM. Physical Treatments for Headache: a structured review. *J Head and Face Pain.* 2005; 45: 738-46.
- 10.Waters WE. Headache and the eye: a community study. *Lancet.* 1970; 2(7662): 1-4.
- 11.Harle DE, Wolffsohn J, Evans BJ. The papillary light reflex in migraine. *Ophthalmic Physiol Opt.* 2005; 25(3): 240-5.
- 12.Rouse MW, Borsting EJ, Mitchell GL, Scheiman M, Cotter SA, Cooper J; Validity and reliability of the revised convergence insufficiency symptom survey in adults. *Ophthalmic Physiol Opt.* 2004; 24(5): 384-90.
- 13.Karania R, Evans BJ. The Mallett fixation disparity test: influence of test instructions & relationship with symptoms. *Ophthalmic Physiol Opt.* 2006; 26(5): 507-22.
- 14.Sheedy JE, Hayes JN, Engle J. Is all asthenopia the same? *Optom Vis Sci.* 2003; 80(11): 732-9.
- 15.Evans BJ, Patel R, Wilkins AJ. Optometric function in visually sensitive migraine before and after treatment with tinted spectacles. *Ophthal Physiol Opt.* 2002; 22(2): 130-42.
- 16.Harle DE, Evans BJ. The correlation between migraine headache and refractive errors. *Optom Vis Sci.* 2006; 83(2): 82-7.
- 17.Harle DE, Evans BJ. Subtle binocular vision anomalies in migraine. *Ophthal Physiol Opt.* 2006; 26(6): 587-96.
- 18.Griffin JR, Grisham JD, Ciuffreda KJ. Binocular anomalies: diagnosis and vision therapy. 4th ed. Boston: Butterworth-Heinemann; 2002. p: 44-9.

Medical Sciences

Accepted: 12/Oct/2009

Received: 17/May/2009

The investigation of relationship between binocular vision status and migraine headaches

Momeni-Moghadam H (MSc)^{*1}, Ansari H (MSc)^{**}, Ostadi-Moghaddam H (PhD)^{***}, Nemati HA (MD)[†], Ehsani M (BSc)^{††}, Masrur S (BSc)^{††}

**Lecturer, Optometry Dept., Zahedan Univ. of Med. Sci. Zahedan, Iran,*

***Lecturer, Epidemiology Dept., Zahedan Univ. of Med. Sci. Zahedan, Iran,*

****Associated professor, Optometry Dept., Mashhad Univ. of Med. Sci. Mashhad, Iran, †Associated professor, Neurology Dept., Mashhad Univ. of Med. Sci. Mashhad, Iran, ††Optometry, Zahedan Univ. Med. Sci. Zahedan, Iran.*

Background and aim: According to controversial results between migraine headaches and binocular vision anomalies, this study was designed to investigate the relationship between some parameters of binocular vision refractive errors and migraine headache.

Methods: In this case-control study, 30 patients with neurologically diagnosed migraine who had inclusion criteria were selected as case group and 30 persons with no migraine headache were selected as control group. First, patients were screened by standard headache questionnaire and diagnosis refined by neurologist. The Refractive errors were determined by retinoscopy and were corrected. Then near point of convergence, jump convergence, stereopsis, fusional reserves and far and near deviation were determined. Data were analyzed by SPSS.15 software, using Man-Withney U test and multiple logistic regressions.

Results: The mean of near phoria, stereopsis, far positive fusional reserve, far negative fusional reserve, near positive fusional reserve, near negative fusional reserve in case and control groups were 6.5 ± 2.85 , 8.3 ± 6.72 pd, 49.0 ± 26.11 , 154.17 ± 333.82 sec/arc, 10.7 ± 2.76 , 6.07 ± 5.07 , 18.2 ± 4.7 , 11.0 ± 7.37 , 16.5 ± 4.49 , 13.97 ± 8.72 , 22.7 ± 5.22 and 14.67 ± 9.25 pd, respectively. The means of above parameters and jump convergence was significantly different between two groups ($P < 0.05$). However; no significant difference was observed between two groups for other variables ($P > 0.05$). In multiple logistic regression only jump convergence, far positive fusional reserve and near positive fusional reserve stayed in model ($P < 0.05$).

Conclusions: This study showed higher rates of binocular vision anomalies (abnormal jump convergence, higher amounts of near deviation, abnormal positive and negative fusional convergence and reduced stereopsis) in migraine group than control. Hence, people who experience migraine headaches should be referred to their optometrist regularly to evaluate their binocular vision statuses.

Keywords Binocular vision anomalies. Headache. Migraine.