

اثر ایزوترینوئین بر میزان لیپید و فعالیت گاما گلوتامیل ترانس پیتیداز سرم در بیماران مبتلا به آکنه و لگاریس

دکتر حسن احمدوند^{*}، دکتر امیر مجdal الدین امیر جوانبخت^آ، دکتر حسین مطوریان پور^۲

^۱ گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران؛ ^۲ گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.

تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۵ تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۱/۱۸ تاریخ اصلاح نهایی: ۹۱/۱۱/۲۱

چکیده:

زمینه و هدف: داروی ایزوترینوئین یک داروی معمول در درمان آکنه و لگاریس است. در این مطالعه اثر داروی ایزوترینوئین بر میزان لیپیدهای سرم و آنزیم های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به آکنه و لگاریس مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، از بین بیماران مراجعه کننده به پزشک متخصص پوست، ۴۴ بیمار مبتلا به آکنه متوسط و شدید با میانگین سنی $\pm ۲۳/۶$ سال که با درمان های معمول بهبود نیافته بودند به روش در دسترس انتخاب شدند و به آنها روزانه $۰/۵$ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدنشان داروی ایزوترینوئین به مدت ۱۲۰ روز تجویز شد. میزان قند خون ناشتا، کلسترول، تری گلیسرید و فعالیت آنزیم های آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز و گاما گلوتامیل پیتیداز در قبل و بعد از درمان با کیت های تجاری موجود اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی زوجی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: این مطالعه نشان داد که بعد از درمان بیماران به مدت ۱۲۰ روز با ایزوترینوئین سطح سرمی کلسترول $۱۲/۰۲\%$ ($P=0/001$)، تری گلیسرید $۵۷/۹\%$ ($P=0/001$) و گاما گلوتامیل ترانس پیتیداز $۳۳/۵۵\%$ ($P=0/001$) افزایش یافته است.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه ایزوترینوئین اثرات منفی روی وضعیت لیپیدی و آنتی اکسیدانی روی بیماران مبتلا به آکنه که از این دارو استفاده می کنند دارد. لذا توصیه می شود در مطالعات آتی هم زمان با مصرف ایزوترینوئین مصرف آنتی کسیدان هایی مانند ویتامین E در بیماران مورد ارزیابی قرار گیرد.

واژه های کلیدی: آکنه و لگاریس، ایزوترینوئین، لیپید سرم، گاما گلوتامیل ترانس پیتیداز.

مقدمه:

گسترش و تشدید آکنه موثرند (۴،۳). درمان آکنه و لگاریس در طول سال ها تغییر کرده است. داروهایی حاوی گروه های رزورسینول و گوگرد در اوایل قرن ۲۰ استفاده می شد. همچنین از سالیسیلیک اسید و رتینوئیدها در درمان آکنه استفاده شده است (۵،۱).

داروی ایزوترینوئین یک رتینوئید سیستمیک است که برای استفاده در درمان آکنه و لگاریس در سال ۱۹۸۲ تأیید شده است. شاید بتوان گفت این دارو موثرترین داروی موجود در درمان آکنه است. به طوری که باعث برطرف شدن ۸۵ درصد ضایعات در افراد مبتلا به آکنه می شود (۶). مطالعات نشان داده اند که تجویز

آکنه و لگاریس یک بیماری مزمن و التهابی غدد سبابه است و علایم بالینی از قبیل نقاط سیاه رنگ، پاپول و ندول در مناطق سبوره ای مانند صورت، قفسه سینه و پشت ظاهر می شود (۱) و مشکلات روانی شدیدی در بسیاری از بیماران مبتلا به آکنه و لگاریس بوجود می آید (۲). مکانیسم دقیق ایجاد آکنه به طور کامل مشخص نشده است، با این حال تولید بیش از حد سبوم، کراتینه شدن بیش از فولیکولی، التهاب و استرس اکسیداتیو به عنوان عوامل شناخته شده ای است که در بیماران مبتلا به آکنه و لگاریس مشاهده می شود. از طرفی آندرورژن ها، عوامل میکروبی و پاتوژن ها نیز در

روش بررسی:

این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی می باشد که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأیید و تصویب شده است و با کد IRCT2012103011316N1 در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران به ثبت رسیده است. در این مطالعه ۴۴ بیمار (۲۰ مرد و ۲۴ زن)، با آکنه متوسط و آکنه شدید مقاوم به درمان معمول به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مدت ۱۲۰ روز روزانه ۰/۵ میلی گرم ایزوترینوئین به ازاء هر کیلو گرم وزن به صورت خوراکی دریافت نمودند. بیماران از مصرف داروهای دیگر منع و از نظر رژیم غذایی آموزش های لازم را دریافت کردند که از تمام افراد برای شرکت در مطالعه رضایت نامه آگاهانه گرفته شد. از بیماران قبل از شروع درمان و بعد از درمان چهار ماهه، بعد از یک شب ناشتابی، در ساعات ۸ الی ۱۰ صبح نمونه خون وریدی گرفته شد و نمونه ها بعد از فاصله زمانی ۰/۵ تا یک ساعت بلا فاصله در دور ۲۰۰۰ در دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم آن ها جدا و در ۷۰- درجه سانتیگراد جهت انجام آزمایش ها نگهداری شد. میزان قند خون ناشتابه، کلسترول، تری گلیسرید و فعالیت میکروگلوبالتیک (GGT) میتواند از شروع درمان و بعد از درمان چهار ماهه با استفاده از کیت تجاری پارس آزمون و روش اتوماتیک اتو آنالایزر (Olympus AU-600, Tokyo, Japan) اندازه گیری شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و تست T زوجی ارزیابی و با هم مقایسه شدند و $P<0.05$ از نظر آماری معنی دار تلقی شد.

یافته ها:

در این مطالعه بیماران دارای مشخصاتی از قبیل سن $49 \pm 4/23$ سال، وزن $12/15 \pm 82/64$ کیلو گرم، قد $14/167 \pm 9/96$ سانتیمتر و اندیس جرم بدن $11/2 \pm 0/22$ کیلو گرم بر متر مربع بودند. میزان کلسترول بعد از درمان نسبت به قبل از

این دارو در بیماران مبتلا به آکنه شدید کیستیک بر تولید و ترکیب سوم در غدد چربی موثر است (۷،۶). هر چند مکانیسم دقیق عمل ایزوترینوئین هنوز ناشناخته است، با قطع مصرف دارو، عوارض دوباره بروز پیدا می کنند. داروی ایزوترینوئین دارای عوارض جانبی ناشناخته ای است و ضرورت دارد در درجه اول تا حد امکان عوارض جانبی آن شناسایی شود و یا اینکه با راهکارهای مناسب با استفاده از درمان های مکمل عوارض جانبی دارو را کاهش داد (۶).

با توجه به اینکه استرس اکسیداتیو ممکن است یکی از عوارض جانبی مصرف ایزوترینوئین باشد و اینکه استرس اکسیداتیو در ایجاد اختلالات لیپیدی و تغییر فعالیت گاما گلوتامیل ترانس پتیداز (GGT) موثر است (۸،۷)، بررسی اثر مصرف ایزوترینوئین بر پروفایل لیپیدی و فعالیت GGT در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس حائز اهمیت است. افزایش کلسترول خون یک عامل حطرزا برای توسعه بسیاری از بیماری ها از جمله آترواسکلروز، انفارکتوس میوکارد و حملات قلبی است (۹-۱۱). درمان با رژیم غذایی و یا تجویز دارو کاهش سطح سرمی لیپوپروتئین با چگالی کم یا کلسترول در بیماران مبتلا به هیپر کلسترولمی منجر به کاهش بروز بیماری عروق کرونر قلب خواهد شد (۱۲،۱۳). از طرفی مطالعات اخیر نشان داده است سرم GGT به عنوان یکی از مارکرهای استرس اکسیداتیو می باشد (۱۴). بنابراین بررسی عواملی مانند برخی داروهای استرس اکسیداتیو و التهاب که می توانند در متابولیسم چربی اختلال ایجاد کنند و زمینه ابتلا به تصلب شرائین را افزایش دهند، از جمله مطالعات مورد علاقه محققین است (۱۵،۱۶).

با توجه به اینکه مطالعه ای در ارتباط با اثر ایزوترینوئین بر پروفایل لیپیدی و فعالیت GGT در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس انجام نشده است، هدف انجام این مطالعه، بررسی ایزوترینوئین بر پروفایل لیپیدی و فعالیت GGT سرم در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس بود.

در صد افزایش یافته است که این افزایش نسبت به قبل از درمان معنی دار بوده است ($P=0.001$). در صورتی که تغییرات میزان قند خون ناشتا، فعالیت آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات ترانس آمیناز بعد از درمان، نسبت به قبل از درمان معنی دار نبود (جدول شماره ۱).

در صد افزایش یافت که این افزایش نسبت به قبل از درمان معنی دار بود ($P=0.001$). میزان تری گلیسرید بعد از درمان نسبت به قبل از درمان $36/67$ در صد افزایش یافت که نسبت به قبل از درمان معنی دار بود ($P=0.001$). همچنین نتایج نشان داد که فعالیت گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز در بعد از درمان $25/12$

جدول شماره ۱: میزان فاکتورهای بیوشیمیابی سرم بیماران قبل از شروع درمان و بعد از درمان چهار ماهه

پارامتر	قبل از درمان	بعد از درمان	ارزش معنی دار بودن (P)
قند خون ناشتا (میلی گرم بر دسی لیتر)	$89/95 \pm 15/67$	$92/23 \pm 12/89$	$0/295$
کلسترول (میلی گرم بر دسی لیتر)	$156/23 \pm 32/43$	$175/02 \pm 32/44$	$0/001^*$
تری گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر)	$96/26 \pm 28/13$	$152/00 \pm 89/62$	$0/001^*$
آلانین ترانس آمیناز (واحد بین المللی بر لیتر)	$19/41 \pm 8/98$	$22/23 \pm 13/69$	$0/135$
آسپارتات ترانس آمیناز (واحد بین المللی بر لیتر)	$20/67 \pm 12/23$	$23/81 \pm 10/57$	$0/206$
گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز (واحد بین المللی بر لیتر)	$13/44 \pm 7/25$	$17/95 \pm 6/94$	$0/001^*$

داده ها به صورت "میانگین \pm انحراف معیار" بیان شده اند؛ ** اختلاف معنی دار در سطح <0.05 P می باشد.

بحث:

داد ایزووترتینوئین در بیماران مبتلا به آکنه و لگاریس باعث افزایش فعالیت GGT می شود. در صورتی که تغییری در میزان قند خون ناشتا، فعالیت ALT و AST بعد از درمان نسبت به قبل از درمان ایجاد نمی کند. مطالعه ای در ارتباط با اثر ایزووترتینوئین بر روی لیپید انجام نشده است، ولی در برخی مطالعات گزارش شده است که ایزووترتینوئین پارامترهای خونی در بیماران مبتلا به آکنه و لگاریس را کاهش می دهد (۱۹، ۲۰). با توجه به داده های بدست آمده، می توان نتیجه گرفت که تغییرات سیستمیک در میزان چربی سرم و فعالیت GGT، در سطح سلولی، ممکن است در اثر القاء ناشی از ایزووترتینوئین و ایجاد تغییرات در غشاء سلول و متابولیسم باشد و در نتیجه در درمان طولانی مدت باعث ایجاد اختلالات متابولیک در بیماران شود. همچنین اختلالات متابولیک بوجود آمده و تغییر در میزان چربی سرم و فعالیت GGT ممکن است مربوط به استرس اکسیداتیو باشد. به علاوه بیمارانی که مدت

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که ایزووترتینوئین باعث افزایش معنی دار کلسترول، تری گلیسرید و فعالیت گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز می شود. مکانیسم های دقیق عمل ایزووترتینوئین در افزایش کلسترول و تری گلیسرید هنوز ناشناخته است. ممکن است که ایزووترتینوئین در تعامل با برخی از گروه های ضروری در جایگاه فعال پروتئین های مهم و یا آنزیم هایی که در متابولیسم چربی مانند هیدروکسی متیل گلوتاریل ردوکتاز که یک آنزیم کلیدی و تنظیمی در متابولیسم کلسترول است باشد (۱۶، ۱۵). همچنین مکانیسم های دقیق عمل ایزووترتینوئین در افزایش فعالیت GGT هنوز ناشناخته است. ممکن است از طریق افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن باعث القای آنزیم گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز شود (۱۷). همچنین ایزووترتینوئین مشابه مواد زنوبیوتیک (xenobiotic) و دیگر داروها ممکن است باعث افزایش خطر ایجاد مشکلات کبدی شود (۱۸، ۱۷). همانطور که نتایج نشان

لیپیدهای سرم و آنزیم GGT می شود و بنابراین لازم است با احتیاط بیشتر مصرف شود.

تشکر و قدردانی:

بدینوسیله نویسندها این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خاطر تصویر و تأمین اعتبار و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام این پروژه تحقیقاتی اعلام می نمایند.

طولانی از داروی ایزوتربینوئین استفاده می کنند ممکن است دچار مشکلات کبدی شوند (۲۱، ۲۲). این عارضه در مورد بسیاری از مواد اکسیدانتیو اتفاق می افتد (۲۳، ۲۴) و مواد آنتی اکسیدان این عارضه را رفع می کند (۲۵-۲۸).

نتیجه گیری:

صرف ایزوتربینوئین ساعت افزایش میزان

منابع:

- Piskin S, Uzunali E. A review of the use of adapalene for the treatment of acne vulgaris. Ther Clin Risk Manag. 2007; 3(4): 621-4.
- Rubin MG, Kim K, Logan AC. Acne vulgaris, mental health and omega-3 fatty acids: a report of cases. Lipids Health Dis. 2008; 13(7): 36.
- Thiboutot DM. Overview of acne and its treatment. Cutis. 2008; 81(Suppl 1): 3-7.
- Adityan B, Thappa DM. Profile of acne vulgaris-A hospital-based study from South India. Indian J Dermatol Venereal leprol. 2009; 75(3): 272-8.
- Amichai B, Avner Shemer A, Grunwald MH. Low-dose isotretinoin in the treatment of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2006; 54(4): 644-6.
- Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, Dréno B, Kang S, Leyden JJ, et al. New insights into the management of acne: an update from the global alliance to improve outcomes in Acne group. J Am Acad Dermatol. 2009; 60(Suppl 5): S1-50.
- Kawashima M, Harada S, Loesche C, Miyachi Y. Adapalene gel 0.1% is effective and safe for Japanese patients with acne vulgaris: A randomized, multicenter, investigator-blinded, controlled study. J Dermatol Sci. 2008; 49(3): 241-8.
- Arican O, Kurutas EB, Sasmaz S. Oxidative stress in patients with Acne Vulgaris. Mediators Inflamm. 2005; 14(6): 380-4.
- Leopold A, Loscalzo J. Oxidative risk for atherothrombotic cardiovascular disease. Free Radic Biol Med. 2009; 47(12): 1673-1706.
- Pesic S, Radenkovic M, Grbovic L. Endothelial dysfunction: mechanisms of development and therapeutic options. Med Pregl. 2006; 59(7-8): 335-41.
- Ahmadvand H, Ani M, Moshtaghe AA. Changes in biochemical parameters related to lipid metabolism following titanium treatment in rat. Iran J Pharm Therap. 2010; 9(2): 69-71.
- Ani M, Moshtaghe AA, Ahmadvand H. Changes in liver contents of lipid fractions following titanium exposure. Iran J Pharmaceut Res. 2008; 7(3): 179-83.
- Berlin JA, Colditz GA. A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart disease. Am J Epidemiol. 1990; 132(4): 612-28.

14. Ceyssens B, Pauwels M, Meulemans B, Verbeelen D, Van den Branden C. Increased oxidative stress in the mouse Adriamycin model of glomerulosclerosis is accompanied by deposition of ferric iron and altered GGT activity in renal cortex. *Ren Fail.* 2004; 26(1): 21-7.
15. Heidarian E, Soofiniya Y, Hajihosseini R. The effect of aerial part of *Cynara scolymus* extract on the hyperlipidemia, plasma antioxidant capacity, and super oxide dismutase activity in diabetic rats. *J Shahrekord Univ Med Sci.* 2011 Dec, Jan; 13(5): 1-10.
16. Pushpavalli G, Veeramani C, Pugalendi KV. Influence of chrysin on hepatic marker enzymes and lipid profile against D-galactosamine-induced hepatotoxicity rats. *Food Chem Toxicol.* 2010; 48(6): 1654-9.
17. Holt M, Ju C. Drug-induced liver injury. *Handb Exp Pharmacol.* 2010; 196(): 3-27.
18. Davoodi M, Moosavi H, Nikbakht M. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. *J Shahrekord Univ Med Sci.* 2012 Apr, May; 14(1): 84-90.
19. Moeller KE, Touma SC. Prolonged thrombocytopenia associated with isotretinoin. *Ann Pharmacother.* 2003; 37(11): 1622-4.
20. Johnson TM, Rapini RP. Isotretinoin-induced thrombocytopenia. *J Am Acad Dermatol.* 1987; 17: 838-9.
21. Cho HC. The association between serum GGT concentration and diabetic peripheral polyneuropathy in type 2 diabetic patients. *Korean Diabetes J.* 2010; 34(2): 111-8.
22. Yolaç Yarpuz A, Demirci Saadet E, Erdi Sanlı H, Devrimci Ozgüven H. Social anxiety level in acne vulgaris patients and its relationship to clinical variables. *Turk Psikiyatri Derg.* 2008; 19(1): 29-37.
23. Taghikhani A, Ansarisamani R, Afrogh H, Shahinfard N, Ganji F, Asgari A, et al . The hepatotoxic and nephrotoxic effects of *Stachys lavandulifolia* Vahl in rat. *J Mazandaran Univ Med Sci.* 2012; 22(88): 84-90.
24. Namjoo A, Nasri H, Talebi-Juneghani A, Baradaran A, Rafieian-Kopaei M. Safety Profile of *Carthamus Tinctorius* L. in Lactation: Brain, Renal and Hepatotoxicity. *Pak J Med Sci.* 2013; 29(1): 378-83.
25. Asgary S, Kazemi S, Moshtaghian SJ, Rafieian M, Bahrami M, Adelnia A. The protective effect of *Cucurbita pepo* L. on liver damage in alloxan- induced diabetic rats. *Shahrekord Univ Med Sci J.* 2010; 11(Suppl 1): 59-65.
26. Kazemi S, Asgary S, Moshtaghian J, Rafieian-Kopaei M, Adelnia A, Shamsi F. Liver – protective effects of hydroalcoholic extract of *Allium hirtifolium* Boiss in rats with alloxan-induced diabetes mellitus Arya Atherosclerosis. 2010; 6(1): 11-5.
27. Shamsi F, Asgari S, Rafieian R, Kazemi S. Effects of *Cornus mas* L. on blood glucose, insulin and histopathology of pancreas in alloxan-induced diabetic rats. *J Isfahan Med School* 2011; 29(147): 927-37.
28. Heidarian E, Rafieian-Kopaei M. Effect of silymarin on liver phosphatidate phosphohydrolase in hyperlipidemic rats. *Bioscience Research.* 2012; 9(2): 59-67.

Effects of oral isotretinoin on serum lipids and gamma glutamyl transpeptidase activity in acne vulgaris patients

Ahmadvand H (PhD)^{1*}, Amir-Javanbakht AM (MD)², Matoorian-Pour H (MD)²

¹Clinical Biochemistry Dept., Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, I.R. Iran;

²Dermatology Dept., Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, I.R. Iran.

Received: 26/Nov/2011 Revised: 6/Feb/2013 Accepted: 9/Feb/2013

Background and aims: Isotretinoin is a common drug in treatment of acne vulgaris. In the present study, the effect of isotretinoin on serum lipids and index hepatic enzymes in patients with acne vulgaris was examined.

Methods: In this clinical trial study, 44 patients with moderate to severe acne vulgaris with mean age of 23.6 ± 6.0 years referred to dermatologist and resistant to conventional treatment were enrolled according to availability method. The patients were administered with oral isotretinoin in 0.5 mg/kg/day dose for 120 days. Fasting blood glucose, cholesterol, triglyceride, and the activity of ALT, AST, and gamma glutamyl transpeptidase (GGT) were measured by commercially available kits prior to and after treatment. The obtained data were analyzed by software using paired t-test in SPSS software.

Results: This study indicated that serum level of cholesterol, triglyceride, and GGT increased by 12.02% ($P=0.001$), 57.9% ($P=0.001$) and 33.55% ($P=0.001$), respectively.

Conclusion: The results of the present study indicated that isotretinoin has negative effects on lipid and antioxidant status in patients with acne vulgaris consuming this drug. Therefore, it is recommended to examine the administration of some antioxidants like vitamin E alongside isotretinoin in patients in the future studies.

Keywords: Acne vulgaris, Isotretinoin, Serum lipid, Gamma glutamyl transpeptidase.

Cite this article as: Ahmadvand H, Amir-Javanbakht AM, Matoorian-Pour H. Effects of oral isotretinoin on serum lipids and gamma glutamyl transpeptidase activity in acne vulgaris patients.
J Shahrekord Univ Med Sci. 2013 Oct, Nov; 15(4): 1-6.

*Corresponding author:

Clinical Biochemistry Dept., Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, I.R. Iran.
Tel: 00989132267893, E-mail: hassan_a46@yahoo.com