

جراحی در سندرم توراسیک اوتلت: مقایسه دو روش جراحی بالای ترقوه و زیربغلی

* دکتر محمدعلی حسینیان، ** دکتر تورج سلیمی، *** دکتر یلدا سلیمانی فرد، **** دکتر کوروش شبیانی
«دانشگاه علوم پزشکی شهریه بهشتی»

خلاصه

پیش‌زمینه: درمان سیندرم توراسیک اوت لت به دو روش غیرجراحی و جراحی صورت می‌گیرد. در مواردی که درمان غیرجراحی موثر نباشد، استفاده از روش‌های جراحی ضرورت دارد. در این مطالعه دو روش جراحی بالای ترقوه (supraclavicular) و زیربغلی (transaxillary) (با یکدیگر مقایسه شدند).
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، تعداد ۶۹ بیمار مبتلا به سیندرم توراسیک اوت لت که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ تحت جراحی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در ۲۶ بیمار این سیندرم به صورت دوطرفه بود. ۳۶ مورد با روش بالای ترقوه برای بار اول، ۳۲ مورد با روش زیر بغلی برای بار اول و ۷ بیمار با روش بالای، ترقه برای، بار دوم جراحی شدند. عکس‌اض. حاچار به مدت ۲۴ ماه مسگک شدند.

یافته‌ها: عوارض بعد از عمل در دو گروه جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضایعاتی نظیر پنوموتوراکس، هموتوراکس، ضایعات عروقی در دو روش جراحی شیشه هم بدنده و لم. ضایعات موقت و دائم در شیشه باز و سد، دو و شش زیبغل، شیشه از دوش بالا، تقدیه بهد.

نتیجه‌گیری: روش جراحی بالای ترقوه به علت دید مستقیم جراح و دسترسی مناسب به محل فشردگی روی شبکه بازویی و به علت کاهش عدم موقت بعد از عمل، جراح، نسبت به روش زیر غلیظ ارجحیت دارد.

د. یافت مقاله: ۶ ماه قتا از حاب؛ ماحا اصلاح و بازنگ؛ ۳ باز؛ بذب ش. مقاله: ۱ ماه قتا از حاب

Surgery in Thoracic Outlet Syndrom:

Comparison of Supraclavicular and Transaxillary Approaches

*Mohammad Ali Hosseini, MD; **Tooraj Salimi, MD; ***Yalda Soleimanifard, MD; ****Kourosh Sheibani, MD

Abstract

Background: Thoracic outlet syndrome is treated using non-surgical or surgical approaches. Surgical treatment is necessary if non-surgical treatments fail. In this study we compared the supraclavicular and transaxillary approaches for surgery of the brachial plexus.

Methods: We, retrospectively, studied 69 patients undergoing surgery to treat thoracic outlet syndrome from 2001 to 2008. Twenty six patients had bilateral thoracic outlet syndrome. Sixty three cases were operated with supraclavicular approach for the first time, 32 cases were operated with transaxillary approach for the first time, and 7 cases were reoperated with supraclavicular approach. The complications were evaluated for 24 months.

Results: Pneumothorax, hemothorax, vessels injury in transaxillary and supraclavicular approach were the same but permanent and transient brachial plexus injury in transaxillary approach were more than supraclavicular approach.

Conclusion: SuprACLAVICULAR approach for surgical treatment of thoracic outlet syndrome provides better access to braxial plexus and there is less need for reoperation compared to transaxillary method.

Keywords: Thoracic outlet syndrome; Surgery; Complications

Received: 6 months before printing : Accepted: 1 month before printing

*Reconstructive Surgeon, Department of Reconstructive Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, IRAN.

**Resident of General Surgery, Department of General Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, IRAN.

***General Physician, Azad University of Medical Sciences, IRAN.

****Chief researcher, Clinical Research and Development Center, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, IRAN.

Corresponding author: Mohammad Ali Hosseini, MD
Emam Hossein Hospital, Nezamabad Street, Tehran, Iran.
E-mail: hosseini@ma@yahoo.com

مقدمه

سندرم توراسیک اوتلت^۱ در اثر فشردگی عروق و اعصاب در ناحیه گردن و بالای ترقوه ایجاد می‌شود.^(۱-۵) درمان بیماری به دو روش جراحی و غیرجراحی انجام می‌شود. بیشتر بیماران به درمان‌های غیرجراحی مثل دادن مسکن و آرامبخش‌ها، فیزیوتراپی، تغییر وضعیت بیمار، انجام ورزش‌های مناسب و تغییر شغل پاسخ می‌دهند و از نتیجه درمان‌های نگهدارنده راضی هستند. در مواردی که درمان‌های غیرجراحی نتواند باعث بهبود بیماران بشود، باید از روش‌های جراحی استفاده کرد، که مهمترین آنها برداشتن دندۀ گردنی و یا دندۀ اول، برداشتن اسکالن^۲، نورولیز شبکه بازویی و آزادسازی عروق ناحیه بالای ترقوه می‌باشد.^(۲,۵,۶)

در سال ۱۸۶۹ «کوت»^۳ روش جراحی دندۀ اول، و در سال ۱۹۲۷ «آدسون»^۴ و همکاران روش برداشتن اسکالن قدامی را شرح دادند.^(۷,۸) «کلاگت»^۵ شیوه برداشتن دندۀ اول از راه پشت را گزارش نمود^(۹) و «روز»^۶ در ۱۹۶۶ روش بالای ترقوه^۷ را برای برداشتن دندۀ اول شرح داد.^(۱۰) این روش به تدریج جایگزین روش‌های دیگر شد و به طور عموم مورد استفاده قرار گرفت.

در مورد عوارض ایجاد شده بعد از برداشتن دندۀ اول از راه زیربغلی^۸ گزارش‌های مختلفی شده است که به صورت کوزالژی، ضعف در عضلات دست، کاهش حس و اختلالات حرکتی و فلنج موقت و یا دائم اندام بالایی، پنوموتوراکس، هموتوراکس، شیلوتوراکس، عفونت و ضایعات عروقی که به صورت قطع کامل و یا پارشیال شریان و ورید زیر ترقوه می‌باشد.^(۱۱-۱۸) در سال ۱۹۶۷ «برانان»^۹ و «ویکاسترام»^{۱۰} روش بالای ترقوه تغییر یافته را معرفی کردند.^(۱۹) در این روش به علت دسترسی آسان

1. Thoracic Outlet Syndrom

2. Scalenotomy

3. Coope

4. Adson

5. Clagett

6. Roos

7. Supraclavicular

8. Transaxillary

9. Brannon

10. Wickstrom

جراح به شبکه بازویی، جراح قادر است که ناهنجاری‌های موجود و باعث فشردگی روی شبکه بازویی و یا عروق می‌شود را مشخص و اقدام به رفع عامل فشار دهنده نماید.^(۱۴,۱۵) از ناهنجاری‌هایی که می‌توانند عامل فشار روی عناصر حیاتی این ناحیه شوند، تغییر جهت دندۀ اول بخصوص در قسمت پروگریمال و پشت است که باعث فشار روی تنۀ‌های عصبی می‌شود و با برداشتن دندۀ از راه زیربغلی تشخیص و درمان آن تقریباً غیرممکن است. وجود باندهای فیروزه که از زایده مهره‌های گردنی منشاء گرفته و باعث فشار روی تنۀ‌های عصبی می‌شوند از دیگر مواردی هستند که ممکن است از راه زیربغلی قابل درمان نباشند. در روش بالای ترقوه امکان دسترسی به چربی ناحیه بالای ترقوه وجود دارد که می‌توان بعد از نورولیز شبکه بازویی، از آن به عنوان پوشش استفاده کرد که از چسبندگی بعدی روی شبکه جلوگیری نماید.^(۱۳)

از آنجا که روش‌های جراحی زیربغلی و بالای ترقوه دو روش متداول برای برداشتن دندۀ اول می‌باشند، لذا هدف از انجام این مطالعه، مقایسه نتایج دو روش جراحی بود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت گذشته‌نگر، برروی بیماران دچار سندرم توراسیک اوتلت که در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ تحت درمان قرار گرفته بودند، انجام شد.

بیماران با عالیم مختلفی از قبیل درد و بی‌حسی اندام بالایی یا بی‌حسی، آتروفی عضلات دست و کاهش قدرت دست، که با فعالیت تشدید می‌شد، مراجعه کردند. برای تمام بیماران الکترومیوگرافی، بررسی جریان اعصاب^{۱۱} و ام‌آرآی جهت بررسی دیسک گردنی انجام شد و پس از اطمینان از وجود عالیم مثبت فیزیکی و عدم وجود دیسک گردنی، اقدام به درمان غیرجراحی و جراحی گردید.

ابتدا تعداد ۴۸ نفر تحت درمان غیرجراحی قرار گرفتند و از این تعداد ۶۹ بیمار که به درمان غیرجراحی پاسخ ندادند و مایل به جراحی بودند، جراحی شدند. ۲۶ نفر سندرم توراسیک اوتلت دو طرفه داشتند. از این تعداد ۶۳ مورد (۴۸ زن با میانگین سنی ۳۸ سال

یافته‌ها

بین دو گروه عمل شده با روش بالای ترقوه و زیربغلی از نظر سن و جنس تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. در روش بالای ترقوه برای بار اول جراحی، از مجموع ۶۳ مورد، ۲۵ مورد (٪۳۶) دچار پنوموتوراکس شدند و ۳ مورد (٪۴) هموتوراکس داشتند که با گذاشتن chest tube به مدت ۴۸ ساعت درمان شدند. در ۲ مورد (٪۳) ضایعه عروقی وجود داشت که ۱ مورد پارگی ناقص ورید سابکلاوین و ۱ مورد قطع کامل شریان سابکلاوین بود که بدون هیچ عارضه‌ای ترمیم شدند (جدول ۲). دو مورد (٪۳) کوزالژی اطراف گردن داشتند که به تجویز داروهای آرامبخش اکفای شد و احتیاج به درمان خاصی نداشت. از مجموع ۳۲ بیمار که با روش زیربغلی جراحی شده بودند، ۱۱ مورد (٪۳۴) پنوموتوراکس و ۲ مورد (٪۶) هموتوراکس، و ۲ مورد (٪۶) هموتوراکس همراه با پنوموتوراکس وجود داشت که برای تمامی موارد chest tube به مدت ۴۸ ساعت گذاشته شد. در ۱ مورد (٪۳)، پارگی ورید سابکلاوین اتفاق افتاد که پس از ترمیم، هیچ ضایعه عروقی برای بیمار باقی نماند (جدول ۲). بین دو گروه درمان شده با روش زیربغلی و بالای ترقوه از نظر عوارض جراحی تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

در گروه درمان شده با روش زیربغلی، ۸ بیمار از درد و بی‌حسی و عدم بهبودی اظهار ناراحتی و نارضایتی کردند. در ۲ مورد عضلات ایتر اوستئوس و تنار کاملاً آتروفی شد و آتروفی عضلات پیشرونده بود و در ۱ مورد فلنج کامل به صورت دیده شد. از این تعداد ۷ بیمار بعد از ۶ ماه عدم بهبودی، تحت عمل جراحی ثانوی به روش بالای ترقوه قرار گرفتند.

و دامنه سنی ۱۳-۶۶، ۱۵ مرد با میانگین سنی ۳۱ سال و دامنه سنی ۱۸-۵۳ بهروش بالای ترقوه برای بار اول تحت عمل جراحی قرار گرفتند (گروه بالای ترقوه اولیه) میانگین کلی سن بیماران در این گروه ۳۷.۶±۱۲/۲ سال بود. سی و دو مورد (٪۲۸) زن با میانگین سنی ۳۶ سال و دامنه سنی ۱۹-۵۱، ۴ مرد با میانگین ۲۹ سال و دامنه سنی ۲۳-۳۵ برای بار اول با روش زیربغلی (گروه زیربغل اولیه) عمل جراحی شدند. میانگین کلی سن بیماران در این گروه ۳۲.۳±۱۴/۲ سال بود.

هفت بیمار (۶ زن، ۱ مرد) از گروه زیربغلی برای بار دوم به روش بالای ترقوه عمل شدند (گروه بالای ترقوه ثانوی). به طور کلی ۷۰ بیمار با روش بالای ترقوه عمل شدند و در مجموع ۱۰۲ مورد عمل جراحی انجام شد (جدول ۱).

جدول ۱. یافته‌های جمعیت‌شناسی دو گروه جراحی

جمع	دفعات عمل			
	بالای ترقوه		زیربغل (۳۲ نفر)	
	(بار اول: ۶۳ نفر)	(بار دوم: ۷ نفر)	سن	سن
۷۶	جنس	جنس	میانگین (دامنه)	میانگین (دامنه)
	(تعداد)	(تعداد)	(۱۳-۶۶)	(۱۹-۵۱)
۱۹	زن	زن	(۴۸)	(۲۸)
	مرد	مرد	(۱۵)	(۴)
۶	۳۱	۲۹	(۱۸-۵۳)	(۲۳-۳۵)
	-	-	(۶)	-
۱	۴۱	-	(۲۶-۶۶)	-
	مرد	-	(۱)	-
۱۰۲	۲۰	-	(۲۰-۲۰)	-
	۷۰	۳۲	-	-
عمل اولیه				
عمل ثانویه				
جمع کل				

بیماران عمل شده تا ۶ ماه، یک بار در ماه و سپس تا ۲۴ ماه، هر سه ماه یکبار به طور متناوب پیگیری شدند. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.

جدول ۲. عوارض بعد از عمل در دو گروه جراحی

نوع عمل	پنوموتوراکس	هموتوراکس	هموتوراکس همراه با پنوموتوراکس	نیاز به جراحی	هموتوراکس همراه با مجده
زیربغل	۱۱ (٪۲۴)	۲ (٪۶)	۱ (٪۳)	۲ (٪۶)	۸ (٪۲۵)
بالای ترقوه	۲۵ (٪۳۶)	۳ (٪۴)	۲ (٪۳)	-	-
p-value	۰/۹۹	۰/۹۹	۰/۷۸	۰/۲۲	<۰/۰۱

بحث

تمام بیمارانی که با عالیم سندرم توراسیک اوت لت مراجعه می‌کنند، در ابتدا باید با درمان‌های غیرجراحی درمان شوند. تعداد زیادی از بیماران به این درمان جواب مثبت می‌دهند، ولی بعضی از بیماران به روش غیرجراحی جواب نداده یا دچار عوارض فشردگی مثل آتروفی عضلات دست شده و درد آنها باعث آزار بیماران می‌شود. باید توجه داشت که این بیماری ممکن است با بیماری‌هایی نظیر سندرم کارپال تونل، سندرم کوبیتال تونل، دیسک گردنی، التهاب تاندون‌های روتاتور کاف و بزرگی پستان‌ها اشتباه شود؛ بنابراین معاینه دقیق بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است. درصورتی که علت بیماری فشردگی روی شبکه بازویی باشد، باید بیمار کاندید برداشتن دنده اول و نورولیز باشد. درصورت انتخاب بیمار برای جراحی، باید از روشی با عارضه کمتر استفاده شود.

بررسی دو روش جراحی بالای ترقوه و زیربغلی نشان داد که عوارضی نظیر پنوموتوراکس، هموتوراکس، ضایعات عروقی، کوزالری ناحیه گردن در دو روش شیوه هم بود ولی عوارض حاصل از عمل جراحی روی شبکه بازویی در روش زیربغلی بیش از روش بالای ترقوه بود. عدم موفقیت جراحی در گروه زیربغلی در بررسی ما %۲۵ بود و علت آن عدم دسترسی و دشواری مشاهده شبکه عصبی و عروق ناحیه بالا و زیر ترقوه در هنگام عمل جراحی بود.

در روش بالای ترقوه، به علت دسترسی آسان‌تر و دید مستقیم جراح به شبکه بازویی، امکان توجه به انحراف دنده اول، احتمال بررسی فشردگی ریشه‌های عصبی توسط سر دنده اول، امکان دسترسی به چربی ناحیه جهت پوشش شبکه بازویی و جلوگیری از ایجاد نسج اسکار در اطراف شبکه بازویی، احتمال مشاهده باندهای غیرطبیعی فشار دهنده روی شبکه، برداشتن و نورولیز آنها و جلوگیری از عود بیماری آسان‌تر و بیشتر است. یافته‌های این مطالعه با نتایج تحقیقات انجام شده توسط «سیکریت»^۱ و همکاران، و «ویگل»^۲ و همکاران همچومنی دارد^(۲۰،۲۱). با وجود اینکه روش زیربغلی می‌تواند از نظر زیبایی

یک مورد که فلچ کامل داشت عمل جراحی مجدد را قبول نکرد و بعد از ۱۴ ماه، بهبودی نسبی از نظر حرکت شانه و خم کردن بازو بدست آورده ولی آتروفی عضلات ایتراؤسٹوس و لومبریکال باقی ماند.

در بین ۷ بیماری که به روش بالای ترقوه مورد جراحی مجدد قرار گرفتند، در یک بیمار سر دنده اول به شکلی انحراف داشت که باعث فشار روی روت T1 شده بود. در این بیمار طی جراحی اول از راه زیربغلی دنده اول برداشته شد ولی سر دنده در محل باقی ماند که باعث فشار روی روت T1 گردید. در جراحی دوم به روش بالای ترقوه، تمام دنده باقی مانده برداشته شد و قبه T1 نورولیز گردید. سه ماه بعد، بهبودی حاصل شد و فلچ و درد باقی مانده از بین رفت و قدرت دست در انجام کارهای روزانه بهتر شد.

در ۱ بیمار نسج فیروزه اطراف پلکسوس وجود داشت. همچنین تنہ C7 در حین عمل جراحی قبلی کاملاً از نخاع کنده شده بود که بعد از نورولیز شبکه قسمت دیستال روت C7 به صورت «انتها به کنار» با نخ ۱۰/۰ به روت C6 دوخته شد و حدوداً بعد از ۴ ماه، درد و بی‌حسی از بین رفت و بیمار رضایت کامل داشت.

در ۲ بیمار باند فیروزه از لبه زائد عرضی منشاء گرفته و باعث فشار روی تنہ بالایی شده بود که زائد عرضی همراه با باند چسبیده به آن برداشته شد، تنہ بالایی نورولیز شد و درد بیماران بعد از حدود ۲ ماه از بین رفت.

در ۱ بیمار قسمت دیستال دنده به طور کامل در جراحی اول برداشته نشد و بر روی شبکه بازویی فشار وارد می‌آورد که قسمت باقی مانده دنده اول برداشته و شبکه نورولیز شد. این بیمار بعد از حدود یک ماه، بهبود یافت.

در نهایت در ۲ بیمار، نسج فیروزه زیادی در اطراف شبکه بازویی قرار گرفته و باعث چسبندگی و فشردگی اعصاب شده بود. در این بیمار نسج فیروزه برداشته شد و نورولیز تمام شبکه به طور کامل انجام گردید. همچنین سعی شد روی اعصاب با چربی پوشش داده شود و تا از چسبندگی مجدد جلوگیری شود. دو ماه بعد از عمل، بیماران اظهار رضایت کردند.

1. Cikrit
2. Weigel

نتیجه گیری

در بررسی حاضر دریافتیم که از نظر عدم موفقیت بعد از جراحی، روش بالای ترقوه نسبت به روش زیربغلی ارجحیت دارد و علت آن دید مستقیم و دسترسی آسان جراح به شبکه بازویی در روش بالای ترقوه است.

برروش بالای ترقوه برتر باشد ولی باتوجه به نیاز به جراحی مجدد در این روش در مقایسه با روش بالای ترقوه، به نظر می‌رسد استفاده از روش جراحی بالای ترقوه برای درمان سندروم توراسیک اوغلت ارجحیت دارد.

References

- 1. Dellen AL.** Nerve Entrapment. In: Mathes S, Hentz VR (eds). Plastic Surgery. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 2005. pp 875-928.
- 2. Jones KJ.** Thoracic outlet compression syndrome. In: Green D, Hotchkiss R, Pederson W, Wolfe S (eds). Green's Operative Hand Surgery. 5th ed. Churchill Livingstone; 2005. pp 1047-73.
- 3. Lukanich JM.** Thoracic Outlet Syndrome. In: Townsend C, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL (eds). Sabiston Textbook of Surgery. Saunders; 2004. pp 1718-31.
- 4. Hayes CW.** Compression neuropathies in the upper limb. In: Thorne CH, Bartlett SP, Beasley RW, Aston SJ, Gurtner GC, eds. Grabb and Smith's Plastic Surgery. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 1997. pp 226-7.
- 5. Oates SD, Daley RA.** Thoracic outlet syndrome. *Hand Clin.* 1996;12(4):705-18.
- 6. Yavuzer S, Atinkaya C, Tokat O.** Clinical predictors of surgical outcome in patients with thoracic outlet syndrome operated on via transaxillary approach. *Eur J Cardiothorac Surg.* 2004;25(2):173-8.
- 7. Coote H.** Pressure on the axillary vessels and nerve by an exostosis from a cervical rib; interference with the circulation of the arm; removal of the rib and exostosis; recovery. *Med Times Gaz.* 1861;2:108.
- 8. Adson AW, Coffey JR.** Cervical rib: a method of anterior approach for relief of symptoms by division of the scalenus anticus. *Ann Surg.* 1927;85:839.
- 9. Clagett OT.** Presidential address: research and prosearch. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1962;44:153-66.
- 10. Roos DB.** Congenital anomalies associated with thoracic outlet syndrome. Anatomy, symptoms, diagnosis, and treatment. *Am J Surg.* 1976;32(6):771-8.
- 11. Horowitz SH.** Brachial plexus injuries with causalgia resulting from transaxillary rib resection. *Arch Surg.* 1985; 120(10):1189-91.
- 12. Qvarfordt PG, Ehrenfeld WK, Stoney RJ.** SuprACLAVICULAR radical scalenectomy and transaxillary first rib resection for the thoracic outlet syndrome. A combined approach. *Am J Surg.* 1984;148(1):111-6.
- 13. Cheng SW, Stoney RJ.** Supraclavicular reoperation for neurogenic thoracic outlet syndrome. *J Vasc Surg.* 1994;19(4):565-72.
- 14. Urschel HC Jr, Razzuk MA.** The failed operation for thoracic outlet syndrome: the difficulty of diagnosis and management. *Ann Thorac Surg.* 1986;42(5):523-8.
- 15. Mellière D, Becquemin JP, Etienne G, Le Cheviller B.** Severe injuries resulting from operations for thoracic outlet syndrome: can they be avoided? *J Cardiovasc Surg (Torino).* 1991;32(5):599-603.
- 16. Mellière D, Becquemin JP, Etienne G.** Complications of surgery of the thoraco-cervico-brachial outlets. *J Chir (Paris).* 1985;122(3):151-7. French.
- 17. Roos DB.** Recurrent thoracic outlet syndrome after first rib resection. *Acta Chir Belg.* 1980;79(5):363-72.
- 18. Degeorges R, Reynaud C, Becquemin JP.** Thoracic outlet syndrome surgery: long-term functional results. *Ann Vasc Surg.* 2004;18(5):558-65.
- 19. Brannon EW Jr, Wickstrom J.** Surgical approaches to neurovascular compression syndromes of the neck. *Clin Orthop Relat Res.* 1967;51:65-70
- 20. Cikrit DF, Haefner R, Nichols WK, Silver D.** Transaxillary or supraclavicular decompression for the thoracic outlet syndrome. A comparison of the risks and benefits. *Am Surg.* 1989;55(6):347-52.
- 21. Weigel G, Schmidt M, Gradl B, Girsch W.** TOS-surgery via a single supraclavicular incision. *Acta Neurochir Suppl.* 2007;100:141-3.